

# تعلیم القلبیہ

## معالجات امراض نسوان

مع تصاویر اعضائے متالہ و آلات مستعملہ

جس کو  
سب سے پہلے علی القابری رستوئے زمان افلاطون دوران اشرف الحکماء افسر الاطباء  
حاذق الملک حکیم حافظ محمد اجمل خان صاحب ام اقبالہ رئیس غظم دہلی  
قاوم الاطباء خاکسار حکیم سید محمد عبدالرزاق ابن حکیم سید محمد غوث شید علی صاحب حوم  
چاند پوری مدرس تشریح مدرسہ طبیبہ دہلی و کچھ رطب نانی مدرسہ طبیبہ مانہ

نے

اہل ملک کی خدمت کیلئے عموماً اور طبالبات العلم مدرسہ طبیبہ مانہ کی تعلیم کیلئے خصوصاً تالیف کیا  
چند برقی پریس دہلی میں ۱۹۳۷ء میں طبع ہوئی

قیمت پچ

دم ایک ہزار



کتاب خانہ طبیب | Facebook

# کلیات طب

حکیم احسان علی قادری پروفیسر کلیات و معالجات طبیہ کالج دہلی  
یہ کتاب شیخ بوعلی بن سینا کی تصنیف اعظم کلیات قانون کا ترجمہ ہے۔ اس میں چند خوبیاں ہیں۔  
(۱) علم طب کے تمام مسائل کلیات کا مشرح بیان ہے (۲) مشکل مضامین کو آسان اردو میں اس طرح بیان کیا ہے  
کہ اردو داں حضرات بھی بخوبی سمجھ سکیں (۳) اصول علاج کے رموز و نکات کو خوب واضح کیا گیا ہے (۴) بعض  
وقار و ورہ کی علامات نہایت بسط و شرح سے لکھی گئی ہیں (۵) طب قدیم و جدید کے اختلافی مسائل کا فیصلہ مسلمات  
اور بدیہات سے کیا گیا ہے (۶) عالیجناب شیخ الملک ثانی حکیم محمد احمد خاں صاحب ام القیام نے پسند فرما کر  
طبیہ کالج دہلی کے نصاب میں داخل فرمایا ہے۔ قیمت فی جلد ۵۰

## معمولات مطب محمود خانی

مرتبہ حکیم احسان علی قادری پروفیسر طبیہ کالج دہلی  
اس کتاب میں وہ نسخے ترتیب کیساتھ جمع کئے ہیں جن پر خاندان شریفی کے اکابر حکماء کا برسوں عمل و رائے ہے  
اور جن کے نتائج اکثر یہ منیذ ثابت ہوئے ہیں  
حکیم محمود خاں اعظم عاذق الملک حکیم عبد المجیب خاں جالینوس وقت حکیم واصل خاں شیخ الملک حکیم  
محمد جمال خاں صاحب کے مطب میں انہیں معمولات سے علاج معالجہ کیا جاتا رہا ہے۔ اور ان حضرات کے جانشین  
عالیجناب شیخ الملک ثانی حکیم محمد احمد خاں و رئیس الحکماء حکیم محمد ظفر خاں دام القیام کے مطب میں انہیں معمولات  
ہزاروں ہندوگان خدا صحتیاب ہوئے ہیں۔

ان معمولات سے نئے معالجوں کو علاج کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے اور پرانے معالجوں کو بصیرت حاصل ہوتی ہے  
یہ معمولات شیخ الملک ثانی و رئیس الحکماء حکیم محمد ظفر خاں صاحب دام القیام کے مصدقہ ہیں، اور طبیہ  
کالج دہلی کے نصاب میں داخل ہیں۔ قیمت فی جلد دس آنہ۔

## تشریح اعضا بنسوان

مصنفہ حکیمہ سید عبدالرزاق صاحب مرحوم مصنف تعلیم القابہ معالجات امراض نسوان  
یہ دو فوں کتابیں شیخ الملک حکیم محمد جمال خاں مرحوم کی مصدقہ ہیں، زنانہ طبیہ کالج دہلی کے نصاب میں داخل ہیں  
قیمت تشریح اعضا بنسوان ۵۰ قیمت تعلیم القابہ معالجات امراض نسوان ۵۰

ان چاروں کتابوں کے لئے کا پتہ کامیاب علاج متصل جامع مسجد دہلی

دیگر تہہ = دفتر دارالتالیفات۔ اہل روڈ قریب بلغ دہلی۔ دفتر اجمل مسگرہن طبیہ کالج قریب بلغ دہلی۔

# فہرست مضامین کتاب ہذا

صفحہ	مضمون	صفحہ
۴۰	سلقۃ الفرج	۵
۴۲	سلقۃ الاحلیل	۸
۴۳	الفرج	۱۲
۴۵	انشقاق الفرج	۱۴
۴۹	انصاف الشفرین	۱۸
۵۰	اجتماع الدم	۲۱
۵۱	فتق	۲۲
۵۳	فرسیمیوس	۲۳
۵۵	عظم البطر	۲۳
۵۷	صدابت غشای البکارت	۲۴
۵۸	انفلاق الفرج	۲۵
۶۱	استرخار المہبل	۲۷
۶۱۷	تضیق المہبل	۲۹
۶۴	رتق	۳۲
۶۸	التهاب المہبل	۳۷
	بین العظام	
	توجاج العظام اور بین العظام کی علل و آثار	
	یم الغشای العظمی	
	سلع العظام	
	انکسار بعض	
	تبع العصب	
	المفاصل	
	بر لینی	
	عظم	
	ملاع صرف و انخلاع انکساری کی علل و آثار	
	بلقۃ الفرج	
	لیم الفرج	
	یر الفرج	





صفحة	مضمون	صفحة	مضمون
٣٢٤	قرص قاذف	٢٤٥	سلعة الرحم
٣٢٨	ناكل قاذف	٢٨١	التهاب الصفاق الرحمي
٣٣٠	سلعة قاذف	٢٨٦	سور مزاج رحم
٣٣١	ورم مثانة	٢٨٤	ضعف الرحم
٣٣٢	قروح مثانة ومجرى بول	٥	عظم رحم
٣٣٥	احتباس بول	٢٨٩	وجع خصيته الرحم
٣٣٩	حرقته البول	٢٩٣	ورم خصية الرحم
٣٣١	سلس البول	٢٩٩	قروح خصية الرحم
٣٣٣	بول في الفراس	٣٠٠	غشاء كاذب خصية الرحم
٣٣٣	حصاة مثانة وكلية	٣٠٢	صغر خصية الرحم
٣٤٤	ورم معار مستقيم	٣١٣	خروج خصية الرحم
٣٤٤	خراج المعار الوركي	٣٠٥	سلعة خصية الرحم
٣٤٨	قرحة معار مستقيم	٣٠٩	استسقاء خصية الرحم
٣٤٠	ناسور معار مستقيم	٣١٧	سلعة وموى غانة
٣٤١	تضييق معار مستقيم	٣١٨	التهاب مجاورات رحم
٣٤٣	النسار معار مستقيم	٣٢٢	وباء غانية
٣٤٦	خروج معار مستقيم	٣٢٣	النسار قاذف
٣٤٦	وبيدان معار مستقيم	٣٢٦	الشفاق قاذف

صفحه	مضمون	صفحه	مضمون
۳۱۱	احتباس لبن	۳۷۹	ورم مقعد
۳۱۳	تجبن لبن	۳۸۱	قرصه مقعد
۳۱۴	سلعه مجاری لبن	۳۸۱	نواسیر
۳۱۵	رض الشدی	۳۸۵	تضیق مقعد
۳۱۷	وجع الشدی	۳۸۶	انسداد مقعد
۳۱۹	حکة شدی	۳۸۶	انشقاق مقعد
۳۲۱	ورم شدی	۳۸۸	استرخار مقعد
۳۲۵	دبلیه شدی	۳۸۸	خروج مقعد
۳۲۷	سرطان الشدی	۳۹۰	حکة المقعد
۳۳۰	قرصه شدی	۳۹۱	بواسیر
۳۳۲	ناسور سدی	۴۰۰	عظم شدی
۳۳۴	سلعه الشدی	۴۰۳	استرخار شدی
۳۳۶	خنازیر شدی	۴۰۴	فساد لبن
۳۳۷	جراحت حلمة الشدی	۴۰۷	کثرت لبن
۳۳۹	ورم حلمة الشدی	۴۰۸	قلت لبن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ  
 وَصَلَّى عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

# سبب تالیف کتاب

فن طب کے علمی اور عملی حصوں پر بہت سی مفید کتابیں موجود ہیں جو بعض یونانی اطباء اور ڈاکٹر صاحبان میں سے تالیف پیشہ صحابے بغرض رفاه عام و اشاعت تعلیم اردو زبان میں تالیف کی ہیں۔ اسی کتابیں جہاں تک میری نظر سے گزری ہیں (خواہ یونانی طب کی ہوں یا ڈاکٹری کی) ان کی تالیف میں ایک ایک خاص طریقہ ملحوظ رکھا گیا ہے چنانچہ اگر آپ یونانی اطباء کی اردو تالیفات کا مطالعہ کریں تو ان میں سے اکثر کتابیں اسی پائیں گے جن میں طبی مصطلحات کا محض ترجمہ ہی استعمال کیا گیا ہے تاکہ عام لوگوں کو ان سے نفع اٹھانے میں کسی خاص فن دان کی ضرورت باقی نہ رہے۔ لیکن ان میں الفاظ مصطلحہ کے موجود نہ ہونے کے باعث ان کو پڑھنے والے صحابہ طبی مصطلحات سے بالکل بے بہرہ رہتے ہیں۔ اور ان کے ذریعہ سے اردو زبان میں طبی تعلیم کی اشاعت نہایت حال کی ضرورتوں کی موافق نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹری طب کی کتابیں جو بغرض اشاعت تعلیم اردو زبان میں تالیف کی گئی ہیں۔ ان میں اکثر ڈاکٹری مصطلحات بلا ترجمہ کے استعمال کئے گئے ہیں۔ یا بہت کم الفاظ کا ترجمہ حسب موقع تلاش کرنے سے ان میں کہیں کہیں مل جاتا ہے اس لئے عام لوگ ان سے منتفع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جو کتابیں بغرض رفاه عام تالیف کی گئی ہیں وہ مصطلحات فن سے بالکل خالی ہیں۔ ان کے پڑھنے والے عام صحابہ مصطلحات فن سے بالکل بیخبر رہتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اس قسم کی تالیفات نے ملک کو ایک حد تک بہت کچھ فائدہ پہنچایا ہے جس کے لئے اہل ملک کو ان مقتدر مؤلفین کا شکر گزار ہونا چاہئے لیکن جس طرح کہ عام اردو خوان احباب کو طبی نانی اور ڈاکٹری کے مفید ذخیروں سے نفع اٹھانے کی ضرورت تھی۔ اور ان دونوں فنوں کو عوام

کے دلوں میں اپنا ذاتی اقتدار بڑھانے کی احتیاج تھی۔ اسی طرح ایک یہ بھی مفید مقصد تھا کہ دیسی اطباء  
 ڈاکٹری مصطلحات واقف ہوں اور ان کے علمی و عملی اصول سے کافی آگاہی حاصل کریں اور ڈاکٹروں  
 کو دیسی طب کے مصطلحات سے واقفیت پیدا کرنا اور ان کے قواعد سے مطلع ہونا از بس ضروری ہے۔ کیونکہ  
 اگر ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک گروہ دوسرے فن کے مصطلحات سے بقدر ضرورت واقف  
 ہو جائے تو مسائل متفقہ کے علم سے باہمی مغائرت اور منافرت کی بیج کنی ہو کر ہر ایک فن کے دل میں  
 دوسری کی وقعت پیدا ہوتی ہے۔ اور مختلفہ مسائل کی معلومات سے ہر ایک فن کو باہمی تبادلہ خیالات نہایت اچھا نتیجہ دے سکتا ہے  
 ظاہر ہے کہ یہ دوسرا اہم مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ فن طب کے علمی اور عملی حصوں پر ایسی  
 کتابیں تالیف کی جائیں جن میں طبیعاتی اور ڈاکٹری کے مصطلحات ہر موقع پر برابر پہلو بہ پہلو مندرج ہوں  
 اور انکار و توجہ بھی اپنے اپنے موقع پر موجود ہوتا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک اپنی مصطلحات  
 کے ساتھ طبعمانوس ہونیکے باعث دوسرے فرق کے مصطلحات سے بخوبی واقف ہو کر ہر فن کے  
 ہر مسئلہ کو باسانی سمجھ سکے اور اس فن کے حسن و قبح پر اپنی رائے استحکام کے ساتھ قائم کر سکے۔

اس لئے میں نے حسب الایما، علی الجناب، عازق الملک حکیم محمد اجمل خان صاحب  
 دام اقبالہم اس کتاب کو زمانہ طبیبہ سکول دہلی کے تعلیمی کورس میں داخل کرنے کی توفیق حاصل کیا  
 اور بقدر اپنی معلومات کے حتی الامکان اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ ضروری موقع پر طب یونانی کے  
 مصطلح الفاظ کے بالمقابل فن ڈاکٹری کے انگریزی یا لاطینی الفاظ کو برکیٹ میں لکھ کر ان کا اردو ترجمہ  
 یا مطلب ہر کر دیا جائے تاکہ طبیوں کو ڈاکٹری مصطلحات کا سمجھنا آسان ہو جائے اور ڈاکٹروں پر  
 یونانی اصطلاحات واضح ہو جائیں اور ڈاکٹر صاحبان اپنی مصطلحات کے بالمقابل عربی اصطلاحات  
 و جھکڑ طب قدیم کے متعلق اپنی غلط فہمی کو دور کر کے طبی ذخائر سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اسکے علاوہ  
 عام شائق فن احباب بھی اس کتاب کی صرف اردو عبارت سے اپنی ضرورت کی موافق فائدہ  
 اٹھا سکتے ہیں۔ بوجہ مذکورہ بالا میں امید کرتا ہوں کہ طبیب، وید، ڈاکٹر اور عام شائقین میری اس  
 حقیر تالیف کو اپنا سچا ہی خواہ سمجھ کر ٹھنڈے دل سے مطالعہ فرمائیں گے اور مجھے دعائے خیر سے  
 محروم نہ رکھیں گے۔

## تہذیب

اب میں خداوند کریم کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے تعلیم القابلہ کے حصہ اول موسوم بہ تشریح اعضاء نسواں سے فارغ ہو کر معالجات امراض نسواں کو شروع کرتا ہوں۔ اس حصہ میں امراض مختصہ نسواں میں سے صرف اُن امراض کا بیان بالتفصیل کیا جائیگا جن کا علاج اکثر استعمال ادویہ سے کیا جاتا ہے۔ اور اُن کے علاج میں کسی دستکاری کی چنداں ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اُن امراض کے علاوہ بعض امراض متعلقہ اعمال جراحی کا بیان بھی صرف اس قدر کیا جائیگا جس سے قابلہ کو اُن کے مختصر حالات کا علم بقدر کافی ہو جائے یا اُن امراض کے علاج میں حسب موقع اگر استعمال ادویہ کی ضرورت پڑے تو اسپر بھی قابلہ پورے طور سے قادر ہو سکے۔ اور ان امراض کا علاج کرانے میں فرقہ نسواں کو عام اطباء اور ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرنیکی شدید ضرورت باقی نہ رہے۔ بلکہ فرقہ نسواں میں بجائے خود ایک ایسی تعلیم یافتہ جماعت اہل ملک کی جتنی خدمات کے لئے تیار ہو جائے جو مستورات کے پوشیدہ اعضائے حالات اور ان کے امراض کا علاج نہایت قابلیت اور ہوشیاری کے ساتھ باقاعدہ کر سکے :

چونکہ اس کتاب کی تالیف کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس سے فرقہ نسواں کو خصوصیت کے ساتھ نفع پہنچایا جائے۔ اور ان کے امراض مخصوصہ کا مفصل بیان مع طریقہ تشخیص اور علاج کے اس کتاب میں لکھا جائے۔ اس لئے جہاں تک ممکن تھا میں نے اس کتاب کے مضامین کو ایسی مناسبت طریقہ سے بیان کیا ہے کہ کسی کو اُن کے پڑھنے میں زیادہ تکلیف یا کسی قسم کا حجاب نہ ہو سکے۔ کیونکہ جس طرح مبتلائے مرض مستورات کے درماندہ مصیبت زدہ اور قابل رحم فرقہ کی بحالت مرض مداوا کرنا اور تشخیص مرض کے لئے اُن کے پوشیدہ حالات کا معلوم کرنا ایک حد تک ضروری ہے۔ اسی طرح ایسے حالات کے بیان کرنے میں بھی اپنے ملک اور مذہب کی نیک رسم پروردہ واری اور حیا کا پورے طور پر لحاظ رکھنا۔ تہذیب اخلاق اور شائستگی کیلئے نہایت لابدی ہے۔ اسی بنا پر مل مید کر سکتا ہوں کہ فرین طب کی طالبات لعلم جماعت کے علاوہ دیگر تعلیم یافتہ مستورات بھی اس کتاب کے مطالعہ سے بلا تامل فائدہ اٹھا سکیں گی :

میں نے اس کتاب کے مضامین کو چار مقالوں پر تقسیم کر کے لکھا ہے چنانچہ پہلے مقالہ میں زنانہ جوف عانہ کی ٹڈیوں کے اُن امراض کا بیان ہے جن سے وضع حمل میں دشواری یا زنانہ اعضا و تناسل کے افعال میں کوئی خرابی واقع ہو سکتی ہے۔

دوسرے مقالہ میں بیرونی اعضا و تناسل زنانہ کے امراض کا مفصل اور مشروح بیان ہے۔ تیسرے مقالہ میں اندرونی اعضا و تناسل کے امراض کا مشروح بیان ہے۔ اس مقالہ میں چار باب ہیں۔ باب اول میں اندام نہانی کے امراض۔ باب دوم میں امراض رحم۔ باب سوم میں امراض خبیثہ الرحم وغیرہ کا بیان ہے۔ باب چہارم میں بعض امراض مثانہ اور مجاری مستقیمہ کا علاج درج کیا گیا ہے۔ چوتھے مقالہ میں امراض پستان کا بیان ہے۔

کتاب ہذا کے مضامین کا اصلی ماخذ تو یونانی طب کی فقیر اور مضبوط کتابیں ہیں۔ لیکن اس میں بعض مضامین مفیدہ کا اضافہ کرنے یا ڈاکٹری طب کے بیانات سے مقابلہ کر کے دکھانے کے لئے حکیم شفاء الدولہ مرحوم کی کتاب رجائع شفاء سے اور ڈاکٹر جیم خاں صاحب مرحوم کی بعض تصانیف سے کافی امداد لی گئی ہے۔

آب میں اس تمہید کے بعد عالیجناب حضرت استاذی حاذق الملک دام اقبالہم کے الطاف مرتبہ پر اس احسانمندی اور شکرگزاری کا اظہار کئے بدون اپنے کلام کو ختم نہیں کر سکتا جسے میں بحیثیت ایک ادنیٰ تلمیذ ہونیکے اپنے دل میں جاگزین پاتا ہوں۔ کیونکہ جناب محدوس نے اس کتاب کی تالیف میں مجھے کمال شفقت سے ترغیب اور تاکید فرمائی نہایت مہربانی اور رعایت لطف سے اعانت و امداد کی۔ بے انتہا بندہ نوازی سے مجھے کتب خاص کی بعض عدیم النظیر کتابوں کے مطالعہ کی اجازت عطا فرمائی۔ اور ہر طرح سے اپنے اظہار خیالات اور طبی خدمات کے ادا کرنے کا موقع دیا۔

خاکستر  
محمد عبدالرزاق عفی عنہ  
مدرس مدرسہ طبیبہ دہلی

مئی ۱۹۱۷ء  
مقام دہلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# DISEASES OF THE FEMALE ORGANS

## تعلیم القابہ

### معالجات امراض مختصہ نسوان

اس حصہ کے چار مقالوں میں سے پہلے مقالہ میں ہڈیوں کے امراض میں سے ان امراض کا بیان لکھا جائے گا جن کے سبب زنانہ خوف عانہ (پلوس) میں کسی قسم کی بد صورتی پیدا ہو کر وضع حمل میں دشواری پیدا کر سکتی ہے یا یہ کہا جائے کہ ان امراض کے باعث زنانہ اعضائے تناسل کے فعل میں کوئی خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ (۱) ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا (۲) ہڈیوں کا نرم ہو جانا (۳) ہڈیوں کے گرد والی جھلی میں ورم ہو جانا (۴) ہڈیوں میں گوٹریاں پیدا ہو جانا (۵) خوف عانہ کی ہڈیاں ٹوٹ کر خراب ہو جانا (۶) بعض جوڑوں کا سخت ہو جانا (۷) کسی ہڈی کا اپنے جوڑے کے مقام سے اٹھ جانا وغیرہ وغیرہ۔

### DISEASES OF THE BONES AND JOINTS.

## پہلا مقالہ

### امراض استخوان و مفصل

اس مقالہ میں تفصیل ہیں اور ان میں ہر ایک مرض کا مفصل بیان مع اسباب و علامات و علاج کے جدا گانہ درج کیا گیا ہے۔

پہلی فصل اَرْعُوجَا حُجَّ الْعِظَامِ درمی کیٹس، یعنی ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا۔ یہ مرض بعض بچوں کو اکثر


چھ مہینے کی عمر سے ڈیڑھ سال کی عمر تک شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اطباء کا خیال ہے کہ کبھی ابتداء سے پیدائش میں ہی رحم کے اندر شروع ہو جاتا ہے اور بعض بچوں کو اس عمر میں شروع ہوتا ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ اور بارہ برس کی عمر تک بچہ اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔

اس مرض میں ابتداء ہی سے ہڈیوں کا نشوونما پورے طور پر نہ ہو سکنے کے سبب وہ چھوٹی رہ جاتی ہیں ہڈیوں کی ساخت میں بعض معدنی اجزاء کم ہو جانے کے سبب وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور انہیں دیگر اعضاء کا بوجھ باریک دیکھنے سے یا عضلات کی معمولی کشش سے وہ رفتہ رفتہ طبعی ہو جاتی ہیں۔

ایسے بچوں کے عضلات کی پرورش بھی پورے طور سے نہیں ہونے پاتی ہے۔ اسلئے وہ تندرست بچوں کی طرح بخوبی چل پھر نہیں سکتے ہیں۔ بلکہ اکثر اوقات لیٹے اور بیٹھے رہتے ہیں۔ اسلئے بدن کے بالائی حصوں کا بوجھ بہ نسبت حالت صحت کے جو ف عائدہ رپوس کی نرم ہڈیوں پر زیادہ پڑتا ہے۔

اور بدن کے نچلے حصے کی ہڈیوں (عظم الفخذ وغیرہ) کا ویا و جوان پر بذریعہ حق الورک (رے سی ٹیو) کے پڑنا چاہئے وہ بہت کم پڑتا ہے یا بالکل نہیں پڑتا اس لئے جو ف عائدہ کی اصلی صورت میں کسی طرح کا خلل پڑ جاتا ہے چنانچہ ان ہڈیوں کی خرابی سے اکثر جو ف عائدہ کا قطر قطن القداحی

التخلیفی (رائی روپوشی ری اڈو ایسٹر) یعنی سامنے سے پیچھے والا قطر چھوٹا ہو جاتا ہے یا جو ف عائدہ ہر طرف سے تنگ یا کسی طرف کو ٹیڑھا ہو جاتا ہے پھر جب مرض مذکور کی کیفیت ر بطور خود یا علاج سے رفتہ رفتہ زائل ہونے لگتی ہے۔ اور تمام ہڈیوں کی ساخت میں اسے ستخوانی درشت مادہ پیدا ہو کر ان میں سختی پیدا ہو جاتی ہے تو اکثر اس قسم کی بد صورتیاں مدۃ العمر قائم رہتی ہیں۔



- (۱) فقرہ قطنیہ۔  
(۲) رے سی ٹیو فقریہ سائنس کو جھکا ہوا۔  
(۳) عظم الفخذ طبعی ہوئی ہے۔  
(۴) حق الورک۔  
(۵) رے فخذ عائدہ پیچھے کو جھکا ہوا۔  
(۶) ثقبہ سادہ۔  
(۷) رے مدخل شکل ۸ ہندسہ آٹھ انگریزی

اس لئے ہمیں لازم ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اسکے تمام حالات کو غور سے دیکھا کریں۔ اور اس بار میں ہرگز



غفلت نہ کریں تاکہ اگر کوئی مرض ابتداءً پیدائش ہی میں اُسے ہو گیا ہے تو اس مرض کے اسباب تلاش کر نیک خیال دل میں پیدا ہو۔ اور علاماتِ مشخصہ کے ذریعہ سے مرض کو تشخیص کر کے بہت جلد اس کے علاج کی طرف توجہ کی جائے۔ کیونکہ اول تو پیدائشی امراض کا زائل ہونا ہی سخت دشوار بلکہ غیر ممکن ہوتا ہے۔ دوسرے یہ بات کہ ہر مرض کے شروع ہونے سے جس قدر مدت کے بعد علاج شروع کیا جاتا ہے اسی قدر دیر میں جاتا ہے۔ اور بدن میں اس کی خرابیاں قائم اور دیر پا ہو جاتی ہیں۔

**اسباب (۱)** اکثر یہ مرض موروثی ہوتا ہے (۲) مزاج میں خنازیری استعداد ہونی یا خنازیکا موجود ہونا (۳) بچے کی ماں کو بحالتِ حمل عمدہ غذائیں نہ ملنا۔ اور بچے کی پیدائشی کمزوری (۴) تنگ تالیک مکان میں بچے کو زیادہ رکھنا جس سے تازہ ہوا اور مناسب روشنی اسے حسب ضرورت نہ پہنچ سکے (۵) مکان کی ہوا غلیظ اور مرطوب ہونا (۶) جو دودھ بچے کو پلایا جائے وہ خراب ہونا (۷) شیر خوار بچے کو اگر بجائے ماں کے دودھ کے دوسری غذادی جائے۔ جسے وہ بخوبی ہضم نہ کر سکے تو ایسی حالت میں اول بچہ کمزور ہو جاتا ہے پھر وہ اکثر اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

**علامات** ناکثر بچہ دبلا اور کمزور ہوتا ہے (۲) ہضم خراب رہتا ہے (۳) رات کو اکثر بچہ نہ ہوتا ہے (۴) شروع مرض میں رات کو سوتے وقت سر اور چہرہ پر پسینہ بکثرت آتا ہے (۵) بدنی پرورش پورے طور پر نہ ہو سکے کے سبب بچے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے (۶) دانت دیر میں نکلتے ہیں (۷) ہڈیاں نرم ہو کر بد صورت ہو جاتی ہیں (۸) بدن کی لمبی ہڈیاں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں (۹) سینہ سانے کو اور پشت پیچھے کو نکل جاتی ہے (۱۰) سر بڑا اور بے ڈول معلوم ہونے لگتا ہے۔

**علاج** مریض کو روشن اور ہوادار مکان میں رکھیں۔ بیرونی ہوا کی سردی سے بچائیں۔ سانس اور آرام کے ساتھ ہوا خوری کرائیں لیکن اسے چلنے پھرنے نہ دیں۔ ہر روز نیم گرم پانی سے غسل کرائیں اگر ماں کے دودھ کی خرابی سے مرض لاحق ہوا ہو تو دودھ کی اصلاح کریں یا دایہ کا دودھ پلائیں۔ اگر گائے کا دودھ پلایا جائے تو چونے کے پانی سے اسکی اصلاح کر لیں۔ گدھی کا دودھ بھی اس مرض میں بہت فائدہ کرتا ہے اگر نیمچہ دودھ کے سوا کوئی دوسری غذا بھی کھاتا ہو تو بخوبی میں نرم کھچڑی یا نرم پلاؤ پکا کر کھلائیں گیہوں کا دلیا اور دودھ چاول یا فرنی بھی مناسب غذا ہے۔

چونکہ اس مرض کا اصلی سبب ہر کہ خون میں لمغی رطوبت کے زیادہ ہوجانے سے غل پرورش

بدنی کے قابل نہیں رہتا ہے اور اس میں ذاتی متانت اور قوت رقیل اجزاء کی طبعی نسبت معمول سے بہت کم ہو جاتی ہے اس لئے ہر طرح سے خون کی اصلاح کا خیال رکھیں۔ اگر ماں کے علاج کی ضرورت محسوس ہو تو اسے مصفیات خون اور مقوی دوائیں چند روز تک پلائیں۔ اس غرض کے لئے بہ نسخہ بہت مفید ہے۔ صفتہ شاہترہ چرائنتہ برادہ صندل سرخ برادہ شیشم ہر ایک ۷ ماشہ اسطوخودوس۔ بادرنجبویہ۔ بادیان ہر ایک ۵ ماشہ پچھان مید۔ عود صلیب ہر ایک ۳ ماشہ شب کو شام کے وقت گرم پانی میں تر کریں۔ اور صبح کو چھان کر شربت عتاب ۴ تولہ حل کر کے پلائیں۔ اسی میں سے دو چمچے دوا بچے کو بھی پلا دیا کریں۔ اگر موسم سردی کا ہو تو اسی دوا میں دوبارہ پانی ڈال کر رکھ دیں اور شام کو قریب چار بجے کے جوش دیکر چھان لیں۔ اور ۲ تولہ مصری ملا کر پلائیں۔ رات کو سوتے وقت اطر لفل شاہترہ ۷ ماشہ کھلانا مفید ہے۔

نسخہ بلغم مصفی خون

اگر بچے کو ماں کا دودھ نہ دیا جاتا ہو یا اس کے دودھ میں خرابی ہو۔ اور صرف بچہ کے علاج کی ضرورت سمجھی جائے تو اس کے لئے یہ نسخہ شربت کا بہت مفید ہے۔ صفتہ تراشہ چوبھنی ۵ تولہ شاہترہ۔ چرائنتہ۔ برگ خلد برادہ شیشم۔ منڈی ہر ایک ۲ تولہ جنطیانہ۔ بوزیدان۔ بادرنجبویہ۔ گل سسج سنار کی ہر ایک ۳ تولہ سب کو ڈیڑھ سیر پانی میں ۲ گھنٹے تک تر رکھیں اس کے بعد نرم آنچ سے استفد پکائیں کہ چارہم حصہ پانی باقی رہ جائے پھر مل چھان کر اس میں ایک سیر دی کھانڈا کر شربت کا توام کریں۔ ایک سال تک عمر والے بچے کو یہ شربت ۷ ماشہ ہمراہ عرق گاوزبان ۲ تولہ کے ایک سال سے تین سال کی عمر والے کو ۹ ماشہ شربت ہمراہ عرق بادیان ۲ تولہ عرق گاوزبان ۲ تولہ کے پلائیں ۳ سال سے ۵ سال تک کی عمر والے کو ایک تولہ شربت ہمراہ عرق بادیان ۵ تولہ کے دیا جائے۔ اگر یہ شربت بچے کو گرمی کرے تو انکی اصلاح کسی ٹھنڈی دوا سے کرنی چاہئے۔

شربت چوبھنی

اس کے علاوہ مچھلی کا تیل (کاڈلیورائل) دودھ میں ملا کر پلانا بھی مفید ہے اور روغن گل خا کی ماش سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ صفتہ گل خا تازہ کوٹ کر اسکا عرق نکالیں۔ اگر یہ عرق ایک تولہ ہو تو اس میں ۵ تولہ تل کا تیل ملا کر نرم آنچ سے پکائیں جب عرق جل کر صرف تیل باقی رہ جائے اسے صاف کر کے شیشی میں رکھیں۔

روغن خا

فصل دوسری۔ لین العظام راستی او مے لے سی آ یعنی ہڈیوں کا نرم ہو جانا۔ یہ مرض اکثر


مستورات کو زمانہ حمل میں لاحق ہوتا ہے۔ اس میں ہڈیاں نہایت نرم۔ نازک اور ہلکی ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ تھوڑے صدمے سے ٹوٹ سکتی ہیں۔ اور بعض اوقات صرف عضلات کی معمولی کشش کے باعث ہڈیاں کئی جگہ سے ہلاکسی چوٹ کے خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں۔ کیونکہ ہڈیوں کو سخت اور مضبوط کر کے والے اجزاء ان کی ساخت میں سے معدوم ہو جاتے ہیں، رطوبت بڑھ جاتی ہے اور انہیں چربی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ عموماً یہ مرض بتدریج بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ چند روز میں ہڈیاں اس قدر نرم ہو جاتی ہیں کہ چاقو سے تراشی جاسکیں۔ اس حالت میں ہڈیوں کے گرد کی جھلی کسی قدر دبیر نرم اور نرم ہو جاتی ہے اور ان کے اندر سیاہ رنگ کا عرق بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ کبھی یہ مرض اس قدر ترقی پاتا ہے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی ایک حد تک ترقی کر نیکے بعد مرض ایک حالت پر ٹھہر جاتا ہے۔ اور جو ہڈیاں اس میں مبتلا ہو چکی ہیں صرف وہی ایک غیر طبعی صورت پر سخت ہو کر رہ جاتی ہیں۔

اکثر حاملہ عورتوں کے عموماً الفقرا (اسپائی نل کالم) اور جوف عانہ رپلوس کی ہڈیاں اس میں مبتلا ہوتی ہیں پہلی مرتبہ حمل میں تو یہ مرض بہت ہی کم لاحق ہوتا ہے لیکن کئی بچے پیدا ہونے کے بعد بعض عورتیں بحالت حمل اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور بعض عورتوں کو ہر مرتبہ کے حمل میں یہ مرض عود کرتا ہے پھر وضع حمل کے بعد خود بخود یا کسی علاج سے زائل ہو جاتا ہے۔ اگر وضع حمل کے بعد ہڈیوں میں نرمی موجود ہوتی ہے تو اگرچہ عورت کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی لیکن جوف عانہ کی ہڈیوں کے ٹوٹ جانے کا بہت خوف رہتا ہے۔ اور اگر مرض میں مبتلا ہونیکے بعد جوف عانہ کی ہڈیاں بد صورت ہو کر اسی طرح سخت ہو جاتی ہیں تو عورت کو وضع حمل کے وقت نہایت تکلیف ہوتی ہے :

یاور کھو کہ اس مرض پر جوف عانہ کی بد صورتی دو طرح پیدا ہوتی ہے (۱) چونکہ بدن بالائی حصوں کا بوجھ عظم العجز (سیکر) کے قاعدے کو نیچے کی طرف دیتا ہے اور عضلات العجان (بیس فی ال سکر) اور سنا طات العجز (الورکیتہ) (سیکر و سناٹک لگائٹس) اسکی نوک کو سامنے کی طرف کھینچتے ہیں اس لیے عظم العجز کا قاعدہ اور اسکی نوک ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہیں۔ اور اسکا درمیانی حصہ پیچھے کو ہٹ جانے کے سبب اسکا سامنے والا سطح زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ اس طرح پر شفقہ عانہ رپلوک برم قطر القد امی مختلف رکاوٹیں گھٹ بہت ہی تنگ ہو جاتا ہے اور جوف عانہ کی شکل خراب ہو جاتی ہے :

۱۔ اس سے معلوم ہو کہ اصول طب پر زمانہ کے مطابق اسے ریح افرا سہ اور تحب ظہر کے قبیلہ سے شمار کرنا چاہئے ۱۲ مؤلف۔


رویکھو تصویر نمبر ۱۰ جوف عانہ کی خرابی



- (۱) فقرات القطن  
(۲) زوایہ خمیریہ فقریہ معمولی  
(۳) بحالت مرض  
(۴) فقر العجز بحالت مرض  
(۵) بحالت صحت  
(۶) عظم العانہ کا سطح مفصلی  
(۷) عظم الخصر  
(۸) عظم النقص  
(۹) کی نوک بحالت صحت  
(۱۰) کی نوک بحالت مرض

(۲) عظم الفخذ (فیمبرون) اپنی ران کی ہڈی کا بالائی گول سر دونوں طرف سے جوف عانہ دپوس کی ہڈیوں کے اس حصہ کو اندر کی طرف دباتا ہے جس سے الوردک (اسے ٹی بیولم) واقع ہے اسلئے شفتہ العانہ (پلوک برم) کے دونوں ترچھے قطر تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور عظم العانہ (اس پلوک) کے پہلو بھی اندر کو دیکر ایک دوسرے کے قریب آکر وہ دونوں متوازی ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں جوف عانہ کا آگے کی ترچھے والا قطر کا بوجھ گیسٹ بھی اپنے معمول سے بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ اور دونوں جانب کے جفتہ باور کیہ (اسکی ال ٹوبر اسٹینز) ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس لئے جوف عانہ کا دروازہ خروج بھی شل دروازہ دخول کے بد صورت (تنگ) ہو جاتا ہے :

رویکھو تصویر نمبر ۱۱ اس قسم کی بد صورتی کی



- (۱) فقرہ قطنیہ  
(۲) قطر العجز  
(۳) قطر مورب چھوٹا ہو گیا ہے  
(۴) قطر العانہ کی پٹائی لمبا ہو گیا ہے  
(۵) مفصل عانہ سے گونگا ہوا ہے  
(۶) زوایہ خمیریہ فقریہ  
(۷) فقر الخصر  
(۸) رطابت بخیرہ و کرہ  
(۹) شفتہ عانہ  
(۱۰) زائدہ خر قیہ قداسیہ علویہ  
(۱۱) قطر عرضی بہت ہی چھوٹا ہے

بد صورتیوں کے نتائج اگر جوف عانہ کی بد صورتی اسکے تنگ ہو جانے سے ہوتی ہے جیسا کہ مذکورہ بالا شکلوں سے ظاہر ہوا تو وضع حمل کے وقت بقدر تنگی کے عورت کو عسر ولادت کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور وضع حمل میں جمتدر زیادہ تاخیر ہوتی ہے اسی قدر زچہ اور بچہ دونوں کی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ رحم کی ساخت کو صدمہ پہنچتا ہے۔ پیدائش سے پہلے بچے کا دم گھٹ جانے سے یا پیدائش کی وقت بچہ کے سر پر غیر معمولی دباؤ بزرگ پڑنے سے بچہ اکثر مر جاتا ہے۔ اس لئے یاور کھنا چاہئے کہ مرض **لینٹا المعظام** (آسٹی اوے لے سی آئی) یعنی ہڈیوں کا نرم ہو جانا عورتوں کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہے۔

**اسباب مرض (۱) بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ ایام حمل میں حاملہ کے خون کا کثیف حصہ (چونے کے بعض نمک) بچے کی پرورش میں بکثرت خرچ ہو جاتے ہیں اور حاملہ عورتوں کے خون میں ثقیل اجزاء اپنے معمول اور ضرورت سے بہت کم رہ جاتے ہیں اسلئے ان کے بدن کے ٹھوس حصوں خصوصاً ہڈیوں کی پرورش میں خلل آنے سے ان کو یہ مرض اکثر لاحق ہو جاتا ہے۔**

**(۲) بعض ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ جب چونے کے نمک گروے میثاب میں بکثرت خارج کرنے لگے ہیں تو خون میں انکی مقدار معمولی حالت کم پاتی رہ جاتی ہے اسلئے ہڈیوں کی پرورش پورے طور پر نہ ہو سکی کہ سبب یہ مرض پیدا ہوتا ہے لیکن یہ لافانی خیال ان دونوں رایوں کے خلاف ہے کیونکہ اگر ڈاکٹروں کی یہ رائیں درست ہوتی تو اس مرض میں بھی چونے کے مرکبات ہی طرح مفید ہوتے ہر ج طرح کے مرض احوال ج العظام میں مفید ہوتے ہیں بلکہ جب ہم رات دن دیکھتے ہیں کہ عموماً حاملہ عورتوں کے احتیاطی شکم میں رطوبت بہت زیادہ ہو جائیکہ سبب انکی طبیعت نہایت خشک اور کثیف یا آخر پری چیزوں کی طرف زیادہ متشاق رہتی ہے چنانچہ اس حالت میں اکثر مستورات اپنی نادانی سے مضر صحت اشیاء چھپا کر کھانے لگتی ہیں جیسا کہ ملتانی مٹی یا مرغ وغیرہ کی ہڈیاں جلا کر یا چوٹے کی جلی ہوئی مٹی یا چونہ یا کوری ہسکیاں وغیرہ تھوڑی تھوڑی چبا کر اکثر کھا یا کرتی ہیں۔ اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں میں سے چونے کے بعض اجزاء ان کے خون میں شامل ہو کر اسے خراب کر دیتے ہیں**

کیونکہ خون میں ان کی مقدار وقتی ضرورتوں سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ گروے ان کثیر المقدار چونہ کے اجزاء کو میثاب کی راہ سے حتی الامکان خارج کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی خون پرورش بدنی کے قابل نہیں رہتا ہے۔ اور اگر عورت کے بدن میں اس مرض کی کچھ بھی استعداد پہلے سے موجود ہوتی ہے یا اس کی ہڈیاں پیدائشی طور پر کسی قدر ضعیف ہوتی ہیں تو ایسے فاسد خون سے ہرگز فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہیں۔ آخر کار

زیادہ ضعیف ہو کر موم کی طرح نرم ہو جاتی ہیں :

(۳) بعض اطباء نے مرض وجع المفاصل (روماٹیزم) کو اس مرض کے اسباب میں سے شمار کیا ہے۔

(۴) غذائی خرابی اور قواعد حفظ صحت کی پابندی نہ کرنا بھی اس مرض کا ایک سبب ہے۔

(۵) ان اسباب کے علاوہ کسی خاص موسم یا مٹی کی آب و ہوا کی کوئی خاص تاثیر بھی اس مرض کو پیدا کرتی ہے۔

(۶) ہڈیوں کی ساخت کی اصلی کمزوری :

(۷) ہڈیوں کے گرد کی جھلیوں کا التهاب۔ یہ تمام امور اس مرض کو پیدا کرنے میں کافی دخل رکھتے ہیں۔

علامات (۱) ماؤں ہڈیوں میں قدرے درمعلوم ہوتا ہے (۲) چونکہ سانس لینے کی حالتیں فقرات صدر

اور پسلیوں کے مفاصل میں قدرت سے حرکت ہوتی ہے۔ اس لئے مریض کو سانس لینے میں تکلیف محسوس

ہوتی ہے (۳) اس مرض میں ہڈیوں کا درد کبھی تو چند روز کا وقفہ دے کر پھر ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی دوسرے

اعضاء کی طرف منتقل ہو جاتا ہے (۴) ہڈیاں سفید رنگور ہو جاتی ہیں کہ تھوڑے صدمے سے ٹوٹ سکتی ہیں

(۵) پیشاب میں چونہ کا نمک (فاسفیٹ آف لائم) بکثرت پایا جاتا ہے (۶) مریض نہایت کمزور و سست ہوتا ہے

سست ہو جاتی ہے (۷) شدت مرض کی حالت میں کمزوری روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ آخر کار مریض نہ

شدت ضعف کے باعث مر جاتی ہے :

یاد رکھو کہ اگرچہ مرض اعوجاج العظام اور مرض لین العظام ان دونوں میں ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں۔

اس لئے یہ دونوں مرض بظاہر یکساں معلوم ہوتے ہیں اور ظاہر ان دونوں میں فرق کرنے سے کوئی نتیجہ

معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان دونوں مرضوں

کے علاج میں بہت فرق ہے چنانچہ مرض اعوجاج العظام میں چونے کا پانی اور چونے کے بعض مرکبات

دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور مرض لین العظام میں چونے کے مرکبات بہت مضر ہوتے ہیں۔ اس لئے

ان کا استعمال قطعاً ممنوع ہے۔ اب ہم ان دونوں مرضوں کے فرق ذیل کے نقشہ میں لکھتے ہیں :

فرق	مرض اعوجاج العظام (ری کیٹس)	اور مرض لین العظام (آسٹی او سٹے لے سی آ)
۱	ہڈی کا صرف وہی حصہ نرم ہو جاتا ہے جو ابھی پورے طور پر سخت ہو کر ہڈی نہیں بن چکا ہے۔	تمام ہڈی پورے طور پر سخت ہو جانیکے بعد نرم ہونے لگتی ہے :
۲	ہڈی اپنی کمال کو پہنچنے سے پہلے نرم ہو جاتی ہے	کامل ہو جانے کے بعد نرم ہونی شروع ہوتی ہے۔

۳	ہڈی کے خضرونی حصے پر گول اُبھار گانٹھوں کی طرح نمودار ہوتے ہیں۔	ایسے ابھار بالکل نہیں پائے جاتے ہیں۔
۴	ابتداءً عمر سے ۱۲ سال کی عمر تک لاحق ہوتا ہے	عمر کے ہر حصہ میں خصوصاً شباب کے زمانہ میں عارض ہوتا ہے۔
۵	مرضی اڑکا ہوا لڑکی دونوں قبلہ ہو سکتے ہیں	صرف عورتوں کو خصوصاً ایام حمل میں لاحق ہوتا ہے۔
۶	ہڈیاں بہت نرم نہیں ہوتی ہیں۔	نہایت نرم۔ نازک اور ہلکی ہو جاتی ہیں۔
۷	چونکہ مرکبات علاج میں دئے جاتے ہیں	نہیں دیے جاتے۔

**علاج۔** ڈاکٹری کتابوں میں اس مرض کا علاج صرف اسقدر لکھا ہے کہ مرضی کی قوت قائم رکھیں اور دوا کو نفع کریں۔ چونکہ مرکبات اس مرض میں کبھی استعمال نہ کریں اس کے سوا کوئی خاص علاج اس مرض کا نہیں ہے۔ لیکن اگر طب یونانی کے اصول کے موافق اس مرض کو ریاہ افسردہ اور تحشب ظہر کے قبیلہ سے قرار دے کر علاج کیا جائے تو نفع کی امید ہے چنانچہ اگر مرضیہ کا مزاج گرم ہو تو چند روز تک نیچے پلائیں صفحہ کل نقشہ گل نیلوفر۔ تخم کاسنی۔ کوہ خشک ہر ایک ۷ ماشہ اصل السوس مقشرہ ۵ ماشہ۔ رات کو گرم پانی میں تر کریں۔ اور صبح مل چھان کر مصری ۲ تولہ ڈال کر پلائیں۔

اگر مزاج سرد ہو تو نیچے دینا سب سے صفحہ اصل السوس مقشرہ۔ بادیان۔ تخم کرفس۔ انیسون ہر ایک ۵ ماشہ۔ بیج کاسنی۔ کوہ خشک۔ پر سیاوشاں ہر ایک ۷ ماشہ۔ مونیرنقی ۱۰ دانہ سب کو پانی میں جوش دیکر چھان لیں۔ اور کلقتہ علی ۲ تولہ حل کر کے پلائیں۔ اگر سہل کی ضرورت پڑے تو ان ہی نسخوں میں سہل کی دوائیں مزاج کے موافق اضافہ کر کے سہل دیں۔

اگر تدریج تنقیہ کی ضرورت سمجھی جائے تو یہ گولیاں مفید ہوں گی صفحہ ابلوہ مصفی۔ مرکب گول۔ سکنج غاریقون۔ ہر ایک ۷ ماشہ زعفران ۳ ماشہ سب کو باریک پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ انہیں سو ۳ ماشہ لیکر ہمراہ عرق بادیان ۵ تولہ کے رات کو سوتے وقت کھلا دیا کریں۔ اس سے تدریج تنقیہ مواد غلیظ کا ہوتا رہتا ہے اور مرض کمزور نہیں ہونے پاتا۔ تقویت کے لئے دوا المسک مختل ۳ ماشہ دونوں وقت غذا سے دو گھنٹہ بعد کھانا مفید ہے۔

تسکین درد اور تحلیل بقیہ مواد کے لئے نیچے مفید ہے صفحہ۔ روغن گل۔ روغن بالونہ۔ روغن بیدانجیر ہر ایک ایک تولہ۔ انیسون زعفران ہر ایک ۲ ماشہ جن بیدستر ایک ماشہ سب کو ملا کر رکھ لیں اور اسمیں سے

بقدر ضرورت لیکر مقام ماؤف پر مالش کیا کریں۔

یہ ضماد بھی اکثر مفید ہوتا ہے صفتہ تخم الہی - تخم خطمی - گل بنفشہ ہر ایک چھ ماشہ کوٹ چھان کر رکھیں۔  
اور مرع کی چربی - بطکی چربی - روغن گل ایک ایک تولہ گرم کر کے اس میں کوٹی ہوئی دوائیں اور تخم  
بیجی ایک تولہ کا لعاب ملائیں - اس میں بقدر ضرورت لیکر ضماد کریں۔

مریضہ کو غذا نرم - لطیف - سر بھج اور مقوی دینی چاہئے۔ چنانچہ گرم مزاج والی کو ماہ الشیعہ گوشت  
اور مرچ سیاہ کے ساتھ پکا کر یا کچڑی یا فرنی مناسب ہے اور سرد مزاج دال کو بخنی - پلاؤ یا خود آب موافق  
ہوتا ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس مرض میں جہاں تک ہو سکے بجائے گوشت کے ترکاریاں دی جائیں بہتر ہے

**فصل تیسری** درم الغشاء العظمیٰ پریری آستانی ٹس یعنی ہڈیوں کے گرد کی جھلی کا متوم  
ہو جانا۔ یہ دم اکثر ان ہڈیوں کی جھلی میں ہوتا ہے جو صرف جلد سے پوشیدہ رہتی ہیں جیسے عرف  
حرقی (ایلیک کر سٹ) یعنی غم الخاصرہ کا بالائی کنارہ۔ یا قصبہ کبریٰ (ٹیبیا) یعنی پنڈلی کی بڑی  
ہڈی کا سامنے والا کنارہ۔ یا عظم الترقیہ و کلاویکل بون یعنی ہنسی کی ہڈی اور عظام المراس  
رکے فی ال بونز یعنی سر کی ہڈیاں وغیرہ۔ اس مرض کی دو قسمیں ہیں ایک حاد (اکیوٹ)  
یعنی شدید اور دوسری مزمن (کروانک) یعنی خفیف العوارض :

(۱) قسم حاد۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے چنانچہ ایک وہ جو کسی خاص مقام میں کسی خارجی سبب سے پیدا  
ہو جاتا ہے اس میں کبھی ریم ٹپاتی ہے اور گاہے ریم نہیں ہوتی بلکہ صرف جھلی متوم ہوتی ہے اور ہڈی ٹپ  
ہو جاتی ہے اور دوسری وہ جس کا مادہ خون میں شامل ہوتا ہے۔ اس میں اکثر خنزیری مزاج کے بچے  
بتلا ہوتے ہیں اور یہ ایک خاص قسم کے حیوانی مادے (کیڑوں) سے ہوتا ہے جن کے سبب سے جھلی مذکور  
متوم ہو جاتی ہے اس میں جا بجا دمل سے بجاتے ہیں اور کبھی ہڈی بھی مراد ہو جاتی ہے :

(۲) قسم مزمن۔ یہ دم بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جو آتشکی زہر کے باعث پیدا ہوتا ہے اس میں  
ہڈیوں کے گرد کی جھلی متوم اور دبیر ہو جاتی ہے۔ اس کی ساخت میں زہر وار خون کا ترقیق حصہ جذب  
ہو کر جا بجا گول ابھار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا خون کی زہریلی مائیت جھلی اور ہڈی کے درمیان جمع ہو جاتی ہے  
کبھی جھلی یا ہڈی کے سطح پر چونے کی طرح کا استخوانی مادہ جم جاتا ہے جس سے ہڈی دبیر ہو جاتی ہے۔  
دوسرے وہ دم جو دمج المفاصل (روماٹزم) کے بعض اقسام میں پایا جاتا ہے جیسا کہ



بعض اوقات مرض آئٹنگ میں مرکبات سیاب کا استعمال بکثرت اور بے احتیاطی کے ساتھ کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ اگر یہ مرض عورت کے جوف عاذہ کی ٹہلیوں میں پیدا ہو جائے تو اس مقام کی جھلی کے متورم ہونے سے اور ٹہلیوں کی دبازت زیادہ ہو جانے کے سبب جوف عاذہ میں ضرور تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ مقام ماؤف کا درجہ وضع حمل کے وقت ضرور دشواری پیدا کرتا ہے اس لئے ہم نے اس موقع پر اس مرض کا ذکر نامناسب سمجھا ہے۔

**اسباب مرض (۱)** مرض پیدا ہونے سے کچھ پہلے مقام ماؤف پر چوٹ لگنا یا کسی طرح کا خراش پہنچنا (۲) خون میں خنازیری رہا یا کسی دوسرے فاسد مادہ کا موجود ہونا (۳) آئٹنگی فساد (۴) وجع المفاصل کے بعض اقسام (۵) مرکبات سیاب کے استعمال میں بے احتیاطی۔ اب ہم ان اسباب کے لحاظ سے اس مرض کے علامات اور علاج علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔

**(۱) چوٹ وغیرہ۔** اگر یہ مرض چوٹ لگنے یا کسی خراش پہنچنے سے پیدا ہوا ہو تو اس کی علامت اُن اسباب کا واقع ہونا ہے اور مقام ماؤف میں درد ورم۔ سوزش وغیرہ کا موجود ہونا ضروری ہے علاج (۱) اگر چوٹ لگنے کا زمانہ قریب ہو اور ورم ابھی شروع ہوا ہو تو یہ ضما د کریں صفتہ میدہ لکڑی۔ گبر و جوز السرو ابھل۔ انبہ ہلدی ہر ایک ایک تولہ۔ اتاقیا۔ مصطلی۔ گلسرخ سمرکی۔ دارچینی ہر ایک ۶ ماشہ۔ اخیون۔ زعفران ہر ایک ایک ماشہ سب کو باریک پسکرنج ایک تولہ کے جو شانہ میں ملائیں اور صبح روغن گل ایک تولہ مخلوط کر کے بیگرم لپ کریں (۲) اگر ورم زیادہ ہو تو تیکید مفید ہے صفتہ۔ ہلدی۔ سحی۔ تل ناریل کہنہ ہر ایک ایک تولہ سب کو کوٹ کر اس کی پوٹیلیاں بنائیں اور گرم کر کے تکمید کریں۔ (۳) روغن بابونہ۔ روغن گل۔ روغن مصطلی۔ روغن دارچینی ایک ایک تولہ لیکر اس میں ایلوہ ۳ ماشہ زعفران ۶ ماشہ ملائیں اور بیگرم مالش کریں (۴) روغن سرخ معمولہ مطب السی موقع پر نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ نسخہ مجبٹھہ تولہ۔ کاسچھل۔ نرگپور۔ چھڑیلہ۔ تچ ہر ایک ایک تولہ۔ دانہ الاچی خور دو ماشہ میدہ لکڑی ہلدی۔ صندل سرخ۔ سنوٹھ۔ کچلہ۔ ناگر موٹھ۔ باچھڑ ہر ایک ۶ ماشہ۔ رتن جوت۔ جائفل۔ لونگ۔ جاوڑی۔ پتھر ج۔ داربلہ۔ دارچینی۔ عود غرقی۔ اسگند ناگوری۔ بوزیران ہر ایک ۳ ماشہ سب کو نیم کوفتہ کر کے آدھ سیر پانی میں ۲ گھنٹہ تک تر کھیں۔ اسکے بعد بندرتن میں نرم آنچ سی اسقدر پکائیں کہ ایک تہائی پانی باقی رہ جائے اس وقت گلاب خالص ۲۰ تولہ اضافہ کر کے پھر بدستور اسقدر پکائیں کہ صرف گلاب ہی باقی رہ جائے

پھر سے مل چھانکرا سیں آدھ سیر تل کا تیل شامل کر کے بدستور سابق اسقدر پکا ئیں کہ صرف تیل باقی بچائے  
 اسوقت زعفران ۲ ماشہ مشک خالص ایک ماشہ پیکرا سیں ملائیں۔ اور سرد ہونیکے بعد اسے چھان کر  
 شیشی میں کھچھوڑیں اور اسیں سے بقدر حاجت لیکر مقام ماؤف پر مالش کریں (۵) مریض کو قبض کی شکایت  
 نہ ہونے میں (۶) رفع قبض کے لئے روغن بیدانجیر کا سٹرا ئیل ۲ تولہ ہمراہ دودھ۔ آتولہ کے پلائیں۔  
 (۲) خنازیری زہر۔ اگر خون میں خنازیری زہر یا کوئی دوسرا فساد موجود ہو تو اسکی مناسب تہہ بر کرنی  
 چاہئے۔ اس کے لئے روغن ماہی رکاوڑ اور ائل (یعنی مچھلی کا تیل نہایت مفید ثابت ہوا ہے (۲) عرق غشہ پلانے  
 سے بھی فائدہ ہوتا ہے (۳) تجربہ کار ڈاکٹروں نے آیوڈین کے بعض مرکبات خصوصاً آیوڈ آف پوٹاسیم کی  
 بہت تعریف کی ہے (۴) اگر اطفال شہترہ ایک تولہ ہمراہ عرق مرکب مصفی خون کے رات کو سوتے وقت  
 کھلایا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے (۵) اکسیر اعظم میں جو ہندی کا یہ نسخہ مرض خنازیر کیلئے لکھا ہے۔  
 یہ میرے تجربہ میں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔ میں نے چند بار اسے اس وزن سے بنایا ہے صفتہ ہڑ بہڑہ۔ آملہ  
 خشک۔ سوٹھہ مرچ سیاہ۔ پیل ہر ایک ایک ماشہ۔ الاچی خورد ۳ عدد۔ ان سب کو نہایت باریک کوٹ  
 چھان کر رکھ چھوڑا۔ اور تریبد سفید مقشر مجوف۔ ہڑ بہڑہ۔ آملہ خشک۔ منخر اٹناس ہر ایک ۴ تولہ رات کو  
 ایک سیر پانی میں بھگو کر صبح کو اسقدر پکایا کہ ایک تنہائی پانی باقی رہ گیا پھر مل چھان کر اس مصفی جو شاندہ میں  
 گوگل مصفی ۲ تولہ ملا کر اسقدر پکایا کہ معجون کی طرح گاڑھا ہو گیا تب آچھ پر سے اتار کر اسیں گٹی ہوئی دوائیل کر  
 چنے کے برابر گولیاں بنا رکھیں جو ان مریضوں کو یہ گولیاں ۵ ماشہ سے ۱۰ ماشہ تک رات کو سوتے وقت ہمراہ  
 عرق بادیان کے دی گئیں۔ اور پانچ سال کی عروائے بچوں کو ۱۰ ماشہ سے ۲۰ ماشہ تک دی گئیں۔ ان اکثر  
 موقعوں پر بہت کامیابی ہوئی ہے لیکن میں نے انکا استعمال سرد مزاج کے مریضوں پر کیا ہے جو نہایت مفید ثابت  
 ہوئی ہیں (۳) آتشکی فساد۔ آتشکی زہر کے سبب جب ہڈیوں کے گرد کی جھلی متورم ہو جاتی ہے تو اکثر بیمار  
 اپنی پٹلیوں کی ہڈی میں سامنے کی طرف درد کی شکایت کیا کرتا ہے جس سے وہ آخر رات میں سخت چپن  
 رہتا ہے۔ بعض بیماریوں کی پٹلیوں کے سامنے رکھنے کے نیچے سے ٹخنوں تک یہ ورم نظر سے بھی معلوم  
 ہوا کرتا ہے وہاں کی جلد سرخ چمکدار اور متورم ہو جاتی ہے اسی طرح بعض بیمار چڈوں کی ہڈی میں بھی  
 درد کی شکایت وغیرہ کیا کرتے ہیں جو اس مقام کی ہڈی یعنی عظم الخاصرہ کی جھلی میں ورم ہونے سے  
 پیدا ہوتا ہے۔ یہ ورم اور درد اکثر تو ایک مدت تک بدستور قائم رہتا ہے۔ لیکن بعض بیماریوں کی

قصر الخصر یا ایک فاسہ میں گہرا چھوڑا ہو کر اندر ہی ایک جاتا ہے۔ یہ چھوڑا یا قوس کا گہرا کھینچنا پھوٹتا ہے اور یا اسکی ریم (احتشاء العانہ) ریلوٹ سہرا یعنی پیرو کے اندر دوائے اعضا کو تباہ کرتی ہے کبھی درم صفاق البطن پر پری ٹونائی ٹس، وغیرہ حوادث کا سبب ہو کر مریض کو ہلاک کرتی ہے۔  
 علاج - آنشکی زہر کو خون میں سے نکالنے کے لئے ایک مدت تک مصفیات خون کا استعمال کرانا چاہئے۔ چنانچہ اس عرض کیلئے (۱) نقوع شاہترہ کا یہ نسخہ ایک دیکھا پلاتے ہیں۔ صفحہ شہترہ چرائتہ منڈی۔ سر بھوکہ عشبہ مغربی۔ ہلیلہ سیاہ ہر ایک، ماشہ۔ افقیون۔ گل سرخ ہر ایک ۵ ماشہ عتاب ۵ دانہ۔ شربت عتاب ۴ تولہ (۲) اگر مریض کے مزاج میں گرمی ہو تو شام کی وقت لعاب بہدانہ ۳ ماشہ۔ عتاب ۵ دانہ۔ عرق مرکب مصفی خون ۱۰ تولہ شربت عتاب ۱۰ تولہ دیا جائے (۳) اس کے بعد معجون عشبہ ایک تولہ ہمراہ عرق عشبہ ۵ تولہ نبات سفید ۵ ماشہ صبح اور شام (دونوں وقت) پلایا جائے لیکن شام کو معجون عشبہ ۵ ماشہ دیا جاتی ہے (۴) اگر بیمار کے مزاج میں زیادہ گرمی اور خون میں حدت ہوتی ہے یا مادہ بہت کثیف ہوتا ہے تو تبرید اور تسکین حدت و ترطیب مواد کے لئے بکری کا تازہ دودھ شربت عتاب کے ساتھ، تولہ کی مقدار سے شروع کر کے ہر روز ایک تولہ دودھ بڑھاتے ہیں اور اسی کے مناسب شربت عتاب کی مقدار بھی کچھ زیادہ کر دیتے ہیں اکثر مریضوں کو دودھ کی مقدار چالیس تولہ تک اور بعض کو تیس تولہ تک بڑھا کر پھر ہر روز ایک تولہ دودھ کم کرتے ہوئے، تولہ پر ختم کرتے ہیں (۵) جو ہر سیکورہ چاول کی مقدار سے ۴ چاول تک موثر تھے میں رکھ کر دیا جاتا ہے جو ایسے موقع پر بہت مفید اور معمول مطلب ہے :

(۴) وجع المفاصل کی جس قسم میں ہڈیوں کے گرد والی جھلی متورم ہو جاتی ہے اسے بھی آنشکی زہر یا کسی دوسری قسم کے فساد خون کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلئے اس کے علاج میں بھی مصفیات خون کے استعمال سے کامیابی ہوتی ہے اور مذکورہ بالا طریقے سے علاج کیا جاتا ہے :

(۵) مرکبات سیاب کے استعمال میں بے احتیاطی کرنے سے اگر یہ مرض (دوم الغشاء العظمی) پیدا ہو جائے تو فوراً ان کا استعمال ترک کرنا چاہئے اور بجائے ان کے دوسرے مصفیات خون پرایا میں جیسے نقوع شاہترہ اور لعاب بہدانہ شیرہ عتاب عرق مصفی خون۔ شربت نیلوفر یا معجون عشبہ نبات سفید وغیرہ۔ اگر ضرورت پڑے تو خفیف سا سہل بھی دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحبان ایسے موقع پر

نوع شہترہ

ترکیب استعمال شربت عتاب

ہمیشہ (آیوڈائیڈ پوٹاشیم) کا استعمال بہت مفید بتاتے ہیں۔ اسکا طریقہ استعمال یہ ہے کہ بعد پہلے کے مریض کو (آیوڈائیڈ پوٹاشیم) ہمراہ مطبوخ یا نقوع عشبہ کے دن میں تین مرتبہ دیتے ہیں۔ اور ہر مرتبہ اسکی مقدار گرین سے۔ اگر تک دیکھتی ہے بلکہ بعض حالتوں میں ۲۰ گرین یا ۳۰ گرین تک بھی دیکتے ہیں فصل چوتھی سلع العظام (آشی) اس میومرز یعنی ہڈیوں کی رسولیاں جب یہ رسولیاں زناہ جوف عانہ کی ہڈیوں میں سے کسی ہڈی کے اندرونی سطح پر پیدا ہو جاتی ہیں تو بقدر اپنی جسامت کے جوف عانہ میں تنگی پیدا کرتی ہیں اور ان کے سبب علاوہ دیگر تکالیف کے عورت کو وضع حمل کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے اسلئے ہم نے ان کا بیان کرنا اس جگہ پر مناسب سمجھا۔

اس قسم کی رسولیاں اکثر سخت ریشہ دار ساخت سے بنی ہوئی اور شکل میں بیضوی ہوتی ہیں۔ اور غشاء عظمیٰ پر پی آسٹی ام) سے پوشیدہ رہتی ہیں۔ ان کی افزائش بہت سست ہوتی ہے اور اکثر ہڈی کے درمیانی مقام سے شروع ہوا کرتی ہیں انچا ہم کبھی تو یہ رسولیاں نرم ہو کر چربی میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد رفتہ رفتہ تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی بہت سخت ہو کر گانٹھ کی طرح وہیں رہ جاتی ہیں۔ اور بعض صورتوں میں گل کر اور زخم بن کر مواد کے ہمراہ خارج ہو جاتی ہیں۔

**اسباب**۔ عموماً ان رسولیوں کے پیدا ہونے کا ابتدائی سبب تو یہ ہے کہ خون کے ذاتی اور فضا میں ایک خاص قسم کا خلل واقع ہو جاتا ہے جس کے سبب سے خون میں ریشہ دار ساخت اور چمکدار مادے کے پیدا کرنے کی قابلیت اور ادنیٰ سبب سے منجمد ہو جانے کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب کسی سبب سے ایسا خون ہڈیوں کے سطح پر اور ان کے گرد والی جھلی میں جمع ہو جاتا ہے تو وہ منجمد ہو کر رفتہ رفتہ ریشہ دار ساخت میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اور یہ ساخت یا تو چند روز کے بعد تحلیل ہو جاتی ہے اور یا اس میں مواد پر زخم ہو جاتا ہے یا وہیں سخت ہو کر چھٹی بیضاوی شکل کی گانٹھ سی ہڈی کے سطح پر بن جاتی ہے۔ اس قسم کی گانٹھ کو ہڈی کی رسولی کہا جاتا ہے۔ اور ایسے موقع پر اجتماع خون کے اسباب میں سے بڑا قوی سبب چوٹ لگنا ہے۔ اس کے علاوہ غلیظ بلغم کے باعث خون گاڑھا ہونا۔ اور وریدی خون کی رفتار میں رکاوٹ واقع ہونا اور عام بدن کی کمزوری بھی رسولیوں کی پیدائش کا سبب سمجھا جاتا ہے۔

**علامات** (۱) رسولی کے پیدا ہونے سے پہلے مقام ماؤف پر چوٹ لگنا (۲) خون میں مذکورہ بالا

۱۔ اس کو عقد العظام یعنی ہڈیوں کی گانٹھ بھی کہتے ہیں ۱۲ مؤلف

قسم کا فساد موجود ہونا (۳) عام بدن کی کمزوری (۴) چوٹ لگنے کے بعد التهاب (النفلا مے شن) کے آثار ظاہر ہونا (۵) مقام ماؤف میں بوجھ سا معلوم ہونا (۶) احتشاء الحانہ پلوک و سرا یعنی پیرو کے اندر والے اعضا پر دباؤ پڑنے سے اس مقام میں کسی قدر تکلیف محسوس ہونا (۷) رسولیوں کے دباؤ سے پیشاب پایا نہ جانے میں قدرے رکاوٹ واقع ہونا۔

علاج (۱) مریض کو چند روز تک یہ نسخہ صبح کا پلا کر تفتیح کرایا جائے صفتہ بادیان پنج بادیان پنج کرفس - اصل السوس منقر غافت ہر ایک ۵ ماشہ - فستقین - شاتہرہ - افیتمون - ہر ایک ۳ ماشہ - مؤیز منقی ۹ دانہ سب کو ڈیڑھ پاؤ پانی میں جوش دیں جب آدھ پاؤ پانی رہ جائے چھان کر ۲ تولہ کلغند عسلی ملا کر پلائیں (۲) پورے طور پر نصیج کے بعد اسی نسخہ میں سناؤ کی گلسرخ - ترب سفید موعوف ہلہ سیاہ ہر ایک ۵ ماشہ - مغر فلوس ۵ تولہ ترنجبین ۲ تولہ - مغر بادام شیریں ۵ عدد اضافہ کیے سے سہل دیں (۳) تین سہل دینے کے بعد اور سہلوں کے درمیانی دنوں میں تبریکانیہ نسخہ پلائیں صفتہ شیرہ بادیان ۵ ماشہ شیرہ تخم خیارین ۳ ماشہ - عرق کوہ ۱۲ تولہ - شربت بنفشہ ۲ تولہ تخم بجان ۵ ماشہ رم اگر کچھلے سہل میں یہ گولیاں آخر رات میں بقدر ۹ ماشہ ہمراہ عرق بادیان کے کھلا کر صبح کو مذکورہ بالا نسخہ بلا مغر فلوس وغیرہ کے پلائیں تو عمدہ طور سے تفتیح ہو جائے اس صفتہ ترب سفید ۱ تولہ غارلقون ایاریق فیتھر ہر ایک ڈیڑھ تولہ حب النسیل ۱۰ ماشہ - نمک ہندی ۴ ماشہ - سب کو باریک میکریانی میں گولیاں چنے کے برابر بنالیں - اگر آخری سہل میں یہ گولیاں نہ دی گئی ہوں تو سہل سے چند روز کے بعد ان میں سے بقدر ۳ ماشہ ہر روز رات کو سوتے وقت ہمراہ عرق بادیان کے کھلا دیا کریں۔

ان سے ہر روز دو تین اجابتیں نرم ہوتی رہیں گی - اور چند روز میں بقیہ مادہ بخوبی دفع ہو جائیگا (۵) اگر اس قسم کی رسولی پیرو پر جلد کے نیچے کسی قدر محسوس ہوتی ہو تو اس پر یہ دوا لگائیں چند روز میں تحلیل ہو جائیگی - صفتہ - ہلدی - سہاگہ - داربلد ہر ایک ۳ ماشہ سرمہ کی طرح باریک پیس کر گھیکوار کے گودے پر چھپکریں اور مقام ماؤف پر باندھ دیا کریں (۶) مرہم اشق کی مالش بھی مفید ہے صفتہ اشق - گوگل - رائی - سمندر جھاگ - زرد اند طویل - تخم انجرو - گندہک زرد ہر ایک ایک تولہ - روغن زیتون کہنہ ۱۲ تولہ - موم زرد ۲ تولہ - اہل گوگل اور اشق کو روغن زیتون میں پگھلا کر موم بھی اشق پگھلا لیں پھر باقی دواؤں کو نہایت باریک پیس کر امیں ملائیں تاکہ سب مل کر مثل مرہم کے ہو جائیں۔

نسخہ بنی

بنی بنی

دوا محل سہل

نسخہ مرہم اشق

اس میں بقدر حاجت لیکر اس کے برابر روغن زیت اور روغن گل ملا کر مالش کریں (۱) مریض کو ایسی غذائیں کھلائیں جن کی بلغم زیادہ پیدا نہ ہونے پائے۔ چنانچہ مغز تخم کڑے اور پچے کا شوربہ مرغن تیار کر کے دیا جائیگی بھی اچھی غذا چوڑے مرغ اور تیر کا گوشت بہتر ہے دودھ اور ترش چیزوں سے پرہیز کریں

**فصل پانچویں** انکسار عظام العانہ (فر کچر آف دی پلوس) یعنی جوف عانہ کی ہڈیوں کا ٹوٹ جانا۔ اگر کوٹھوں یا عجز کے مقام پر کوئی سخت چوٹ لگے تو جوف عانہ رپلوس کی ہڈیوں میں عرف حقفی (ایلیک کرسٹ) یا فرج دور کی (اسکی ال بریس) یا عظم العانہ (آس پویس) ٹوٹ جاتی ہیں اور یا مفصل العجزی (الحر حقفی) رسیکر وایلیک سنکائڈرو سنر) کھل جاتا ہے اور احتشاء العانہ (پلوک سرائ) میں سے مٹانہ۔ معار مستقیم اور وہاں کی عروق زخمی ہو جاتی ہیں۔ جریان خون کی کثرت و جوف عانہ کے اندر والے اعضاء پر فوئی صدمہ پہنچنے سے یا بول براز کے بند ہو جانے سے مریض مر جاتا ہے۔

اگر مریض قوی ہو اور صدمہ کی برداشت کر سکے تو مناسب تدابیر سے تندرست بھی ہو جاتا ہے اور اگر ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بے موقع جڑ جائیں یا ٹھیک موقع پر جڑنے کی حالت میں اس جگہ دستہ بین رکے (س) پیدا ہو کر نزل ایک بے ڈول ابھار کے چند روز تک قائم رہے تو اس کے تحلیل نہ ہونے سے جوف عانہ میں بد وضعی پیدا ہو کر ہمیشہ کے لئے عیب باقی رہ جاتا ہے۔ اور اس بد وضعی کی باعث دیگر خرابیوں کے علاوہ عورت کو وضع حمل کی وقت شدید تکلیف ہوتی ہے۔

ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑنے سے جوف عانہ کی بد صورتی


**علاج** ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جڑنے کی تدابیر چونکہ اعمال جراحی کے متعلق ہیں اس لئے ان کا بیان مفصل جراحی میں دیکھو لیکن اگر ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بے موقع چڑھانے کے سبب یا جڑے ہوئے مقام پر گوٹری سی پیدا ہو جانے کے سبب سے جوف عانہ میں تنگی اور بد وضعی پیدا ہو گئی ہو تو اس کے لئے اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہے کہ وضع حل سے پہلے مقام ماؤف پر چند روز تک برابر ایسی چیزیں باندھی جائیں جن سے ہڈیوں کو جوڑ معمول سے زیادہ نرم اور پھیلے ہو جائیں اس غرض کی ذیل کی تدابیر مناسب ہیں۔

۱۔ اموم زرد چربی بطا چربی مرغن خانگی ایک ایک تولہ گلاسے کی نلی کا گودہ ۲ تولہ۔ روغن سوسن ۴ تولہ۔ سب کو بیکل کر رکھ چھوڑیں اور ان میں سے قدرے لیکر مالش کر دیا کریں (۲) اشق جاؤ شیر بیعہ سا لکھ ہر ایک ایک تولہ۔ گوگل ۲ تولہ سب کو شراب میں حل کریں۔ اور چربی مرغن کی چربی ریچھی کی ہر ایک چار تولہ روغن الہی۔ روغن سوسن ہر ایک ۲ تولہ میں پگلا کر سب کو مالیں۔ اور اس میں سے تھوڑا سا لیکر مالش

تدابیر ہڈیوں کے جڑنے کی

کیا کریں (۳) مفر تخم ارندی سپا ہوا ۴ تولہ روغن زرد گاؤ ۲ تولہ شہد خالص ایک تولہ سب کو ملا کر نیلگرم  
لیپ کریں (۴) مفر نر تولہ مفر بادام شیریں مفر پستہ ہر ایک ۲ تولہ سب کو پیس کر چلتی دنبہ کی چربی  
۳ تولہ ملا کر باندھیں (۵) غذائیں مرغن اور مقوی کھلائیں۔ دودھ بقدر ہضم کے ایک مدت تک پلائیں۔  
امید ہے کہ ان تدابیر سے جوڑوں میں نرمی پیدا ہو کر حتی المقدور وضع حل میں آسانی ہوگی۔

**فصل چھٹی** انکسار العصب رفر کچر آف دی کاکسکس یعنی چچی کی ہڈی کا ٹوٹ جانا  
جوڑوں کے بل کرنے سے یا چچی کے مقام پر چوٹ (دلت وغیرہ) لگنے سے یہ ہڈی اکثر ٹوٹ جاتی ہے خصوصاً  
جن مستورات کی یہ ہڈی اور اس کے جوڑے عمری کے سبب سے نرم اور خام ہوں وہ اسرارضہ  
میں ادنی سبب سے مبتلا ہو جاتی ہیں۔



**علامات** (۱) مقام مائوف میں درد شدید ہوتا ہے (۲) مریض کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ چلنا پھرنا۔  
سخت دشوار ہوتا ہے (۳) بیٹھنے میں بھی سخت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس حالت میں عضواؤں  
پر بدن کا بوجھ پڑتا ہے (۴) دماغ مستقیم رکھنے میں سب سے پہلی آنت میں شدید تکلیف  
ہونے کے سبب سے براہ دشواری آتا ہے (۵) اگر فقہ میں انگلی داخل کر کے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو حرکت  
دیں تو قرقعہ (کر سے پی ٹے شن) (یعنی کرک اسٹ) کی سی آواز محسوس ہوتی ہے۔

**علاج** ج مفصل میں انگلی داخل کر کے ہڈی کو اس کے اصلی موقع پر قائم کریں۔ اس کے بعد مریض کو نرم

بستر پر آرام سے لیٹے رہنے کی تاکید کریں جب تک ہڈی کے جڑ جانے کا یقین نہ ہو جائے مریض کو بستر سے اٹھنے کی اجازت نہ دیں بلکہ پورے طور پر صحت حاصل ہونیکے بعد چند روز تک مریض کو نرم گتے پر بیٹھنا چاہئے۔ دوران علاج میں قبض نہ ہونے دیں۔ تلیئین کے لئے ارند کی کانسیل رکاسٹر آئل، بقدر ایک یا ڈیڑھ تولہ تھوڑے سے دو دھبے ملا کر کبھی کبھی پلا دیا کریں۔ چوٹ کے مقام پر یہ لیسپ کرنا چاہئے۔ صفحہ مرکبی۔ ایلوہ۔ گل ارمنی۔ ہلدی۔ مبدہ لکڑی۔ کندر۔ گل سرخ۔ گلزار ہر ایک ۷ ماشہ۔ کچھ سیاہ ۲ تولہ زعفران ۳ ماشہ سب کو باریک پسک پانی میں ملائیں اور نیم گرم لیسپ کریں۔ ریسپ کے بعد سینکنا بھی چاہئے۔ اس کے علاوہ روغن دیودار کی مالش بھی نہایت مفید ہے نسخہ ہلدی چوب دیودار۔ مبدہ لکڑی۔ زن جوت۔ ملہٹی۔ جائفل۔ کمبہ۔ تخم میمنی۔ دار ہلد۔ بھڑ بھو جے کے چھپر کا دھواں ہر ایک ایک تولہ سب کو پہلے خوب کھل کر پیں پھر آدھ سیر پانی میں نرم آئچ سے پکائیں جب ایک تہائی پانی باقی رہ جائے اس وقت دوا کے ثقل کو کپڑے میں لیکر خوب نچوڑیں۔ اور پانی میں نہیں تولہ روغن کچھ ڈال کر نرم آئچ سے پکائیں جب پانی جل کر صرف تیل باقی رہ جائے۔ برتن کو آئچ پر سے اتار لیں۔ بعد سرد ہونے کے تیل کو اوپر سے با احتیاط تمام نکال لیں۔ تاکہ نیچے کامیل اور تلچھٹ یا قدرے پانی کا بقیہ تیل میں نہ آنے پائے۔ ضرورت کے وقت اس تیل میں سے ۲ تولہ لیکر اس میں زعفران ایک ماشہ مشک خالص اتنی ملا کر اس میں تھوڑا سا مقام ماف پر ملیں۔ اس سے درد میں تخفیف ہوگی اور دم تحلیل ہو جائے گا۔

**فصل ساتویں وجع المصعص رکاسی جی آئی ٹس** یعنی استخوان نشستگاہ کا درم اور درد اس ہڈی پر چوٹ لگنے کے بعد اگرچہ ٹوٹی ہوئی ہڈی علاج سے درست ہو جاتی ہے لیکن کبھی اس جگہ قدرے درم اور درد باقی رہ جاتا ہے۔ یا اس جگہ خفیف سی چوٹ لگنے سے درد اور دم پیدا ہو جاتا ہے جو کسی علاج سے زائل نہیں ہوتا۔ یہ مرض اکثر عورتوں کو لاحق ہوتا ہے کیونکہ ان کی یہ ہڈی سیدھی اور پیچھے کو مائل ہوتی ہے اس لئے اس کے اوپر والی ساختیں ادنیٰ صدمہ سے ایذا پاتی ہیں اور ان میں دم ہو جاتا ہے۔

**علامات**۔ اس مرض میں تمام وہ علامتیں موجود ہوتی ہیں جو اس ہڈی کے ٹوٹ جانے کے بیان میں لکھی گئی ہیں لیکن مقعد میں انگلی داخل کر کے حرکت دینے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کی سی آواز



نہیں سنائی دیا کرتی ہے۔

علاج اول تو چند روز تک مری دالانہ و لگائیں اور روغن دیودار کی مالش کریں۔ اسی طرح بیگن کے ٹکڑوں سے تمکید کرنا بھی فائدہ کرتا ہے صفت بیگن تازہ ویسی کے دو ٹکڑے کر کے ان پر بلدی سبزی چھ ماہ نہایت باریک پس کر چھپکیں اور انھیں گرم نوے پر قدرے گھی کے ساتھ سینک کر اسے مقام ماؤں پر لگو کر کریں۔ اگر کسی علاج سے بھی درد کو آرام نہ ہو اور مرضہ کو درد کی سخت تکلیف ہے تو آخر کار مجبوراً اس ہڈی کو بذریعہ عمل جراحی نکال دیا جاتا ہے۔

فصل آٹھویں تجر المفاصل رانیکا یلوسس (یعنی ہڈیوں کے جوڑ سخت ہو کر ان کی حرکت موقوف ہو جانا۔ کتاب ہذا کے پہلے حصے میں یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ مرد اور عورت کے جوف عانہ کی تمام ہڈیاں اگرچہ باہم خوب مضبوطی کے ساتھ جڑی رہتی ہیں۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے جوف عانہ کی ہڈیوں کے جوڑ حمل کے آخری زمانہ میں کسی قدر ڈھیلا اور نرم ہو کر قدرے حرکت کرنے کے لائق ہو جاتے ہو جاتے ہیں تاکہ وضع حمل کے وقت ان میں قدرے حرکت پیدا ہو کر زنانہ جوف عانہ کی وسعت کسی قدر بڑھ سکے اور اس سبب سے وضع حمل کی معمولی تکلیف میں کچھ کمی ہو جائے۔

پھر جب ان کے جوف عانہ کے مفاصل کسی سبب سے اس قدر سخت ہو جائیں کہ اپنے موقع پر وہ ڈھیلا نہ ہو سکیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کو وضع حمل کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے ہم اس موقع پر جوڑوں کی سختی کے اقسام اور اس کے اسباب اور انکی علامتیں مع علاج کے درج کرتے ہیں۔

قسم اول تجر لیتی رفا بئرس اینکائیلسس (اس میں جوڑ کے گرد والے رباطات نہایت سخت اور دبیر ہو جاتے ہیں۔ جوڑ میں التهاب (انفلامیشن) یعنی سورش و سرخی پیدا ہو کر اسکی درمیانی غضروف سخت ہو جاتی ہے۔ جوڑ کے اندر معمولی ریشہ دار ساخت پیدا ہو جاتی ہے جوڑ کے گرد والے رباطات اور عضلات سکڑ کر چھوٹے ہو جاتے ہیں۔

لہٰذا اس ضداد اور روغن کے نسخے فصل سابق میں درج ہیں ۱۲ مؤلف۔

۱۳ اس کو تجر غیر تام یا ناقص دان کمپلیٹ اینکائیلسس بھی کہتے ہیں ۱۲ مؤلف۔

اسباب اکثر یہ مرض پرانے وجع المفاصل سے یا دم مفاصل کی ایک خاص قسم ریویرکولر آرٹھرائٹس کے سبب ہوتا ہے یا سوزاک کا آخری نتیجہ ہوتا ہے

قسم دوسری تجر معظی راشی الس اینکالوسس اس میں جوڑے کے اندر والی نرم ساختیں خراب اور معدوم ہو کر دونوں ہڈیوں کے مفصلی سطح آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ یا جوڑے کے درمیان والی غضروف ہڈی میں تبدیل ہو کر دونوں ہڈیوں کو ایک کر دیتی ہے۔ اور جوڑے کے گرد والے رباطات بھی ہڈی بن جاتے ہیں۔

اسباب اگر یہ حالت جوڑوں کے پرانے امراض میں واقع ہوتی ہے یا جوڑوں پر چوٹ لگنے سے انیس التهاب (انفلامیشن) پیدا ہو کر اس کے بعد رفتہ رفتہ جوڑ میں چونے کا مادہ پیدا ہونے لگتا ہے پھر وہ مادہ ہڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ مرض قد اڑۃ الدم رپائی ایما کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تشخیص۔ اس مرض کی دونوں قسموں میں تشخیص کرنی معالج کیلئے ضروری ہے۔ کیونکہ قسم اول قابل علاج ہو اور قسم ثانی اکثر موقعوں پر لا علاج سمجھی جاتی ہے ان دونوں قسموں کی تشخیصی علامات نقشہ ذیل میں کیجیو۔

بیمار	قسم اول کی علامتیں	قسم دوم کی علامتیں
۱	جوڑ کو زور سے ہلائیں تو قدرے حرکت ہو سکتی ہے	بالکل حرکت نہیں ہو سکتی ہے۔
۲	حرکت دلانے سے جوڑ میں درد ہوتا ہے۔	درد بالکل محسوس نہیں ہوتا ہے
۳	جوڑ کے متعلق عضلات سکڑ سکتے ہیں۔	ان میں سکڑنے کی قابلیت نہیں رہتی

لیکن اگر یہ مرض جوف عانہ کے مفاصل میں لاحق ہو تو ان علامات کی رو سے تشخیص کرنا سخت دشوار ہوتا ہے صرف علاج کی کامیابی یا عدم کامیابی سے تم اُسے تشخیص کر سکتے ہو جو بعد علاج کے معلوم کر سکو گے علاج۔ اگر جوڑ میں سے التهاب یا دم زائل ہو چکا ہو۔ اور جوڑ سخت ہو گیا ہو تو اس وقت ایسی دواؤں کا استعمال کرنا چاہئے جن سے جوڑ کی اندرونی نرم ساخت اور اس کے رباطات نرم اور ڈھیلے ہو جائیں اس غرض کے لئے تدریجاً ذیل عمل میں لائیں راگس باؤنہ۔ تخم خطمی سیسوس گندم کے جو شانڈے سے نپول کرائیں ۲۲ گندھک کے چنے کا پانی منگا کر اس سے غسل کرائیں ۲۴ کجریاہ۔ ناریل کہنہ۔ مخفر تخم ارندٹی۔ باریک کوٹ کر اسکی پوٹلیوں سے تکبید کریں ۲۴ جو نسخے لپ اور الماش وغیرہ کے مقابلہ ہذا

۱۵ اس کو تجر تام رکلیٹ اینکالوسس ابھی کہتے ہیں ۱۲ مولف

جراحی


تشخیصی علامات

نظروں اور نچکد کے لئے

کی پانچویں فصل میں ہم درج کر آئے ہیں وہ اس موقع پر بھی مفید ہوں گے۔  
اگر اس قسم کی تدابیر سے نفع ہو جائے تو سمجھ لیتا ہے کہ مرض کی قسم اول تھی اور اگر علاج سے  
نفع نہ ہو تو مفصل عانہ کے لئے کوئی دوسری نافع تدبیر نہیں ہے۔ البتہ دوسرے مفصل میں جوڑ  
کو زور سے حرکت دینا یا مفصل کے بعض رباطات اور عضلات کو قطع کرنا مفید ہوتا ہے۔ یا بذریعہ  
عمل جراحی کے مصنوعی مفصل بنادیا جاتا ہے جو نہایت دشوار عمل ہے۔


فصل نویں: انخلاع المفصل (رڈسلو کیشن) یعنی جوڑ کا اکھڑ جانا۔ اگرچہ یہ لفظ عام ہے۔ لیکن  
اس جگہ ہم صرف کوٹھے کے جوڑ کے انخلاع کا بیان کرتے ہیں جو چار طرح پر ہوتا ہے چنانچہ ان چاروں  
صورتوں میں سے بالفعل وہ صورت بیان کی جاتی ہے جس میں ران کی ہڈی کا اوپر والا گول سرحتی الودک  
رانے سی ٹیبلیم (گڑھے) میں سے باہر نکل کر اس کے اوپر اور پیچھے کی جانب عظم الفخذ کا اکھڑا  
کی پشت پر جا ٹھیرتا ہے۔ یہ صورت اکثر اس وقت پیش آتی ہے جبکہ پاؤں اندر کی طرف مڑا ہوا ہو تو  
حالت میں صدمہ قوی باہر کی جانب سے کوٹھے پر پیچھے۔ اس میں رباط العرقی الفخذی راہی او فیومول  
لگامٹ ثابت رہتا ہے۔ لیکن اس جوڑ کا لفافہ رباطیہ رکیب شیولر لگامٹ پیچھے اور اوپر سے  
پھٹ جاتا ہے اور بعض اوقات رباط مستدیر پر راؤنڈ لگامٹ ابھی پھٹ جاتا ہے۔

دیکھو تصویر نمبر ۱ اس اکھڑے ہوئے جوڑ کے رباطات کی



علامات اس جوڑ کے اکھڑ جانے کی حالت میں یہ علامتیں موجود ہوتی ہیں (۱) اکھڑے ہوئے پاؤں کی طوالت ڈیڑھ انچ سے ڈھائی انچ تک گھٹ جاتی ہے (۲) اس پاؤں کا انگوٹھا تندرست جانب کی ایڑی کے اندر کی طرف ہوتا ہے (۳) پاؤں اندر کو مڑ جاتا ہے اور ایڑی اونچی ہو جاتی ہے (۴) ران پیٹ کی جانب کسی قدر مڑ جاتی ہے (۵) پنڈلی ران کی طرف مڑ گھٹنے کا جو نصف سکر جاتا ہے اس لئے بیمار جب لیٹا ہے تو گھٹنا اونچا ہو جاتا ہے۔ اور گھٹنے کو سیدھا کیا جائے تو مریض کی کمر ستر سے اونچی ہو جاتی ہے (۶) ماؤف پاؤں کو تندرست پاؤں کی طرف کسی قدر لے جاسکتے ہیں لیکن پاؤں باہر کی طرف مڑ نہیں سکتا (۷) ران و خانہ الا عظم رگ ریٹ ٹرو کنٹیر تندرست جانب کی نسبت کم نمایاں ہوتا ہے اور

حق الورک کے کنارے پر سامنے کو مائل رہتا ہے (۸) اس جگہ کے عضلات مجتمع ہو جانیکے باعث کو لھا کسی قدر چوڑا معلوم ہوتا ہے (۹) اگر مریض دبلا ہو اور مقام ماؤف متورم نہ ہو تو پدی کا سر اٹھانے سے غیر جگہ پر معلوم ہوتا ہے



تصویر نمبر اکھڑے ہوئے جوڑ کو پتھری کر دینا یا جاتا ہے

(تصویر نمبر اکھڑے ہوئے جوڑ کی عروق حرقی)



زانہ حرقیہ عروق خانہ الا عظم عروق

یا در کھو کہ اس جوڑ میں اکثر تو صرف انخلاع ہی واقع ہوتا ہے لیکن کبھی عدم قوی کے باعث انخلاع المفصل کے ساتھ ہی حق الورک اسے سیٹے بولم کے کنارے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور اس حالت میں انخلاع المفصل مع انکسار العظم زفر کچیر کے واقع ہوتا ہے۔ اس لئے ہم

نمبر شمار	علامات انخلاع صرف	علامات انخلاع مع الانكسار
۱	جوڑ بالکل حرکت نہیں کر سکتا ہے	اگر حرکت کی وقت درد ہوتا ہے لیکن جوڑ کی حرکت بدستور قائم رہتی ہے۔
۲	پاؤں کا رخ اندر کی طرف مائل ہوتا ہے	رخ باہر کو ہو جاتا ہے
۳	حرکت دلانے کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کی آواز نہیں ملتی دیتی	ایسی آواز سنائی دیتی ہے
۴	پاؤں کی پٹریوں پر شکل سیدھا ہوتا ہے اور اس کی طوالت اور شکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور بعد سیدھا ہونیکے پھر اسی حالت پر قائم رہتا ہے	کیچنے سے باسانی سیدھا ہو جاتا ہے لیکن چھوڑ دینے کے بعد سکر کر چھوٹا ہو جاتا ہے۔

علاج۔ اس قسم کے انخلاع میں ہڈی کو اپنی جگہ پر چڑھانے کے لئے طبیوں اور ڈاکٹروں نے چند طریقے نکالے ہیں۔ اس جگہ پر ہم ان میں سے ایک آسان پرانا طریقہ بتاتے ہیں جس کی تعریف حکیم ابوالقاسم زہراوی نے بھی اپنی کتاب میں بہت کی ہے اور زمانہ حال کے ڈاکٹروں نے اس میں کچھ ترمیم کر کے اپنے اعمال میں شامل کر لیا ہے چنانچہ وہ طریقہ یہ ہے کہ اول زمین پر نرم بستر بچھا کر مریض کو اُس پر سیدھا لٹائیں اور دستکار ماؤف جانب کھڑا ہو کر بیمار کے ٹخنے کو ایک ہاتھ سے اور گھٹنے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر اب ٹانگ کو ران پر اور ران کو پیٹ پر اس طرح سکیڑے کہ ٹرے ہوئے پاؤں کا رخ قدرے اندر کو رہے اس طرح کرنے سے ران کی ہڈی کا اکھڑا ہوا سرحتی الورک (رے سی ٹے ہولم) کے پیچھے اور اوپر سے ہٹ کر مقام مقصود کے قریب آ جاتا ہے۔ اب تمام پاؤں کو رفتہ رفتہ گھماتے ہوئے باہر کو موڑیں اور آخر کار باہر کو گھمائیں۔ اس سے ران کی ہڈی کا سر اپنے معمولی مقام پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ماؤف پاؤں کو دوسرے پاؤں کے متوازی لاکر رکھیں تو اس میں کوئی خرابی نہ پائینگے اور پاؤں اپنے ٹھیک موقع پر ہو گا۔ مریض کی تکلیف بھی یکایک کم ہو جائیگی اس وقت ہر طرح اطمینان کر کے بندش باندھیں اور بیمار کو ہدایت کریں کہ عضوماؤف کو بالکل حرکت نہ دے اسکے بعد جوڑ پر مقوی تیلوں کی مالش کریں اور درم ہو تو اس کو تحلیل کرنیوالی ادویات کا استعمال کریں اس کام کے لئے روعن سرخ اعلیٰ درجہ کی مفید دوا ہے۔ اس کا نسخہ اور بنانے کی ترکیب کتاب ہذا کے صفحہ ۱۵ پر درج ہے۔

پاؤں کے پھلانے کا طریقہ

لوس کتاب کا نام التعلیق علیٰ معجز عن البالیف ہوا کا مصنف علامہ اندر کل رہنے والا ایک اہل طب تھا اس نے یہ کتاب ۵۵۰ھ میں تصنیف کی



انجام اگر یہ جوڑ بند ریجہ دستکاری کے پورے طور پر درست نہ ہو سکے یا درست ہونیکے بعد کھڑکے اور چند بار اکھڑنے اور درست ہونے کے سبب جوڑ ڈھیلہ ہو جائے اور ادنیٰ حرکت سے جوڑ اکھڑ جائے یا کڑتا ہو یا ہڈی پورے طور پر اپنی اصلی جگہ پر نہ پہنچے ہو اور ہڈی کو چڑھاتے وقت کچھ نقصان باقی رہ گیا ہو تو ان سب حالتوں میں ران کی ہڈی کا گول سر عظیم الخاصرہ الیلم کو ہمیشہ اندر کی طرف دبا تا رہتا ہے اس دباؤ سے ماؤف جانب کا قعر الخاصرہ (ایلی اک فاسہ) اندر کو دبا جاتا ہے اس لئے شفقہ عانہ (پلوک برہم) کا قطر عرضی رٹرانسورس ٹایا میٹر یعنی آڈا قطر گھٹ جاتا ہے اور حد بہ درکید (اسکی ال ٹوبراسٹی) باہر کو نکل جاتی ہے۔ اس لئے جوف عانہ مخرج (آوٹ لٹ) کشادہ ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں جوف عانہ کی شکل بگڑ جاتی ہے اور اس کی اندرونی وسعت کم ہو جانے کے سبب سے عورت کو وضع حمل کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے ہم نے اس انحراف کا بیان یہاں درج کیا ہے۔

# دوسرا مقالہ

## زنانہ اعضائے تناسل بیرونی کا مرض

اس مقالہ میں پندرہ فصلیں ہیں۔ اور ان میں ہر مرض کا مفصل بیان مع اسکی اقسام اور جداگانہ علاج کے درج کیا گیا ہے۔

**فصل پہلی** - حِلَّةُ الْفَرَجِ رولور پر ورائی ٹس (یعنی شرمگاہ کی خارش اور جلن)۔ اس مرض میں عورت کو ہر وقت اپنی شرمگاہ کے بیرونی حصے میں اس قدر خارش اور جلن محسوس ہوا کرتی ہے جس سے وہ بیچاری نہایت بے چین اور بیتاب رہتی ہے۔ اور شرم کے سبب سے وہ اپنی حالت کو حتی الامکان چھپاتی ہے اور کسی پر ظاہر کرنا پسند نہیں کرتی ہے۔ لیکن بدولت کھجلائے چارہ نہیں پاتی ہے کبھی اس موذی مرض کی ایسی شدت ہوتی ہے کہ مریض کو رات دن میں کسی وقت بھی سونا نصیب نہیں ہوتا کیونکہ خارش اسے ہر وقت بے چین اور پریشان رکھتی ہے۔

یہ مرض کبھی تو خاص اس مقام کی جلد میں کوئی خرابی پیدا ہونے سے اور خون میں گرمی اور حرارت (تیزی) پیدا ہونے سے مستقل طور پر لاحق ہوتا ہے۔ اور کبھی بجائے خود مستقل مرض نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ کسی دوسرے مرض کا تابع ہو کر بطور اسکی علامت کے ظاہر ہوتا ہے اسلئے ہم اسکو دو قسم پر تقسیم کر کے بیان کرتے ہیں

**قسم اول**۔ وہ خارش اور سوزش جو بجائے خود مستقل مرض ہے۔ اس سے ہماری مراد وہ خارش نہیں ہے جو بشمول عام بدن کے خاص اس جگہ بھی لاحق ہو بلکہ اسوقت ہماری مراد وہ خارش ہے جو مقامی طور پر خاص اسی عضو میں پائی جائے۔ اگرچہ بعض عہد کے ہر حصے میں لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن اکثر بڑھاپے کی عمر میں (جیکہ حیض کی آمد بند ہونے لگتی ہے) اسکی زیادہ شکایت سنی جاتی ہے۔ خصوصاً وہ عورتیں جن میں زیادہ تباہی ہوتی ہیں جو اپنی جسم کی صفائی اور غسل کا اہتمام پورے طور پر نہیں رکھتی ہیں۔

**اسباب (۱)** بدن اور لباس کی صفائی کا خیال نہ رکھنا (۲) کھانے پینے میں گرم چیزوں کا زیادہ استعمال رکھنے سے خون میں حدت پیدا ہو جانا۔ جیسا کہ تیز نمک مرچ گڑ۔ تیل وغیرہ کے بکثرت استعمال سے ہوتا ہے (۳) حیض کے بند ہو جانے سے تمام بدن کے خون میں گرمی اور تیزی کا پیدا ہو جانا اور خاص اس مقام میں اس کا فساد ظاہر ہونا (۴) اعصابی کمزوری اور قوت حس کی تیزی (۵) مقام ماؤف کی جلد میں پسینہ کے غدودوں (سوٹ گلیٹنڈز) کی خرابی یا غدد دھنیدہ سی بے شی اس گلیٹنڈز میں کسی مرض کا پیدا ہونا (۶) جلد کے مسامات میں چم جوؤں کی پیدائش ہونا (۷) جلد میں خشکی کا پیدا ہونا۔

**علامات (۱)** مقام ماؤف میں گرمی اور سوزش محسوس ہوتی ہے (۲) گرم چیزوں کے استعمال سے یا گرم مقام میں زیادہ رہنے سے۔ اور گرم لباس پہننے سے مضرت ہوتی ہے (۳) پیشاب میں جلن ہوتی ہے (۴) بھوک کم لگتی ہے اور پیاس زیادہ ہوتی ہے (۵) غذا کے ہضم ہونے میں بھی کبھی تاخیر ہوتا ہے (۶) مقام ماؤف میں اگر پسینہ آتا ہے تو اس میں سخت بدبو آتی ہے (۷) اگر جلد میں چم جوؤں یا خشکی ہو تو شاہدہ سے ظاہر ہو سکتی ہے۔

**علاج۔** مریضہ کو لازم ہے کہ ہر روز گرم پانی اور صابن سے غسل کرے۔ اپنے بدن اور لباس کو خوب صاف رکھے۔ نہانے میں کاربالک سوپ یا کسی دوسری قسم کے خوشبودار صابن کا استعمال رکھیں تو اور بھی زیادہ مفید اور نافع ہوگا۔

اگر خون میں گرمی اور حدت پیدا ہونے کے سبب سے یہ مرض لاحق ہوا ہو تو چند روز مریضہ کو یہ نسخہ پلایا جائے صفت۔ لعاب بہدانہ ۳ ماشہ۔ شیر عذاب ۵ دانہ۔ عرق شامہترہ۔ آلوہ میں تیار کر کے شربت نیلوفر ملا کر ہر روز دونوں وقت اس کو پیائیں۔

یا دیکھو کہ کبھی اس نسخہ کا چند روز تک متواتر استعمال کرنے سے مریضہ کے معدے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے یا کسی سبب پہلے ہی سے اس کا معدہ خراب ہوتا ہے اور ہضم میں تاخیر رہتا ہے تو ایسی حالت میں یہ نسخہ مناسب نہیں ہوتا۔ اس سے بجائے نفع کے نقصانات پیدا ہونیکا خوف ہوتا ہے اس لئے نسخہ تجویز کرنے سے پہلے اور اس کا استعمال کر نیکی حالت میں معالج کو مریضہ کے معدہ کی حالت دریافت کرنے سے غافل نہیں رہنا چاہئے۔ اگر معدہ میں خرابی ثابت ہو تو شیر بادیان ماشہ



عرق شاہترہ ۱۰ تولہ مخیرہ بنفشہ ۴ تولہ کے ساتھ پلائیں۔ یا نقوع شاہترہ پلائیں۔  
فسخہ شاہترہ چارہ۔ سر بھوکہ بندی۔ برادہ مندل سرخ۔ ہلیدہ سیاہ ہر ایک، ماشہ غناب  
۵ دانہ۔ رات کو گرم پانی میں ترکیبیں۔ اور صبح کو لچھان کر شربت نیلوفر ۲ تولہ ڈال کر پلائیں۔  
اس کے علاوہ مہندی کے پتے پیس کر مقام خارش پر دن میں چند مرتبہ لپ کرنا بھی مفید ہوتا ہے  
اور لعاب بہانہ یا لعاب اسپنغول مسلم یا تخم حلی کے جو شاندرے سے طہارت کرنا اور ملتانی مٹی کا  
لیپ کرنا بھی سوزش اور خارش کو رفع کرتا ہے۔ شرمگاہ پر جو نکلیں لگانا بھی مفید ہیں۔  
اگر حیض کی غیر معمولی بندش سے یہ مرض لاحق ہوا ہو تو حیض کے جاری کرنے کی تدابیر عمل میں  
لائیں جائیں ردیکھو بیان احتباس حیض کا

اگر ضعف اعصاب اور عام بدن کی کمزوری یا حص کی تیزی اس مرض کا سبب ہو تو مرن  
اور مقوی غذائیں مریض کو کھلائی جائیں۔ غذائیں گھی اور دودھ کا زیادہ استعمال رہے۔ حریرہ  
مقوی دماغ پلائیں جس کا نسخہ یہ ہے۔ مخمر تخم کدوے شیریں۔ مخمر تخم تربوز ہر ایک ۶ ماشہ۔  
مخمر بادام شیریں مقشر، عدد سب کو پانی میں پیسکر گائے کا دودھ آدھ پاؤ۔ نبات سفید  
۳ تولہ اضافہ کیے پکائیں اور حریرہ بنا کر پلائیں۔ اس کے علاوہ تخم خنشاں سفید۔ کنب مقشر۔  
آملہ خشک۔ جنے کا بین۔ سب مساوی لے کر پانی میں باریک پیس لیں اور اٹھنے کی طرح روغن  
مخمر تخم کدوے شیریں۔ روغن بادام شیریں۔ ہر ایک ۶ ماشہ روغن گل ایک تولہ۔ سب کو  
ملا کر مالش کریں۔

اگر جلد میں خشکی یا اس کے غدود کی خرابی سے شرمگاہ میں خارش پیدا ہوئی ہو تو اس کے  
لئے روغن بادام شیریں روغن بابونہ ایک ایک تولہ۔ موم سفید ۹ ماشہ اور آب کاسنی سبز ۳ تولہ کی  
قیروطی بنا کر مقام ماؤف پر ملیں۔ اسی طرح یہ نسخہ بھی بہت نفع کرتا ہے۔ صفحہ گلیسرین۔ ایک  
حصہ گلاب خالص آٹھ حصے دونوں کو خوب ملا کر اس میں کپڑا تر کریں اور مقام ماؤف پر رکھیں۔  
تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کپڑے کو بدلے رہیں ۛ

لے بدن پر ملنے کیلئے جو دوا بنائی جائے اور اس میں روغن اور موم کی مقدار زیادہ ہو تو اسے عربی زبان کی طحا اصطلاح میں

قیروطی کہتے ہیں ۱۲۔ ایک شہر انگریزی دوا پر جکانگ سفید شفاف اور قوام شہد کا سا ہوتا ہے ۱۲ مولف

نقص شاہترہ

حیرہ مقوی دماغ

اگر بالوں کی جڑوں اور جلد کے مسامات میں باریک باریک جوئیں پیدا ہو جانے سے شرمگاہ میں خارش آتی ہو تو عضواؤں کو ہر روز چند بار مرکبوری لوشن سے اچھی طرح دھونا بہت فائدہ کرتا ہے اسی طرح مرکبوری آئینٹ (مرہم زیتنی) یا مرہم کیا ٹول ہر روز دوبارہ لگانا بہت نفع کرتا ہے اور تنباکو کے جیسا ندے سے عضواؤں کو دھو کر اسپرقر سے کیا ٹول چھڑکنا بھی مفید ہے۔

**قسم دوم۔** وہ خارش یا سوزش جو کسی دوسرے مرض کی تابع ہو جیسے ورم شرمگاہ۔ ورم رحم ورم مثانہ سوزاک حرقت بول۔ کرم امعاء وغیرہ۔ اس قسم کی خارش کا علاج ان امراض کے ضمن میں بیان کیا جائے گا جن کے تابع یہ خارش ہوتی ہے اس لئے ان امراض کا بیان دیکھنا چاہئے

**فصل دوم درم الفرج** (دولوائی لٹ) یعنی شرمگاہ کا سوجنا شرمگاہ کے مقام میں کبھی اس قدر سوجن پیدا ہو جاتی ہے جس سے مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ مقام ماؤں میں جلن اور پچھل خارش ہوتی ہے۔ اختلاف اسباب کے لحاظ سے اس مرض کی سات قسمیں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں جن کو ہم سہولت علاج کی غرض سے علیحدہ علیحدہ ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

**قسم اول شرمگاہ کا خفیف ورم** ہے جو شادی کے ابتدائی زمانہ میں اکثرت مباشرت کے باعث بعض اُن کو کھدالڑکیوں کو لاحق ہو جاتا ہے۔ یا وضع حمل کی تکلیف سے اکثر عورتوں کو بعد وضع حمل کے عارض ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس قسم کا ورم اکثر تھوڑے دنوں میں خود بخود تحلیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ورم کی تکلیف زیادہ ہو یا کسی سبب سے ورم بڑھ جائیگا اندیشہ ہو تو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔

**علامت** اس قسم کے ورم کی یہ ہے کہ اس کا سبب پہلے واقع ہوا ہو گا جو دریافت کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔

**علاج** (۱) سب سے پہلے سبب مرض کو کثرت مباشرت کا ترک کرنا ضروری ہے (۲) پوست خشکاش

سٹہ پر کھدالڑکی آتے مرکبوری دوا رکھا ۵۔ ۱۲ گریں باریک ہیں کر ۲۰ اونس دھندلا ایک بوتل پانی میں حل کر لیں اس عرق کے ایک اونس میں نصف گرین دوا ہوتی ہے ۱۲ مولف سٹہ اس کو بلوائنٹ منٹ بھی کہتے ہیں یہ مرہم ولایت سے بنا ہوا آتا ہے اور انگریزی دوا فروشوں کے ہاں ملتا ہے۔ نسخہ اس کا یہ ہے۔ پارہ ۱۱ حصے چربی بھیر کے پیٹ کی ۱۱ حصے خوب ملائیں اگر یہ مرہم کچھ دنوں رکھا رہے تو اس میں پارہ کے اجزاء نقطوں کی صورت میں نظر آنے لگتے ہیں اسلئے استعمال کے وقت اسے خوب مل کر لیا جائے ۱۲ مولف سٹہ اس کا نسخہ یہ ہے۔ کیلول ۱۰۔ ۱۲ گریں وایسین ایک اونس میں ملا لیں ۱۲ مولف۔

ایک تولہ ایک سیر پانی میں خوب پکائیں۔ اور اسفنج یا صاف کپڑے کی گدی اس میں تر کے چند بار نصف نصف گھنٹہ تک تکمید (فومن ٹیشن) کریں (۳) کبھی صرف گرم پتھر یا اینٹ وغیرہ کے ساتھ سینکنے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے (۴) اگر مرغیہ کمزور نہ ہو اور موسم بھی زیادہ سرد نہ ہو تو مرغیہ کو گرم پانی میں بٹھانا بھی مفید ہوتا ہے خصوصاً جبکہ اس میں محلل دوائیں جوش دی گئی ہوں جیسے تخم بیجھی۔ تخم حنظل۔ کلوہ خشک وغیرہ (۵) اگر اس کے بعد بھی ضرورت باقی رہے تو روغن بابونہ روغن گل ایک ایک تولہ ملا کر گرم کریں اور مغاوت پر نرم ہاتھ سے مالش کریں (۶) اگر ورم میں گرمی یا جلن محسوس ہو تو پھپھو کر (۷) ماشہ گلاب (۸) تولہ میں حل کر کے اور اس میں کپڑا تر کر کے ورم کے موقع پر رکھنا مفید ہوتا ہے۔ (۹) غذائرم اور سر ترلع الہضم جس میں نمک مرچ بہت کم ہو کھلانی چاہئے۔ ایسے موقع پر دودھ پلانا بھی نہایت مفید ہوتا ہے۔

**قسم دوم سری۔** وہ ورم جو پتی کی طرح انفقا تا شرمگاہیں پیدا ہو جائے۔ اگر ہضم غذا کی خرابی سے تیز بخارات استقدر زیادہ مقدار میں پیدا ہوں جو مسامات جلد سے تحلیل نہ ہو سکیں۔ یا بیرونی سردی کے اثر سے جلد کے مسامات سکڑ جائیں اور معمولی بخارات کو تحلیل ہونے سے باز رکھیں۔ اور یہ بخارات جلد کے نیچے بند ہو کر اپنی تیزی یا کثرت مقدار کے باعث جلد میں خارش پیدا کریں تو اس وجہ سے زیادہ کھجلائے کے باعث پچھر کے کاٹنے کی طرح پہلے جلد پر ددوڑے پیدا ہوتے ہیں پھر سبک ورم پیدا ہو جاتا ہے علامات راحضواؤت میں چوٹیوں کے کاٹنے کی سی چھن اور ان کے چلنے کی سی حرکت مع قدرے جلن کے محسوس ہوتی ہے (۱) پچھر کھجلائے سے ددوڑے پیدا ہو کر ورم ہو جاتا ہے (۲) سورہ ہضمی کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں (۳) کبھی ظاہر بدن پر بیرونی سردی لگنے سے ورم ہو جاتا ہے (۴) بخار بالکل نہیں ہوتا ہے۔

**علاج (۱) اعانت ہضم اور تحلیل بخارات کے لئے جوارش کمونی ایک تولہ کھلا کر ادھر سے شیرہ ہادیان شیرہ تخم کثوت ہر ایک ۵ ماشہ عرق ہادیان عرق کلوہ چھ چھ تولہ میں نکال کر اور شربت بردی ۳ تولہ حل کر کے پلائیں (۲) اگر کسی قدر قبض ہو تو بجائے شربت زوری کے خمیرہ بنفشہ یا گلشنہ یا شربت دینا بقدر مناسب دینا چاہئے (۳) ایسے موقع پر گنیشیا سلفاس ۳ ڈرام یا سلفیٹ آف سودا سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے (۴) تخم عزیزہ ۲ تولہ۔ گھاری نمک ۵ ماشہ یا ایک میسکر ورم کی جگہ مالش کریں (۵) روغن گل**

ایک تولہ سرکہ خالص ہماشہ ملا کر ملنا۔ یا روغن چنبیلی ایک تولہ۔ کاغذی لیموں کے عرق ۲ تولہ میں ملا کر ملنا بھی مفید ہے (۶) گیرہوں کی بھوسی ۳ تولہ۔ نمک طحام ہماشہ دوسیر پانی میں جوش دے کر اس کو طہارت کرنا بھی فائدہ دیتا ہے (۷) پلمبائی ایسی ٹٹے ٹس ۱۶ اونس ۲۰ اونس پانی میں حل کر کے اس میں صاف کپڑا تر کریں اور بار بار مقام درم پر رکھیں۔ اس سے بھی ورم بہت جلد تحلیل ہو جاتا ہے اور خارش فوراً موقوف ہو جاتی ہے۔

**قسم تیسری۔** درم درخویا تھبجہ رائے۔ ڈی ما، یعنی ڈھلڈھلا ورم یا پھولا پن جو رقت خون اور کثرت رطوبت کے سبب یا عروق جاذبہ رملے ٹمکس کے ضعف سے یا ان پر کسی طرح کا بیرونی دباؤ پڑنے سے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ مرض استسقا کی زیادتی میں یا حمل کے آخری زمانہ میں اکثر واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسی حالت میں عروق جاذبہ خون کی مائیت کو اعضا کی ساخت میں سے پورے طور پر جذب نہیں کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بدن کے غد دملفا ویدہ رملے ٹمک گلیٹنڈز بھی اس قیق رطوبت میں اپنا تصرف (کیمیائی تغیر) کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں اس لئے جن اعضا کی ساخت میں وہ خام رطوبت معمول سے زیادہ باقی رہ جاتی ہے ان میں ورم رخو پیدا ہو جاتا ہے۔

**علامات (۱)** وجود سبب رقت خون وغیرہ امور کے آثار پائے جاتے ہیں (۲) عضو ماؤف کی ساخت میں پھولا پن مع قدرے ثقل کے ہوتا ہے (۳) مقام درم پر انگلی کے دباؤ سے گرھٹا پڑ جاتا ہے (۴) شدت مرض کی حالت میں جلد کے اندر پانی کی جھلک محسوس ہونے لگتی ہے۔ (۵) مقام ماؤف میں گرمی یا سوزش بالکل نہیں ہوتی ہے۔

**علاج۔** اگر یہ ورم رقت خون اور کثرت رطوبت کے سبب سے ہو تو اس کا علاج اس طرح کریں۔

(۱) جوارش جالینوس ہماشہ میں کشتہ خبث السدید بقدر دو چاول ملا کر چند روز کھلائیں (۲) اگر مزاج میں گرمی نہ ہو تو اجوائن دیسی ہماشہ قدرے نمک سیاہ کے ساتھ رات کو سوتے وقت پھکایا کریں (۳) ہضم کی دستی کا خیال رکھیں (۴) رفع قبض کیلئے حب تنکار دو عدد کبھی کبھی رات کو سوتے وقت کھانا مفید ہے نسخہ حب تنکار۔ سہاگہ تیلیہ جو اکھا رنو شادر ہر ایک ۳ ہماشہ۔ نمک میندہ۔ نمک سوخچر۔ نمک

سانبصر۔ ہر ایک ۴ ہماشہ۔ سونٹھ عرچ سیاہ پیل ہر ایک ایک تولہ۔ پوست ہلیہ زرد۔ ہیرہ۔ آملہ خشک ہر ایک دو تولہ۔ سب کو خوب کوٹ چھان کر لیموں کاغذی کے عرق میں گوندھ کر جنگلی بیر کے

برابر گولیاں بنالیں ۱۵ اسفوف تریب بھی بلغم کو بذریعہ اسہال کے خارج کرتا ہے اور شیخ علیہ الرحمۃ نے اس کی بہت تعریف لکھی ہے نسخہ یہ ہے - تربد سفید مصفی - سونٹھ - شکر سفید ہر ایک ایک تولہ لیکر اسفوف بنائیں اور اس میں سے ۶ ماشہ لیکر پانی کے ساتھ پھکائیں (۱۶) سونٹھ ۳ ماشہ نمک ۳ ماشہ باریک پس کر چنے کے بین میں ملا کر دم پر زری سے مالش کرنا یا اسکی پوٹلیوں سے تمکید کرنا بھی مفید ہے اگر دم ملغمی استسقا کے سبب ہو تو اس کا علاج کریں (۱۷) جو ضما و مرض کے شکم پر کیا جائے اسی میں سے تھوڑا سا لے کر اس مقام پر بھی لپ کریں صفحہ ۲۰ شک بڑا ایک تولہ - زیرہ سیاہ گل امنی بابونہ - اکیلل الملک - ناگ موتھا - مکو خشک ہر ایک ۳ ماشہ - مرکی - ایلوہ - ریوند چنی ہر ایک ۳ ماشہ بورہ امنی ۲ ماشہ سب کو پانی میں باریک پیکر نیگرم ضما و کریں (۱۸) دخت انگور کی راکھ - نمک شورہ - بکری کی میتگنیاں بقدر حاجت لے کر ضما و کریں (۱۹) گیہوں کی بھوسی اور نمک طعام کی پوٹلیوں سے تمکید کرنا بھی بہت فائدہ کرتا ہے -

اگر وضع حمل کا زمانہ قریب ہو نیکی سبب یہ دم پیدا ہو گیا ہو تو اس کے علاج کی چند ان ضرورت نہیں ہوا اگر ضرورت سمجھی جائے تو صرف ریہ کی پوٹلیوں سے تمکید کرنا کافی ہوتا ہے -

قسم چوتھی وہ دم ہے جو اندام نہانی کی معمولی رطوبت میں تیزابی خاصیت پیدا ہو جانے کے سبب سے اور بدن کی صفائی کا لحاظ بذریعہ غسل یا طہارت کے پورے طور پر نہ رکھنے سے پیدا ہوتا ہے - یہ مرض اکثر غریبوں کی اولاد اور بیل رہنے والی رطوبتوں میں رسن بلوغ کے قریب پایا جاتا ہے -

علامات (۱) مریضہ کا میل کچھلا رہنا اور غسل و طہارت کا خیال نہ رکھنا (۲) شرمگاہ سے بدبودار اور تیزابی رطوبت کا بہنا (۳) مقام ماؤف میں قدرے گرمی اور جلن مع سرخی اور خارش کے محسوس ہونا (۴) مریضہ کے مزاج میں گرمی اور تیزی کے آثار پائے جانا (۵) پسینہ کی کثرت اور اس کا متعفن ہونا -

علاج (۱) مریضہ کو نہانے اور بدن کے صاف رکھنے کی ہدایت کریں (۲) گسرخ رسوت خالص - صندل سرخ - جدوار اصلی ہر ایک ۶ ماشہ - مکو سبز کے پانی میں پیکر ضما و کریں -

(۳) اگر مزاج میں گرمی زیادہ ہو تو لعاب بہدانہ ۳ ماشہ - شیرہ عناب ۵ دانہ - عرق مصفی خون ۱۰ تولہ میں تیار کر کے اور شربت نیلو فر ۲ تولہ حل کر کے پلائیں (۴) غذا میں ٹھنڈی ترکاریاں یا مسوڑم قدرے سرکہ خالص سے چاشنی دے کر ہمراہ چپاتی کے کھلائیں -

قسم پانچویں - وہ دم یہ ہے جو خون میں گرمی اور تیزابی خاصیت پیدا ہونے سے - اور مقام ماؤف میں کمزوری ہونے کے سبب سے پیدا ہوتا ہے -


علامات (۱) مقام ماؤف میں سرخی اور جلن محسوس ہونا (۲) پیشاب میں گرمی اور جلن کی شکایت - (۳) عام بدن میں امتلائے خون کی علامات موجود ہونا (۴) پیاس کی شکایت اور بدن میں غیر معمولی گرمی یا خفیف بخار کی سی حالت معلوم ہونا -

علاج (۱) مریضہ کو صبح کے وقت نفوع شائستہ ہمراہ شربت ضروری بار کے پلائیں (۲) شام کے وقت لعاب بہدانہ والا نسخہ شربت نیلوفر کے ساتھ دیں (۳) اسکے ساتھ ہی گل سرخ - رسوت - آرد جو طلب رپانی کی کافی ہر ایک ۶ ماشہ - آب کاسنی سبز - آب مکوہ سبز (بقدر حاجت) میں پیسکر قضا د کریں (۴) مکوہ خشک - تخم حطی ایک ایک تولہ - برگ نیب سبز - برگ حنا سبز ہر ایک دو تولہ سب کو دوسیر پانی میں پکا کر اس سے طہارت کرائیں اس سے دم بہت جلد تحلیل ہو جاتا ہے -

یاد رکھو کہ یہ دم کبھی اس قدر شدت پکڑتا ہے کہ جا بجا سیاہی کے دھبے پڑنے لگتے ہیں اس میں گرمی اور جلن بشتت محسوس ہونیکے علاوہ سخت تیز بخار بھی ہونے لگتا ہے - ایسی حالت میں علاوہ تدابیر مذکورہ بالا کے مقام ماؤف پر جو نکس بھی لگائی جاتی ہیں یا فصد ہل کی ضرورت پڑتی ہے - قسم چھٹی - کبھی یہ دم اُن غدوں سے شروع ہوتا ہے جو شرنگاہ اور اندام نہانی کی ساخت میں گہرے واقع ہیں - پھر دم کے بڑھنے سے شرنگاہ کے کنارے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں - اس وقت یہ لب پھول کر موٹے اور سرخ ہو جاتے ہیں - اگر پورے طور پر علاج نہ کیا جائے تو دمل ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے لیکن یہ دمل باہر کی طرف بہت کم پھوٹتا ہے - اکثر اندام نہانی کی ساخت میں پیپ راستہ کر کے دمل سے دہر اندر کی طرف خارج ہوتی ہے بعض مرتبہ یہ دمل مقعد میں پھوٹتا ہے -

علامت - شرنگاہ کے لب دم کے باعث پھولے ہوئے سرخ و نیز اور گرم ہوتے ہیں ٹیس کا درد ہوتا ہے - اس وقت یہ دم متفق الا سختیائی رسوڈنٹل ہرنیا سے مشابہ ہوتا ہے لیکن یہ دمل کا دم زیادہ سرخ اور سخت اور محدود ہوتا ہے برخلاف مرض متفق کے کیونکہ نہ اس میں مقام ماؤف زیادہ سرخ ہوتا ہے نہ اس میں ایسی سختی ہوتی ہے نہ وہ محدود ہوتا ہے بلکہ وہ کھانسنے سے بڑھ جاتا ہے - اور دبانے سے گھٹ جاتا ہے علاوہ بریں اسباب متفق کی موجودگی بھی اس کی بڑی علامت ہے -

دیکھو تصویر نمبر ۹۔ اس ورم کی



(۱) برکب

(۲) بظریع غلاف

(۳) شفر صغیر

(۴) شفر کبیر متورم

(۵) قحطۃ البیض ورم سے ڈھکا ہوا ہے

(۶) قحطۃ المہبل

(۷) شفر کبیر غیر متورم

علاج۔ ابتدا میں ایسی دواؤں کا لیپ کریں جن سے مادہ کی آمد منقوت ہو جائے۔ پھر اگر نفع معلوم نہ ہو تو جو نکلیں لگائیں۔ اگر دمل ہو جائے تو ملٹس باندھیں اور ضرورت ہو تو مریضہ کو جلاب میں لگا کر پیپ موجود ہو تو نشتر سے شکاف دے کر زخم کا علاج کریں۔ بعض مرتبہ مصفیات خون اور تریبیدی کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت لعاب بہدانہ والا نسخہ اور نقوع شاہ ترہ مفید ہوتا ہے۔

قسم سائویس وہ ورم ہے جو شرمگاہ میں بسبب آتشک یا سوزاک وغیرہ کے اکثر ہو جاتا ہے اسکا خاص علاج رعلاوہ تداہیر مذکورہ بالا کے اوہی ہے جو ان امراض کے بیان میں لکھا جائے گا۔

ردیکھو بیان ان امراض کا کتاب ہذا میں

فضل تیسری بشوالضرع را پرلشن آف دی ولوا یعنی شرمگاہ کی پھنسیاں کبھی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں شرمگاہ کی جلد پر نکل آتی ہیں یہ چار قسم کی ہوتی ہیں۔ اگرچہ ان کا عام سبب تو خون کی خرابی اور حرارت ہے اور اسی لئے ان سب کا علاج بھی قریب قریب ایک ہے۔ لیکن پھر بھی بعض اقسام کے لئے بعض بعض دوائیں مخصوص ہیں اسلئے ان اقسام کو ہم علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔

قسم اول۔ باریک اور سرخ رنگ کے دانے جن میں گرمی اور جلن زیادہ ہوتی ہے کبھی شدت تکلیف کے سبب سے مریضہ کو خفیف سی تپ بھی ہو جاتی ہے۔

علاج (۱) لعاب بہدانہ ۳ ماشہ۔ شیرہ عناب ۵ دانہ۔ شیرہ تخم کاہو مقشر ۳ ماشہ۔ عرق مرکب

مصفی خون ۱۰ تولہ میں تیار کریں اور شربت نیلو فر ۲ تولہ حل کر کے پلائیں (۲) رسوت۔ صندل سفید ۱۰ ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ کافور ایک ماشہ۔ آب کاسنی سبز میں پیکر لپ کریں (۳) کتھ سفید ۱۰ ماشہ۔ کافور ایک ماشہ۔ گلاب خالص میں حل کریں اور سفید کپڑا اس میں نر کر کے بار بار عضو ماؤف پر رکھیں (۴) اگر پھنسیوں میں ریم ٹنگی ہو تو مرہم کافوری لگانا مفید ہوتا ہے نسخہ اس کا یہ ہے سفیدہ کاشغری مفسول تولہ۔ صندل سفید گھسا ہوا ۱۰ ماشہ۔ کافور ۳ ماشہ۔ سب کو نہایت باریک پیکر رکھیں اور مرہم سفید ایک تولہ۔ روغن گل ۳ تولہ میں لپکا کر پی ہوئی دوائیں اس میں ملائیں اور دستے سے خوب حل کریں جب سرد ہونے کے قریب آئے تو ایک انڈے کی سفیدی اس میں ڈال کر خوب گھوٹیں کہ ایک ذات ہو جائے۔ بعد سرد ہونے کے مرہم دانی میں رکھ چھوڑیں۔

قسم دوسری۔ یہ پھنسیاں پہلی قسم سے کسی قدر بڑی اور پیپ دار ہوتی ہیں۔ ان میں جلن اور درد بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ ان کی پیپ میں تیزابی خاصیت بھی نہیں ہوتی ہے۔

علاج تداویسہ کورہ بالا کے علاوہ پھنسیوں پر مرہم دار سنگ کالیپ کرنا مفید ہے اور سفیدہ کاشغری کا مرہم بھی لگایا جاتا ہے نسخہ یہ ہے مرہم سفید ۳ ماشہ۔ روغن گل ایک تولہ میں بگھلا کر سفیدہ کاشغری مفسول ۱۰ ماشہ اس میں ملائیں۔ جب تک سرد ہووے دستے سے خوب حل کریں۔

قسم سوم۔ خارش نر در جرب کی پھنسیاں جو اکثر بشمول دیگر مقامات کے شمر گاہ کے لبوں پر بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ دانے خارش کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور زیادہ کھجلائے سے تیزابی کیفیت کی رفیق رطوبت ان میں سے خارج ہوتی ہے اور جہاں یہ رطوبت لگتی ہے وہیں دوسرے دانے نکل آتے ہیں۔ پھر یہ دانے زیادہ بڑے ہو کر ان میں ریم ٹنگ جاتی ہے۔ اس وقت دانوں میں سوزش اور درد شدید ہوتا ہے۔

علاج (۱) اس قسم کی پھنسیوں کو مرہم کلیلہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے نسخہ روغن کنجدہ تولہ میں نیب کے تازہ پتے جلائیں پھر ان کو نکال کر تیل میں مرہم نر در ۱۰ تولہ بگھلا دیں پھر اس میں کلیلہ مصفی ۳ تولہ ڈال کر اچھی طرح حل کر کے سرد ہونے سے پہلے چھان لیں تاکہ تلچھٹ اور بیل علیحدہ ہو جائے سرد ہونے کے بعد یہ مرہم استعمال کریں (۲) مرہم کبریت بھی نہایت مفید ہے نسخہ مرہم نر در ایک تولہ روغن کنجدہ تولہ میں بگھلا لیں جب سرد ہو جائے گندہک اتو لہ مصفی باریک پیس کر اس میں ملا لیں۔



(۳) ایلوہ مصفی ۳ ماشہ املی ایک تولہ۔ آب شاہترہ سبترہ ۱۰ تولہ میں یا تازہ پانی میں صبح کو ترکیں۔ دوسرے دن صبح کو اس کا نتھار لیکر پی لیں۔ یہ عمل تین دن تک کہے پھر تین دن چھوڑ دیں۔ پھر تین دن اسی طرح پی کر تین دن ترک کریں پھر تین دن تک پیئیں۔ اس میں پندرہ دن صرف ہوتے ہیں۔ نو دن استعمال دوا میں اور چھ دن درمیانی وقفہ کے۔ اس ترکیب سے گرم مزاج والے مرضیوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے ۴۴ کھجلی کے مرض میں گندھک برصے تجربہ بہت نافع ثابت ہوا ہے۔ اس کے استعمال کے چند طریقے ہیں ان میں ایک آسان طریقہ جو بارہا تجربہ میں آچکا ہے وہ یہاں لکھا جاتا ہے صفت۔ گائے کا دودھ ایک سیر چینی کے پیالے میں رکھیں اور گائے کا گھی ۵ تولہ کر چھ میں ڈال کر خوب گرم کریں۔ اور گندھک مصفی باریک پسکرا سیں ڈالیں جب گھی میں شعلہ اٹھے اس کو مع گندھک کے دودھ میں ڈال کر کسی برتن سے ڈھک دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گھی کو دودھ پر سے اتار کر پھر کر چھ میں ڈالیں اور خوب تیز گرم کر کے دودھ میں کا گندھک نکال کر پکتے ہوئے گھی میں ڈالیں جب گھی میں شعلہ اٹھے بدستور سابق اس کو دودھ میں ڈال کر ڈھک دیں۔ اسی طرح دودھ کو اس طی اور گندھک سے سات مرتبہ بگھار دیکر گھی اوپر سے اتار لیں یہ گھی پھنسیوں پر لگا یا جاتا ہے اور دودھ کو مرضی پی لیتا ہے۔ اگر یہ دودھ مرضی کو مفہم ہو جائے تو بہت جلد مرض رفع ہو جاتا ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے بعد تھے ہو جائے تو بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔

قسم چہارم۔ آتشکی پھنسیاں جو سیاہی مائل خشک اور سخت ہوتی ہیں ان میں نہ زیادہ درد ہوتا ہے نہ زیادہ پیپ ہتی ہے۔ البتہ قدرے جلن محسوس ہوتی ہے۔ کبھی پھنسیوں کے اوپر سے جلد کا چھلکا اتر کر سرخ زخم نکل آتا ہے جس کے کنارے کسی قدر ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔

علاج۔ مرضیہ کو چند روز مصفیات خون کا استعمال کرائیں۔ معجون عشبہ ہمراہ عرق عشبہ کے پلانا مفید ہوتا ہے۔ اطریفل شاہترہ رات کو کھلانے سے فائدہ ہوتا ہے ان کے علاوہ مرکبات سیما بھی اس مرض میں نہایت نافع اور عجیب الاتر ہیں چنانچہ پھنسیوں کے لئے میرحم نہایت مجرب ہے نسخہ۔ پارہ مصفی گندھک مصفی۔ توتیا سبز۔ مردار سنگ۔ چچا لیہ کہنہ سوختہ۔ کتھ سفید ہر ایک ہا ماشہ سب کو باریک پسکرا نگاہ رکھیں۔ گائے کا گھن ۲ تولہ ایک سو ایک مرتبہ سرد پانی سے دھو کر اس میں وہ دوائیں ملائیں۔

تھوڑی دیر تک

گندھک کا استعمال

کرم سیف

قسم پنجم۔ آتشکی متے (وارٹس) جب آتشکی نہ ہر خون میں سرایت کر جاتا ہے۔ یا اس میں کسی سبب سے سودا ویت غالب ہو جاتی ہے تو جلد کی ساخت کے غدد و جسامت میں بڑھ جاتے ہیں۔ اور مثل چھوٹے چھوٹے دانوں کے نمودار ہوتے ہیں۔ اس قسم کے سسے تمام جسم کی جلد میں ہر جگہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اکثر ہاتھ پاؤں چہرہ کے علاوہ عورتوں کی شرمگاہ پر اندام نہانی کے قرب و جوار میں اور مقعد کے گرد زیادہ پائے جاتے ہیں۔

اسباب (۱) خون میں آتشکی زہر یا سودا ویت بڑھ جانا (۲) مقام ماؤف پر کسی قسم کا خراش پنخیا (۳) مقامی کمزوری اور خون کی خرابی۔

علامت (۱) یہ دانے نہایت سخت سیاہی مائل ہوتے ہیں (۲) شکل میں مثل گوبی کے پھول کے کھردرے اور خاردار ہوتے ہیں (۳) ان کی جسامت باجرہ کے دانے سے بیر کی گٹھلی کے برابر تک ہوتی ہے (۴) کبھی ان میں قدرے خارش بھی ہوتی ہے۔

علاج دو طرح کیا جاتا ہے (۱) تصفیہ خون کے لئے پینے کی دوائیں عام اصول کے موافق پلائی جائیں اور سہل کے ذریعہ سے تنقیہ کر دیا جائے۔ سودا ویت کو پیدا کرنے والی اشیاء سے پرہیز کر لیا جائے۔ دودھ گھی اور مرغن غذائیں کھلائی جائیں (۲) اگر سسے بڑے ہوں تو انھیں کاٹ کر کسی تیزاب سے جلا دیا جائے اور اگر چھوٹے ہوں تو صرف تیزاب سے جلا دینا کافی ہوتا ہے۔ اس غرض کے لئے ڈکرومک ایسڈ استعمال کیا جاتا ہے۔

فصل چوتھی سلحۃ الصراج ریپوڈنڈل کانڈی لوما یعنی شرمگاہ کی رسولیاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرمگاہ کے لبوں پر اندام نہانی کے کناروں پر اندر کی طرف چند قسم کی رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اکثر بڑھاپے کی عمر میں دیکھنے میں آتی ہیں۔

چنانچہ شرمگاہ کے لبوں پر پیدا ہونے والی رسولیاں اکثر خفیہ طور پر بڑھتی ہیں۔ ابتداء میں مریضہ ان سے بالکل بے خبر رہتی ہے لیکن جب کسی قدر بڑھ جاتی ہیں اس وقت مریضہ کو چلنے پھرنے میں کچھ ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ اور شرمگاہ کے لبوں کو اگر چٹکی سے دبا کر دیکھیں تو ان کی ساخت میں رسولی محسوس ہوتی ہے۔


اس قسم کی رسولیوں میں سے بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں دباؤ سے درد نہیں ہوتا۔ اور

نہ اس مقام کی جلد کے رنگ میں کچھ فرق ہوتا ہے لیکن اگر شکاف دیا جائے تو ان کی مختلف حالتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض کے اندر سے نہایت سخت اور منجھ ماوہ نکلتا ہے اور بعض میں چربی کی طرح کا نرم مادہ نکلتا ہے بعض کے اندر گاڑھا زرد رنگ یکم کی طرح کا مواد ہوتا ہے۔ اور بعض میں سے رقیق لسیدا رطوبت مثل اندے کی سفیدی کے خارج ہوتی ہے اور ان میں سے بعض قسم کی رسولیاں جلد بڑھ جاتی ہیں اور بعض بہت دنوں میں آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں۔ اسی طرح بعض رسولیوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور ان میں سے بدبودار تیزابی خاصیت کا مواد نکلتا رہتا ہے کبھی ان میں درد ہوتا ہے اور جب ان میں زخم ہو جاتے ہیں کبھی تو سیلان خون کا بھی اتفلق ہوتا ہے اور بعض رسولیاں خاکی رنگ کی ہوتی ہیں اور ان میں خارش آتی ہے لیکن کئی قسم کا مواد ان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔

رسولیوں کے اقسام

ان کے علاوہ اندام نہانی کے دہانے کے گرد پیدا ہونے والی رسولیاں بھی بہت قسم کی ہوتی ہیں جن کی جسامت مسٹر کے دانے سے بیضہ مرع کے برابر تک ہوتی ہیں۔ اس وقت مریضہ کو چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض تو نرم چربی کی طرح۔ اور بعض سخت ریشہ دار ساخت کی ہوتی ہیں بعض سادہ ہوتی ہیں جن میں درد نہیں ہوتا۔ اور بعض سرطانی جن میں درد و لبتہ ہوتا ہے کبھی ان میں سخت خارش ہوتی ہے اور کھجلائے سے زخم ہو جاتے ہیں۔ زخموں سے رقیق رطوبت جاری رہتی ہے۔

رویکھو تصویر نمبر ۱۰۔ ان رسولیوں کی



- (۱) رگب
- (۲) بظریع خلاف کے
- (۳) شفر کبیر
- (۴) شفر صغیر
- (۵) شفر صغیر کی رسولی نے بڑھ کر فتح المہبل کو گھیر لیا ہے۔
- (۶) شفر کبیر کی رسولی جمع خلفی تک
- (۷) جمع خلفی
- (۸) فتح المہبل
- (۹) فتح المہبل۔ رسولی سے گھرا ہوا
- (۱۰) اٹیل میں قاتنا طیر ڈالا ہوا ہے۔


اسباب (۱) اکثر تو یہ رسولیاں آتشکی زہر کے سبب پیدا ہوتی ہیں (۲) بڑھاپے میں نقصائے سن کے سبب خون کی غلظت اور گاڑھے بلغم کی زیادتی (۳) احتراق خون اور سودا ویت کا غلبہ۔

علاج۔ اگر بدن میں آتشکی زہر کا چوڑا بت ہو جائے تو وہی عام اصول اختیار کریں جنکے موافق آتشک کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور اگر بلغم غلیظ کے سبب خون میں خرابی پیدا ہوئی ہو تو چند روز تک یہ نسخہ منضج کا پلا کر تنقیہ کرانا چاہئے۔ نسخہ: شہترہ چڑاۓ۔ بادیان منڈی۔ ہر ایک ماشہ اسطوخودوس۔ بادرنجبویہ۔ گاؤ زبان ہر ایک ۳ ماشہ غلاب ۵ دانہ۔ افیمون ۵ ماشہ۔ رات کو گرم پانی میں تر کر کے صبح کو چھان کر شربت غلاب ۲ تولہ داخل کر کے پلائیں۔ سہل کے دن ادویہ سہلہ اضافہ کریں۔ اور دوسرے تیسرے سہل میں پوست ہلیلہ کا بلی تولہ۔ گل سرخ، ماشہ اضافہ کریں۔ تیرہ کے دن یہ نسخہ مفید ہے۔ شہرہ بادیان۔ شہرہ غلاب۔ عرق مصفی خون میں تیار کر کے شربت بنفشہ اور تخم ریحان داخل کر کے پلائیں۔ مہسلوں سے چند روز کے بعد رات کو سوتے وقت اطراف نفل شہترہ ۹ ماشہ کھلانا مفید ہے۔

اگر احتراق خون کے سبب خون میں سودا ویت غالب ہو تو یہ نسخہ منضج کا مفید ہے صفتہ۔ شہترہ، ماشہ۔ غلاب ۵ دانہ۔ منڈی ۹ ماشہ۔ گل نیلوفر، ماشہ۔ آلو بخارا ۵ دانہ۔ گل سرخ، ماشہ۔ افیمون ۵ ماشہ۔ گاؤ زبان ۵ ماشہ۔ گلقدسم تولہ۔ باقی تدبیر مہلوں کی وہی ہے جسکا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ ان سے علاوہ ایسے مر لیں کیلئے بکری کا تازہ دودھ ہمراہ شربت غلاب کے بہت مفید ہے۔ ان حملہ تدابیر سے رسولیوں کی آئندہ پیدائش اور بڑھنا موقوف ہو جاتا ہے۔ مقامی علاج اس طرح کیا جاتا ہے کہ اول چند روز تک تحلیل کرنیوالی ادویات کا استعمال کریں۔ جیسا کہ مرہم اشنق مندرجہ صفحہ ۱۸ کتاب ہذا۔ اور کمبید کجند سیاہ والی۔ اور اگر اس علاج سے نفع نہ ہو تو شگاف و دیگر رسولی کو نکال دیتے ہیں یا اس میں کا مواد نکال کر اسے کاسٹک سے جلادیتے ہیں۔ یا رسولی کو مقررہ سے کاٹ کر کسی تیزاب سے جلادیتے ہیں؟

فصل پانچویں سلعۃ الاحلیل ریور تیصل ٹیومر یعنی زنارہ شمر گاہ میں مجرے بول کے دہانے پر عونی رسولیاں۔ کبھی عورتوں کے ثقہ البول رمی لے لٹس پوری نے ری اس کے گرد چھوٹی چھوٹی رسولیاں باریک ڈنڈیوں کے ذریعہ سے باہر کی طرف لٹکی اور پھیپے سے پوشیدہ پائی جاتی ہیں۔ ان کی جسامت مٹر کے دانے یا سیم کے بیج کے برابر تک ہوتی ہے۔

۱۵ دیکھو صفحہ ۱۱ کتاب ہذا ۱۲ مؤلف ۱۵ دیکھو صفحہ ۲۴ کتاب ہذا ۱۲ مؤلف ۱۶



(۱) مجمع قدامی

(۲) بطر مع غلاف

(۳) دلیز الفرج

(۴) جلیب اور اس کے گرد کی رسولیاں

(۵) شکر کبیر

(۶) سفر صغیر

(۷) قحطہ المہبل

(۸) قید فرجی

(۹) سفر زور تہ

(۱۰) مجمع خلفی

(۱۱) قحطہ المہرز

نصو نمبر ان رسولیوں کی

اسباب ان کے تقریباً وہی ہیں جو فصل سابق میں ہم لکھ آئے ہیں۔ اسلئے اعادہ کی ضرورت نہیں۔  
علاج۔ سوائے مذکورہ بالا تدابیر کے یہ ہے کہ ان رسولیوں کو متفرق سے کاٹ کر کسی تیزاب یا کاسٹک سے جلا دینا چاہئے۔ بعض مرتبہ یہ رسولیاں جلا دینے کے بعد بھی دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں اور اکثر بعد کاٹنے کے ان سے بکثرت خون جاری ہو جاتا ہے جو معمولی تدبیروں سے جلد بند بھی ہو جاتا ہے لیکر ڈاکٹر رحیم خان صاحب مرحوم نے لکھا ہے کہ انھوں نے ایسی عورتوں کا علاج کیا۔ ان کی رسولیاں کاٹ کر کاسٹک سے جلا دیں۔ جو پھر دوبارہ پیدا نہیں ہوئیں۔

فصل چھٹی قرآح الفرج (سپوریشن) یا السریشن آف دی ولوا یعنی شرمگاہ کے زخم اکثر پھنسیوں کے ریم واربونے سے یا اتفاقاً کوئی پھوڑا نکل کر پکے اور میوٹنے سے یا کوئی رسولی کاٹنے سے یا عسر ولادت وغیرہ کے باعث شکاف ہو کر اس میں ریم پڑ جانے سے یا مرض آلتسک کے باعث شرمگاہ میں زخم ہو جاتے ہیں۔ جو بعض تو سادہ زخم اور بعض خراب قسم کے ہوتے ہیں۔

علاج۔ اگر یہ زخم سادہ اور معمولی ہوں اور زیادہ گہرے نہ ہوں تو مرحیم کمیلہ یا ریم سنیدہ کاشمیری

لگانا کافی ہوتا ہے۔ اگر زخم زیادہ پیپ دار گہرے اور متشن ہوں تو جو شانہ برگ نیب کا بالک بالک  
لوشن سے دھونا۔ اور اچھی طرح صاف کر کے مرہم کا فوری لگانا یا بوروا میوڈو فارم چھڑک کر بالک  
آئیل کا پچھایہ رکھنا بہت مفید ہے اور صرف برگ نیب تازہ نہایت باریک پیسکران کی لگدی تھوون  
پر باندھنے سے اکثر خراب قسم کے زخموں (قرح متعفنہ) کو بہت جلد فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ زخم  
آتشکی مادہ سے پیدا ہوئے ہوں، تو مرض آتشک کا خاص علاج کرنا چاہئے اور جو ادویات اس موزی  
مرض کے لئے خاص ہیں۔ کھانے اور لگانے میں ان کا استعمال کرنا چاہئے۔ اس عرض کیلئے رسکپور  
کی گولیاں بعد تنقیہ کے کھلانا اور مرہم سیاب لگانا سہارا خاندانی مجرب ہے۔

کبھی زخموں کی عفونت گوشت میں سرایت کر جاتی ہے اور عضومؤف کا گوشت بالکل مردار  
ہو کر گلنے اور سڑنے لگتا ہے۔ شدت تکلیف اور زیادتی عفونت کے باعث مرضیہ کو بخار شدہ پید رہتا ہے  
ایسی حالت کو اصطلاح میں غائر یا رگسنگرین کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں تدابیر مذکورہ بالا کے  
علاوہ فصد صافن کھولنے اور مسہل دینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مسہل سے پہلے جو نسخہ منفعی کا  
پلایا جائے اس میں مصفیات خون کے ساتھ ایسی دوائیں ضرور شامل ہوں جن سے خون کی حدت  
اور بخار کی شدت کو پورے طور پر تسکین حاصل ہو سکے ایسے موقع پر یہ نسخہ منفعی کا سب سے بہتر ہے۔  
صفقتہ شامہرو منڈی گل سرخ گل نیلوفر۔ تخم کاسنی ہر ایک، ماشہ۔ تمر ہندی ایک تولہ اور بخار  
۵ دانہ۔ اقیقون ولایتی ۵ ماشہ۔ رات کو گرم پانی میں تر کر کے صبح کو چھان لیں۔ اور خمیرہ بنفشتہ ۴ تولہ  
حل کر کے پلائیں۔ اگر ضرورت ہو تو اسمیں پوست ہلیدہ کا بی، ماشہ اضافہ کیا جائے۔ شام کو خمیرہ غلاب  
۵ دانہ لعاب بہدانہ ۳ ماشہ۔ عرق مرکب مصفی خون، اتولہ۔ شربت نیلوفر ۲ تولہ۔ بدستور تیار کر کے  
پلایا جائے مادہ کا نفع ہو جانے کے بعد اسی منفعی کے نسخے میں مغز امتاس ۱۰ تولہ۔ سناو کی، ماشہ ترنجبین  
۴ تولہ۔ گلقدہ ۴ تولہ۔ شیرہ مغز بادام شیریں، عدد اضافہ کر کے مسہل دیں۔ مسہل کے درمیانی  
دنوں میں اور تین چار دن تک مہلوں کے بعد تیرید میں شام کا نسخہ شیرہ غلاب والا خمیرہ کا دواں اتولہ

۱۰ اسمیں میوڈو فارم ایک حصہ اور بورک ایسڈ دو حصے ہوتے ہیں ۱۲ مولف ۱۵ اسیں پانچ حصے تل کائیں اور ایک حصہ کا بالک ایسڈ  
ہوتا ہے ۱۲ مولف ۱۵ رسکپور دانہ الچی سفید۔ عاقر قرحا۔ لونگ ہر ایک چھ ماشہ سب کو باریک پیسکران کے عرق میں حل کریں۔ اور  
مرچ سیاہ کے برابر گولیاں بنائیں اور ان میں سے ایک گولی ملائی میں رکھ کر ہر روز صبح کے وقت کھلائیں ۱۲ مولف

نسخہ منفعی کا سب سے بہتر ہے

ورقی فقرہ ایک عدد۔ تخم ریحاں ۵ ماشہ کے ساتھ پلایا جائے۔ اگر تین چار منہج پلانے کے بعد ایک یا دو مرتبہ ہلکی سی تلمین رنڈ ریو گنیشیا سلفاس۔ یا سلفیٹ آف سوڈا کے اٹھیل مواد کی غرض سے کرادی جائے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر وہی منہج پلا کر مسہل دینے سے کامل تنقیہ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ جب پہلی تلمین کافی ہوتی ہے تو مسہل دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔


اس کے علاوہ زخموں کے سڑے ہوئے حصہ کو اگر کاسٹک سے جلا دیا جائے تو آئندہ ان کی ترقی رک جاتی ہے۔ لیکن مناسب ہے کہ کاسٹک لگانے سے پہلے چند منٹ زخم پر کوکین سیلوشن رفیصدی سات والا لگا کر اسے اچھی طرح بے حس کر لیں۔ تاکہ کاسٹک لگانے سے مریض کو تکلیف نہ ہو اس کے بعد لائیو آر پٹاسی پرمینگنس میں کپڑا تر کر کے زخم پر رکھیں۔ کوئلہ کی پلٹس بھی سڑے ہوئے زخموں کے لئے بہت مفید اور نافع ہوتی ہے۔

**فصل ساتویں** ایشقاق الفرج رے سی ریشن آف وی پرے نی ام، یعنی شرمگاہ کا شگاف جو عورت کے عجان پر رے نی ام، یعنی سیون کے مقام پر کسی سبب سے ہو جاتا ہے یہ شگاف اندام نہانی کے سوراخ سے پیچھے کو ہوتا ہے اور بعض دفعہ مقعد کے سوراخ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس حالت میں اندام نہانی اور مقعد کا راستہ کچھ دور تک گہراؤ میں باہر سے ایک نظر آنے لگتا ہے جب تک یہ زخم تیار رہتا ہے مریض کو پانخانہ کے وقت نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ اور زخم پرانا ہو نیکیے بعد اگرچہ پانخانہ کے وقت کچھ تکلیف تو زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن اس قدر وقت ضرور پڑتی ہے کہ اندام نہانی کا وہاں فضلہ کی آلودگی سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ اور طہارت میں زیادہ تکلف کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ صفائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس مرض کا علاج طمانکے لگا کر نہ کیا جائے تو چند روز میں زخم کے کنارے مند مل ہو کر درست ہو جاتے ہیں۔ اور مدت العمر یہ شگاف بلا درد اور تکلیف کے موجود رہتا ہے۔

(دیکھو تصویر نمبر ۲ اس شگاف کی صفحہ ۴۶ پر)

۱۵ یہ عرق دو گرین فی اونس کا متھن مواد کی ترقی کو روکتا ہے اور میں گرین فی اونس کی طاقت کا میس لس کے قانون کو غارت کرتا ہے ۱۶ مؤلف

(دیکھو تصویر نمبر ۱۲۔ اس شگاف کی)



(۱) جبل الزہرہ - یارکب

(۲) مجمع قدامی

(۳) زلفۃ البظر

(۴) حشفۃ البظر

(۵) بصلۃ الدلیز

(۶) دلیز الفرج

(۷) ثقبۃ البول

(۸) ثقبۃ المهبل

(۹) شقاق الفرج

(۱۰) قید فرجی

(۱۱) حصرۃ زورقیۃ

(۱۲) مجمع خلفی


ثقبۃ المبرز

**اسباب** ۱) اکثر اس مرض کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب اتفاقاً بچے کی جسامت جوف عانہ اور مخرج جنین کے انداز سے زیادہ ہو یا جوف عانہ کے زیادہ فراخ ہونے سے بچے کا سر یکا یک اس مقام پر آٹھیرے یا جوف عانہ میں بد صورتی ہونے کے سبب عسر ولادت واقع ہو یا وضع حمل غیر طبعی کے وقت قابلہ ضروری آلات کے استعمال میں بے احتیاطی کرے تو ان اسباب سے کوئی سبب مقام ماؤف کے شگاف کا باعث ہوتا ہے (۲) اسی طرح مقام ماؤف پر کسی حثارجی صدمے یا چوٹ وغیرہ کا اتفاق پڑنا۔ یا جماع قوی خصوصاً جبکہ بالجبر اس فعل کا ارتکاب کیا جائے تو اس حالت میں بھی یہ عارضہ لاحق ہو سکتا ہے (۳) قبض شدید کی حالت میں اگر فضلہ برازیہ کا نہایت سخت سدہ بن کر دفعہ خارج ہو تو اس سے بھی سیون کے مقام پر مقعد کی طرف سے شگاف ہو کر اندام نہانی کے سوراخ تک پہنچ سکتا ہے :



علاج چونکہ اس مقام کی ساخت نرم اور متخلل و پھلجلی، اور نازک ہے۔ فضلات بول و براز اس پر گذرتے ہیں۔ اور براز کے خارج ہوتے وقت یہاں کچھ نہ کچھ زور بھی پڑتا ہے۔ اس لئے یہ زخم مشکل سے درست (مندمل) ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو علاج باحتیاط تام اور جلد کرنا چاہئے فوراً شگاف میں ٹانگے لگائیں۔ مریضہ کے بول و براز کو آسانی سے خارج کرنا انتظام کریں مقام کو فپہ مانع عفونتہ (انٹی سپٹک) ادویات کا استعمال کریں۔ اس کام کے لئے بورو آئیوڈوفارم عمدہ چیز ہے۔ اگر شگاف زیادہ لمبا اور گہرا نہ ہو تو بدرجہ دواء التزاق (اسٹکن) کے اس کے کنارے خوب ملا کر صرف اس ہی دوا کا چھڑکنا اور کپڑے کی گدی پانی میں تر کر کے مضبوط باندھ دینا کافی ہوتا ہے یا ورکھو کہ اگر شگاف لمبا اور بہت گہرا ہو تو اس میں ٹانگے دو مرتبہ لگائے جلتے ہیں۔ اولیٰ اندام نہانی روچائنا کی طرف اور اس کے بعد عمدہ کی جانب۔ اس لئے چاہئے کہ مریضہ کو یائیں کروٹ پر لٹا کر اندام نہانی کے اندر اسفنج کا ٹکڑا بطور شیاف کے رکھیں۔ اور دویاتین ٹانگے لگا کر اسفنج کو نکال لیں پھر زخم پر آئیوڈوفارم چھڑک کر سفید کپڑے کی گدی پانی میں تر کر کے رکھیں اور اوپر سے پٹی باندھ کر مریضہ کو نرم بستر پر لیٹا رکھیں۔ مریضہ کا پیشاب رات دن میں دویاتین مرتبہ بدرجہ قاتا طیر کے تھے ٹر کے نکال دیا کریں۔ اور ہر مرتبہ اندام نہانی کو کسی عرق دافع عفونت (جیسے کابالک لوشن) سے بدرجہ پچکاری کے دھو دیا کریں

دیکھو تصویر نمبر ۱۱۔ آلا قاتا طیر کی




اگر مرہم کی ضرورت ہو تو یہ مرہم اندام نہانی کے لئے نہایت سودمند ہے صفقتہ موم سفید ۳ ماشہ روغن گل ایک تولہ پگھلا کر سفیدہ کا شعری مغسول۔ مردار سنگ۔ کانور ہر ایک ۳ ماشہ باریک پسکرا سمیں ملائیں اور قدرے سفیدی انڈے کی اسمیں مخلوط کر کے زخم پر لگائیں۔ مرہم دیگر موم سفید۔ چرنی گردہ بزمغز ساق گاؤ۔ ہر ایک ایک تولہ پگھلا کر سنگ جراحت ایک تولہ باریک پسکرا

لہ: زخموں کو دھونے کے لئے یہ لاشن چالیں جہیں ایک حصہ کی طاقت کا ہرناجا جاتا ہے۔ ۱۳ مؤلف



اور جبند روز تک زخم پر ادویہ مدتیکہ کا استعمال کرتے ہیں اور مائع عفونت ادویات کے عرق سے بذریعہ پچکاری کے دھوتے رہیں۔

(دیکھو تصویر نمبر ۱۵- اس آلہ کی)



یہ آئرا پر سے چکان اور صاف اور اندر سے قلعی دار نہایت شفاف ہوتا ہے جب اسے اندام نہانی کے اندر داخل کر کے کسی قدر پھیلاتے ہیں تو بیرونی روشنی اندام نہانی تک پہنچنے سے زخم کی حالت بخوبی معلوم ہو سکتی ہے۔

اس مدت میں مریضہ کو ایسی غذا دیں جس سے فضلہ براز کم پیدا ہو اور طبیعت میں کسی قدر قبض ہے پانچ ماہ کی حاجت دو تین دن تک بالکل نہ ہو۔ اور مریضہ کا پیشاب ہر روز بذریعہ قانا طبر کے ٹھکڑے دو یا تین مرتبہ نکالتے رہیں۔ اگر درمیان میں مریضہ کا براز خارج کرنے کی ضرورت پڑے تو گرم پانی اور صابون سے حقنہ کر کے براز خارج کر دیں پھر تین چار دن کے بعد جب زخم مندمل ہو جائے تو ٹائٹے کاٹ دیں اور مقام ماؤف پر ایک گدی رکھ کر پٹی سے باندھے رکھیں۔ اور جب تک زخم کے مضبوطی سے چڑ جانے کا یقین کامل نہ ہو جائے۔ مریضہ کو اجابت کرانے کا خیال رکھیں۔

(دیکھو تصویر نمبر ۱۶ حقنہ کی پچکاری)



Rectal Bougie

Vaginal Bougie

دیجائیل بوجی

فصل طحوس۔ المتصان الشفرین ریونی ان آف دی لیبیا یعنی ترمگاہ کے دونوں ہولک

باہم جڑ جانا۔ یہ مرض اکثر بچپن میں عارض ہوتا ہے۔ اس سے کبھی پیشاب اور حیس کا راستہ بالکل بند ہو جاتا ہے اور کبھی قدرے سوراخ باقی رہتا ہے جس کی راہ تھوڑا تھوڑا پیشاب تکلیف کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ اور حیس کا خون بھی کچھ رک کر یہ شوری نکلتا ہے۔

**اسباب** (۱) بچپن میں اتفاقیہ سوزش فرج (انفلامیشن) کے لاحق ہونے سے (۲) اگر اکثر اوقات شرمگاہ لیسیدار رطوبت سے آلودہ رہتی ہو اور صفائی کا لحاظ نہ رکھا جائے (۳) کسی سبب سے شرمگاہ کے لبوں میں رخم ہو جائیں اور ان کے علاج میں احتیاط اور بخوبی خبرگیری نہ کی جائے تو اندمال کے وقت شرمگاہ کے دونوں لب جڑ جاتے ہیں (۴) کبھی شرمگاہ کے لبوں کے درمیان میں ایک جھلی کا ذب ریشہ دار ساخت کی پیدا ہو جاتی ہے جو لبوں کو جدا کر کے دیکھنے سے معلوم ہوا کرتی ہے۔ اس کے ذریعہ سے بھی دونوں لب جڑے رہتے ہیں :

**علاج**۔ انگلی سے لبوں کو جدا کریں اگر زیادہ مضبوطی سے نہیں جڑنے پائے ہیں تو علیحدہ ہو جائینگے۔ اگر خوب جڑ گئے ہیں تو نشتر سے شگاف دیا جائے۔ اس کے بعد کسی مرہم مدلل کا استعمال کریں اور اکثر التوائیں صرف رنوں نجد میں ترکیبا ہو اکر دونوں لبوں کے درمیان رکھنا کافی ہوتا ہے۔

**فصل نویں اجتماع الدم رکن حیش چن** یعنی اجتماع خون۔ جو اکثر شرمگاہ کے لبوں میں ہو جاتا ہے۔ چونکہ شرمگاہ کے لبوں کی ساخت میں غدودی جو ہر پھلچھلا خانہ دار اور چربی زیادہ ہے اور اس میں عروق بکثرت موجود ہیں۔ اس لئے کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ شرمگاہ کے مقام پر کسی قسم کی چوٹ لگنے سے اس کے لبوں میں یا مقام رکب (ما نرؤی نیرس) کی ساخت میں اجتماع خون ہو جاتا ہے۔ اور مقام ماؤف سوچ کر پھولا ہوا اور سرخ ہو جاتا ہے۔ التهاب (انفلامیشن) یعنی سوزش کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔


کبھی تو یہ حالت ایک دو دن میں خود بخود زائل ہو جاتی ہے۔ اور کبھی عروق کی دیواروں میں سے آب خون (سیرم) پھینک کر یا عروق پھٹ کر اور خون بہہ کر گوشت کے خانوں میں بھج جاتا ہے۔ پھر وہ خون منجمد ہو کر یا تو مدلل کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس میں ریم پیدا ہو کر خارج ہوتی ہے یا اس منجمد خون سے رسولی بن جاتی ہے۔ شاید وناور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ منجمد خون اس مقام پر سخت ہو کر ایک گمرہ سی پیدا کرتا ہے جو مدت تک رہتی ہے۔

**علاج** پہلے جب چوٹ لگنے سے مقام مآؤف پر سرخی اور گرمی محسوس ہو کر اجتماع خون کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو فوراً پھٹکری ایک حصہ گلاب خالص دس حصے میں حل کر کے اُس میں سفید کپڑا تڑکیں اور بار بار مقام مآؤف پر رکھیں۔ اگر مریضہ کو گرمی یا جلن زیادہ محسوس ہو تو اس میں قدرے کافور بھی حل کریں اگر اس سے نفع نہ ہو تو آب کاسنی سبز۔ آب مکوہ سبز میں رسوٹ خالص حل کر کے اول طلاء کریں پھر اسی میں جدو از خطائی گھسکر طلاء کریں۔ اس علاج کا یہ اثر ہے کہ آنے والا مادہ تو رک جاتا ہے اور موجودہ مادہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ روغن سرخ کی مالش بھی ایسے موقع پر مجیدہ مفید ہے اور جب اس تدبیر سے نفع نہ ہو اور دہل ہو جانے کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو درم کے مقام پر پولش باندھیں۔ تاکہ مادہ پک کر دہل بھوٹ جائے اور پیچ خارج ہو کر زخم صاف ہو جائے اور اگر پکنے کے بعد پھوٹنے میں دیر لگے تو نشتر سے شگاف دیں۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ دہل کے پھوٹنے کا انتظار نہ کریں جسوقت یم پڑ جائے فوراً شگاف دینا مناسب ہے تاکہ اندر کی جانب منہ کر جانے کا خوف نہ رہے اور عضو مآؤف کی ساخت زیادہ گلنے سے محفوظ رہے۔ شگاف کے بعد مکاتبات کا استعمال کرنا چاہئے۔

اگر مقام مآؤف میں رسولی پیدا ہوگئی ہو تو اس کے تحلیل کرنے کی کوشش کریں۔ اسکے لئے مرہم اشق اور تمکید کچھ سیاہ والی مفید ہے۔ اگر اس سے نفع نہ ہو تو رسولی کو احتیاط سے نکال کر ٹائکے لگائیں اور زخم کو بذریعہ بورڈ آئیوڈو فارم کے مندل کرائیں شگاف دیتے میں فستربہی شربانیوں کی احتیاط نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ رسولی کا کوئی حصہ نکالنے سے باقی نہ رہ جائے۔ ورنہ رسولی دوبارہ عود کر آتی ہے۔ اس لئے اگر اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہو تو اسے کاسٹک سے جلا دینا چاہئے۔

**فصل دسویں** فتن (ہرنیا) یعنی آنت اترانا۔ اس جگہ فتن سے ہماری مراد اس مرض کی وہ قسم ہے جس میں آنت عورتوں کے قناتۃ الاربیدہ (اینگوی نل کینال) کی راہ خارج ہو کر رحم کے سرباط مستند میں (راؤنڈ لگامنٹ) کے ہمراہ شرمگاہ کی جانب اتر آتی ہے۔ اگرچہ یہ مرض عورتوں میں بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی تین قسمیں اکثر واقع ہوتی ہیں راہ فتن مچھلی

ردی جائسل ہرنیا، اس میں آنت اندام نہانی کی ساخت میں اترا آتی ہے (۲) فتح استجیائی ریوٹونڈل ہرنیا، اس میں آنت شمرگاہ کے لیوں کی ساخت میں اترا آتی ہے (۳) ان دونوں قسموں کے علاوہ کبھی فتح فخذی (فیورل ہرنیا) بھی لاحق ہوتی ہے اس میں آنت لان کی طرف اترا آتی ہے۔



اسباب (۱) کسی سبب دیو اثر کم کا کمزور ہونا (۲) زیادتی رطوبت سے مجرا سے اریہ کا وھیلا ہونا (۳) بوجھ اٹھانا - زور کرنا (۴) دائمی کھانسی اور اکثر قبض رہنا (۵) کمزور سخت پٹی باندھنا۔ اور احتشاء شکم کی کمزوری یا آنتوں کی بندشوں کا وھیلا ہونا۔


علاج اول قابض دواؤں کا پیپ کرنا چاہئے تاکہ تنق کا مقام زیادہ پھیلنے نہ پائے۔ پیپ کا نسخہ یہ ہے صفت مصطکی - کمزور - انزروت - خور المسود - اقا قیا - گلنار - دم اخوین - مرکی پشکری - ایلوہ - اہل رسوت - ان سب دواؤں کو ہمزین لیکر نہایت باریک پسیر چھان لیں اور سریش کو

آب کوہ منبر میں حل کر کے ان میں پپی ہوئی دواؤں ملا کر محفوظ رکھیں۔ اس میں سے قدرے لیکر کپڑے پر لگائیں اور مقام فتن پر چپکادیں یہ دوا خشک ہو کر مع کپڑے کے دب چکی رہے گی۔ کھانسی دواؤں میں سے جوارش جالینوس۔ جوارش کمونی۔ معجون فلاسفہ اچھی ہیں۔ اس کے علاوہ مقام ماؤف پر کمائی لگانا بھی مفید ہے۔ اور اکثر حالتوں میں پسندیدہ شمار کیا جاتا ہے۔

(دیکھو تصویر نمبر ۱۸-۱۹-۲۰ کمائی کی)

Double Circular Truss

ڈبل سرکیولر ٹرس




(۲۰)

Single Circular Truss.

سنگل سرکیولر ٹرس



(۱۹)



(۱۸)

نمبر ۱۸ فتن فحشی کے لئے اور  
نمبر ۱۹ و ۲۰ فتن اسبابی کے  
لئے ہے۔

فصل گیارہ صویس فریسیموس (اکشن آف کلائی ٹورس) یعنی نظر کی بے وقت اور شدید تندہی جس طرح مردانہ عضو تناسل کے سفنجی حصہ میں بے وقت اجتماع خون ہونے سے ان کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مستورات کے نظر کی سفنجی ساخت میں بے موقع اجتماع خون ہونے سے ان کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔

اسباب (۱) کبھی شرمگاہ کی خارش یا رحم کی اندرونی خارش کے باعث نظر کی جانب دوران خون تیز ہو جانے۔ (۲) عورت کو اسی طرح مرض فریسیموس ہو جاتا ہے جس طرح فریسیموس کے

سبب سے یہ دونوں مرض پیدا ہو سکتے ہیں (۲) نظر کی جتنی تیز ہو جائے خصوصاً جبکہ سپیدائی  
 طور پر کسی عورت کا نظر اپنی معمولی مقدار سے کسی قدر لمبا ہو۔ اور شرمگاہ کے لمبوں سے باہر نکلا رہے۔  
 تو ایسی حالت میں چلتے پھرتے وقت لباس وغیرہ کی تھوڑی سی رگڑ سے یا سوتے ہوئے اتفاقاً  
 شرمگاہ پر کچھ دیر تک ہاتھ رکھا رہنے سے بظریں گرمی پیدا ہو کر اس کی طرف دوران خون تیز ہوتا  
 ہے۔ اس لئے بظریں غیر معمولی اور بے وقت تندی پیدا ہو جاتی ہے (۳) بعض بد وضع عورتیں  
 اپنی خواہش سے حصول لذت کے لئے نظر کو ہاتھ سے ملا کرتی ہیں یا دو عورتیں مل کر باہم مساحت  
 کرنے کی خواہش کرتی ہیں۔ ان دونوں بد افعالیوں سے بھی بظریں کی جانب دوران خون تیز ہو کر  
 یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔


علاج (۱) اگر شرمگاہ یا رجم کی خارش اس مرض کا سبب ہو تو سب سے پہلے ازالہ سبب ضروری  
 ہے (۲) اگر مقام ماؤف کی حس زیادہ ہو جانے کے سبب سے یہ مرض پیدا ہوا ہو تو حس کو کم  
 کرنے والی دوائیں کھانے اور لگانے کی استعمال کریں۔ اس غرض کے لئے یہ معجون بہت مفید ہے۔  
 صفتہ۔ تخم سداب ۳ تولہ۔ تخم فرنجشک۔ بیج نسوسن ہر ایک دو تولہ گلنار گل سرخ ہر ایک  
 ۱ تولہ۔ کشنیز خشک۔ تخم خرفہ سیاہ ہر ایک ایک تولہ۔ خارحسک۔ تخم خشخاش سفید۔ لہسورہ  
 ہر ایک ۹ ماشہ۔ طباشیر۔ اجوائن خراسانی ہر ایک ۶ ماشہ۔ بیج بند۔ مسک اصلی۔ تخم کاہو۔ ہر ایک  
 ۳ ماشہ۔ سب کو کوٹ چھان کر شہد خالص ۴ تولہ میں ملائیں رات کو سوتے وقت ۹ ماشہ سے  
 ایک تولہ تک کھلائیں۔ اسی طرح اگر کبھی کبھی پیاسی بردمانڈ ۱۰ اگرین عرق گاؤ زبان ۲ تولہ اور عرق  
 گلاب ایک تولہ میں حل کر کے رات کو سوتے وقت پلا دیا کریں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور  
 مقامی طور پر کوکین لوشن لگانا بھی مفید ہے (۳) اگر نظر کے زیادہ لمبا ہونے سے یہ مرض پیدا ہوا ہو  
 تو اس کے اسباب پر نظر کر کے علاج کرنا چاہئے۔ اور اگر مناسب ہو تو اس کا کسی قدر حصہ اوپر سے  
 کاٹ ڈالیں۔ لیکن اس دستکاری میں بظریں کی شریان کو اچھی طرح باندھنا ضروری ہے تاکہ جریان  
 خون زیادہ نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد مائع عفونت اور زخم کو بھر لانے والی ادویات کا استعمال  
 کرنا اور ہر طرح کی احتیاط ضروری ہے (۴) اگر عادت بد سے یہ مرض ہوا ہے تو بڑا علاج ترک عادت  
 ہے۔ اس کے بعد ایسی دواؤں کا استعمال بھی لازمی ہے جن سے دوران خون کی تیزی اور



اعصاب کی حس کسی قدر کم ہو جائے۔ اس غرض کے لئے تذبذب مندرجہ نمبر ۳ عمل میں لائی جائیں تو بہت مناسب ہے۔

**فصل بارہویں۔** عظم البظر رہا پیر ٹرائی آف کلی ٹورس یعنی بظر کا بڑھ جانا بعض ملکوں اور بعض نسل کی عورتوں کا بظر پیدائشی طور پر معمول سے زیادہ لمبا ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض ڈاکٹروں نے پانچ چھ انگشت تک لمبا ہونا بیان کیا ہے۔ ایسے موقع پر بڈسکی کو دور کرنے اور طہارت وغیرہ میں آسانی کی غرض سے اسے کاٹ ڈالتے ہیں۔ اور بعض مستورات کا یہ عضو مرض آتشکی وغیرہ کے سبب بڑھ جاتا ہے۔ **اسباب (۱)** مکی آب و ہوا کی خاص تاثیر یا نسلی خاصیت (۲) خون میں آتشکی فساد یا کوئی دوسری خرابی (۳) عضوماء وٹ کی طرف دوران خون تیز ہونا (۴) ایسی حالت میں عضوماء وٹ کو زیادہ کھلانا اور اکثر ملتے رہنا۔

**علامت (۱)** امراض کی حالت میں عضوماء وٹ کا رنگ اودا بینگنی اور جلد چمکدار یا کھردری بے رونق ہوتی ہے (۲) اگر بھولی ہوئی اور خون سے پر ہوتی ہیں (۳) اکثر اوقات عضوماء وٹ میں شدید کھلی ہوتی ہے (۴) گاہے آتشکی زخم بھی موجود ہوتے ہیں۔



**علاج۔** اگر عضوماء وٹ کی مقدار بہت زیادہ بڑھ گئی ہو تو اس کا شافی علاج اگرچہ سوائے کاٹنے کے

دوسرا نہیں ہے۔ لیکن عمل و سنگاری سے پہلے سبب مرض کا ازالہ بھی نہایت ضروری ہے تاکہ سنگاری کے بعد مرض کے دوبارہ عود کرنے کا یا کسی دوسری خرابی کا اندیشہ باقی نہ رہے کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ مواد مرض کا عام تنقیہ کرنے سے پہلے اگر خاص مقام ماؤف پر کوئی تیز دوا لگائی جاتی ہے یا کوئی محرک مادہ عمل کیا جاتا ہے تو اصل مرض کی شدائد کے علاوہ دوسری قسم کی جدید خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لئے تمہیں چاہئے کہ سنگاری سے پہلے مریضہ کے موجودہ حالات پر گہری نظر ڈالو۔ اگر اس کے بدن میں فاسد اخلاط اس قدر موجود ہوں کہ جن کے حرکت کرنے یا جوش میں آنے سے دوسری خرابیاں پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اپنے اصول کے موافق مادہ مرض کو بدن سے نکلنے کے قابل کر کے منضج دے کر تنقیہ کامل کرالو چنانچہ اگر خون میں تشکی رہ رہا کوئی دوسری خرابی زیادہ موجود ہو تو پہلے یہ منضج ملاؤ صفتہ شہا ہترہ چرائنتہ منڈی پوست ہلیلہ زرد۔ برادہ ششم۔ برادہ صندل سرخ ہراکب، ماشہ۔ افیمون ۵ ماشہ نیم مندی ۲ تولہ رات کو پانی میں تر کر کے صبح کو لکچھان کر شراب عذاب ہم تولہ اس میں حل کر کے پلائیں۔ نضج مواد کے بعد یا تو اس میں سنار کی رگل سرخ ہراکب، ماشہ۔ مغز فلوس ۲ تولہ۔ ترنجبین ہم تولہ شیرہ منضر بادام شیریں، عدا و اضافہ کر کے بدستور منقرض تین مہل دیں۔ اور مہلوں کے درمیان دنوں میں مہلوں کے بعد دو تین دن تک تبرید کا نسخہ شیر و عذاب عرق مرکب والا پلائیں۔ آدو یا مطبوخ ہندی کے مہل سے تنقیہ کرائیں۔ یہ مہل اکثر تشکی مواد کو خارج کرنے کے لئے ہمارا معمول مطب ہے صفتہ۔ پوست دخت نیب۔ پوست دخت کچال۔ بیج حنظل۔ پھلی ببول۔ گٹائی خورد وچ پتوں اور جڑ کے پُرانا گڑ۔ ہراکب، اولہ سب کی کٹی کر کے تین سیر پانی میں پکائیں جب تین پاؤ پانی باقی رہ جائے۔ صاف کر کے بوتل میں رکھیں یہ سات خوراکیں ہیں جو سات دن تک برابر پلائی جاتی ہیں۔ ہر روز تین مرتبہ سے دس مرتبہ تک دست آجاتے ہیں۔ نہایت غلیظ اور متعفن مواد خارج ہوتا ہے شام کو قریب ۳ بجے کچھ پی کی مونگ کی ملائم کھلائی جاتی ہے۔ اس سے تشکی مواد خوب نکل جاتا ہے لیکن اگر دست نہ آئیں تو گرمی کرتا ہے اس لئے اس کو ہوشیاری سے مناسب موقع پر استعمال کرنا چاہئے۔ پھر جب مذکورہ بالا طریقہ سے تنقیہ کر لیا گیا ہو اور مریضہ کی طبیعت ہر طرح قابل اطمینان ہو۔ تو اسوقت سنگاری کرنی چاہئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول نظر کو جڑ کے پاس ریٹم کے تاگے سے

مضبوط باندھیں۔ اور دوسرے دن بندش سے نیچے والے حصے کو جس قدر مناسب ہو کاٹ دیں۔  
 ڈاکٹر رحیم خان صاحب مرحوم نے اپنی کتاب امراض نسوان میں لکھا ہے کہ ایک عورت (عمر ۲۷ سال)  
 کو آتشک ہو گئی تھی۔ اول تو اس کی شرمگاہ کے لبوں اور نظر میں نہایت شدید پھیلائی ہوئی شمع ہوئی  
 اور پھر اس کا نظر بڑھا شروع ہوا۔ یہاں تک کہ چند روز میں چھوٹے کھیرے کے برابر ہو گیا تھا۔ اور  
 اسکی جگر کے گرد آتشکی زخم بھی موجود تھے جب اُن کے زیر علاج آئی تو انھوں نے بڑھے ہوئے  
 نظر کو کاٹ ڈالا۔ اول تھوڑا سا خون نکلا۔ لیکن شریان کو ریشم سے باندھنے کے بعد بند ہو گیا تقریباً  
 ایک ہفتہ میں جراثیم کا زخم اچھا ہو گیا۔ لیکن آتشکی زخم بدستور سابق موجود تھے۔ اس سے معلوم  
 ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی بدنی حالت کو دیکھ کر سمجھ لیا ہو گا کہ اسے تنقیہ کی ضرورت نہیں  
 ہے۔ یا دستکاری سے پہلے اسے دست آور دواؤں کا استعمال کرایا ہو گا۔

**فصل تیرھویں۔** عدل البطل یعنی بظرف نہ ہونا۔ بعض عورتوں کی شرمگاہ میں بظرف پیدائشی  
 ہی بالکل معدوم ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں اکثر بانجھ ہوتی ہیں اور ان کو شہوانی لذتوں کی طرف ابتداء  
 سے ہی بالکل رغبت نہیں ہوتی ہے اور اگر اسی طرح ان کا رحم اور خصینہ الرحم بھی مفقود ہوں تو ان کے  
 اکثر افعال و عادات میں بالکل مردوں کی شباهت پائی جاتی ہے۔ یہ سب خرابیاں پیدائشی  
 ہونے کے سبب سے لا علاج ہوتی ہیں۔


**فصل چودھویں۔** صلابۃ غشاء البکامق (ہارڈنس آف ہائمن) یعنی پردہ بکارت کا سخت  
 اور دبیر ہونا۔ اگر پردہ بکارت معمول سے زیادہ سخت اور دبیر ہو۔ لیکن اندام نہانی کے سوراخ  
 کو بالکل بند نہ کر سکے یا باوجود پورا بند کر لینے کے اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ موجود ہوں تو  
 خون حیض کے جاری ہونے میں اس سے کسی طرح کی رکاوٹ واقع نہیں ہو سکتی ہے اسلئے حیض کا  
 خون تو اپنے معمولی دنوں میں برابر جاری ہوا کرتا ہے۔ اور شادی ہونے کے وقت تک عورت کو  
 اس سے مضرت یا تکلیف محسوس نہیں ہوا کرتی ہے۔ لیکن جب اسے اپنے خاوند کے ساتھ  
 مباشرت کا اتفاق ہوتا ہے تو اس کو سخت تکلیف پیش آتی ہے خصوصاً جبکہ خاوند قوی اور فربہ  
 اندام ہو۔ کیونکہ ایسی حالت میں پردہ بکارت اپنی غیر معمولی سختی اور دیارت کے باعث پھٹ  
 نہیں سکتا ہے۔ اور اندام نہانی کے سوراخ کو تنگ یا بالکل بند رکھتا ہے جس سے مقاربت میں

نہایت دشواری ہو نیکی باعث جانین کو خصوصاً عورت کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اور فعل جماع کی تکمیل نہ ہو سکے کے باعث استقرار حمل بہت کم ہوتا ہے۔ اور اگر خاوند کسی قدر کمزور اور لاغر اندام ہو۔ اور پردہ مذکور نے اندام نہانی کے سوراخ کو بالکل بند نہ کیا ہو تو مفارقت کے وقت چندان تکلیف نہیں ہوتی ہے اور اس حالت میں پردہ مذکور بدستور قائم رہ سکتا ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ ایسی حالت میں استقرار حمل نہایت مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے حمل قرار پا جائے تو بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ بچہ پاری کو دو چند مصیبت کا سامنا ہوتا ہے۔

علاج پردہ بکارت کو مقرر اس سے کاٹ ڈالیں یا نشتر سے شگاف دیں یا انگلی سے پھاڑ دیں پھر کٹے ہوئے موقع پر سفید کپڑائی کے تیل میں تر کر کے رکھیں اگر ضرورت سمجھی جائے تو نہایت ہلکا سا کاربالک آئل بجائے سادہ تیل کے استعمال کیا جائے تاکہ زخم کے کنارے سخت ہو کر بہت جلد درست ہو جائیں۔ یا شورے اور چاندی کے تیزاب (نائٹریٹ آف سلور) سے جلا کر دوسرے دن اسی تیزاب کا عرق (سیلوشن) زخم پر لگائیں۔ اس سے بھی زخم بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے۔

فصل پنجم میں۔ اختلاف الفرج رام پر فورٹ مائٹن (یعنی پردہ بکارت کا پورا گول اور بے سوراخ ہونا جس سے اندام نہانی کا سوراخ بالکل بند ہو جائے۔ یہ بھی مرض رتق کی ایک قسم ہے ایسی لڑکیوں کی ماں بہن کو کبھی سن بلوغ سے پہلے ہی ہلاکتیں دھلاتے وقت اس امر کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ اور اس کا علاج کسی ہوشیار قابلہ سے کرا لیتے ہیں اور کبھی ماں کی غفلت سے یہ بات کسی پر ظاہر نہیں ہونے پاتی ہے۔ پھر جب لڑکی سن بلوغ کو پہنچتی ہے تو حیض کا خون اپنا راستہ کھلا نہ پانے کے سبب سے زخم اور اندام نہانی کے اندر ہر جینے رکارت ہوتا ہے۔ اور مدت تک وہاں جمع رہ رہے ہو اس میں عفونت اور ایک خاص قسم کی زہریلی فاسیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے طرح طرح کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں :

دیکھو تصویر نمبر ۲۲ صفحہ ۵۹ پر



بعض موقع پر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کو صراحہ ای پی پی لپ سی (یعنی مرگی کی طرح بیہوشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ اور صرع کا معمولی علاج کرنے سے کچھ نفع نہیں ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ مریضہ کو ایسے دورے تو نہیں پڑتے لیکن یہ شکائیں ضرور پائی جاتی ہیں۔

**شکایات (۱)** مریضہ کے شکم میں غیر معمولی کلائی اور قدرے درمخسوس ہوتا ہے (۲) خون فاسد کے اجتماع سے مریضہ کے مزاج میں غیر طبعی گرمی پیدا ہو جاتی ہے (۳) چہرے کی رونق زائل ہو کر زردی یا سیاہی کی جھلک نظر آنے لگتی ہے (۴) بھوک جاتی رہتی ہے۔ اور مریضہ روز بروز کم طاقت اور لاغر ہوتی جاتی ہے (۵) مریضہ کا شکم حاملہ کی طرح کسی قدر بڑھ جاتا ہے اور وہ سوائے ان تکالیف کے اور کچھ بیان نہیں کر سکتی ہے۔

مریضہ کے یہ ظاہری حالات اور شکم کی بے موقع کلائی دیکھ کر گھر کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور اس پریشانی کی حالت میں لڑکی کی جانب سے ان کے دل میں طرح طرح کے فاسد خیالات آنے لگتے ہیں لیکن تفتیش حالات سے جب ان کو اصلی مرض کا پتہ لگ جاتا ہے اور عشاء مذکور میں شکاف دیا جاتا ہے تو خون فاسد کثیر المقدار خارج ہو کر مریضہ کی حالت رو بصحت ہو جاتی ہے کبھی ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ خون مدت تک رحم کے اندر جمع رہنے کے سبب سے کچھ دما میپ کی صورت بن جاتا ہے اور پھٹی میں شکات دینے سے تمارج بہتا ہے۔

**علاج۔** اس جھلی میں اس طرح شکاف دینا چاہئے کہ حتی الامکان علامت بکارت کی بھی باقی رہے اور خون حیض کے لئے راستہ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد کانڈی فلوئڈ لوشن سے بذریعہ پچکاری کے رحم کو اچھی طرح دھو ڈالیں۔ لیکن دستکاری کرنے میں قابض کو یہ احتیاط رکھنی نہایت ضروری ہے کہ اول وہ اپنے ہاتھوں اور تمام آلات کو جو اس دستکاری میں مستعمل ہوں گے، کاربولک لوشن سے (جو کم سے کم چالیس سوں حصے کی قوت کا ہو) اچھی طرح اطمینان کے ساتھ دھو اور مقام ماؤف کو بھی سیلوشن مذکور سے اچھی طرح تر کر لے۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ تھوڑا سا سیلوشن مذکور مقام دستکاری اور مکان کی دیواروں پر بھی چھڑک دے تاکہ تمام مکان کی ہوا میں سے عفونت پیدا کرنے کی استعداد ذرا کم ہو جائے۔ یہ احتیاط اس لئے ضروری ہے کہ ایسا نہ کرنے سے بعض موقع پر دیکھا گیا ہے کہ مریضہ کی حالت دستکاری کرنے سے پہلے اچھی تھی اور دستکاری کرتے ہی جب خون فاسد اس کے رحم سے خارج ہوا تو بیرونی ہوا اشکاف کی راہ سے رحم کے اندر داخل ہو کر کسی جدید فساد اور خاص سمیت کا باعث ہوئی۔ پھر وہ سمیت رگوں کے ذریعہ سے تمام بدن میں سرایت کر گئی اور مریضہ بیہوش ہو کر تھوڑی دیر میں مر گئی۔ اس لئے دستکاری سے پہلے ہوا کی اصلاح کی جائے اور آلات جراحی وغیرہ کو مائع عفونت رانٹی سپٹک اشیاء سے دھو لینا نہایت ضروری سمجھا گیا ہے اور اس غرض کے لئے کاربولک لوشن یا کمپری لوشن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دستکاری کے بعد اندام زخم کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک پچایہ صاف روئی کا تیل کے تیل میں یا ہلکے کاربولک لوشن میں تر کر کے زخم پر رکھیں اور دو یا تین دن تک مریضہ کو آرام سے چت لیٹی رہنے دیں۔ اگر ضرورت ہو تو ہر روز ایک مرتبہ یا دو مرتبہ زخم کو برگ تیب کے جو نشانہ سے دھونا بھی چاہئے۔ اور گرمی یا پیاس کی حالت میں مریضہ کو لعاب بہدانہ ۳ ماشہ شیرہ عتاب ۵ دانہ عرق مرکب مصفی خون ۱۰ تولہ شربت نیلو قمر ۲ تولہ بطور

تبرید کے پلانا بھی مناسب ہے۔ غذا

ہلکی اور جلد ہضم ہونیوالی

دینی چاہئے۔

# تیسرا مقالہ

## اندرونی اعضائے تناسل کے امراض

اس مقالہ میں چار باب ہیں۔ پہلے باب میں اندام نہانی کے امراض۔ دوسرے باب میں امراض جسم۔ تیسرے باب میں امراض خصیتہ الرحم اور دیگر متعلقات رحم کا بیان ہے۔ باب چہارم خصیمہ ہے۔ ہر باب میں چند چند فصلیں ہیں جن میں ہر ایک مرض کا علاج مع اسباب و علامات کے جدا گانہ لکھا گیا ہے۔

### باب اول امراض اندام نہانی

اس باب میں دس فصلیں ہیں اور ہر ایک فصل میں ہر ایک مرض کے اسباب و علامات اور مجرب علاج درج ہیں۔

**فصل پہلی** استرخاء المہبل پے رائے سس آف دی ویجائنا یعنی اندام نہانی کی ساخت کے تمام عضلاتی ریشوں اور عضلہ عاصۃ المہبل (اسفنکٹر ویجائنی) کا معمول سے زیادہ ڈھیلا ہو جانا۔ چونکہ اندام نہانی کے زیادہ فراخ ہونے کی حالت میں مرض انزال الرحم پر ولب سرلیج ٹرائی کا بہت اندیشہ ہوتا ہے۔ اور مقایست کے متعلق بھی خرابیاں واقع ہوتی ہیں اس لئے عضونہ کو رکھنے کی تدابیر عمل میں لانا ضروری ہیں۔

**اسباب**۔ اس مرض کے چند سبب ہوتے ہیں اس لئے ہم ہر ایک سبب کو مع اسکی مناسب تدابیر کے جدا گانہ بیان کرتے ہیں۔

۱۔ جیسے عدم تلذذ مباشرت وغیرہ سے ۱۲۔ مؤلف۔

ساتھ ملا کر فرجہ کریں :

(۵) وضع حمل کے بعد سمیٹ کی اشیاء، قابضات کا استعمال نہ کرنے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے چونکہ وضع حمل کے وقت اندام نہانی کی ساخت ماؤف اور سست ہو جاتی ہے۔ اسلئے وضع حمل سے قریب ایک چھ کے بعد جب نفاس کا خون بالکل بند ہو چکتا ہے اور رحم بالکل صاف ہو جاتا ہے اس وقت رحم اور اندام نہانی کی تقویت کے لئے قابلہ بعض قابضات ماؤف کا فرجہ استعمال کیا کرتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے ایسا نہ کیا جائے تو اندام نہانی کی ساخت قوت سے پہلے سست اور رحم کمزور ہو جاتا ہے۔

علاج۔ مقویات رحم اور قابض ادویات کا فرجہ ان کے موقع پر ضرور کرنا چاہئے۔ چنانچہ یہ نسخہ بہت مفید ہے۔ صفتہ۔ مازوسنر۔ تخم چوکا ہر ایک ۵ ماشہ۔ خبث الحدیدہ برہ جوز السرد۔ ہر ایک ۳ ماشہ۔ آلمہ خشک۔ چھڑیلہ ہر ایک ۲ ماشہ۔ زعفران ایک ماشہ۔ سب کو سرکہ کی طرح باریک پس لیں اور حُفّت بلوط۔ گلنار ایک ایک تولہ کو پانی میں جوش دے کر اس میں سفید کپڑا تر کریں اور پسلی ہوئی دوا اس پر چھڑک کر فرجہ کریں۔

فصل دوسری۔ تَقْصِیْقُ الْمَکْهُلِ رَدِیْ جَائے نس (مس) یعنی اندام نہانی کا سکر مکر تنگ

ہو جانا۔ یہ مرض اندام نہانی کے عضلاتی ریشوں اور اس عضلے کے تشنج (سکر) جانے سے ہوتا ہے جو اس کے دہانے پر محیط ہے۔ مضرت اس کی ظاہر ہے کیونکہ اس حالت میں مقاربت کے وقت دشواری ہوتی ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں عورت بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ مباشرت میں تکلیف ہونی اور جماع پر قدرت نہ ہونی۔ یہ دونوں ایسی باتیں ہیں کہ جن کا لازمی نتیجہ اولاد سے محرومی ہے۔ اس لئے حتی الامکان اس عارضہ کی تدبیر تینا نا طیب کے لئے ضروری اور ان کو عمل میں لانا قابلہ کا فرض ہے۔ چنانچہ اس کے اسباب مع علاج درج ذیل ہیں۔

(۱) صدغرسنی۔ جس طرح صدغرسنی میں تمام اعضاء اپنی طبعی مقدار سے چھوٹے ہوتے ہیں اسی طرح سے رحم اور اندام نہانی کی تجویف بھی مقدار طبعی سے بہت کم اور تنگ ہوتی ہے۔ اس عمر میں وطیفہ زوجیت کا ادا کرنا ہر طرح زوجین کے لئے مضر ہوتا ہے۔ خصوصاً زوجہ کے لئے علاوہ وقتی تکلیف کے اپنے نتیجہ کے لحاظ سے بھی سم قاتل ہوتا ہے۔ کیونکہ اول تو صدغرسنی میں استفراغ

نایمجال سبب

نوع قوی دم

تقصیق الماکھل

نایمجال سبب



مشکل سے ہوتا ہے۔ دوسرے جو لڑکیاں چھوٹی عمر میں حاملہ ہو جاتی ہیں اکثر ان کی قوت وضع حمل کے وقت دروزہ کی شدائد کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اور اکثر بچے کی پیدائش کے وقت ماں اور بچہ دونوں کی غریزہ جانیں ناخاق تلف ہو جاتی ہیں۔

علاج۔ سب سے بہتر تدبیر تو یہ ہے کہ مستحیضہ السن لڑکی سے مباشرت کرنا ممنوع کر دیا گیا ہے۔ اسلئے جب تک تمام اعضاء کا نشوونما اپنی مناسب مقدار تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک مباشرت نہ کی جائے۔ اچھی غذا تازہ ہوا۔ خوشی اور فارغ البالی کے ساتھ سسرال میں رہنا لڑکیوں کے نشوونما میں بڑا دخل رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تدابیر بالکل بے سود اور لغو ہیں۔ جوانی میں شکایت خود بخود زائل اور رفع ہو جاتی ہے۔

(۲) عضلاتی قوت۔ جب تمام بدن کے عضلات خصوصاً اندام نہانی کی ساخت کے گول عضلاتی ریشے نہایت قوی اور قریب ہوتے ہیں (جیسا کہ سن شباب میں) ایسی حالت میں وہ زور سے سکڑ کر چاروں طرف سے سٹپے ہوئے رہتے ہیں۔ اسلئے اندام نہانی میں ایک حد تک تنگی رہتی ہے۔ اگر یہ انقباض نہایت قوی اور حد سے زیادہ ہونے کے باعث ناگوار اور مضر سمجھا جائے تو اس کا علاج اس طرح سے کریں کہ اگر گرم پانی سے طہارت کرنے کی ہدایت کریں اور اندام نہانی کو رونغن بابونہ سے چکنا رکھیں۔

(۳) ادویہ قابضہ کا مقامی استعمال۔ اگر کوئی عورت اپنی نادانی اور نا عاقبت اندیشی سے ایک مدت تک قابض ادویات کا استعمال بطور فرجہ کے کرتی رہے تو ان دواؤں کے اثر سے اندام نہانی کی ساخت سکڑ کر اس کی تجویف کبھی اس قدر تنگ ہو جاتی ہے جو کسی موقع پر باعث تکلیف اور مضرت ہو سکے۔ علاج (۱) ایسی اشیاء کا استعمال آئندہ قطعاً ترک کیا جائے (۲) اگر ضرورت ہو تو برگ خطمی یا تخم خطمی یا گل بابونہ کے جوشاندے سے چند روز طہارت کرائی جائے (۳) گلیسرین کو بند ریحہ پککاری کے اندام نہانی میں پہنچانا۔ یا اس میں کپڑا تر کر کے بطور فرجہ کے اندر رکھنا مفید ہے (۴) موسم اور گھی کی قیر طلی لگانا سب سے بہتر ہے۔

(۴) اندام نہانی کی خشکی اور تحمل رطوبات۔ اگر اندام نہانی کی غشاع لعلابی (سیوس میمبرین) کے مسامات میں سے معمولی رطوبت کا ترشح کم ہوتا ہے۔ اور غلہ دہنوں (بارہنوں) گلیسنڈز (یعنی

بیماری

بیماری

بیماری

اُس جگہ رطوبت پیدا کرنے والے غدود بھی اپنے فعل سے عاجز رہتے ہیں تو اندام نہانی کی تجویف اکثر اوقات اپنے معمول سے زیادہ خشک رہتی ہے۔ اور اسی وجہ سے مقاربت کے وقت اندام نہانی میں زیادہ تنگی محسوس ہوتی ہے۔ جو کہ سیکھہ مضرت سے خالی نہیں ہے۔

علاج۔ اگر تمام بدن میں عام طور پر خشکی کے آثار پائے جائیں تو مرغن غذائیں اور دیگر مرطبات کا استعمال کرائیں۔ گائے یا بکری کا دودھ بقدر برداشت طبعیت کے پلائیں۔ گلیسرین۔ روغن گل میں ملا کر بطور فرزجہ کے استعمال کرائیں۔ موم روغن۔ یا روغن منخرنحم کدوئے شیریں یا روغن گل سے اندام نہانی کو چکنا رکھیں۔

(۵) پردہ بکارت کی سختی۔ اور اس کا بجنسہ قائم رہنا۔ چونکہ پردہ بکارت اندام نہانی کے سوراخ کو نیچے سے کسی قدر بند رکھتا ہے۔ اسلئے اگر وہ اپنی غیر معمولی سختی کے باعث اول مقاربت کے وقت نہیں پھٹتا ہے۔ تو اس کے قائم رہنے سے اندام نہانی کا دہانہ تنگ رہتا ہے اور اسکی مضرت ظاہر ہے۔ علاج۔ پردہ مذکور مقراض سے کاٹ دیں اور کپڑا روغن گل میں تر کر کے شکاف کے اندر چند روز تک رکھیں تاکہ پھٹے ہوئے مقام کے کنارے درست ہو جائیں۔

(۶) امدال قروح۔ آد کے نک اسٹریکچر یعنی کسی عضو کا زخم اچھا ہو کر اس کی ساخت کا شکڑ جانا اگر کسی وجہ سے اندام نہانی کے اندر زخم ہو کر علاج سے مندرجہ ہو جاتا ہے تو امدال زخم کے زمانہ میں احتیاط نہ کرنے سے اکثر دو صورتیں پیش آیا کرتی ہیں را کھی تو امدال زخم کو وقت گوشت زائد پیدا ہو کر اندام نہانی کی تجویف کو تنگ یا بالکل بند کر دیتا ہے (۱۲) اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اندام نہانی کی ساخت کے عضلی ریشے (مسیکولر فائبرز) یا اس کے اندروالی غشاء (عجائی) میو سکس میمبرین) شکڑ کر تجویف کو نہایت تنگ کر دیتے ہیں جس سے یا تو بالکل مباشرت کے قابل نہیں رہتی ہے یا مقاربت کے وقت اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔

علاج۔ اگر گوشت زائد کے پیدا ہونے سے تجویف تنگ ہو گئی ہے تو اندام نہانی میں ایسی ہی ہر وقت رکھنے کی ہدایت کریں جس سے نالی قروح ہو جائے۔ اگر اس طرح سے مطلب حاصل نہ ہو تو پہلے کوکید۔ ہیلوشن سے عضو کو بے حس کر کے مرہم زنگار کا فرزجہ رکھیں۔ یا کاسٹک سے گوشت زائد کو جلائیں۔ پھر امدال کے لئے کسی مرہم کا استعمال کریں۔ اگر تجویف بالکل بند ہو گئی ہے تو بذریعہ


دستکاری اسے کھول کر زخم کا علاج کرنا چاہئے۔ اور اگر اندام نہانی کی ساخت کے عضلی ریشے یا اس کے اندرونی جھلی سکڑ کر سخت ہو گئی ہے تو اس کو نرم کرنے اور اصلی حالت پر لانے کے لئے مرہم داخلیوں اچھی دوا ہے۔ اسی طرح گلیسرین یا ویزلین کے استعمال سے بھی یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے۔

**فصل تیسری رتق (اثرے) سیا آف وی ویکائنا** یعنی اندام نہانی کی نالی کا نہایت تنگ یا بالکل بند ہونا۔ اس مرض کی چند صورتیں ہیں (۱) اندام نہانی کی ساخت اصل پیدائش میں بالکل معدوم ہو۔ یا اس میں ایک یا ایک سی نالی خروج حیض وغیرہ کے لئے پائی جائے۔ لیکن عورت مقاربت کے قابل نہ ہو (۲) اندام نہانی کے اندر کچھ دور یا اس کی انتہا پر خیم رحم کے قریب کوئی غیر معمولی سخت جسم جس کی ساخت مثل عضلہ یا غضروف وغیرہ کے ہو غیر طبعی طور پر حاصل ہو جائے۔ اور اندام نہانی کو بالکل بند یا اس قدر تنگ کر دے جس سے عورت مقاربت کے لائق نہ رہے (۳) اندام نہانی کے اندر گوشت زائد یا سستے وغیرہ پیدا ہو کر منفذ کو بند کر دیں۔ خواہ یہ گوشت بعد اندام قرح کے پیدا ہو گیا ہو یا پیدائشی طور پر ابتدائے عمر سے ہی موجود ہو (۴) کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندام نہانی کے اندر والی جھلی (میوئس میمرین) بوجہ سوزش یا ورم کے سرخ ہو کر آپس میں جھپٹ جاتی ہے اور منفذ بند ہو جاتا ہے (۵) کبھی شرمگاہ کے دونوں لب آپس میں جھپٹ کر اندام نہانی کے دہانے کو بند کر دیتے ہیں (۶) کبھی اندام نہانی کا بیرونی سوراخ پردہ بکارت سے بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اور پردہ مذکور نہایت سخت اور دبیر ہونے کے سبب سے مباشرت کا مانع ہوتا ہے۔ خواہ اس میں کوئی چھوٹا سوراخ واسطے خروج حیض کے پایا جائے یا نہیں :

**علاج۔** اگر اندام نہانی کی ساخت میں کوئی پیدائشی عیب موجود ہوتا ہے یا وہ بالکل معدوم ہوتی ہو تو یہ صورت بالکل لا علاج اور اس مقام پر دستکاری کرنا نہایت خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ سبب رتق میں دستکاری سے اندام نہانی کو درست اور منفذ کو ٹھیک کیا جاسکتا ہے۔ ہوشیاری کے ساتھ عمل جراحی عمدہ طور پر کرنے سے عورت مباشرت کے قابل اور صاحب اولاد ہو سکتی ہے :

چنانچہ اگر اندام نہانی کے اندر کوئی غیر معمولی جسم گوشت زائد یا چینی وغیرہ کی طرح کا پیدا ہو گیا ہے یا اس کے اندر والی جھلی کے آپس میں جھپٹ جانے سے منفذ بند ہو گیا ہے تو بذریعہ آلہ مفتاح الفرج دوی جائنٹل اسپے کیولم سے اندام نہانی کو کشادہ کر کے غیر معمولی جسم کو باطنیا ط نشتر سے کاٹ دیا جائے۔

اس کے بعد زخم کا علاج مناسب مریضوں سے کیا جائے۔ -  
 (تقریباً نمبر ۲۳۳) آلہ منفتح الفرج کی



دی جائے گی

لیکن یہ دستکاری نہایت دشوار ہے مریضہ کو بذریعہ دوا بیہوشی رکھ کر دوا فرما کر کے بیہوش کر کے دستکاری کی جاتی ہے۔ تیسری شریانوں میں سے اگر کوئی بڑی شریان کٹ جائے تو اس احتیاط سے باندھنا پڑتا ہے پھر بھی جریان خون کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس مقام پر دستکاری کرنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے جو سوائے ہوشیار اور فن جراحی سے واقف کار قابلہ کے دوسرا شخص نہیں کر سکتا ہے۔

اگر پردہ بکارت کی سختی سے یہ مرض ہو تو اس میں شگاف دینا چاہئے۔ اور اگر شرمگاہ کے دونوں لب جڑ گئے ہوں تو ان کو بھی بذریعہ نشتر کے جدا کر دیا جائے۔ بعد کو اندام زخم کی تدبیر کی جائے اور عضو کو بے حس کرنے کے لئے دستکاری کر

پہلے کو کین سیلوشن کا استعمال کرنا ضروری ہے :

فصل چوتھی - التهاب المہبل (روئے جائے ٹس) یعنی اندام نہانی کے اندر والی جھلی میں سوزش اور سرخی پیدا ہونا۔ اس مرض کو عربی میں حمرة الفرج اور انگریزی میں رکتار آف دی ویجاٹنا یعنی اندام نہانی کا زکام یا نزلہ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح معمولی زکام یا نزلہ میں ناک اور حلق کی اندرونی جھلی سرخ اور متورم ہو کر اس میں جلن محسوس ہو ا کرتی ہے۔ اور اس میں ہر وقت رطوبت مترشح ہو کر ناک اور حلق سے بہا کرتی ہے۔ اسی طرح اس مرض میں بھی اندام نہانی کی اندرونی جھلی کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس مرض کی دو قسمیں ہیں ایک حاد اور دوسری مزمن۔

قسم اول حاد (اکیوٹ) یعنی شدید العواض اور سریع الزوال۔ یہ قسم کنواری لڑکیوں اور بڑی عورتوں کو بہت کم لاحق ہوتی ہے اور جوانی کی عمر میں خاوند والی عورتوں کو خصوصاً وضع حمل کے بعد اکثر واقع ہوتی ہے۔

اسباب (۱) اندام نہانی کی اندرونی جھلی پر کوئی سخت رگڑ لگنا اس مرض کا بڑا سبب ہے

بیماری

بیماری

بیماری

جیسا کہ اکثر عسر ولادت کی حالت میں بچے کے اٹک جانے یا آلہ مخی اجماع النجین (فارسیس) کی رگڑ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کبھی زنا بالجبر کے صدمہ سے یا صغیر سن لڑکی کے ساتھ مجامعت کرنے سے۔ یا کثرت جماع سے اکثر لاحق ہوتا ہے (۲) اندام نہانی میں کوئی تیز لڑی کیفیت کی رطوبت پیدا ہونا (۳) عورت کو حلق کی عادت ہونا (۴) عورتوں کا سوزاک بھی اس کا موجب ہوتا ہے (۵) خون میں حدت اور مزاج کی گرمی اور گرم اشیاء یا تیز مرچ کا زیادہ کھانا اور دت تک پیشاب جلن سے آنا بھی اس مرض کو پیدا کر سکتا ہے :

**علامات (۱)** اندام نہانی کی اندروالی جھلی سرخ اور خشک نظر آتی ہے اور اس میں جلن محسوس ہوتی ہے (۲) کھڑے ہونے یا بیٹھنے کی حالت میں خصوصاً پاؤں گھانے کے وقت تمام عجان رہنے کی ام یعنی شمر گاہ اور مقعد کے درمیان کی جگہ میں اس قدر درد شدید ہوتا ہے کہ لفظیہ اسے برداشت نہیں کر سکتی ہے (۳) پیشاب جلن کے ساتھ جلد جلد اور تھوڑا تھوڑا آتا ہے (۴) بدن میں خفیف سی حرارت اور اعضا شکنی معلوم ہوتی ہے (۵) گرمی اور سر میں اور پیڈ لیوں میں درد محسوس ہوتا ہے (۶) پھر سکے بعد یا تو اندام نہانی کے اندروالی جھلی نرم اور نرم ہو کر عوارض میں کمی ہونے لگتی ہے۔ اور اس میں ہوا ایک سفید گاڑھی رطوبت (مثل دہی یا چھا چھکے) بہنے لگتی ہے۔ اور دت تک یہ سفید رطوبت شمر گاہ سے جاری رہتی ہے۔ پھر جب سیلان رطوبت کو ایک عرضہ گد رتا ہے تو رفتہ رفتہ درد اور حرارت موقوف ہو جاتی ہے اس حالت میں یہ مرض مزمن کہلاتا ہے (۷) اور یا اندام نہانی کے اندر خوب دم ہو کر ایک حد تک عوارض مذکورہ میں روز بروز شدت ہوتی ہے۔ اور وہ دم پک کر اس میں ریخ پڑ جاتی ہے۔ اور وہ دم پھوٹ کر دت تک زخم سے پیپ جاری رہتی ہے۔

یا دیکھو کہ اندام نہانی سے بہنے والی رطوبت سفید اور گاڑھی ہوتی ہے اور سیلان رحم والی رطوبت کا قوام پتلا ہوتا ہے۔ کیونکہ اندام نہانی کے اندر پیدا ہونے والی معمولی رطوبت میں ایک قسم کے ترش تیزابی اجزاء کسی قدر موجود ہوتے ہیں جو اس غیر معمولی رطوبت کے ساتھ مل کر اسے گاڑھا کر دیتے ہیں۔ اور سیلان رحم والی رطوبت میں رحم کے اندر ہی کسی قدر کھار ہوتا ہے جو اسے منجھ ہونے سے باز رکھتا ہے۔ اور خون حیض پران دونوں تیزابوں کا اثر بالکس ہوتا ہے کیونکہ حیض کے خون میں کسی قدر اجزاء ریشہ دار ساخت کو پیدا کرنے والے (فائبرین) موجود ہوتے ہیں جنکے باعث حیض کا

خون رحم کے اندر والے کھاری اجزاء کے اختلاط سے کسی قدر کاڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ بہ کر اندام نہانی کے اندر آتا ہے تو اس وقت اندام نہانی کی ترش رطوبت فائبرین کے ساتھ مل کر اسے رقیق کر دیتی ہے۔ علاج (۱) ابتدائی حالت میں اور شدت عوارض کے وقت سب سے پہلے مسکن حرارت راینٹی پاٹریک اور مٹھراج (زریغری جے رت) یعنی دل کو خوش کرنے اور حرارت کو تسکین دینے والی ادویات کا استعمال کریں جن سے خون کی حرارت کم ہو جائے اور قلب کی حرکات کسی قدر سست اور باقاعدہ ہو کر دوران خون کی تیزی گھٹ جائے لیکن ان سے دلیں کمزوری نہونے پائے جیسے لعاب بہدانہ ۳ ماشہ - شیر عذاب ۵ دانہ - عرق مرکب مصفی خون ۱۰ تولہ شربت نیلوفر ۲ تولہ - (۲) اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو چار روز منہج بارد (مٹھانج) پلا کر سہل بارو سے تنقیہ کرائیں - نسخہ - گھل بنفشہ - گل نیلوفر - شاہترو - گل سرخ - چرائٹہ - منڈی تخم خیارین ہر ایک ۷ ماشہ - عذاب - آلو بخارا ہر ایک ۵ دانہ سب کو شام کے وقت گرم پانی میں ترکیں - صبح کو چھان کر مصری ۲ تولہ حل کر کے پلائیں - یہ نسخہ منہج کا ہے - اور اگر اسی میں پوست ہلیلہ زردینا کی ہر ایک ۷ ماشہ - تمر ہندی ۴ تولہ - مغز الماس ۵ تولہ اور مغز بادام شیریں مقشر، عدد اضافہ کر کے بدستور تیار کریں تو یہی سہل بارو ہو جاتا ہے - (۳) اس کے علاوہ سہل کے لئے (مینگنے شیا سلفاس) یا سفوف جلیپ مرکب رپلو جلیپ کمپونڈ) تنہا یا کیاول کے ہمراہ بقدر مناسب دینا مفید ہوتا ہے - (۴) تسکین التهاب اور جلن کے لئے پوست خشتخاش کے جو شانہ سے یا لعاب دارو اوں کو لعاب سے اندام نہانی میں بار بار پچکاری کرنا بھی نفع کرتا ہے - جیسا کہ لعاب بہدانہ یا لعاب اسپنخول یا لعاب خطمی یا لعاب ریشہ خطمی وغیرہ (۵) اسی طرح اسی کا جو شانہ پلانا اور اسی کی پچکاری کرنا بھی مفید ہوتا ہے (۶) تجربہ کار ڈاکٹروں کا قول ہے کہ (اپی کے کیوانا) زیادہ مقدار میں پلانا اس مرض میں بھی ریشل زحیر یا چیش کے بہت نافع ہے - اکثر ڈاکٹر صاحبان اس کی بہت تعریف کرتے ہیں (۷) اگر یہ تدا بیر عمدہ طور پر عمل میں لائی جائیں تو امید ہے کہ بہت جلد تھفا حاصل ہوگی - اور درم کے پیدا ہونے اور اس کی زیادتی یا اس کے پکتے اور پھوٹنے تک نوبت نہ پہنچے گی :

اور اگر کسی سبب سے یہاں تک نوبت پہنچے کہ درم پیدا ہو کر عوارض شدید ہونے لگیں تو (۱) علاوہ تدا بیر مذکورہ بالا کے محلل اور ام دواؤں کا ضماد شرمگاہ اور سیون (پرے فی ام) کے مقام پر

کیا جائے صفتہ مکوہ خشک تولہ مغز الماس و ماشہ۔ آرد جو گھل بابونہ۔ اکیلل الملک۔ با پھڑ۔ گل سرخ۔ رسوت۔ صندل سرخ ہر ایک ۱۵ ماشہ سب کو مکوہ ستر کے پانی میں میسر نیم گرم ضماد کریں (۲) پوست خنخاش کے جو شاندے سے بذریعہ اسفنج کے تکبید (فومن ٹیشن) کرنا چاہئے (۳) اگر ان تلباس سے ورم تحلیل نہ ہو سکے (درواد پرنے کے آنا نظر ہوئے لگین تو اسی کی پولٹس باندھی جائے اور خود پھوٹنے سے پہلے بذریعہ شتر کے شکاف دیکر پیپ نکالنا بہتر ہے (۴) اس کے بعد ادویہ مدللہ قروح اور مناسب مرہوں کا استعمال کرنا چاہئے۔

اندام زخم کے زمانے میں اس بات کا لحاظ نہایت ضروری ہے کہ اندام نہانی کی نالی میں کوئی غیر معمولی تبدیلی واقع نہ ہو جائے جیسا کہ ضیق منفذ۔ یا جھلی کے باہم چٹ جانے سے منفذ بند ہو جانا۔ یا گوشت زائد کا پیدا ہو جانا وغیرہ :

اور جب اس مرض میں سوزش اور درد وغیرہ عوارض کم ہونے لگیں۔ اور صرف سیلان رطوبت ہی باقی رہ جائے تو وہ علاج کرنا چاہئے جو دوسری قسم (مرمن) میں بیان کیا جائے گا :

قسم دوم سری مزمن (کرانک) یعنی خفیف العوارض اور دیر پا۔ یہ قسم اکثر ابتدا میں پیدا ہوتی ہے۔ اور کبھی اقم اول (حاد) کے بعد انتہائی طور پر پیدا ہو جاتی ہے جبکہ اس کے مادے میں سے اجڑے لطیفہ جلد تحلیل ہو جائیں۔ اس مرض کو عربی میں سیلان (رطوبت الفرج) اور ڈاکٹری میں رو بجا رنل لیو کیوریہ کہتے ہیں۔ یہ مرض بوڑھی اور کمزور عورتوں کو خصوصاً جبکہ غسل وغیرہ سے بدن کی صفائی کا لحاظ پورے طور پر نہ کیا جائے تو اکثر لاحق ہو جاتا ہے اور جوان قوی اور فربہ عورتوں کو بہت کم ہوتا ہے

اسباب (۱) مزاج کی سردی اور تمام بدن یا خاص مقام مائوف پر خارجی سردی کا اثر کر جانا۔ (۲) عام بدن کی کمزوری۔ اور محنت مشقت کرنا (۳) اچھی غذاؤں کا نہ ملنا (۴) اندام نہانی میں تیزابی ترش رطوبت کا زیادہ پیدا ہونا (۵) لباس اور بدن کی صفائی کا لحاظ پورے طور پر نہ رکھنا :

علامات (۱) اس مرض میں مریضہ کو حرارت ہوتی ہے نہ اندام نہانی کے اندر سوزش اور جلن ہوتی ہے اور نہ اس میں سرخی محسوس ہوتی ہے۔ (۲) البستہ کبھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ اندام نہانی کے اندر والی جھلی فم رحم کے قریب کسی قدر پھولی ہوئی نمناک اور نرم ہوتی ہے (۳) مریضہ کو سب سے زیادہ یہی شکایت ہوتی ہے کہ شرمگاہ سے ہر وقت سفید اور گاڑھی رطوبت مثل دہی یا چھالچھد کے جاری رہتی ہے

ابتداء میں تو مریضہ اس کی کچھ پروا نہیں کرتی ہے اور نہ علاج کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ نہ کسی پر اس کا اظہار گوارا کرتی ہے (۳) لیکن جب کچھ مدت تک یہ رطوبت برابر جاری رہتی ہے تو مریضہ روز بروز لاغر و ضعیف ہوتی جاتی ہے (۵) مریضہ سے کوئی ادنیٰ مشقت کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر وقت کمر میں خفیف سادہ و ریتا ہے زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے بھی کمر میں درد ہونے لگتا ہے (۶) مریضہ کو نہ اچھی طرح بھوک لگتی ہے نہ غذا مفہم ہوتی ہے۔ اکثر ترش ڈکائیں آتی ہیں (۷) اکثر پیٹ میں نفخ اور ستر افر رہتا ہے اور قبض کی زیادہ شکایت ہوتی ہے ۛ

علاج (۱) مریضہ کو صاف اور اچھی ہوا میں آرام سے رکھیں اور ہر وقت بدن و لباس کی صفائی کا خیال رہے (۲) زود ہضم اور مقوی غذا کھلائیں جیسے بکری کا گوشت اور مرغی کے انڈوں کی زردی وغیرہ (۳) دودھ اور چاول وغیرہ مرطوب چیزیں مضر ہوتی ہیں۔ مباشرت سے بھی پرہیز کرنا بہتر ہے۔

(۴) پوست برفیہ مرغ کا کشتہ بقدر ۲ چاول معجون مورچس میں ملا کر کھلانا مفید ہے صیفیہ مورچس مازوسنہر سپاری کہنہ گل سرخ جب الاس گل مخوم۔ پوست ہلبہ زرد۔ پوست ہلبہ آملہ خشک نشاستہ گندم طباشیر ہر ایک ۶ ماشہ۔ پوست انار ۹ ماشہ۔ موصلی سیاہ۔ موصلی سفید ہر ایک ایک تولہ۔ سب کو خوب کوٹ چھانکر نگاہ کھیں اور نبات سفید۔ شہد خالص ہر ایک ساڑھے بارہ تولہ کو آب انار شیریں آب بنشیریں پانچ پانچ تولہ میں قوام کر کے اسمیں پی ہوئی دوائیں ملائیں۔ اسکی خوراک، ماشہ سے ایک تولہ تک ہے (۵) سفوف کہر باکایہ نسخہ بھی میرا خاندانی مجرب ہے صیفیہ کہر باشمعی۔ یشب سبز۔ دانہ الاچی خورد۔ زیرہ سفید۔ گل سرخ مصطکی۔ جب الاس۔ گلنار۔ کرنازج۔

دم الاخویں ہر ایک ۶ ماشہ نبات سفید ۵ تولہ کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور اس میں سے بقدر ۵ ماشہ صبح کو اور ۵ ماشہ سہ پہر کوتا زہ پانی کے ساتھ پھانک لیا کریں فضل الہی سے ایک ہفتہ میں اکثر شفا ہو جاتی ہے (۶) مازو۔ گلنار۔ حبث بلوط۔ پھٹگری۔ لود پٹھانی ہر ایک ۶ ماشہ باریک پسیر بندریہ پولیوں کے اندام نہانی میں رکھنا بہت فعیل کرتا ہے ر، پھٹگری پانی میں حل کر کے اندام نہانی میں چکپاری کرنا بھی مفید ہے (۷) ڈاکٹری کتابوں میں اس نسخہ کی بہت تعریف لکھی ہے صیفیہ۔ زنگ سلفاس نصف اونس۔ پھٹگری بریاں نصف اونس رٹے تک ایسٹم۔ ایک اونس ان تینوں دواؤں کو ملا کر رکھیں۔ اور اس میں سے ایک ڈرام (۳۰۔ ماشہ) کے کر بینٹ اونس


نسخہ معجون مورچس

نسخہ کہر باکایہ



(۵) تولیہ پانی میں حل کر کے پچکاری کریں :

دیکھو تصویر نمبر ۲۴۔ بڑی پچکاری



**فصل پانچویں جِلَّةُ الْمَقْبَلِ (ریجائنل پٹورائی ٹس)** یعنی اندام نہانی کے اندر خارش محسوس ہونا۔  
 کبھی اندام نہانی میں نہایت شدت کے ساتھ خارش محسوس ہوتی ہے جس سے مریض بہت  
 بے چین رہتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ اندام نہانی میں کوئی چیز (انگلی وغیرہ) داخل کر کے اس سے  
 کھجاتی رہے اگرچہ یہ حالت کوئی مستقل مرض نہیں ہے۔ بلکہ عارضی طور پر بعض امراض کے تابع ہو کر پائی  
 جاتی ہے۔ جیسا کہ اس کے اسباب سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ مریض ان امراض سے پیچھے  
 ہونے کے باعث صرف اسی بات کی فکر کیا کرتی ہے۔ اور طبیب اس کے اسباب کی تشخیص  
 کر کے انکا علاج کرتا ہے۔ اس لئے بعض سہولت جدا گانہ فصل میں بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔  
**اسباب (۱)** اندام نہانی کے اندر کسی تیز رطوبت کا پیدا ہونا (۲) اندام نہانی کی اندرونی جھلی میں  
 نہایت خفیف سا التهاب (انفلامیشن) ہونا (۳) رحم سے شوریٹ یا کسی قسم کی تیز رطوبت کا  
 سیلان (۴) محارہ مستقیم (رکٹم) کے اندر دید (ان) المعاء (اگزی پورس) ورمی کیولیرس  
 کی پیدائش (۵) عورت کو جلق کی بد عادت ہونا :


**علامات** اس مرض کے مختلف اسباب میں سے جو سبب ہوگا اسی کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔  
 اور ان اسباب کا موجود ہونا بھی بڑی علامت ہے چنانچہ (۱) اندام نہانی سے ایسی رطوبت کا بہنا  
 جس میں شوریٹ یا کوئی تیزابی کیفیت موجود ہو۔ اس کی بڑی علامت ہے (۲) اندام نہانی کی اندرونی  
 جھلی میں التهاب، ہونا۔ یا رحم سے رطوبت کا سیلان بدریعہ المستقیم (۳) ایسے کیولم کے علوم  
 ہو سکتا ہے (۴) اگر عورت کو جلق کی عادت ہو تو دریافت کرنے سے پتہ چل سکتا ہے (۵) اگر مستقیم

اند رچنے پیدا ہو گئے ہوں تو مریضہ کی متعین بھی خارش شدید ہوتی ہے۔ اور کبھی برازیں کم باریک خارج ہوتے ہیں: علاج سبب کے موافق علاج کرنا چاہئے مثلاً اندام نہانی کی اندرونی جھلی میں التهاب ثابت ہو تو اس کا علاج فصل سابق میں مذکور ہے۔ اگر سیلان رطوبت ہو تو اس کے لئے پھٹکری گلاب میں حل کر کے اندام نہانی کے اندر پچکاری کرنا مفید ہے۔ اور سفوف کھر با سے بھی نفع ہوتا ہے۔ اگر رحم سے تیزابی رطوبت بہتی ہو تو اس کا علاج سیلان رحم کی بحث میں بیان کیا جائے گا۔ اگر جلن کی عادت ہو تو مریضہ کو ایسا خلوت کا موقع نہ ملنے دیں اور وعظ و نصیحت سے کام لیں۔ اگر آنتوں میں چٹنے پیدا ہو گئے ہوں تو ان کا علاج کرنا چاہئے۔ چونکہ یہ کرم علاوہ مسہل مستقیم کے معاجرا عود (سیکم) اور قولوں میں بھی ہوتے ہیں اس لئے اول مریضہ کو پے در پے تین چار جلاب دیں جن سے خوب کھل کر دست آجائیں تاکہ اکثر چٹنے نکل جائیں اور باقی رہے ہوئے کرم آنتوں کے نچلے حصہ میں اتر آئیں۔ اس کے بعد کھانے کا نمک ۲۰ تولہ باریک میکسک آتش جو ۱۲ تولہ میں ملا کر مقعد میں پچکاری کریں۔ یا ٹنگیہ اسٹیل ۴ ڈرام ۲۵ تولہ پانی میں ملا کر اس کی پچکاری کریں اس ترکیب سے چند روز متواتر پچکاری کرنی چاہئے کیونکہ یہ کرم نہایت وقت سے مارے جاتے ہیں اور کبھی تھوڑے عرصہ کے بعد پھر کرم پیدا ہو کر وہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اس لئے زیادہ دنوں تک علاج بذریعہ اسہال اور پچکاری کے کرنا چاہئے اور انوشلارو یا کسی معجون میں فولاد کھلانا چاہئے:

فصل چھٹی خراج المہبل پر ولپ سس آف ویجائنا، یعنی اندام نہانی کا خروج۔ اس مرض میں اندام نہانی کی اندرونی جھلی (میوکس کوٹ) بوجہ کثرت رطوبت کے ڈھیلی اور کمزور ہو کر اپنے اپنے اتصالی مقام سے جدا ہو جاتی ہے اور اندام نہانی کے دہانے میں یا کسی قدر اس سے باہر نکل آتی ہے اور کبھی اتفاقاً کسی سخت رگڑ یا صدمہ کے باعث اندام نہانی کی تمام ساخت اپنی جگہ سے پھسل کر باہر نکل آتی ہے۔ اس حالت میں عورت کو پیشاب و پاخانہ میں دشواری پیش آتی ہے اور جماع کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ استقرار عمل بھی بدشووار ہوتا ہے۔

اسباب ۱) عام بدن کی کمزوری ۲) کثرت رطوبات کے باعث اندام نہانی کی ساخت کا مست کمزور اور ڈھیل ہونا۔ اور اس کی ساخت کے تمام پرتوں کا باہمی اتصال اور قرب ہونا

اعضاء سے ان کا تعلق ضعیف ہو جانا (۳) کثرت جماع سے دائمی اذیت پہنچنا (۴) عسر ولادت یا ولادت غیر طبعی کی صحت کا اتفاق پڑنا (۵) متنازع پیشاب سے پُر ہو تو وہ بھی اندام نہانی کی ساخت کو باہر کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ علامات - جب اندام نہانی کی طرف اندرونی جھلی باہر نکل آتی ہے تو ابتداء میں عورت کو عضو مائوف کے اندر کچا وٹ کا سادہ محسوس ہوتا ہے۔ اور جھلی نڈکوسٹ کر اندام نہانی کے سورخ میں ایک نرم ڈانٹ کی طرح پھنسی ہوئی یا کسی قدر اس سے باہر نکلی ہوئی نظر آتی ہے جھلی کا رنگ ہلکا گلابی یا کسی قدر گہرا سرخ یا او دا ہوتا ہے۔ مریضہ کو پیشاب تھوڑا تھوڑا اور قدر سے تکلیف سے آتا ہے چلنے پھرنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے لیکن اس حالت پر جب کچھ مدت گزر جاتی ہے اور مریضہ تکلیف کی شوگر ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ ضعیف سی اذیت اور بے چینی اُسے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ۱۹۹۵ء میں ایک مریضہ کی حالت اس کے شوہر نے مجھ سے اس طرح بیان کی تھی کہ اُس کے اندام نہانی کی اندرونی جھلی جماع کے وقت خروج ذکر کے ساتھ باہر آ جاتی ہے اور دخول کے وقت اندر چلی جاتی ہے۔ پہلے تو اسے جماع کے وقت کسی قدر تکلیف ہوتی تھی لیکن اب چند روز سے تکلیف کا احساس جاتا رہا اور عورت جماع کے بعد اس جھلی کو اپنے ہاتھ سے اندر کر دیتی ہے۔ مجھے دریافت حال سے معلوم ہوا کہ اس کا سبب عورت کی کمزوری اور کثرت جماع ہوا تھا۔ (تصویر نمبر ۲۵ - اندام نہانی کی سامنے والی دیوار نکلی ہوئی ہے۔)



اور جب عسر ولادت یا کسی سخت رگڑ کے باعث اندام نہانی کی تمام ساخت رتینوں پر ت ایسے کو کھینچ کر باہر نکل آئیں تو اس کی صرف پھیلی دیوار (اندام نہانی کا فرش) باہر نکل آئے کی صورت میں اس کے ساتھ قعدہ بھی کھینچ کر باہر نکل آتی ہے۔ اور مریضہ کو براز کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے بلکہ ہر وقت

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا سیون کا مقام پر سے فی ام، اس تکلیف سے بچھا جاتا ہے اور اگر اندام نہانی کے سامنے والی دیوار اندام نہانی کی چھت، یا ہرنکل آتی ہے تو اس کے ساتھ شانہ (بلیڈر) بھی کسی قدر نیچے کو کھینچ آتا ہے۔ اور مریضہ کو پیشاب نہایت کم اور مشکل سے آتا ہے۔ کیونکہ شانہ کے نیچے کو کھینچ آنے سے اس کی گردن اور مجراے بول کا سوراخ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس لئے بہت حصہ پیشاب کا شانہ میں باقی رہ جاتا ہے۔ اور اگر اندام نہانی کے دونوں حصے (آگے اور پیچھے دلی دیواریں) ایک ساتھ باہر نکل آئیں تو اس حالت میں یہ دونوں قسم کی تکلیف ساتھ پائی جائیں گی۔ اور ان کے علاوہ مریضہ کو سرس اور کوٹھوں میں بلکہ رانوں اور پنڈلیوں تک بشدت درد محسوس ہو گا لیکن جب اندام نہانی کا خروج بہ سبب ڈھیلا ہو جانے اس کی ساخت کے اور بوجہ ضعیف ہو جانے اتالی تعلقات کے واقع ہونے کا ذکر بالا تکالیف بہت کم پائی جاتی ہیں۔


**تشخیص**۔ اس مرض اور خروج الرحم میں اس طرح سے فرق کیا جاتا ہے کہ اس مرض میں اندام نہانی کے دہانے سے باہر نکلا ہوا جو گولا سا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی شکل گول ہوتی ہے اور دہانے سے نرم محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر انگلی داخل کریں تو رحم کا منہ اپنی جگہ پر محسوس ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے مرض خروج الرحم میں باہر نکلا ہوا گولا مخروطی شکل کا ہوتا ہے۔ اور دہانے سے انگلی کو سخت محسوس ہوتا ہے۔ اس گولے کے پچھلے حصہ پر رحم کا منہ معلوم ہوتا ہے۔

**علاج**۔ اگر اندام نہانی کی صرف اندرونی جھلی باہر نکل آئی ہو تو پہلے اسے انگلی سے اپنی جگہ پر پہنچائیں۔ اس کے بعد پٹیکری گلاب میں حل کر کے سفید کپڑا اس میں ترکیب اور اس کی موٹی سی تہی بنا کر اندام نہانی کے اندر رکھیں یا اسفنج کا لمبا سا ٹکڑا اس میں ترکیب کے بجائے تہی کے اندام نہانی میں رکھ کر لنگوٹ کی طرح پٹی بندھ جائے، سے خوب کسکے یا بندھیں۔ اور پٹیکری یا تہی میں گھول کر اس کی پچکاری دن میں چند بار کریں۔ مازوسنر۔ گل سرخ۔ مائیں۔ گل انبی۔ مصطکی۔ گلاب۔ دانه الاچھی خود ہر ایک تین ماشہ لے کر سب کو نہایت باریک سرمہ کی طرح پیسکر بذریعہ پوٹی کے اندام نہانی میں رکھنا مفید ہے۔ اسی طرح مریضہ کو سر دیانی میں بٹھانا یا اس سے نطول کرنا بھی نافع ہے۔ کھانے میں ایسی دواؤں کا استعمال مناسب ہے جو قابض اور مخفف رطوبات اور مقوی معدہ ہوں تاکہ آئندہ بلغمی رطوبات کی پیدائش کم ہو جیسے جوارش مصطکی۔ جوارش جالینوس۔ جوارش کندر۔ محون۔ سیاری۔ پگ۔

مہجوں موجرس ونچرہ۔ اور کشتہ خبث الحدید یا کشتہ پست بقیہ مرغ بھی اس غرض کے لئے بہت مفید ہے۔ ان چیزوں میں سے جو مناسب ہو استعمال کریں۔

اگر اندام نہانی کی تمام ساخت کسی سخت رگڑ کے سبب سے خارج ہوگئی ہو تو علاوہ تلبیس مذکورہ بالا کے رٹہ کا پھلہ (پے سری) اندام نہانی کے اندر رکھیں جو اس غرض کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

تصویر نمبر ۲۶-۲۷۔ آلہ پے سری داخل کرنے کی



اول کی حالت

بعد کی حالت

پھر رضیہ کو آرام سے چت لٹھی رہنے دیں۔ نیز ایسی تدابیر کریں جس سے برا زرم ہو کر آسانی سے آئے  
اس غرض کے لئے ہلکے لیٹنات کا استعمال کرنا چاہئے۔ اسی طرح مرضیہ کا پیشاب بھی قاناقا طیلور کے تھپی ٹر  
کے ذریعہ سے دن رات میں چند بار نکال دیا کریں۔ جب اس تدبیر سے نفع نہ ہو تو کبھی ایسا بھی کرنا  
پڑتا ہے کہ اندام نہانی کی جانی دیوار میں زخم پیدا کر کے ٹانگے لگا دیتے ہیں تاکہ بعد اندام زخم کے  
عضو سخت اور متشنج (سکے ٹرکس) ہو جائے اور اندام نہانی کی ساخت باہر نکل نہ سکے۔ ان تمام  
تدابیر کے علاوہ کبھی تنقیہ و طوبت بلغمیہ کی غرض سے منضج و مہل بلغم بھی دینا پڑتا ہے۔ خصوصاً جب کہ  
خروج اندام نہانی کا سبب استرخا و رطوبی ہو۔ **منضج بلغم** جو ایسے موقع پر بہت مفید ہوتا ہے  
گل بنفشہ۔ بادیان۔ بیج کاسنی۔ بیج بادیان۔ پر سیا و شال۔ ہر ایک ۵ ماشہ۔ تخم کھوٹ پوٹی باندھکر  
بیج اذخر گاؤرباں ہر ایک ۵ ماشہ۔ میوزر مٹلی و دانہ سب کو نبات کے وقت گرم پانی میں تر کریں اور صبح کو

لی چنان کہ خمیرہ بنفشہ ہم تولد اس میں حل کر کے پلائیں۔ شام کے وقت یا تو نامی نسخہ کا ثفل دوبارہ بھگو کر بدستور پلایا جائے اور یا یہ نسخہ دیا جائے۔ شیرہ بادیان شیرہ تخم کثوث پانچ پانچ ماشہ شیرہ مویر منقہ ۹ دانہ عرق بادیان عرق مکوہ ہر ایک ہاتولہ میں تیار کر کے اس میں خمیرہ بنفشہ ہم تولد حل کر کے پلایا جائے پھر چھ یا سات روز تک یہ منفع پلانے کے بعد جب نفع مواد کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو اسی نسخہ میں جو صبح کو پلایا جاتا ہے یہ سہل کی دوائیں بڑھادی جی چاہئیں۔ سنائی کی تربید سفید ہر ایک ۷ ماشہ گلقد۔ ترخین۔ شکر سرخ ہر ایک ۴ تولہ اور منفع کے شروع کرنے سے آٹھویں یا دسویں دن یہ سہل حسب معمول تیار کر کے علی الصبح پلایا جائے اور سہل پلانے کے بعد مریضہ کو سونے نہ دیں۔ پیاس کے وقت عرق بادیان عرق مکوہ مساوی ملا کر قدر ضرورت پلاتے رہیں جب اس سے خوب دست آجائیں تو شام کو قریب ۴ بجے کے مریضہ کو مونگ کی کھجڑی ملائم کھلائیں۔ پھر رات کو غذا نہ دی جائے۔ اور صبح کو یہ نسخہ تہرید کا دینا چاہئے۔ خمیرہ گاوزباں ایک تولہ۔ ورق نقرہ ایک عدد میں لپیٹ کر اول کھلایا جائے اور شیرہ بادیان ۵ ماشہ شیرہ غلاب ۵ دانہ عرق گاوزباں ۲ تولہ میں تیار کر کے شربت بنفشہ ۲ تولہ حل کر کے اور تخم بیکان ۵ ماشہ اسپر چھڑک کر اس کے اوپر سے پلایا جائے۔ اسی طرح سے اکثر تین سہل دے جاتے ہیں اور اگر ضرورت سمجھی جاتی ہے تو کبھی تیسرے سہل سے پہلے مریضہ کو دو یا تین نسخے منفع کے پلا کر آخری سہل دیا جاتا ہے۔ اس طریقہ سے بغم کا تنقیہ پورے طور پر ہو کر مریضہ کو شفا ہو جاتی ہے تنقیہ کے بعد منقویات معدہ و رحم چند روز تک کھلائیں۔

**فصل ساتویں۔** قروح المہبل والسرین آف دی وچائنا یعنی اندام نہانی کے معمولی زخم۔ اندام نہانی کے اندر کسی سخت رگڑ سے شگاف پیدا ہو جانے کے باعث یا درم اور پھنسیوں کے پک کر پھوٹنے سے اکثر زخم ہو جاتے ہیں۔ کبھی اندام نہانی یا رحم سے تیزابی طوالت کا دوائی رساؤ بھی خراشیں پیدا کر کے زخم ڈل دیتا ہے۔ اور کبھی مرض آتشک یا سوزاک سے بھی اس مقام میں زخم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اندام نہانی کی تجویف شرمگاہ سے رحم تک گہری واقع ہوئی ہے اور اس کا بیرونی حصہ گزرگاہ بول میں واقع ہے۔ اور اندرونی گہرا حصہ خارجی ہوا سے دور ہے اور فضلاتِ عظیمہ وغیرہ اسپر ہمیشہ بہتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ زخموں کی صفائی اور مرہم وغیرہ اوویہ مدلتہ قروح کا لگانا اور ان کا ہر وقت زخموں پر لگا رہنا نہایت دشوار ہوتا ہے اس لئے یہاں کے زخم اکثر دیر پا اور نہایت

عسر الاندمال ہوتے ہیں۔ اور مدت تک ان میں سے ریم جاری رہتی ہے اور قابلہ دوران علاج میں ان زخموں کی خبر گیری اچھی طرح نہ کرے اور باقاعدہ زخموں کو دھونے صاف رکھنے کا لحاظ نہ رکھے تو نتائج اکثر خراب نکلتے ہیں چنانچہ یا تو زخم میں بدگوشت پیدا ہو کر مانع اندمال ہو جاتا اور زخم کا منہ چھوٹا ہو کر زنا صورت ہو جاتا ہے۔ یا زخم پر گوشت زائد پیدا ہو کر منفذ کو تنگ بالکل بند کر دیتا ہے یا اندام نہانی کی اندرونی جھلی (میوس میمبرین) اس سے آب خون مخرج ہو کر اس کو چمٹا دیتا ہے۔ اس سے بھی منفذ بند ہو جاتا ہے یا اندمال کے اثر سے اندام نہانی کی ساخت سکڑ کر ضیق مہل کا باعث ہوتی ہے کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ زخموں میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں :

علاج۔ اگر زخم سادہ ہوں تو ان میں کسی قسم کی سمیت یا چھوت کا اثر موجود نہ ہو تو ان کے لئے صرف معمولی مرہم کا استعمال اور زخموں کا صاف رکھنا کافی ہوتا ہے جیسا کہ برگ نیب کے جو شانڈے سے دھونا اور مرہم کیلہ یا مرہم سرنج وغیرہ کا استعمال کرنا۔ اور اگر ان میں سوزش اور جلن کی شکایت ہو اور پیپ زیادہ بنتی ہو تو جو شانڈہ ٹم کٹاں سے یا زنگ لوشن یا کاربالک لوشن سے دھو کر مرہم کا فوری یا مرہم کتھ سفید یا مرہم آبیوڈوفارم وغیرہ کا استعمال کرنا بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر اندام نہانی یا رحم سے تیزابی رطوبات کا اکثر بہتے رہنا زخموں کا باعث ہو تو ان تیزابی رطوبات کی پیدائش کو روکنا۔ اور ان کی حد کم کرنے کی تدابیر عمل میں لانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ اس عرض کے لئے اکثر اطباء تصفیہ خون اور تسکین حد کو سب سے مقدم رکھتے ہیں اور نقوع شاہترہ بالعباب بہدانہ شیرہ غلاب عرق مرکب مصفی خون شربت نیلوفر بقدر حاجت مرہم کو صبح شام پلاتے رہیں اور زخموں کا علاج مرہم کتھ وغیرہ سے کرتے ہیں :

ضروری احتیاطیں جو ان زخموں کے دوران علاج میں قابلہ کو ہمیشہ نظر رکھنی چاہئیں (۱) زخموں کو صاف رکھنے کے لئے دن میں دو یا تین مرتبہ نیم گرم پانی۔ یا کاربالک لوشن یا زنگ لوشن یا جو شانڈہ برگ نیب یا جو شانڈہ ٹم کٹاں وغیرہ سے دھونا لازم ہے (۲) اس کے بعد جو مرہم مناسب موقع کے ہو اور طبیب معالج اس کے استعمال کی ہدایت کرے اس کو صاف کپڑے کی بنی ہوئی موٹی بنی پر لگا کر اندام نہانی کے اندر اس طرح رکھا جائے کہ مرہم زخم کے موقع پر پہنچ جائے۔ اور زخم پر لگا رہے۔ اس طرح مرہموں کو استعمال کرنے سے اندام نہانی کی اندرونی جھلی باہم چمٹ


نہیں سکتی۔ اور اس کی ساخت سکڑنے اور متضد تنگ ہونے سے محفوظ رہتا ہے (۳) مریضوں کی استعمال میں اس بات کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ مریضوں میں قوت مدللہ قروح کے علاوہ جلا اور صاف کرنے کی تاثیر بھی ضرور ہونی چاہئے تاکہ زخم کا انگور دہست رہے اور اس سے خون تراوش نہ پائے اور یہ پلا رہے۔ اس ترکیب پر عمل کرنے سے بدگوشت پیدا نہیں ہو سکتا (۴) مریضوں میں روغنیات یا چربی اور موم کا خبر بھی ضروری ہو تاکہ بعد اندام کے عضوی ساخت سکڑنے سے محفوظ رہ سکے (۵) چھوت دار یا سمیت والے زخموں میں ایسی ادویات کا استعمال نہایت ضروری ہے جو دافع عفونت راتھی سٹیک اور سمیت کو دور کرنے والی ہوں۔ جیسے کاربالک لوشن وغیرہ۔ چنانچہ۔ آتشکی زخموں میں آئیوڈائنڈ آف مرکوری لوشن اور سوزاک کے زخموں میں سلفیٹ آف کاپر رقتیا کے پانی یا ایلم لوشن سے زخم کو بذریعہ پچکاری کے دھویا جاتا ہے۔ اور جراح بھی اپنے ہاتھوں اور آلات کو ایسے ہی عرقوں سے دھویا اور صاف کیا کرتے ہیں (۶) اگر زخم اندام نہانی کے انتہائی حصے میں ہونے کے باعث نظر نہ آسکے ہوں تو آلہ مفتاح الفرج (ایسے کیولم) کے ذریعہ سے انکی حالت معلوم کرنی چاہئے (۷) اگر زخم زیادہ متعفن ہوں اور ان سے رطوبات فاسدہ زیادہ ہتی ہوں تو چاندی کی ایک ٹلی جس کا قطر قریب ایک انچ کے ہو بنوائی جائے اور اس کے گرد صاف کپڑا یا لینیٹ لپیٹ کر اسپرمرم لگایا جائے اور اس ٹلی کو احتیاط کے ساتھ اندام نہانی کے اندر رکھ دیا جائے۔ اس ترکیب سے رطوبات فاسدہ اندام نہانی کے اندر جمع نہ رہ سکیں گی اور زخم کے مقام تک صاف ہوا بھی جاسکے گی ۛ

فصل آٹھویں ناصور المہیل (ویجائنل فیسچولا) یعنی اندام نہانی کا ناصور۔ اگر قابلہ اندام نہانی کے زخموں کے علاج میں ضروری احتیاطوں کو مد نظر نہ رکھے۔ اور دوران علاج میں پورے طور پر خبر گیری نہ کرے تو زخموں پر بدگوشت پیدا ہو کر اور ان کے منہ چھوٹے ہو کر ناصور ہو جاتے ہیں جن سے ہمیشہ مواد بہتا رہتا ہے۔ یہ ناصور اندام نہانی کی گھلی یا لگی دیواریں اکثر ہوا کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں مقاموں پر اندام نہانی کی اندرونی جلی میں بہت سی جینٹیں (روجیر) موجود ہیں جن کے باعث زخموں میں مواد بکثرت جمع رہتا اور بچھی طرح خارج نہیں ہونے پاتا ہے اس لئے زخموں کے صاف نہ رہنے سے ناصور ہو جاتے ہیں ۛ



کبھی یہ ناصورا سفدر گہرے ہوتے ہیں کہ اندام نہانی کی تمام ساخت کو گلا کر مشانہ یا معاوستقیم تک پہنچ جاتے اور ان میں بھی سوراخ کر دیتے ہیں اسوقت مریضہ کا بول یا براز اور یاد و دونوں فضلات ان سوراخوں کی راہ اندام نہانی کی طرف سے خارج ہونے لگتے ہیں۔ ایسی حالت میں مریضہ کو سخت تکلیف ہوتی اور علاج مشکل ہوتا ہے :

رقصویر نمبر ۲۸ ناصور کی



- (۱) معاوستقیم
- (۲) رحم کی ساخت
- (۳) اندام نہانی
- (۴) مشانہ کا جوت
- (۵) فتحہ المہبل
- (۶) حلیل
- (۷) شفر صغیر و کبیر
- (۸) عجان
- (۹) فتحہ المہرز

اگر یہ ناصورا اندام نہانی کی پچلی دیوار میں ہو تو اس کو ناصور المعانی المہبلے (رکٹو و بچائسل فچولا) یعنی معاوستقیم اور اندام نہانی کے درمیان کا ناصور کہتے ہیں۔ اور اگر سانے کی دیوار میں ہو تو اس کو ناصور المسانی المہبلے (روی) اسانکو و بچائسل فچولا یعنی مشانہ اور اندام نہانی کے درمیان کا ناصور کہتے ہیں :

علاج۔ اول مریضہ کو چوکی پر گھٹنوں کے بل اونڈھا بٹھائیں اور آلہ مفتاح الفرج (ڈکبل سپے کیوٹم) سے فرج کو کشادہ کر کے مقام ناصور کو ملاحظہ کریں۔ اس کے بعد ناصور میں آلہ ساہنہ الفرج و ح (پروپ) یعنی سلائی داخل کر کے اس کی وسعت اور گہرائی کو دریافت کریں :



رقصویر نمبر ۲۹ سلائی کی




پھر مریضہ کو اونڈھا کر مقام مؤلف کو صابون اور گرم پانی کی پچکاری سے صاف کریں اسکے بعد

پیشکری کے پانی سے ناصور کو اندر سے بذریعہ پیکاری کے اچھی طرح دھوئیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد توتیا کا پانی ناصور کے اندر پہنچائیں۔ اگر زخم اور ناصور خفیف سا ہوتا ہے تو چند روز تک اسی طرح دھونے اور صاف رکھنے سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ناصور زیادہ گہرا اور زخم زیادہ متعفن ہونے کے باعث مریضہ کو دس سے تیس دن کے درمیان شفا حاصل نہ ہو تو ناصور کو بذریعہ گرم آہنی تلکے جلائیں لیکن عموماً دستکاری کرنی پڑتی ہے طریقہ دستکاری کا یہ ہے کہ اول بذریعہ حقن کے انٹریوں کو صاف کریں اور مریضہ کو پیشاب بذریعہ قاتا طیر کے تھپڑ کے نکال دیں۔ اس کے بعد مریضہ کو کلوروفارم سنگھا کر رنے تھانوی کی وضع سے میسر پر لٹائیں۔ پھر آلفٹاح الفرج زدک بل سپے کیولم کے ذریعہ فرج کو کشادہ کر کے مقام ناصور اور اس کے عمق کا امتحان سلائی سے کریں اور ہک فارسیس سے پکڑ کر داہنی یا بائیں جانب کو خمیدہ چھری (لفٹ یارنٹ اینگولر ناؤف) سے قریب چوتھائی انچ کے کنارہ ناصور سے میوکس میمبریں کو چیر دیں اور تمام زخم کو نیا کر کے سوراخدار سوئی (پرفورٹڈ نیڈل) میں آہنی تار پرو کر ٹانگے لگائیں۔ ٹانگے لگانے کا یہ طریق ہے کہ سوئی مذکور میں آہنی تار پرو کر ایک جانب سے داخل کر کے دوسری جانب کو نکال لیویں اور تار کو سپس کے ذریعہ پکڑ لیویں۔ اور چونکہ سوزن مذکور دستہ دار ہوتی ہے۔ اس لئے جس راہ سے داخل کیا تھا اسی راہ سے نکال لیویں اس طور سے تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر تار کو پرو دیویں اب زخم کے دونوں کناروں کو ملانے کے واسطے تار کے باہر والے دونوں سروں کو فورٹریٹڈ بلیڈ کے پیچ میں پرو کر بل دیویں۔ اس طریقہ سے زخم کے کنارے بہت نزدیک آ جاتے ہیں ۛ

(دیکھو تصویر نمبر ۳۰-۳۱-۳۲ ان آلوں کی)





یا ورکھو کہ اس دستکاری میں زیادہ خبرگیری چاہئے۔ اور مریضہ کے مثانہ میں قاتنا طیر کے کچی ٹمے رکھ دیوں۔ تاکہ مثانہ میں پیشاب کا ایک قطرہ بھی نہ رہنے پائے۔ اور اندام نہانی کو کسی عرق دافع عفونت (انٹی سینگک لوشن) سے بذریعہ پیکاری کے اکثر اوقات دھو دیا کریں تاکہ وہ بھی بالکل صاف رہے جیسے کاربالک لوشن وغیرہ اس کے علاوہ بروڈنڈ آف پوٹاسیم اور کلور ہائیڈریٹ کا بھی بقدر مناسب کھلانے میں استعمال کریں پ:

**فصل نویں** قرح اخرنجی (سفلیٹک السرٹین) یعنی آتشکی زخم۔ اندام نہانی کے اندر بھی آتشکی زخم بھی پائے جاتے ہیں جن کے مادہ میں خاص سمیت اور تعدیل کی خاصیت موجود ہوتی ہے۔ یہ مرض (آتشک) دوطرح کا ہوتا ہے ایک موروثی جو ماں باپ سے اولاد میں آتا ہے۔ دوسرا کسی جو مرد سے عورت کو یا عورت سے مرد کو ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر پہلے سے مرد کو ہو اور وہ تندرست عورت سے مقاربت کرے تو عورت بھی مرض مذکور میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر پہلے سے عورت مبتلا ہے مرض ہو اور تندرست مرد اس سے مقاربت کرے تو مرد مبتلا ہو جاتا ہے۔ چونکہ آتشکی زخم دوطرح کے ہوتے ہیں۔ ایک غیر اصلی آتشک کے زخم (سافٹ ٹنگر) یعنی نرم زخم۔ اور دوسرے اصلی آتشک (ہارڈ ٹنگر) یعنی سخت قسم کے زخم۔ اس لئے ہم ان دونوں قسموں کے زخموں کو جدا جدا مع علاج کے بیان کریں گے۔

**قسم اول** نرم زخم (سافٹ ٹنگر) اس قسم کا مادہ خون میں شامل نہیں ہوتا اسی وجہ سے مرض مقامی روکل اکن ٹیجی اس (کہلاتا ہے اور اس کے زہر کا اثر مقام ماؤف پر ہی ہوتا ہے ان زخموں کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ جب آتشکی مادہ مقام ماؤف کی نازک جلد یا غشاء لعابی (میوکس میمبرن) پر اپنا تیزابی اثر کرتا ہے تو اول وہ مقام چھل جاتا ہے پھر ۴۴ گھنٹے کے اندر سرخ ہو جاتا ہے دوسرے یا تیسرے روز قدرے ورم ہو کر پھنسی پیدا ہو جاتی ہے جس میں تیسرے یا چوتھے روز ورم بڑھ جاتی ہے۔ اس پھنسی کی نوک سیاہ اور اس کے گرد سرخ حلقہ پایا جاتا ہے چوتھے یا پانچویں دن وہ پھنسی پھوٹ کر اور اس سے قدرے مواد خارج ہو کر گہرا زخم ہو جاتا ہے۔ اس میں درد شدید

اور مواد کثرت خارج ہوتا ہے زخم کے چاروں طرف ورم ہوتا ہے اور اس کی شکل بے قاعدہ مثل کرم خوردہ سطح کے نظر آتی ہے۔ زخم کا رنگ خاکستری کنارے صاف۔ جڑ کسی قد سخت دکھائی دیتی ہے۔ میعاد اس زخم کی تین ہفتہ سے دو ہفتہ تک ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس کے ساتھ جنگاسہ میں ورم دبدبہ بھی نمودار ہو جاتی ہے۔ جس سے مواد خارج ہو کر زخم مثل آتشکی زخم رساٹ شکر کے باقی رہ جاتا ہے۔ اکثر یہ زخم شرمگاہ کے لبوں میں اور اندام نہانی کی اندرونی جھلی میں ہوتے ہیں۔ اور کبھی زخم کے منہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔

اگر زخم کی صفائی اور عمدہ علاج کی طرف توجہ نہ کی جائے یا مریضہ کے خون میں کسی دوسری قسم کا فساد موجود ہو یا خراب غذائیں کھانیکا اتفاق پڑے تو زخم بڑھ کر غانغل یا رنگینگرین تک بھی فوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور سیاہ رنگ کے چھچھڑے خارج ہونے لگتے ہیں۔ اور کبھی اس سے بھی زیادہ شدت ہوتی ہے یہاں تک کہ تمام شرمگاہ اور اندام نہانی کے اندرونی ساخت میں اول سخت ورم ہوتا اور پھر وہ ساخت مردہ ہو کر گل جاتی ہے اور شدت تکالیف کے باعث مریضہ نہایت ضعیف ہو کر مر جاتی ہے۔

**علاج** دو قسم کا ہونا چاہئے۔ ایک پلانے کی دوائیں جو صفی خون اور سکن حدت ہوں جیسے تقویر شاہترہ معمولہ مطب عالیجناب حافظ الملک دام اقبالہم۔ یا انفیوزن آف چرائٹہ۔ یا عرق عشبہ و معجون عشبہ اور لعاب بہدانہ۔ شیرہ عناب، عرق مرکب صفی خون وغیرہ۔ اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو چند روزہ نچھ مفتح کا پلا کر سہل دیں صفتہ۔ شاہترہ۔ چرائٹہ۔ منڈی۔ پوست ہلبیہ کا بلی گل نیلوفر ہر ایک، اشہ۔ بسفاج فتق۔ افیمون۔ برگ بادرنجبویہ۔ ہر ایک ۵ ماشہ عناب ۵ دانہ۔ سب کو شام کے وقت گرم پانی میں تر کر کے صبح کو ل جھان کر خمیرہ بنفشہ ۳ تولہ ملا کر پلائیں۔ بعد نصیح مادہ کے اسی نسخہ میں سنہا کی ۵ ماشہ مغز فلوس ۱۵ تولہ۔ ترنجبین ۱۵ تولہ شیرہ مغز بادام شیریں، عدد اضافہ کر کے سہل دیں۔ سہلوں کے درمیان معمولی تبرید پانی چاہئے۔ اور اکثر اس سہل کے بجائے مبلو بخ ہفت روزہ یا کالی دوا کا سہل بھی دیا جاتا ہے۔

مریضہ کو غذائیں سرد اور تقویٰ زود ہضم دیں۔ جیسا کہ آتش جو یا کچھری دال مونگ مقشر یا دال مونگ چاول خشک کے ساتھ۔ یا بوٹی سبز ترکاریوں کے ساتھ اور جہاں تک ممکن ہو گوشت سے خصوصاً سادہ اور گرم مصالحہ وغیرہ سے اجتناب رکھیں۔

یہ بات رکھنے کے قابل ہے کہ اس قسم میں پارہ یا اس کا کوئی مرکب اندرونی طور پر استعمال میں نہ لانا چاہئے۔ کیونکہ اس قسم کا زہر عام خون میں شامل نہیں ہوتا۔ اس لئے اگر پارہ کا استعمال کیا جائے تو اس کا اثر خون کے ذریعہ عام بدن پر ہوگا۔ اور بجائے نفع کے اس سے مضرت کا احتمال ہو وہ مضرت یہ ہے کہ ایسے موقع پر پارہ کے استعمال سے اکثر مواد مرض میں تحریک ہو کر اس کا فساد عام ہو جاتا اور دوسری آتشک رسکنڈری سلفس پیدا ہو جاتی ہے :

نظامی ادویات کے استعمال میں یہ بات خوب یاد رکھنی چاہئے کہ جب تک ضعیف الاثر دواؤں سے کام چلے قوی العل اور تیز اثر دواؤں کے استعمال کی ہرگز جرأت نہ کریں پس اسی قاعدہ کے رو سے اول دیکھیں کہ اگر زخم سادہ اور غیر متغض ہوں اور ان پر زیادہ پل بھی نہ ہو تو نیم گرم پانی سے دھونا اور صرف مرہم آیوڈو فارم لگانا کافی ہوتا ہے۔ اور اگر سمیت اور تغض کا اثر زیادہ پایا جائے تو جو شانہ برگ نیب سے دھونا اور مرہم کا فوری استعمال کرنا مفید ہوگا۔ اور اگر اس سے نفع نہ معلوم ہو تو اول نائٹرک ایسڈ سے زخموں کو جھک کر گلاب اور کا فور سے دھو ڈالیں تاکہ تیزاب مذکور کی حدت اور سوزش دفع ہو جائے اس کے بعد مرہم کتھ سفید یا مرہم سفید کا استعمال کریں :

تیزاب مذکور سے زخموں کو اس وقت جلانا چاہئے جبکہ ورم یا سوزش نہ ہو اور زخم زیادہ پرانے ہوں اور اگر سوزش زیادہ نہ ہو تو سرد پانی یا عرق سیسہ محلول (لڈوشن) یا کتھ کے پانی یا اسپرٹ لوشن یا جو شانہ تخم کتان سے بذریعہ پچکاری کے زخموں کو اچھی طرح دھوئیں۔ اور سلفیٹ آف زینک جینل گرین پانی ۸۔ اونس میں حل کر کے لینٹ اس میں ترکیبیں اور فرج کے بسوں اور انڈم نہانی کے درمیان رکھیں تاکہ وہ باہم چپٹنے اور گرگٹ سے محفوظ رہیں :

اگر زخم پر بدگوشت پیدا ہونے کا خوف ہو تو قدرے تو تیا اسپرٹ چھڑکے یا تو تیا کے پانی سے اکثر زخم کو دھویا کریں تاکہ بدگوشت زائل ہو جائے اور آئندہ نہ ہونے پائے۔

چونکہ ایسے زخموں میں تیزابی دواؤں کے استعمال سے اکثر سیلان خون کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے مناسب موقع پر اس نسخہ کا استعمال بھی مفید پایا گیا ہے نسخہ ٹے نک ایسڈ پلڈ ورم ریٹینٹ اسپرٹ ایڈرام۔ پانی ۴۔ اونس سب کو ملا کر اس سے زخم کو تر رکھیں :

دوسری قسم۔ اصلی آتشک (ہارڈشکر یا سی نی س) اسکا زہر زیادہ خون میں شامل ہوتا ہے۔

پارہ کا اندرونی استعمال منع ہے۔

اس لئے اس کا فساد صرف اعضا مخصوص ہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ انسان کے ہر رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتا ہے اور عام بدن میں اپنا فساد پیدا کر سکتا ہے۔ جس وقت سے یہ زہر آدمی کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ فوراً مرض مذکور کی علامات اور اس کے عوارض ظاہر نہیں ہوتے۔ بلکہ کچھ مدت تک وہ زہر بدن میں بیکار پڑ رہتا ہے اور اس کا کوئی فساد ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ غالباً اس مدت میں وہ زہر خفیہ طور پر بدن میں انفرانش پاتا رہتا ہے۔ اس زمانہ کو ڈاکٹری اصطلاح میں زہر کے بیکار پڑنے کہتے ہیں۔ اس کی مدت قریب دو ہفتہ سے چھ ہفتہ تک یا اس روز سے چھالیس روز تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد مرض آتشک کا پہلا درجہ درپاؤ مری سفلس (شروع ہوتا ہے جس کی مدت ایک ہفتہ سے چھ ہفتے تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ (سکنڈری سفلس) دو تین ہفتے کے وقفہ کے بعد شروع ہو کر چند ہفتہ سے دو سال تک رہتا ہے۔ بعد ازاں تیسرا درجہ (ٹرنٹری سفلس) ہوتا ہے جس کی انتہائی مبعاد مقرر نہیں ہے۔ اب ہم آتشک کے اسباب اور اس کے ہر درجہ کی علامات کو مع علاج کے بیان کرتے ہیں :

اسباب سرایت مرض آتشک کا بھی مادہ دو طرح سے انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ماں باپ سے اولاد میں وراثتاً اس کی سمیت منتقل ہو کر آتی ہے اور کچھ مدت کے بعد جسکی مقدار مقرر نہیں ہے، اولاد میں مرض مذکور ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو موروثی آتشک کہنا چاہئے۔ دوسرے یہ کہ مرض مذکور کسی دوسرے شخص سے منتقل ہو کر مرض میں آیا ہو۔ اس کو آتشک کسی کہنا چاہئے جو چند طریقوں سے لاحق ہو سکتا ہے :

(۱) آتشک والے مریض کے ساتھ جماع کرنے سے اگر مرض عورت کو ہو تو اس سے مرد کو بھی ہو جاتا ہے اور اگر پہلے سے مرد مبتلائے مرض ہو تو اس سے عورت کے جسم میں بھی وہی زہر سرایت کر جاتا ہے اس کے زخم اول اعضائے تناسل پر ہوتے ہیں :

(۲) ایسی عورت کا بچہ جانے سے جو مرض آتشک میں مبتلا ہو قابلہ کی انگلیوں پر مرض مذکور کا اثر ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اسی وقت قابلہ دوسری عورت کی خدمت میں بدون اچھی طرح صفائی کرنے کے حاضر ہو جائے تو دوسری عورت بھی مبتلائے مرض ہو سکتی ہے :

(۳) آتشک والے مریض کے برتن میں پانی پینے سے تندرست آدمی کی زبان اور لبوں پر آتشک کا

اثر ہو جاتا ہے دم، جس بچہ میں آتشک کا مادہ موروئی طور پر موجود ہو اس کو دودھ پلانے سے دایہ کی چھانٹیوں پر اس مرض کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں ۛ  
(۵) اگر آتشک والے بچہ کے ٹیکہ سے مواد لیکر دوسرے تندرست بچہ کو ٹیکا لگایا جائے تو اس کو بھی کسی وقت میں یہ مرض ہو سکتا ہے ۛ

(۶) آتشک والے مریض کے بستر پر سونے سے اگر اس کا مواد تندرست آدمی کے جسم پر لگ جائے تو وہ بھی مبتلا ہے مرض ہو سکتا ہے ۛ

(۷) اگر آتشک کے پہلے یا دوسرے درجہ والے مریض کا خون یا اس کے زخموں کا مواد کسی تندرست آدمی کے بدن میں داخل ہو جائے تو اس کو بھی وہی مرض ہو سکتا ہے زعفرک آتشک کا مواد خواہ کسی طرح دوسرے تندرست آدمی کے نازک مقامات پر لگے تو اپنا اثر ضرور پیدا کرتا ہے۔

اس بیان سے آپ کو یہ بھی بخوبی معلوم ہو گیا کہ ایک تندرست آدمی کے جسم میں آتشکی زہر کے حاصل ہونے کا طریقہ صرف ایک جملع ہی نہیں ہے بلکہ اس مرض کا حصہ ماں باپ سے اولاد کو وراثتاً ملنے کے علاوہ دوسرے متعدد طریقوں سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک عورت سے دوسری عورت کو بذریعہ قابض کے یا ایک بچہ سے دوسرے بچہ کو بذریعہ ٹیکہ کے پہنچ سکتا ہے۔ اور دودھ پینے والے بچہ سے دایہ کو یا دایہ سے بچہ کو لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص سے دوسرے کو بذریعہ استنہالی اسباب و ظروف وغیرہ کے پہنچ سکتا ہے۔

اس لئے اطباء کو لازم ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مریض آتشک میں مبتلا ہو کر آئے اسکو ایک نظر دیکھتے ہی عیاشی اور بد فعلی کا بجا الزام خواہ مخواہ اسپر نہ لگایا جائے۔ اگرچہ اس زمانہ میں آتشک والے مریضوں میں سے اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں جو باوجود صاحب عقل و شعور ہونے کے اپنی خواہشات نفسانی سے مجبور ہو کر فاحشہ اور بازاری عورت کے ساتھ مقاربت کر کے اس موزی مرض کی بلا میں ہمیشہ کے لئے خود گرفتار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ سب کا حال یکساں نہیں ہوتا ممکن ہے کہ دوسرے طریقہ سے کسی کو مرض لاحق ہوا ہو۔ اور مریض کو جو خود گرفتار ہوا ہے اپنے خیالی ڈکوسلے پر مہفت کا الزام لگایا جائے۔ حالانکہ یہ الزام تندرست مرض سے کچھ بھی لائق نہیں رکھتا ہے۔

آتشکی زخم اور ان کے مواقع آتشکی زخم عورتوں اور مردوں میں علاوہ اعضاء تناسل کے

مقعدہ۔ لبوں۔ رخساروں کو ذیقین ٹائسل گلیٹنڈز زبان۔ تالو۔ حنجرہ۔ ناک اور انگلیوں پر ناض کی جڑوں میں ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ آتشکی زخم کچھ زیادہ وسیع یا گہرے اور متعفن نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ان کے قرب وجوار والے غدود اکثر پھول جاتے ہیں۔ اگر زخم اعضائے تناسل میں ہوں تو جنگاسہ کے غدود یا متورم ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ پک کر پھوٹ جاتے اور ان کے زخم بھی آتشکی زخموں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اگر منہ یا لبوں میں زخم ہوں تو زیریں جڑے کے نیچے والے غدود اور غلہ خلف الاذن پر پڑ کر گلیٹنڈز یعنی کلن سے پچھلے اور پچھلے غدود میں ورم ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ہاتھ یا چھاتیوں میں زخم ہوں تو غلہ دالبطیہ (ایگزٹری گلیٹنڈز) یعنی بغل کے اندر والے غدود متورم ہو جاتے ہیں۔

آتشکی زخموں کی خاصیت۔ آتشک کے پہلے درجہ میں زخم مختلف اقسام کے ہوتے ہیں بعض اوقات صرف ایک پھنسی ہوتی ہے جس کے گرد سرخی کا حلقہ اور سختی پائی جاتی ہے اور کبھی ایک چھوٹا سا گول زخم درمیان میں قدرے گہرا خاکستری رنگ کا جس کے کنارے ابھرے ہوئے مسخ اور نہایت سخت ہوتے ہیں زخم سے کبھی قدرے رطوبت ترقیق ہتی ہے۔ اور کبھی بالکل خشک ہوتا ہے۔ البتہ اگر اسپرٹافا کوئی خارجی اذیت پہنچے تو اجتماع خون کے باعث اس میں ریم پیدا ہو سکتی ہے۔ کبھی زخم بالکل گہرا نہیں ہوتا صرف اس مقام کی جلد چھلی ہوئی سی ہوتی ہے۔ چڑے کے مقام پر غدود پھول جاتے ہیں لیکن ان میں کچھ زیادہ درد نہیں ہوتا۔ البتہ اگر مریض کو زیادہ چلنے پھرنے کا اتفاق پڑے تو ان میں ورم اور درد و لشدت ہونے لگتا ہے۔ عموماً یہ زخم چھ ہفتہ کے اندر خود بخود اچھے ہو جاتے ہیں لیکن پورے طور پر نہیں کیونکہ دوبارہ ادنیٰ تحریک سے یہ زخم عود کر سکتے ہیں۔ اور ان کے گرد کی سختی قریب تین مہینے تک رہا کرتی ہے۔ اگر مرکبات سیاب کا استعمال کرایا جائے تو اس وجہ کی آتشک کو ہا سے ۸ ہفتے تک کی مدت میں آرام ہو جاتا ہے۔ ورنہ کم سے کم چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ ایک سال تک یہ درجہ طول پکڑ سکتا ہے۔

دوسرے درجہ کی علامات۔ پہلا درجہ ختم ہونے کے بعد چھ یا سات ہفتے تک مریض کو بظاہر کوئی شکایت اس مرض کے متعلق نہیں معلوم ہوتی۔ اور اپنے کو خاصی تندرست سمجھتی ہے (اسلے اس مدت میں مادہ مرض اس کے بدن میں بیکار پڑا رہتا اور اندرونی طور پر ترقی پذیر ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد خون میں فساد شدید ہو جانے کے باعث ذیل کی علامات ظاہر ہوتی ہیں :



(۱) روز بروز مریضہ ناتوان اور ضعیف ہوتی جاتی ہے (۲) بھوک یوں مایوسا گھٹتی جاتی ہے (۳) تمام بدن میں خشکی اور بے رونقی کے ساتھ جلد میں خصوصاً تفصیلات اور چھاتی کے مقام پر سرخ سرخ تلبے کی رنگت کے دانع ہو جاتے ہیں (۴) بدن مختلف مقامات پر جلد موٹی ابھری ہوئی سخت اور سُرخ ہو جاتی ہے (۵) کبھی جلد پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہو جاتی ہیں جن پر سے جلد کا باریک پرت چھلکوں کی طرح اکثر اتر کر رہتا ہے (۶) جلد پر کبھی آبلے مختلف مقدار کے پیدا ہونے لگتے ہیں جن میں تین پانی یا ریم بھری رہتی ہے (۷) کبھی جلد پر صرف گوٹریاں سی پیدا ہو جاتی ہیں اکثر یہ تمام جلدی خرابیاں مرض آتشک میں بدن کے صرف ایک ہی نہیں بلکہ دونوں طرف بالمقابل یکساں ہوتی ہیں (۸) لوزیتن رٹانسٹل گلیسنڈز میں ورم ہو کر زخم ہو جاتے ہیں جن کا رنگ خاکستری اور کستارے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان زخموں میں درد بہت کم ہوتا ہے اور وہ بہت دیر تک زیادہ پھیل جاتے ہیں (۹) بدن کے عام غدود خصوصاً سر کے پچھلے اور پس گوش والے غدود پھول جاتے ہیں۔ (۱۰) منہ۔ زبان۔ تالو خجرہ۔ اور علصمدہ پلر آف دی فاسٹس کی لعابی جھلی متورم ہو جاتی اور کبھی اس میں کسی قدر خراش یا زخم بھی پیدا ہو جاتے ہیں (۱۱) کبھی مریض کے منہ۔ لبوں۔ باجھوں اور حلق یا خجرہ میں اور اسی طرح مقعدہ کے گرد اور شمرگاہ پر چھوٹی چھوٹی اور سخت پھنسیاں مسوں کی طرح نمودار ہو جاتی ہیں (۱۲) سبوں اور سر کے بال پتلے اور خشک ہو کر گر گئے لگتے ہیں (۱۳) ناخن سخت اور متورم ہو جاتے ہیں۔ (۱۴) آنکھ کے طبقات میں سے قرینہ مکدر اور غیر شفاف ہو جاتا۔ اور عنبیہ مشیمہ۔ شبکیہ متورم ہو جاتے ہیں (۱۵) جو ہڈیاں صرف جلد سے پوشیدہ ہیں (جیسا کہ ساق اور کلائی اور پیشانی کی ہڈیاں) ان کے اوپر والی جھلی رپری اسٹی ام متورم ہو جاتی ہے (۱۶) ان متورم مقامات میں اکثر اتر کے وقت ایسا شدید درد ہوتا ہے کہ وہ بے یار کرنے سے اس میں کچھ تخفیف نہیں ہوتی۔ یا در کھوکھو کہ مرض آتشک کے دوسرے درجہ میں تمام علامات مذکورہ بالا کا موجود ہونا ایک شخص میں اور ایک وقت میں ضرور نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض علامتیں کسی مریض میں پائی جائیں اور بعض علامتیں موجود نہ ہوں۔ اگر آتشک کے اس درجہ میں نہایت کوشش کے ساتھ باقاعدہ علاج کیا جائے تو یہ تمام عوارض چھ سات ہفتے میں رفع ہو کر مریض اچھا ہو جاتا ہے درنہ قریب دو سال تک طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا رہنا پڑتا ہے اور آٹھ دن نئی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے

تیسرے درجہ کی علامات - دوسرا درجہ ختم ہونے کے بعد پھر چند مہینے اور بعض صورتوں میں چند سال کا وقفہ دے کر آتشک کا تیسرا درجہ (ٹرسٹری سفلس) شروع ہوتا ہے اس وقفہ کے زمانہ میں آتشکی عوارض میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہتا اور بظاہر مریض کو سوائے اس کے اور کوئی شکایت محسوس نہیں ہوتی کہ وہ کبھی کبھی اپنی زبان یا ہاتھوں کی جلد میں قدرے سوزش یا خفیف سی خراش پاتا ہے یا کبھی اتفاقاً اس کو امراض جلدی میں سے کوئی معمولی سامرض ہو کر چند روز کے بعد زائل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس مدت میں بیمار کا جسم آتشکی زہر سے بالکل پاک اور صاف نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ سمیت رفتہ رفتہ برابر خون میں سرایت کرتی اور خفیفہ طور پر ترقی کرتی رہتی ہے۔ اس وقت ایک سفید غلیظ القوام چپکاؤ دار رطوبت جس کو لاطن زبان میں گٹا کہتے ہیں پیدا ہو کر موجب فساد ہوتی ہے جب اس کا فساد ایک خاص حد تک خون میں سرایت کر کے تمام اندرونی اور بیرونی اعضا پر اپنا پورا تسلط کر لیتا ہے اس وقت آتشک کے تیسرے درجہ کے عوارض ظاہر ہونے لگتے ہیں :

چنانچہ (۱) کبھی خون کی حد سے جلد کی باریک رگیں پھٹ جاتی ہیں اور ان سے خون نکل کر جلد کے نیچے جمع ہو جاتا اور اس میں سرخ داغ پیدا کرتا ہے جس کو ابوسمارا کسٹراڈیمین آف بلڈ کہتے ہیں (۲) یا چھوٹی چھوٹی گومڑیاں پیدا کرتا ہے جو کبھی مثل اخروٹ کے بڑھ جاتی اور پک کر پھوٹ جاتی ہیں یا وہیں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اگر پختی ہیں تو ان کے زخم گہرے اور متعفن خراب قسم کے ہوتے ہیں (۳) اور کبھی وہ مادہ جلد کے نیچے خانہ دار جھلی میں جمع ہو کر اول اس میں سختی اور پھر زخم پیدا کر دیتا ہے جیسا کہ اکثر عورتوں کی رانوں اور پیٹلیوں پر ہوتا ہے (۴) کبھی وہ مادہ عضلات بدن میں نفوذ کر کے ان کو سخت اور بیکار کر دیتا ہے (۵) کبھی مفاصل اور ان کے رابطات میں سخت ورم اور وجع المفاصل کا موجب ہوتا ہے (۶) بعض حالتوں میں مفاصل اور ان کی اندرونی جھلی جھیلیوں میں زخم ہو کر جوڑ سکاڑ جاتے ہیں (۷) ہڈیوں اور ان کے اوپر کی جھلی پر بھی اس کا سخت اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ یا تو صرف یہی ہوتا ہے کہ جھلیوں میں وہ مادہ سخت چوڑے کی طرح کا ہو کر ان میں سختی پیدا کر دیتا ہے جو چند روز کے بعد علاج سے زائل ہو جاتی ہے یا اس میں اس قدر ترقی ہوتی ہے کہ جس کے باعث ہڈیوں کی پرورش اچھے طور پر نہیں ہونے پاتی۔ اور وہ پتلی اور کمزور ہو جاتی ہیں۔

اور یا ان جھلیوں میں ورم ہو کر ریم پڑ جاتی ہے (۸) اسی طرح جب ہڈیوں پر اس کا اثر ہوتا ہے تو وہ مختلف مقامات سے موٹی اور سخت ہو جاتی ہیں۔ یا خاص ان کی ساخت میں ورم ہو کر وہ نرم ہو جاتی ہیں۔ یا ان میں زخم ٹپک رہے ہوں یا بالکل مردہ ہو جاتی ہیں اور گل کر ان کے ریزے ریم کے ساتھ نکلنے لگتے ہیں (۹) اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ منہ زبان، حلق، حنجرہ، اور قصبہ ریه کی اندرونی جھلی (میکوس میمبرین) میں سختی اور ورم پیدا ہو کر زخم ہو جاتے ہیں (۱۰) کوئل کر گر جاتا ہے تالو بھوٹ جاتا ہے۔ ناک کی نازک ہڈیاں گل کر ناک کی نازک ہڈیاں گل کر ناک بے ڈول ہو جاتی ہے (۱۱) حنجرہ کی عضاریف اور لسان المزمار رو وکل کا رڈر، خراب اور تباہ ہو کر آواز بیٹھ جاتی ہے ۛ

ان عوارض کے علاوہ بدن کے اندرونی اعضا بھی اس مرض کے حملہ سے محفوظ نہیں رہتے۔ چنانچہ (۱) دماغ اور نخاع پر اثر ہونے سے فالج، رعشہ، استرخاء، تشنج، کزاز وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ (۲) آنکھوں پر جب اس کے فساد کا اثر ہوتا ہے تو اس سے آنکھ کے پردوں کی بعض بیماریاں خصوصاً خراب قسم کے زخم پیدا ہو جاتے ہیں یا ان کی ساخت میں کثافت اور سختی پیدا ہو کر ضعف بصارت کا موجب ہوتی ہے بلکہ بعض موقع پر تو نزول الماء رکٹرکٹ (تک بھی نوبت پہنچتی ہے (۳) جگر اور گردن کی خرابی سے استسقاء یا سوء القنیدہ (۴) نی م آ تک نوبت پہنچتی ہے (۵) معدہ اور آنتوں کے فساد سے اسہال آنے لگتے ہیں (۶) پھیپھڑے پر اثر ہونے سے مرض سل پیدا ہو جاتا ہے (۷) رحم اور مثانہ پر اثر ہونے سے ان اعضاء کے امراض لاحق ہوتے ہیں (۸) خصیوں اور باقی اعضاء تناسل پر تو اس کا اثر مشہور ہے (۹) کنج ران، بغل اور گردن کے غدود لمفاویہ (لیمفٹک گینڈز) اکثر پھیل جاتے ہیں (۱۰) عام شریانوں اور وریدوں پر بھی اس موذی مرض کا اثر ہوتا ہے۔ جس کے باعث ان میں سختی پیدا ہو کر ان کی تجاویف تنگ ہو جاتی اور وہ موٹی ہو جاتی ہیں۔ عرض کہ آتشک ایسا موذی مرض ہے کہ اس کو اگر تمام الامراض کہا جائے تو بالکل بجا ہے ۛ

علاج۔ مرض آتشک اصلی رہارڈ شنگلر کے علاج میں ان تینوں اصول کی پابندی نہایت ضروری ہے (۱) سب سے پہلے تمام بدن کو عام فضلات سے پاک اور معرہ وغیرہ اختیار کو ان کی آلائشوں سے صاف کرنا چاہئے تاکہ جو دوائیں اس مرض کے لئے مخصوص ہیں انکی تاثیر تمام بدن کے

۱۵ جیسے رمد (افتھیمیا)، آشوب چتم، یا مرض سبل (آکرائیٹس) وغیرہ۔ لائوف۔

آتشک سے پیدا ہونے والے امراض

رگ وریشہ میں اچھی طرح سرایت کر کے آتشکی زہر کا پورے طور پر مقابلہ کر سکے۔

(۲) خاص آتشکی زہر کو فدا اور بر باد کرنے والی ادویات کا استعمال کرنا لازم ہے تاکہ اسکے موجودہ عوارض اور آئندہ خراب نتائج سے مریض کو نجات ملنے کی توقع کی جاسکے۔

(۳) خون کی دستی اور اس کا تصفیہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تاکہ آتشکی زہر سے متاثر ہونے کی استعداد خون میں سے زائل ہو کر وہ پورے طور سے پرورش بدنی کے لائق ہو جائے۔

ان اصول پر نظر کرنے سے آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ معالج کا یہ فرض ہے کہ وہ تنقیہ عام کے لئے سب سے پہلے چند روز تک مریض کو نفور شہترہ وغیرہ مصفیات خون اور منضجات پلا کر مادہ کو قابل اخراج کر کے مسہل مناسب سے تنقیہ عام کرائے اس کے بعد مرض آتشک کے زہر کا خاص علاج اس کی ادویہ مخصوصہ سے کرے اور آخر میں یا اس کے ساتھ ہی مصفیات خون (مثل معجون غشہ عرق غشہ وغیرہ) کا استعمال کرائے۔ اس طرح باقاعدہ علاج کرنے سے قوی امید کجا سکتی ہے کہ بہت جلد مریض کو شفا حاصل ہوگی :

**مرکبات سیماپ کا استعمال**۔ یونانی اطباء ویدوں اور ڈاکٹروں نے بالاتفاق اپنے سالہا سال کے تجارب سے یہ بات بخوبی ثابت کر دکھائی ہے کہ مرکبات سیماپ کا استعمال کرنا آتشکی زہر کو فدا کرنے کے لئے ایک اعلیٰ تدبیر ہے۔ بعض مریضوں میں تو اس کا فوری اثر سحر کا سا کام کرتا ہے۔ ماہر ڈاکٹروں کا قول ہے کہ آتشک کے پہلے اور دوسرے درجہ میں مرکبات سیماپ زیادہ کوئی دوا موثر نہیں ہے اور اس کے تیسرے درجہ میں آئیوڈائیڈ پوٹاسیم۔ آئیوڈائیڈ ایمونیم۔ اور آئیوڈائیڈ سوڈیم وغیرہ سب زیادہ نافع ہیں۔ لیکن ان دواؤں کا استعمال نہایت احتیاط سے کرنا چاہئے کیونکہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان سے نفع کی نسبت نقصان کا بہت زیادہ خوف ہوتا ہے۔

**مرکبات سیماپ کا استعمال مرض آتشک میں اکثر چار طور سے کیا جاتا ہے (۱) داخل استعمال** کھانے پینے کے طور پر استعمال کرنے کے لئے مرکبات سیماپ میں سے رسپیور اور دارچینہ زود اثر اور کم مضرت ہونے کے لحاظ سے زیادہ بہتر تسلیم کئے گئے ہیں۔ ویسی اطباء ان دونوں کو بعض اشیاء مصلحہ کے ساتھ مرکب کر کے بخمسہ گولیوں وغیرہ کی صورت میں دیتے ہیں یا ان کا جوہر اڑا کر استعمال کراتے ہیں۔ آتشکی مواد کو خارج کرنے کے لئے خالص پارہ مصفی بعض مسہلات کی ترکیب میں بھی شامل

کیا جاتا ہے۔ اور بعض نسخوں میں مردار سنگ بھی اپنی منفعت کے لحاظ سے جزو اعظم سمجھا جاتا ہے۔  
 ڈاکٹر صاحبان مرکبات سیلاب کو اپنے محوزہ طریقہ سے استعمال کراتے ہیں۔ ان کا قول ہے۔  
 ”چونکہ مرکبات سیلاب اکثر دست آور ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو کسی قدر فیون کے ہمراہ ملا کر دینا چاہیے“  
 نسخہ (۱) اگر بے پاؤڈر۔ ایک گرین۔ دو ڈوس پاؤڈر ایک گرین۔ ایکسٹراکٹ جن شین بقدر ضرورت  
 ملا کر ایک گولی بنائیں۔ ایسی تین گولیاں استعمال کرائیں۔ اگر تیسرے دن اثر ظاہر نہ ہو تو ہر روز چہار  
 گولیاں دیں اور ایک ہفتہ کے بعد پانچ گولیوں تک بڑھا سکتے ہیں۔ ان گولیوں سے اگر زیادہ  
 دست آویں تو دو ڈوس پاؤڈر کی مقدار بڑھا دیں اور قبض ہو تو کم کریں (۲) اگر یہ گولیاں موافق  
 نہ ہوں تو آئیوڈاٹڈ آف مرکوری بقدر نصف گرین دن میں تین مرتبہ دیں (۳) سب کلورائیڈ آف  
 مرکوری ۱۲ گرین سے ۱۶ گرین تک گولی کے طور پر استعمال کرائیں۔ کمزور مریضوں کو آتشک کے  
 تیسرے درجہ میں اس کو ۱۶ سے ۱۶ گرین تک ٹنکچر سنکونا۔ اور ڈیٹاکشن سنکونا کے ساتھ  
 دیتے ہیں۔ کبھی چند گرین آئیوڈاٹڈ آف پوٹاشیم اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔

(۲) دھونی۔ مرکبات سیلاب کا استعمال دھونی (فیمی کیشن) کے طور پر دیسی اطباء اور  
 خصوصاً ویدوں کے یہاں پارہ کو بعض دواؤں کے ہمراہ ملا کر مریض کو دھونی دیتے ہیں جس سے  
 بیمار کو پسینہ بکثرت اگر مرض میں فوری تخفیف ہو جاتی ہے ایسے نسخوں کی مختلف ترکیبیں مکی کی ہیں  
 چنانچہ یہ نسخہ نہایت مفید اور مجرب ہے صفحہ گائے کا گھی ہم تولہ لے کر اس میں نیب کے  
 تازہ پتوں کی ٹکیہ جلا لیں پھر جلی ہوئی ٹکیہ نکال کر گھی میں موم سفید ۲ تولہ گھملائیں۔ اور اس میں  
 پہلے رسکپور ۲ ماشہ پھر شنگرف ۲ ماشہ پھر تو تیا سب ۳ ماشہ۔ ہر ایک باریک پسایا علی الترتیب  
 ملائیں اس کے بعد چار گرہ کپڑا دیسی کاڑھا اس میں موم جامہ کی طرح تر کر لیں اور اس کی بتیاں  
 بنا کر رکھ چھوڑیں۔ ان میں سے ایک بتی لیکر پیری کے کوئلوں کی آگ پر جلا کر مریض کے تمام بدن  
 کو دھونی دیں۔

ڈاکٹر صاحبان کے یہاں اس طرح دھونی دی جاتی ہے کہ مریض کے کپڑے اتار کر سٹون کر سی  
 پر بٹھاتے ہیں اور اس کو ایک کبل اس طرح اڑھاتے ہیں کہ اوپر کی جانب سر کے نیچے گردن سے  
 مثل چوغہ کے ہمارے اور نیچے کی طرف زمین پر لٹکتا رہے اور اس کبل کو بذریعہ ایک گول آہنی

حلقہ اور سخیوں کے پھیلا ہوا رکھیں تاکہ مریض کے بدن سے علیحدہ رہے۔ پھر اسٹول یا کرسی کے نیچے ایک برتن کھولتے ہوئے پانی کا اور دوسرا برتن جس میں بائی سلفورس آف مرمری بقدر ایک دو

(تصویر نمبر ۳۴- دھونی کا طریقہ)



ڈرام کے یا کیلومل بقدر بیس یا تیس گرین کے ڈالا گیا ہو۔ اسپرٹ لمپ یا کونلوں کی آغ پر رکھیں تاکہ پانی کے بخارات سے جسم کے مسامات کھل جائیں اور پسینہ آنے لگے اور اس کے ساتھ ہی سیاب کا دھواں بھی بدن پر لگ کر اپنا پورا اثر کرے۔ اگر دھونی کے وقت پسینہ نہ آئے تو گرم چائے پانی چاہئے۔ یہ دھونی متواتر چند وقت تک شام کے وقت کرنی چاہئے اور دھونی کے بعد مریض کو مع کبیل کے بستر پر لٹائیں۔


(۳) مالش۔ مرکبات سیاب کا استعمال بذریعہ مالش (ان ایکشن) کے۔ یہ طریقہ اور اس کے بعد کا طریقہ دونوں خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹروں کے یہاں مروج ہیں (انگوانٹم ہائیڈرا جوائی) بقدر بیس گرین یا زیادہ سے زیادہ ایک ڈرام لے کر مریض کی رانوں یا بازو کے اندرونی جانب رات کو سونے سے پہلے مالش کریں۔ مالش کے بعد مریض کو گرم کپڑے پہنا کر سونے دیں اور صبح کو اٹھ کر گرم پانی سے غسل کر لیں۔

یا دیکھو کہ مالش سے پہلے مقام مالش کو گرم پانی اور صابون سے اچھی طرح دھولینا چاہئے اور ہر روز ایک ہی مقام پر مالش نہ کرنی چاہئے بلکہ اس کی جگہ بدلتے رہیں اور مالش کرنے والا اپنے ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے پہن کر مالش کیا کرے۔

(۴) پچکاری۔ جلد کے نیچے بذریعہ پچکاری کے سیاب کا کوئی مرکب پہنچایا جائے۔ چنانچہ سبکلورائیڈ آف مرمری یا گرین فی صدی کی طاقت کا عرق بقدر بیس قطرے کے بذریعہ مریض کا جلد پر ہائڈروک سرنج کے جلد کے نیچے داخل کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول دوا کے عرق کو

اس پکپکاری میں بھریں۔ پھر جس جگہ پکپکاری لگانی ہو وہاں کی جلد کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور سبابہ سے پکڑ کر قدرے اونچا اٹھائیں اور دائیں ہاتھ سے پکپکاری کی سوئی جلد کے نیچے بقدر ایک انچ کے داخل کر کے باہر نکلیں دو اندر داخل کریں اور پکپکاری کے بعد بیمار کو آرام سے لیٹا رہنا چاہئے۔ ورنہ دہل کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے :

(تصویر نمبر ۳۰- ہائپوڈرمک سرینج)



### مرکبات سیما کے استعمال کا وقت اور ضروری احتیاطیں

(۱) مرض آتشک کے پہلے اور دوسرے درجہ میں مرکبات سیما کے استعمال سے نفع ہوتا ہے اور تیسرے درجہ میں کچھ معتد بہ فائدہ محسوس نہیں ہوتا بلکہ بعض مرتبہ اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ (۲) چونکہ سیما کا اثر آنتوں پر زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس کے اثر کو روک کر استعمال کرنا چاہئے : (۳) چونکہ اس کا اثر مسوڑوں اور منہ پر سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اس لئے استعمال کے زمانے میں خیال رکھنا چاہئے کہ جو قوت مسوڑوں کے قریب کسی قدر سرخی نمودار ہو جائے اور انہیں قدرے درد محسوس ہونے پر فوراً استعمال بند کر دیں۔ ورنہ دانتوں کو سخت نقصان پہنچتا ہے :

(۴) خنازیری مزاج والے مریضوں کو اکثر اس سے نقصان ہوتا ہے :

(۵) امراض گردہ میں مبتلا اشخاص کو مرکبات سیما کا استعمال مضر ہوتا ہے :

(۶) نہایت کمزور اشخاص اور ان کو جو بابت اپنے پیشہ کے پانی میں بھیگنے اور زیادہ سردی سے بچ نہیں سکتے مضرت ہوتی ہے :

(۷) مرکبات سیما استعمال کرنا ایسی حالت میں بیمار کو وقت معین پر ہلکی اور نرم غذا اٹھلانی چاہئے ہواخوری اور غسل ہمیشہ پابندی سے کرنا چاہئے۔ گرمیوں میں سرد پانی سے غسل کرنا جائز ہے :

(۸) سردی کا موسم ہو یا گرمی کا ہمیشہ رات کو فوڈ لین کے کپڑے پہنے چاہئیں۔  
 (۹) دوران استعمال میں منشی ادویات اور شراب کا استعمال بالکل منع ہے اور احتیاطاً حقہ پینا بھی اگر ترک کیا جائے تو بہتر ہے۔

مرکبات سیماپ کے فوائد مرض آتشک کے جس درجہ میں ان کا استعمال کرایا جاتا ہے (۱) اُس درجہ کے شدید عوارضات رک جاتے ہیں (۲) اُس درجہ کی میعاد کم ہو جاتی ہے (۳) خون کی اصلاح ہو کر اس کے سرخ دانے زیادہ ہو جاتے ہیں (۴) جسم کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے (۵) زخموں کی سختی کم ہو جاتی ہے (۶) زخم کے سطح پر سرخ انگور پیدا ہونے لگتے ہیں (۷) رقیق رطوبت کے بجائے زخموں میں سالم ریم پیدا ہو کر دس روز کے اندر ان کی حالت درست ہو جاتی ہے (۸) غدد و جو پہلے سخت اور متورم تھے وہ رفتہ رفتہ چھوٹے ہو کر آخر کار بالکل غائب ہو جاتے ہیں (۹) دوسرے درجہ میں جلد کی سختی اور دھبے وغیرہ غائب ہو جاتے ہیں۔ حلق اور منہ کی حالت درست ہو جاتی ہے زخم وغیرہ عوارض کو بھی بہت نفع ہوتا ہے۔

### مرکبات سیماپ کے خراب نتائج اور ان کا علاج

اگر مرکبات سیماپ کو ان کے وقت کے خلاف یا مقدار سے زیادہ استعمال کرایا جائے تو ذرا ہلکا پھول جلتے ہیں اور نرم ہو کر دانتوں سے علیحدہ ہونے لگتے ہیں۔ زبان اور حلق میں ورم ہو جاتا ہے اور سخت چپکواؤں اور متضغن رطوبت بکثرت منہ سے بہنے لگتی ہے۔ اگر اسپر بھی اس کا استعمال جاری رہے تو دانت ہل کر رہنے لگتے ہیں۔ زبان منہ اور حلق میں زخم ہو جاتے ہیں۔ تھوک پیدا کرنے والے غدد متورم ہو جاتے ہیں۔ ورنہ سفیدی شرت سے مرض کو بوجھ راتے لگتے ہیں۔  
 علاج۔ پوست کچنل۔ پوست کیکر۔ پوست نیچ جھڑیری۔ برگ چنبیلی اور اس کی شاخیں ان میں سے جو چیز دستیاب ہو سکے اس کو پانی میں جوش دے کر نصفہ اور غرقہ کریں۔ صرف تھوکیہ پشوری پانی میں بھجورس سے کھپ کر لایا بھی مفید ہوتا ہے اور پورے میٹاس کو پانی میں سھوکر اس سے کھیر کر بھی نفع کرتا ہے۔ یوڈائیڈ آف پوٹاشیم یا کورائیڈ آف پوٹاشیم بھی اس کے لئے بہت نافع ہے۔ گرنا شہ سے نفع نہ ہو تو بعض صورتوں میں کوئی ہکسہس دینا بہتر ہے۔ درمیان کچھ کے لئے میگنیشیم سنکس مناسب ہوتا ہے۔



(۲) مرکبات سیاب کا استعمال مدت تک جاری رکھنے سے کبھی اسپہال اور پیش ہو جاتی ہے :-  
 علاج - سیاب کا استعمال کچھ دنوں کے لئے ترک کرائیں اور بیمار کو سردی سے بچائیں۔ چاک مکچھر سہرا  
 افیوں کے دیں۔ اور افیوں کا حقہ کرائیں۔ لعاب ریشہ خطمی بہا ماشہ - شیرہ حب الاس ۳ ماشہ عرق  
 مرکب مصفی خون اتولہ - شربت بنفشہ ۲ تولہ - اسپنخول مسلم بھانک کر اوپر سے بھانک کر پلانا بھی ایسی  
 موقع پر نافع ہوگا۔ اگر ضرورت ہو تو اس میں لعاب بہدانہ ۳ ماشہ بڑھا دیا جائے :-

(۳) کبھی بغل اور چڑے اور کہنیوں کے مقام کی جلد سرخ اور متورم ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر  
 دانے پیدا ہو کر ان میں سے ایک قسم کی رقیق رطوبت رسنے لگتی ہے اور کبھی زخم ہو جاتے ہیں۔

علاج - اول تکمید کریں۔ اور اگر اس سے نفع نہ ہو تو خفیف سا مسہل دیں۔ بجائے مرکبات سیاب کے  
 عرق عشبہ وغیرہ مصمیات خون کا استعمال کرائیں۔ آٹھ دس روز میں بیشکایت زائل ہو جاتی ہے۔

(۴) مرکبات سیاب کے مدت تک استعمال کرنے سے کبھی بیمار نہایت کمزور ہو جاتا اور اسکے بدن  
 میں خون صلح کی کمی سے دل دماغ وغیرہ اعضائے رئیسہ کی پرورش میں نقصان آنے لگتا ہے  
 جس سے مریض سست ہمت اور متفکر رہتا ہے اکثر اوقات دل دھڑکتا رہتا ہے تنفس میں تکلیف  
 ہوتی ہے دم گھٹنے لگتا ہے شب کو پسینہ آتا ہے نیند جاتی رہتی سہیے آخر کار بیہوشی ہو کر مر جاتا ہے۔

علاج - سیاب کا استعمال فوراً متروک کر کر تبدیل آب و ہوا کا مشورہ دیں مقوی غذائیں دیں۔  
 ڈیکا کش آن سنکونا بارک ہمراہ آئیوڈاٹلڈ پوٹاشیم یا ڈائلوٹ نائٹک ایسڈ کے استعمال کرائیں :-

آئیوڈاٹلڈ آف پوٹاشیم کا استعمال - یہ دو آتشک کے تیسرے درجہ میں بہت مفید ہے  
 اور ان حالتوں میں زیادہ مستعمل ہوتی ہے کہ جہاں مرکبات سیاب کا استعمال ناجائز قرار دیا جائے  
 یا ان سے فائدہ نہ ہو یا خراب نتائج پیدا ہوں۔ خصوصاً جبکہ آتشک کا زہر عصاب میں اثر کر گیا  
 ہو یا اعضائے رئیسہ اور مختلف اندرونی اعضا پر وہ حملہ کرے یا جلد وغیرہ میں کینک کا فساد عام  
 ہو جائے تو اس کے استعمال سے بہت فائدہ ہوتا ہے :-

لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بعض ماہر ڈاکٹروں کے نزدیک اس کا دنیا اُس وقت  
 نافع ہوتا ہے جبکہ مرض آتشک کے کسی درجہ میں اس سے پہلے مرکبات سیاب کا استعمال کر لیا گیا ہو  
 ورنہ اس سے پہلے چند روز تک نہایت تھوری مقدار میں رسکیور کا استعمال کر لیا جائے۔ اور

کبھی دونوں کو ملا کر ساتھ استعمال کراتے ہیں :

اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ بعد تنقیہ و اسہال کے مریض کو ہر روز تین مرتبہ آئیوڈائنڈ آف پوٹاشیم گرین سے ۱۰ (گرین تک اور بعض حالتوں میں ۲۰ گرین سے ۴۰ گرین تک ہمراہ ڈیکاکشن سکونایا مسطبوخ یا نفقوع عشبہ مغربی (سار ساپر پلام کے یا ہمراہ دونوں چیزوں کے پلانا چاہئے۔ اکثر یہ نسخہ بھی نہایت مفید ہوتا ہے۔ صفحہ ۱۰ آئیوڈائنڈ آف پوٹاشیم ایک سکروپل ٹنکچر آرنشیا ۱۲ ڈرام۔ انیفوزن آف جنشین ۱۵۔ اونس اسمیں سے بمقدار ایک ایک اونس کے دن میں تین مرتبہ دیں۔ اگر مریض کو وجع المفاصل کی شکایت ہو تو آئیوڈائنڈ آف پوٹاشیم کو برومائڈ آف پوٹاشیم کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں اور کبھی اس کے ساتھ کاربونیٹ ایمونیا۔ اور کلورائیڈ آف ایمونیا بھی ملا کر دیتے ہیں اور اگر شب کے وقت بڑیوں میں در دیا بے چینی کی شکایت ہو تو صرف برومائڈ آف پوٹاشیم بقدر ۲۰ گرین کے رات کو سوتے وقت دینا بہت مفید ہے :

**ضروری احتیاطیں** (۱) واضح ہو کہ مرکبات سیاب کی طرح آئیوڈائنڈ آف پوٹاشیم کا استعمال بھی ایک عرصہ تک جاری رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے خصوصاً جبکہ مریض کے بدن میں آتشکی مادہ زیادہ موجود ہو تو اس حالت میں کم سے کم سال تک اس کا استعمال جاری رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس دوا کا اثر مریض کے بدن میں رفتہ رفتہ ہو کر پورے طور پر ازالہ مرض ہو جائے۔ اسلئے جہاں تک ہو سکے یہ دوا نہایت تھوڑی مقدار میں دینا بہتر ہوتا ہے :

(۲) لیکن بعض اشخاص کے مزاج میں قدرتی طور پر اس دوا کی مخالفت پائی جاتی ہے یا ان کے بدن میں آتشکی مادہ بہت کم ہوتا ہے تو انہیں اس دوا کے نہایت تھوڑی مقدار میں بھی (یا وہ دونوں تک متواتر استعمال کرنے کی برواشت نہیں ہوتی :

اس لئے اکثروں نے یہ قاعدہ مقرر کر لیا ہے کہ دو تین ہفتہ تک آئیوڈائنڈ آف پوٹاشیم کا استعمال کر اگر دو چار دن کے لئے بند کر دینا چاہئے۔ تاکہ آئیوڈیزم کے خراب نتائج ظاہر ہونے نہ پائیں (۳) آئیوڈیزم کی علامتیں یہ ہیں کہ مریض کو شدید زکام ہو جاتا ہے۔ ناک سے رقیق پانی بکثرت جاری ہوتا ہے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ سر اور ناک میں درد ہوتا ہے۔ کبھی بدن پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ ان خرابیوں کو روکنے کی غرض سے آئیوڈائنڈ آف پوٹاشیم کے ساتھ قدرے

پھر بلا دونا ملا دیتے ہیں۔ یا اسے عرق عشبہ کے ساتھ یا بابائی کاربوٹ آف پوٹاس کے ساتھ استعمال کراتے ہیں۔ (۴) جب اس دوا کے استعمال سے مریض کو زکام کے آثار ظاہر ہونے لگیں۔ آنکھیں سرخ ہو جائیں اور سر میں درد کی شکایت کرے تاک سے رقیق پانی بہنے لگے تو اس کا استعمال فوراً موقوف کر کر یہ نسخہ پلانا چاہئے: صفقتہ - خمیرہ گاوزبان ایک ٹولہ ورق نقرہ ایک عدد میں لپیٹ کر ادل کھلائیں اور اس کے اوپر سے بہدانہ ۳ ماشہ عناب ۵ دانہ سپستان ۹ دانہ - نبات سفید ۲ ٹولہ پانی میں جوش دے کر دن میں دو مرتبہ پلایا جائے اس کے استعمال سے اکثر تین دن میں یہ تمام کایاتیں رفع ہو جاتی ہیں (۵) اگر اس کے زیادہ مدت تک استعمال کرنے سے مریض کے تمام بدن پر پھسپیاں نہایت چھوٹی ہوں تو قدرے کافور اور پیپر منٹ روغن گل میں ملا کر مالش کرنا بھی نفع دیتا ہے پھر جب یہ شکایتیں بالکل رفع ہو جائیں تو آئیوڈائیڈ آف پوٹاسیم نہایت ہی تھوڑی (ایک یا دو گرین کی) مقدار میں صرف یا کسی مصلح دوا کے ساتھ ملا کر پھر دینی شروع کی جائے اس ترکیب سے اکثر کوئی ضرر نہیں ہوتا اور وہ موافق آجاتی ہے:

یونانی اطباء اس مرض کے پہلے اور دوسرے درجہ میں منضجات سودا اور مصنیات خون زیادہ دنوں تک پلا کر خنچا سہل دیتے ہیں۔ نسخہ منفع کا یہ ہے صفقتہ گل بنفشہ گل سرخ گل نیلوفر شاہترہ چراغہ - سر پھوکہ - صندل سرخ - عشبہ - ہلیلہ سیاہ - میٹھی ہر ایک ۷ ماشہ - افیتون - بسفنج - بادنجونہ گاوزبان ہر ایک ۵ ماشہ عناب آلو بخارا - ہر ایک ۵ دانہ - گلقدیر یا خمیرہ بنفشہ ۴ ٹولہ مریض کے مزاج کے موافق اس نسخہ کی دواؤں میں حسب موقع تغیر و تبدل کیا جاتا ہے اور یہی لحاظ مسہل کی دواؤں میں بھی رکھا جاتا ہے جب مادہ خوب نفع پا کر نکلنے کے قابل ہو جائے تو اسی منفع کے نسخہ میں مسہل کی دوائیں بڑھادی جائیں۔ جیسے سنار کی - ترید سفید - جب النبل - شحم حنظل - زیتہ خطمی - مغز فلوس - ترنجبین - شیر خشت وغیرہ۔ ان میں سے جو دوائیں مزاج مریض کے مناسب سمجھی جائیں وہی اختیار کرنی چاہئیں۔ مسہل کی یہ گولیاں بھی اکثر بہت مفید ہوتی ہیں۔

صفقتہ - مغز جمال گوٹہ مدبر - مغز کر نجوہ - سونف - سونٹھ - کلونجی - مرچ سیاہ - آملہ خشک - پوست ہلیلہ کابلی - گل سرخ - ہر ایک ۷ ماشہ سب کو باریک پس کر پانی میں گوندھ لیں اور جھڑیری کے بیر کی برابر گولیاں بنا لیں۔ ان میں سے ایک گولی ٹھنڈے پانی کے ساتھ کھلائی جائے اگر مادہ کا

بھج بخوبی ہو گیا ہے تو ان سے آٹھ یا دس مرتبہ خوب کھل دست آ جلتے ہیں۔ ہر مرتبہ دست کے بعد تھوڑا سا پانی ٹھنڈا پلانا چاہئے اور جب پیاس لگے اس وقت بھی ٹھنڈا پانی دیا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے دانتوں میں کمی معلوم ہو اور مریض کو نزلے وغیرہ کی شکایت نہ ہو تو مدد کے لئے کسی قدر گلاب خالص پانی میں ملا کر اور بر سے ٹھنڈا کر کے پلایا جاتا ہے۔ شام کو مونگ کی نرم کچھڑی کھلائی جاتی ہے اور دوسرے دن تیسری کا معمولی نسخہ پلایا جاتا ہے۔

اکثر مریضوں کو منہج کے بعد مطبوخ ہندی بھی پلایا جاتا ہے جس کا نسخہ کتاب ہذا کے صفحہ (۵۹) پر درج ہے۔ یہ مطبوخ آتشکی مادہ کو نکالنے میں نہایت مینظیر ثابت ہوا ہے لیکن اس مطبوخ کے دوران استعمال میں کبھی مرض کو خود بخود یا کسی بے احتیاطی کے باعث پچش ہو جاتی ہے تو اس کو آرام ہونے تک اس سہل کا استعمال ملتوی رکھ کر پچش کا یہ نسخہ پلایا جاتا ہے صفتہ لعاب بہانہ ماشہ۔ لعاب ریشہ خلی سہ ماشہ۔ پانی یا عرق مصفی خون ۱۰ تولہ میں تیار کر کے شربت بنفشہ ۲ تولہ ملا کر اور اسپنخول مسلم، ماشہ اس پر چھڑک کر پلانا چاہئے۔ اور جب پچش بالکل جاتی رہے اس وقت سہل کی باقی خوراکیں پلائی جائیں

**فصل دسویں۔ عورتوں کا سوزاک۔** ڈاکٹری اصطلاح میں اس مرض کو رگنوریہ کہتے ہیں۔ یہ عورتوں کے اندام نہانی اور مجرا بول میں ایک خاص قسم کے التهاب (انفلامیشن) کا نام ہے۔ جو اکثر وجہ تیزی اور تعفن مادہ منویہ یا دیگر رطوبات فاسدہ کے اور کبھی بذریعہ چھوت کے عورت کو اس کے شوہر سے عارض ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اکثر مردوں کو فاحشہ عورت کے ساتھ محبت و ربت کرنے سے لاحق ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں اکثر یہ مرض اندام نہانی سے شروع ہو کر باہر کی جانب شہرگاہ کے بولوں اور مجرا بول یا بطرکے ٹورس تک پھیلنا ہے اور اندر کی جانب رجم تک۔ بلکہ شاذ و نادر قاذف نالیوں رنی لوپی ان ٹیوبز اور خصیۃ الرحمہ راویریز تک پھیل جاتا ہے۔ اور کبھی عورت کے مجرا بول سے شروع ہو کر اندام نہانی تک پھیل جاتا ہے۔

جب تک اندام نہانی کے بیرونی حصہ تک رہتا ہے اس وقت تک عورت کو صرف پیشا کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے اور جب اندام نہانی کے اندرونی حصہ یا رحم وغیرہ تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ اس حالت میں ہر وقت سوزش اور طین نہایت بے چینی اور درد کے ساتھ ہوتی ہے۔

اکثر شدت تکلیف کے باعث بخار بھی آنے لگتا ہے۔ اندام نہانی اور مجرا بول سے پیپ رطوبت میں ملی ہوئی نکلا کرتی ہے کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مواد بہت کم خارج ہوتا اور کبھی بالکل خارج نہیں ہوتا اور مقام ماؤف کی اندرونی جھلی (سکوس میمبرین) میں صرف سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اس کو خشک سوزاک رگنور یا سنگٹا کہتے ہیں:


**اسباب (۱)** سوزاک کے مواد کا اکثر کرنا بذریعہ مقاربت یا کسی دوسرے طریقے سے (۲) مادہ منویہ اور دیگر رطوبات کا اندام نہانی میں جمع ہو کر وہاں متعفن ہو جانا اور عضویں خراش پیدا کرنا (۳) بذنی صفائی اور غسل کا لحاظ نہ رکھنا۔

**علامات**۔ اگر مرض حاد اور شدید العوارض ہوتا ہے تو (۱) مجرا بول شرمگاہ اور اندام نہانی کی اندرونی جھلی (سکوس میمبرین) نہایت سرخ اور متورم ہوتی ہے (۲) پیشاب سخت سوزش اور تکلیف کیساتھ قطوڑا تھوڑا اور بار بار آتا ہے (۳) اس کے بعد اندام نہانی اور مجرا بول سے پیپ رطوبت میں ملی ہوئی جاری ہوتی ہے (۴) جنگا سہ کے غدود پھول جاتے ہیں اور اگر مرض خفیف العوارض اور ضمن ہوتا ہے تو اس میں اس قدر زیادہ تکلیف نہیں ہوتی اور صرف پیشاب کے وقت سوزش محسوس ہوتی ہے۔ اور سفید رطوبت غلیظہ ریم کے ساتھ مجرا بول اور اندام نہانی سے خارج ہوتی ہے۔ اور اندام نہانی کی اندرونی جھلی ٹھنڈی اور گلابی رنگ کی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت اس مرض اور سیلان رحم میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس حالت میں ان دونوں مرضوں کے درمیان اس طرح فرق کیا جاتا ہے کہ اگر عورت کے مجرا بول کو انگلی سے دبائیں تو اس مرض میں رطوبت سفید غلیظہ برآمد ہوگی اور سیلان رحم میں اس دباؤ سے کوئی رطوبت نہیں برآمد ہوتی۔ سیلان رطوبت فرج رو بجائی نل کٹا رہے اور اس مرض میں یہ فرق ہے کہ سوزاک والے مواد کو اگر غور میں سے دیکھیں تو اس میں خالص مادہ سوزاک کا رگنوکا کس، پایا جائے گا اور یجائی نل کٹا رہے کی رطوبت میں وہ موجود نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر سوزاک مدت تک رہے تو اس کے باعث دیگر عوارض ریشل وجع المفاصل اور آشوب چشم وغیرہ کئے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو سیلان رحم وغیرہ میں نہیں ہوتے۔

**علاج** (۱) اگر مرض حاد اور شدید العوارض ہو تو مریضہ کو آرام سے سلا میں ۲ پوسٹ پختخاش کے پو شانہ سے تکبید کریں۔ انگوٹھ پلبائی ڈای اسی ٹیٹس کا استعمال کریں (۳) لنت کو چکے لیم

سیلان رحم اور سوزاک مادہ میں فرق

لوشن یا لڈ لوشن یا کسی ایٹمی سپٹک لوشن میں ترکر کے اندام نہانی کے اندر رکھیں (۴) پوست خشکاش کے جو شانہ کی پچکاری مجرا بول اور اندام نہانی میں کریں :



تصویر نمبر ۳۴ پچکاری کی

(۵) نمکین مہل دیں (۶) آتش جو رقیق - یا جو شانہ تخم کتان اور تخم ریحان کا پلائیں - یہ چیزیں دوا اور غذا کا کام دیتی ہیں (۷) پوست فاسہ شکر کی ایک تولہ رات کو پانی میں تر کریں اور صبح کو اسکا تھلہ لے کر شربت بروسی معتدل ۴ تولہ حل کر کے پلائیں (۸) تین چاندن کے بعد اسی دوا کے ساتھ یہ سفوف بھی دیا جاتا ہے صفتہ - گیر و پھٹگری بریاں - کباب چینی ایک ایک تولہ سب کو باریک کر ملا رکھیں - اس میں سے ڈیڑھ ماشہ دوا اس کے برابر کچی کھانڈ میں ملا کر دی جاتی ہے (۹) اس کے علاوہ غذا دو دھ چاول یا فیرنی کم شیرینی کے ساتھ مناسب ہے - ترشی اور تیز مرچ - گوشت اور گرم مصالحہ وغیرہ سے پرہیز کرائیں :

جب مقام ماؤف کی سرخی اور دم کم ہو جائے تو پہلے اندام نہانی اور شرمگاہ کو نیم گرم پانی سے اچھی طرح دھوئیں اور آبن کرائیں - پھر اندام نہانی کے اندر ایلیم لوشن کی پچکاری کریں بخیر پچکاری کا بھی بہت مفید ہے - ایلیم ۱۰ گرین - شوگراف لڈ - ہگرین پانی ۱۰ اونس - اس کی پچکاری دن میں دو تین بار کریں - اگر مر لیضہ کے مجرا بول یا اندام نہانی وغیرہ سے مواد بکثرت خارج ہو اور تدا بیر مذکورہ بالا سے نفع نہ ہو تو روغن تاپین یا کوپے کا استعمال کریں :

اگر مرض پہلے ہی سے خفیف الحواض ہو یا کچھ دنوں کے بعد فرمن ہو گیا ہو تو مذکورہ بالا دواؤں کا استعمال اس موقع پر بھی کریں - سفوف کا یہ نسخہ اس حالت میں بہت فائدہ کرتا ہے صفتہ - ست گلو - ست سلاجیت - الایچی خورد - کچھاں بید - لمہٹی - تالمکھانہ - نبسلوچن - قلعی کشتہ ہر ایک ۱ ماشہ - مصری ۴ تولہ - سب کو باریک کوٹ چھانکر سفوف بنائیں اور اس میں سے ۱ ماشہ ہمراہ تازہ پانی کے ہر روز پھینکائیں - کاسٹک آف سلور بقدر ہگرین ایک اونس پانی میں حل کر کے

نسخہ سفوف سوزاک

نسخہ پچکاری سوزاک

نسخہ سفوف سوزاک

لنٹ اس میں تر کریں اور اس کو ایک موٹی تہی یا نلکی پر لپیٹ کر اندام نہانی کے اندر رکھیں تاکہ دوا کا اثر مقام ماؤف پر اچھی طرح سے ہو سکے اور اندام نہانی کی دیواریں باہم چپٹنے سے محفوظ رہیں۔ اور مواد بھی بخوبی خارج ہو سکے اور جب کسی دوا سے نفع نہ ہو۔ اور مواد بکثرت خارج ہوتا رہے تو اندام نہانی کو بذریعہ آلہ مفتاح الفرج کے کشادہ کر کے مقام کو کاسٹک کی تہی سے جلائیں اور ٹے نک ایسڈ کی تہی جبرائے بول میں رکھیں اس سے بہت جلد نفع ہو جاتا ہے۔

## باب دوم امراض رحم

اس باب میں اکتیس فصلیں ہیں اور ہر ایک فصل میں ہر ایک مرض کے اسباب و علامات

اور مجرب علاج درج کئے گئے ہیں :

**فصل پہلی حکۃ الرحم** ریوٹرائن پرورائیٹس یعنی رحم کی خارش۔ رحم کے جوف میں اس کے سرے رحم (رحم) تک کبھی گدگدی کی طرح ایک قسم کی خوشگوار خارش آتا کرتی ہے جس سے مریض کو خود بخود مجامعت کی خواہش ہونے لگتی ہے اگر ایسی حالت میں مریض کو اتفاقاً جماع میسر ہو جائے تو اس پر بجائے تسکین حاصل ہونے کے خارش میں اور بھی ترقی ہو جاتی ہے کیونکہ مردانہ عضو تناسل کی رگرمقام ماؤف تک نہیں پہنچ سکتی بلکہ اس سے رحم کے اعصاب حسیدہ (سنسری نروز) کو اور مواد موجب مرض کو اور بھی زیادہ تخریک ہوتی ہے۔ اسی سبب سے مریض ہر وقت بے صبری کے ساتھ جماع کی خواہشمند رہتی ہے اور جب تک اس مرض کو پیدا کرنے والا مادہ رحم کی تجویف میں ایک خفیف سا خراش اور دغدغہ پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی تیزی سے رحم کے اندرونی سطح پر کوئی دوسری علت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت تک مریض کو رسوائے خارش کے کسی قسم کے دریا سوزش وغیرہ کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوا کرتی ہے۔ لیکن اگر مادہ کی تیزابی کیفیت سے رحم کے اندر پھسپیاں یا ورم وغیرہ پیدا ہو جائیں تو خارش کے ساتھ درد اور جلن کی بھی شکایت پائی جاتی ہے۔ اس لئے ہم اس مرض کو دو قسموں پر تقسیم کرتے ہیں :

**قسم اول۔** وہ خارش جو بلا ورم یا پھنسیوں کے ہوتی ہے :

**اسباب (۱)** اس کا اصلی سبب خون کی گرمی اور حدت ہے جس کے باعث رحم کے اندر تیزابی رطوبت (شور یا ترش) پیدا ہونے لگتی ہے یا عورت کی منی میں تیزابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یا رحم کے اندر صفراوی مادہ کا انصباب ہونے لگتا ہے۔ غرض ان تینوں چیزوں میں سے جو کوئی چیز ہوگی وہ اپنی حد و لذع (داری ٹے شن) یعنی تیزی کے سببے زحم کے اندر خراش اور دغدغہ پیدا کر کے خارش کی موجب ہو سکتی ہے (۲) اس کے علاوہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مصیبت مشہور والی عورت نہ ہو اور اسے بعض بد افعال عورتوں کی صحبت میں آزادانہ زندگی بسر کرنے کا اتفاق پڑے۔ تو اکثر باہمی مساحقت کرنے یا جلق کی عادت ہو جاتی ہے اور اس فعل قبیح پر دامت کرنے سے چونکہ رحم کی طرف دوران خون تیز ہونے لگتا ہے۔ اس لئے رحم میں تیزابی رطوبت کی پیدائش ہو کر خارش آنے لگتی ہے جو مریضہ کو ہمیشہ کے لئے اس فعل پر مجبور کرتی رہتی ہے :

**علامات (۱)** مریضہ کے بدن میں حدت خون کے آثار ظاہر ہونا (۲) اس کے مزاج میں صفراویت یا سوداویت کا غالب ہونا (۳) رحم کے اندر (سوا، خارش کے) سوزش یا درد کا نہ ہونا۔ اور بخار بھی نہ ہونا۔ ان علامتوں کی رو سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریضہ کا رحم پھنسیوں یا ورم سے محفوظ ہے۔

**علاج** سبب کے موافق تدبیر کرنی چاہئے (۱) مثلاً جبکہ تمام بدن میں حدت خون کے آثار ظاہر ہوں۔ اور رحم کے اندر تیزابی رطوبات کی پیدائش یا صفرا کا انصباب ثابت ہو جائے تو ایسی اشیاء کا استعمال کرنا چاہئے جن سے تمام بدن میں ٹھنڈک پیدا ہو اور خون کی حدت رفع ہو جائے جیسا کہ لعاب بہدانہ ۳ ماشہ۔ شیرہ عناب ۵ دانہ۔ شیرہ منخرنم کدو شیریں ۳ ماشہ۔ عرق مرکب مصفی خون ۱۰ تولہ۔ شربت نیلوفر ۲ تولہ بدستور مقرر پلائیں (۲) اسی طرح تخم کاہو تخم خرفہ زرشک۔ سماق وغیرہ کا شیرہ نکال کر شربت غورہ۔ شربت نارنج۔ شربت صندل یا سکنجبین کے ساتھ دیا جاسکتا ہے (۳) اگر ان تدابیر سے پورے طور پر نفع نہ ہو تو اول مصفی خون منفحات پلا کر مہل بار دسے تنقیہ کرائیں :

نسخہ منفع۔ گل بنفشہ۔ گل نیلوفر منڈی۔ شاہتہ۔ تخم کاسنی۔ گل سرخ ہر ایک سات ماشہ۔



غناہ آلو بخارا ہر ایک ۵ عدد۔ تمر ہندی ۲ تولہ۔ ان میں سے جو دو میں مناسب ہوں لیکر رات کو گرم پانی میں ترکیب اور صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ ۴ تولہ ملا کر پلائیں اور جب نضج کے آثار طاس ہر ہونے لگیں اسی نسخہ میں سنوا کی ۷ ماشہ منقر الملتاس ۵ تولہ اضافہ کر کے حسب قاعدہ تین مہل دیں ۴۴ اگر مریضہ جوان قوی الجشتہ ہو اور بدن میں خون کی زیادتی پائی جائے تو پیڑو کے مقام پر جو نکلیں بھی لگائی جاتی ہیں ۵۰ بلکہ یونانی اطباء تو جو نکلیں لگانے سے پہلے بعض موقع پر فصل باسلیق (بے زلیک سیکشن) یا فصد صافن (سفی نس سیکشن) کے ذریعہ سے بقدر مناسب خون نکلو ابھی تجویز کرتے ہیں ۴۵ ڈاکٹروں نے ایسے موقع پر بروما ٹڈ آف پوٹاسیم اور کلورل ہائیڈریٹ کی بہت تعریف لکھی ہے مقامی ادویات میں سے ۱۱ صندل سفید۔ تخم کاہنوقشر۔ تخم خرفہ سیاہ۔ تخم خنشاخ۔ تخم خطمی۔ رسوت سبز۔ ہرے دھینے کے پانی اور سبز کوہ کے پانی میں پیسکر اور قدرے روغن گل و سفیدی بھئی مرغ ملا کر فرزجہ کے طور استعمال کرائیں ۴۲ اسی طرح فرزجہ لعناع بھی مفید ہے ۴۳ پوست انار۔ کوکنار۔ عدس مسلم۔ پانی میں جوش دے کر بذریعہ پکپاری کے رحم کے اندر پیچائیں ۴۴ دودھ اور روغن گل کی پکپاری کرنے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور اگر عورت کا دودھ پکپاری کے لئے میسر آئے تو اور بھی بہتر ہے۔

غذا۔ آتش جو رختکے گائے کے دودھ اور قدرے شکر کے ساتھ یا دی ترش کے ساتھ دیا جائے۔ یا روٹی سرد ترکاریوں کے ساتھ جیسلمہ پالک یا کدو وغیرہ یا دال مونگ یا مہبت مسور کے ساتھ مناسب ہے اور نیز نمک مرچ۔ گرم مصالحہ۔ گوشت سادہ۔ گڑ۔ تیل وغیرہ گرم اشیاء سے پرہیز رکھنا ضروری ہے۔

اگر مریضہ نے اس مرض کو اپنے افعال (مساقت وغیرہ) سے پیدا کیا ہے تو اس کے لئے علاوہ قیام پر مذکورہ بالا کے ترک عادت کرنا۔ اور اس اکثر اوقات امور خانہ داری میں مشغول رکھنا اور زیادہ تخیل آزادانہ بسر اوقات کا موقع نہ دینا مناسب طریقہ سے نصیحت کرنا اعلیٰ درجہ کی تدبیر ہے قسم دوم سرمی۔ رحم کی وہ خارش جو اس کے اندر پھنسیاں پیدا ہونے سے یا ورم فرس لاحق


۱۵ صفحہ۔ پوربہ خشک۔ سداب۔ عدس مقشر۔ پوست انار شیریں ہر ایک ۷ ماشہ گلاب خالص۔ ۱۰ تولہ سرکہ خالص  
تولہ میں جوش دیں اور اس میں اول ذکر کر کے فرزجہ رکھیں ۱۲ تولہ ۴

ہونے سے یا خصیتہ الرحم وغیرہ کے اندر ورم فرمن ہو جانے کے سبب عارض ہوتی ہے۔ اگرچہ اس قسم کی خارش کے ابتدائی اسباب بھی وہی ہوتے ہیں جو قسم اول میں بیان کئے جا چکے ہیں۔ اور ان اسباب کی رو سے اس قسم کا علاج بھی قریب قریب قسم اول کے ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن اس قسم کی خارش چونکہ امراض مذکورہ رحم کے ورم اور پھنسیوں وغیرہ کے تابع ہوتی ہے اسلئے اس قسم کی خارش میں ان امراض کا خاص علاج مقدم رکھنا چاہئے جو آئندہ ان امراض کے بیان میں مع علامات مشخصہ کے مفصل درج کیا جائے گا۔

**فصل دوسری۔** بتور الرحم (ایرپشن آف وی یوٹرس) یعنی رحم کی پھنسیاں۔ کبھی رحم کی تجویف میں اس کے تمام اندرونی سطح پر یا اس کے کچھ حصے پر خصوصاً غم رحم کے قریب چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن کے باعث مریضہ کو رحم کے اندر ہر وقت خارش اور قدرے سوزش محسوس ہوا کرتی ہے۔ اور مریضہ نہایت بے چین رہتی ہے۔ کبھی شدت تکلیف کے سبب سے مریضہ کو خفیف سا بخار ہو جاتا ہے۔

**اسباب** (۱) عموماً اس کا ابتدائی سبب خون کی حث ہوتی ہے جو سبب آمنیش قدس صفر کے اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں تیزابی رطوبات رحم کے اندر پیدا ہو کر اسکی اندرونی جھلی میں اول تو چند روز تک خارش پیدا کرتی ہیں۔ اور کچھ مدت کے بعد پھنسیاں پیدا کرتی ہیں (۲) کبھی خراب قسم کی منی رحم کے اندر پہنچنے سے یا رحم کے اندر ہو چکر وہاں فاسد ہو جانے سے رحم کے اندر پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

**علامات** (۱) رحم کے اندر خارش اور سوزش محسوس ہوتی ہے (۲) پھنسیاں پک جاتی ہیں تو ان میں سے زرد رنگ کی رقیق تیزابی رطوبت خارج ہو کر اندام نہانی کے راہ سے بہا کرتی ہے (۳) اگر پھنسیاں غم رحم کے قریب ہوتی ہیں تو اندام نہانی میں انگلی داخل کرنے سے انگلی کو محسوس ہو سکتی ہیں (۴) اور اگر زیادہ دور مقام میں ہوتی ہیں تو اندام نہانی اور رحم کے منہ کو آہٹناح الرحم (۵) اسے کیولم سے کشادہ کر کے اس کے مقابل صاف آئینہ رکھتے ہیں اس سے یہ پھنسیاں بخوبی دریافت ہو سکتی ہیں۔ اور اس عرض کے لئے چند غم کے آئینہ دار اسپے کیولم بھی آتے ہیں جیسا کہ تصویر ذیل سے ظاہر ہوتا ہے۔



علاج (۱) تسکین حدت خون کے لئے وہ تبرید پلائیں جو پہلی فصل میں صفحہ پر درج ہو چکی ہے (۲) اگر ضرورت ہو تو فصد یا مسہل کے ذریعہ سے تنقیہ بھی کرایا جائے اگر پھنسیاں فم رحم کے قریب ہوں تو یہ مرہم بذریعہ تبی کے وہاں تک پہنچایا جائے حشفۃ گل سرخ مر وارسنگ کھریاٹی مصفی - چاندی کامیل - سفیدہ رنگ کا ہر ایک ۳ ماشہ سب کو کھل میں نہایت باریک پیس لیں اور موم سفید ایک تولہ - روغن گل ۲ تولہ بگھلا کر پی ہوئی دوائیں اسمیں ملا لیں (۴) اگر پھنسیاں دو مقام میں ہوں اور اس لئے مرہم کی تبی وہاں تک پہنچ نہ سکے تو یہ مرہم یا اس کی دوائیں خوب پی ہوئی بازنگ سبز کے پانی میں ملا کر اور قدرے روغن گل اور عورت کا دودھ اس میں اضافہ کر کے بذریعہ پچکاری کے رحم کے اندر پہنچائیں (۵) پتنگ کی لکڑی پانی میں جوش دیکر ایک ٹریسے برتن میں ڈالیں اور مر فیقہ کو اس میں بٹھائیں - اس عمل کو طبی اصطلاح میں آبزن (ام مرسن) کہتے ہیں - اس ترکیب سے پھنسیوں کا مادہ بہت جلد تحلیل ہو جاتا ہے اور سوزش وغیرہ کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے :

۱۵ کھریاٹی : نگریزی بچاک) لینی چاہئے وہ نہایت صاف اور عمدہ ہوتی ہے اور چاندی کامیل سناروں کی کٹھالی میں لگا ہوتا ہے جو کٹھالی کی مٹی سے علاحدہ اور صاف کئے استعمال کیا جاتا ہے - مؤلف :

غذا - سبز ترکاریاں ٹھنڈی جیسے کدو سفید - پالک - خرفہ کا ساگ وغیرہ اور خشک دودھ یا دہی کے ساتھ یا آتش جو کھلائیں - اور تیز نمک مرچ - گرم مصالحہ اور گرم اشیاء سے پرہیز کریں۔  
**فصل تیسری - ورم عشاء رحم (انڈومٹرائٹس)** یعنی رحم کی اندرونی جھلی کا ورم۔ یہ رحم کی صرف اندرونی جھلی (میوگس میمرین) میں ہوتا ہے اور اکثر رحم کی ساخت کے باقی پرست سالم رہتے ہیں۔ اس لئے اس ورم میں ایسے شدید عوارض نہیں پائے جاتے جیسے کہ رحم کی ساخت کے دوسرے طبقات میں ورم ہونے کی حالت میں لاحق ہوتے ہیں۔ اس ورم سے رحم کی اندرونی جھلی پھول کر اس کے بوقت کو تنگ کر دیتی ہے۔ اور پیڑوں کے مقام پر زیادہ ابھار محسوس نہیں ہو کر تلبہ ہے چونکہ اس ورم میں اکثر ایک غلیظ اور سفید رطوبت رحم سے بہا کرتی ہے اس لئے اس کو انگریزی میں "گٹار آف دی یوٹرس" بھی کہتے ہیں یہ ورم وقیم کا ہوتا ہے۔ ایک لحاظ (اکیوٹ) یعنی شدید العوارض اور حبلہ زائل ہونے والا۔ دوسرا مزمن (کروئک) یعنی خفیف العوارض اور دیرپا۔

**قسم پہلی -** یعنی ورم حاد۔ اس کا سبب سابق پرری ڈسپوزنگ کا زہن یعنی ابتدائی سبب رحم کی اندرونی جھلی کا کمزور ہو جانا ہے جو اکثر بوجہ کثرت مجامعت کے یا کثرت استقاط عمل اور بار بار حاملہ ہونے سے لاحق ہوتا ہے اسی لئے یہ مرض خاوند والی عورتوں کو بہ نسبت کنواری لڑکیوں کے زیادہ ہوتا ہے اور عام بدن کی کمزوری بھی اس مرض کے حدوث میں پوری اعانت کرتی ہے۔ اور سبب واصل (اکسٹنگنگ کا زہن) یعنی سبب قریب یا محرک خون کی خرابی اور مقام علت پر کوئی اذیت پہنچنا ہے۔ جیسا کہ کثرت مجامعت وغیرہ سے یا سردی کی جگہ بہت مدت تک بیٹھے رہنے سے ہوتا ہے۔ آتشکی زہر کا عام بدن میں سرایت کر جانا۔ اور احتباس حیض بھی اس مرض کا موجب ہو سکتا ہے۔ کبھی اندام نہانی کی اندرونی جھلی (میوگس میمرین) کا ورم زیادہ پھیل کر رحم کی اس جھلی تک پہنچ جاتا ہے ۛ

**علامات (۱)** مریضہ کے پیڑوں پر خفیف سا ابھار محسوس ہوتا ہے (۲) زیر ناف دبانے سے درد ہوتا ہے (۳) کمزور اور نیند یوں میں بھی درد کی شکایت ہوتی ہے (۴) کبھی شدت تکلیف کے باعث بخار بھی ہو جاتا ہے (۵) کسی دن مریضہ کو قبض شکم ہوتا ہے اور کبھی اسہال یا بچش کی

تکلیف ہوتی ہے (۶) اگر آلہ مفتاح الفرج سے اندام نہانی کو کشادہ کر کے بذریعہ آئینہ کے رحم کی حالت ملاحظہ کریں تو فم رحم متورم اور اس کی اندرونی جھلی سرخ معلوم ہوگی (۷) ابتداً امراض میں رحم کی اندرونی جھلی خشک رہتی ہے لیکن دو یا تین دن کے بعد اس میں سے چپکا کڑا گڑھی رطوبت مترشح ہو کر بہنے لگتی ہے (۸) اس کے بعد رطوبت مذکورہ کے ساتھ قدرے خون اور یا سیپ بھی مخلوط ہو کر آنے لگتا ہے (۹) جس قدر یہ مادہ بکثرت خارج ہوتا ہے اسی قدر دیگر عوارض تکالیف میں سخت ظاہر ہونے لگتی ہے (۱۰) یہ مرض پندرہ یا بیس دن کے بعد (علاج سے یا خود بخود) یا تو زائل ہو جاتا ہے اور مریضہ کو صحت کلی ہو جاتی ہے۔ اور یا مرض منہو کر مدت دراز تک باقی رہتا ہے۔

علاج (۱) مریضہ کو آرام سے پلنگ پر لیٹے رہنے دیں چلنے پھرنے اور زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے منع کریں (۲) یہ نسخہ پلائیں۔ گل بنفشہ۔ پرسیاوشال۔ مکوہ خشک نیم خطمی۔ تخم خیابن ہر ایک ۷ ماشہ۔ مونیزنتی ۹ دانہ۔ گاؤربان ۵ ماشہ۔ سب دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں تر کر کے صبح کو ل چھان کر خمیرہ بنفشہ ۴ تولہ حل کر کے پلائیں (۳) شام کو قریب ۴ بجے کے خمیرہ گاؤربان ایک تولہ ورق نقرہ ایک عدد میں لپیٹ کر ہمراہ شیرہ بادیان شیرہ مکوہ خشک ہر ایک ۵ ماشہ۔ شیرہ مونیزنتی ۹ دانہ۔ عرق برنجاسف ۷ تولہ۔ عرق مکوہ ۵ تولہ میں تیار کر کے خمیرہ بنفشہ ۴ تولہ اس میں حل کر کے پلائیں (۴) دم کو تحلیل کر نیوالی دواؤں کا ضامنیم گرم کر کے پیڑو کے مقام پر کریں نسخہ ضماد۔ مکوہ خشک ایک تولہ۔ مغز امتاس ۹ ماشہ۔ آرد جوگل بابونہ۔ اکلیل الملک بالچھڑ۔ گل سرخ۔ صندل سرخ۔ ایلوہ۔ جدوار اصلی۔ رسوت خالص مصطکی رومی ہر ایک ۶ ماشہ۔ سب کو آب کاسنی سبز آب مکوہ سبز بقدر حاجت میں پیس کر سرکہ خالص ۶ ماشہ۔ روغن گل ایک تولہ پلائیں اور نیم گرم ضماد کریں (۵) مرہم داخلیون ایک تولہ۔ آب مکوہ سبز۔ آب کاسنی سبز بقدر حاجت کے کے ساتھ مخلوط کر کے فرجہ کے طور پر استعمال کریں (۶) اگر ضرورت ہو تو جو شاندہ تخم السی کا بذریعہ پچکاری کے رحم کے اندر پہنچائیں (۷) مریضہ کے ساتھ مجامعت ہرگز نہ کریں (۸) غذا ہلکی زود ہضم اور لطیف کھلائیں۔ آتش جو تہایت مناسب غذا ہے۔ قلیہ مع سرد ترکاری کے اور چائے معمولی غذا ہے کسی قدر چاول اور دودھ کا بھی مضائقہ نہیں ہے (۹) گرم چیزوں۔ ترشی۔ اور گوشت سادہ سے پرہیز کرنا ضروری ہے :

قسم دوسری ورم مزمن۔ جو خفیف العوارض اور دیر پا ہوتا ہے۔ چونکہ اس مرض میں ہمیشہ رحم سے سفید رطوبت جاری رہتی ہے اس لئے اس کو عربی میں سیلان رحم اور انگریزی میں "یوٹرائن لیور کوریا" کہتے ہیں :

اسباب۔ اس قسم کے اسباب بھی تقریباً وہی ہوتے ہیں جو قسم اول میں مذکور ہو چکے ہیں لیکن خون میں سودا ویت یا بلغمیت کا پیدا ہو جانا اور بہت سرد مقام پر مدت تک بیٹھے رہنا بھی اس مرض کا موجب ہوتا ہے اور عام بدن کی کمزوری بھی اس مرض کے حدوث میں پوری اعانت کرتی ہے علامات (۱) سفید رقیق یا قدرے گاڑھی رطوبت رحم سے ہمیشہ جاری رہتی ہے (۲) اس رطوبت کے مدت تک جاری رہنے سے مریضہ نہایت کمزور ہو جاتی ہے (۳) مریضہ کو ضعف ہضم اور قبض شکم کی اکثر شکایت رہتی ہے (۴) درد کمر اور کسل و کاہلی کے ساتھ درد سر کی بھی تکلیف رہتی ہے (۵) ایام حیض میں اور چند روزان سے پہلے ان تمام عوارض میں شدت ہو جاتی ہے اور ایام مقررہ کے بعد پھر تمام تکالیف قدرے کم ہو جاتی ہیں (۶) خون حیض کی مقدار اکثر بہت کم ہو جاتی ہے اور اس کی معمولی ترتیب و انتظام میں خلل واقع ہو جاتا ہے (۷) زیر ناف رحم کے موقع پر سختی پائی جاتی ہے :

علاج (۱) اس مرض میں یہ نسخہ نہایت مفید ہوتا ہے۔ جو ارش مصطلی، ماشہ ہماہ شیرہ بادیان۔ شیرہ تخم کنوٹ ہر ایک ۵ ماشہ۔ عرق مکوہ، تولہ۔ عرق الاچی، تولہ میں تیار کر کے گلقدیم تولہ اس میں حل کریں اور دونوں وقت ہی نسخہ پلائیں (۲) معجون موچرس بھی اس موقع پر مفید ہوتی ہے۔ (۳) ناریل پاگ ایک ہندی مرکب دوا ہے اس کے لئے نہایت مجرب ثابت ہوئی ہے۔

صفقتہ۔ گل دہاوہ۔ موچرس۔ مائیں خورو۔ مائیں کلاں۔ مازو سبر۔ گوند چنیہ۔ سنگمراحت۔ ہر ایک ایک تولہ۔ نخود بریان متقشر ۳ تولہ خوب باریک کوٹ چھانکر ناریل سفید مسلم میں بھر دیں اور اسی کی ڈاٹ لگا کر پہلے اس کے اوپر کھینکا ہو اکیڑا لپیٹ دیں۔ پھر اس پر آٹا لپیٹ کر گرم راکھ میں دبائیں جب آٹا سرخ ہو جائے اس وقت نکال لیں اور سرد ہونے کے بعد آٹا اور پٹا اتار کر

نسخہ

۱۔ یہ معجون ہندوستانی دواخانہ دہلی سے عمدہ بنی ہوئی مل سکتی ہے۔ مؤلف۔

مع ناریل کے ہاؤن دستہ میں خوب کوٹ لیں کہ سب یکذات ہو جائے۔ پھر آدھ پاؤگی اور آدھ پاؤ  
شکر سفید کے ساتھ قوام کر کے رکھ چھوڑیں اس میں سے ایک تولہ لیکر ہر روز صبح کے وقت گائے  
کے دودھ کے ساتھ کھالیا کریں (۴) ان کے علاوہ باقی وہ تمام تدابیر عمل میں لائیں جو اندام  
نہانی کے درم فز میں کتاب ہذا کے صفحہ پر درج ہیں)

ڈاکٹری تجربہ میں یہ نسخہ اس مرض کے لئے نہایت مفید ثابت ہوا ہے اور حکیم شفاء الدولہ  
مرحوم نے اپنی کتاب جامع شفاء میں اسکی بہت تعریف لکھی ہے صفتہ۔ سرکلورائڈ آف  
کیوری رسکیور پلا اگرین ہمراہ مطبوخ عشبہ یا نقوع عشبہ (ڈیکاکشن۔ یا انفیوژن آف  
سارسا پر پلا) کے پلائیں اور اگر رسکیور سے کسی قدر بدبھمی یا فساد معده کے آثار ظاہر ہونے لگیں  
تو بجائے رسکیور کے آئیوڈائڈ آف پوٹاشیم ہائیڈرین سے ہائیڈرین تک دے سکتے ہیں۔

یا در کھوکھ ڈاکٹروں نے اس مرض میں دو چیزوں کو سخت مضر بتایا ہے ایک یہ کہ مقوی  
دواؤں میں سے تمام لوہے کے مرکبات اس مرض میں مضر ہوتے ہیں خواہ وہ کسی ترکیب اور کسی  
صورت میں دیئے جائیں۔ اُن کا قول ہے کہ لوہے کے تمام مرکبات امراض میوکس میمرین کیلئے  
مضر ہیں اس لئے اس مرض میں ان کا استعمال ناجائز ہے دوسرے یہ کہ اس مرض میں کوئی  
رفیق سیال دوا بذریعہ پکپکاری کے رحم میں ہرگز نہ پہنچائی جائے۔ اس لئے کہ اس مرض میں  
رحم کی تجویف اپنی اصلی مقدار سے بہت تنگ ہو جاتی ہے ایسی حالت میں خوت ہے کہ وہ رفیق  
سیال چیز قاف نالیوں رفی لوبی ان ٹیونر کے راہ جوف عانہ اور شکم کے اندر فضاء صفاقی  
پرری ٹونی ال کے دی ٹی) میں پہنچ جائے کیونکہ یہ بات بارہا کے تجربہ سے خوب ثابت ہو چکی ہے  
کہ فضاء صفاقی میں خارجی پانی یا کسی چیز کے پہنچنے سے فوراً ورم صفاق پرری ٹونی ٹس  
پیدا ہو کر مریضہ مر جاتی ہے اسی وجہ سے انھوں نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ اس مرض میں  
جو مقامی ادویات استعمال کی جائیں وہ رفیق سیال نہ ہوں بلکہ گاڑھی دوائیں فزجہ کے  
طور پر استعمال کی جائیں۔ چنانچہ یہ نسخہ شبیاف کا نہایت مجرب بتایا گیا ہے صفتہ  
زنگ سلفاس ہائیڈرین۔ پھٹکری لوہے پر بھونی ہوئی ۱۰ اگرین۔ روغن کوکو ۳۰۔ گرین سیکو  
ملا کر گرم کریں اور شبیاف بتائیں بعد سرد ہو جانے کے یہ شبیاف قسم مہم (آس پوٹری)

دے کے مرکبات مضر ہیں۔

ڈاکٹری شفاء۔ رفیق دوائی پکپکاری مضر ہے۔

کے اندر رکھ دیں۔ تاکہ یہ دوائیں رفتہ رفتہ رطوبات رحم میں حل ہو کر ان کا اثر رحم کی اندرونی جھلی تک بخوبی پہنچ سکے ۛ

**فصل چوتھی** ورم رحم رٹرائٹس یعنی رحم کے طبقہ عضلیہ (مسیکولر کوٹ) کا ورم۔ یہ ورم اکثر تورحم کے عضلاتی پرت میں ہی مخصوص رہتا ہے لیکن کبھی رحم کے طبقہ مخاطیہ (میسوکس کوٹ) یعنی رحم کی اندرونی جھلی تک بھی تباہ کر جاتا ہے اور شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ورم رحم کے طبقہ مصلیہ (سیرس کوٹ) یعنی اُس کے بیرونی پرت تک سرایت کر جاتا ہے جو کہ فی الواقع صفاق البطن پر پری ٹونی ام) کا ایک حصہ ہے اس آخری صورت میں مریض کی حالت نہایت خطرناک ہوتی ہے ۛ

**اسباب**۔ اس مرض کے اسباب سابقہ درپری ڈسپوزنگ کا زہنی ابتدائی اسباب عموماً پانچ قسم کے ہوتے ہیں (۱) احتباس حیض خصوصاً جبکہ وہ ایک یا دو روز تک اپنے موقع پر جاری نہ ہو کر وقتاً قبل از وقت کسی سبب سے رک جائے کیونکہ حیض کے دنوں میں رحم کی طرف دوران خون تیز ہوتا ہے جس کے باعث رحم کی عروق ہر وقت کثیر المقدار خون سے بھری رہتی ہیں۔ اور کثرت خون کے باعث رحم کی ساخت موٹی اور اس کی اندرونی جھلی سرخ رہتی ہے اور اس خون کے قابل الدفع اجزاء رحم کی عروق شعریہ (کپیلر) سے رس رس کر خارج ہوتے رہتے ہیں پھر جب حیض کا خون کسی عارضی سبب سے قبل از وقت رک جاتا ہے تو اس کے قابل الاخراج فضلی اجزاء رحم کی عروق اور اس کی ساخت میں ذخیرہ معمولی طور پر جمع ہو کر ورم پیدا کر دیتے ہیں (۲) کبھی کثرت مجامعت سے بھی رحم میں ورم ہو جاتا ہے خصوصاً جبکہ اس فعل میں معمول سے زیادہ قوت صرف کی گئی ہو۔ یا کسی دوسری قسم کی بے اعتدالی عمل میں لائی گئی ہو۔ کیونکہ ایسی حالتوں میں رحم اور اندام نہانی پر قوی صدمہ پڑتا ہے اور دوران خون کے تیز ہونے سے رحم کی عروق میں اجتماع خون ہو کر ورم پیدا کرتا ہے (۳) کبھی اتفاقی کوئی رجب ضرب با صدمہ پیڑ و پگٹے سے بھی رحم کو اذیت پہنچتی ہے اور اس میں ورم ہو جاتا ہے (۴) بعض دفعہ استفادہ عمل یا وضع حمل کی غیر معمولی تکلیف سے رحم میں ورم ہو جاتا ہے جو مدت تک سنا رہے

ۛ جیسا کہ متذکرہ کے بعض غیر معمولی طریقے جن کو بعض ادبائش عمل میں لاتے ہیں۔ مؤلف



خصوصاً جبکہ ایسے موقع پر یا اس کے بعد شکم پر مالش وغیرہ کا یا کسی سخت رگڑ کا صدمہ پہنچا ہو۔  
(۵) کبھی اندام نہانی کا ورم بڑھ کر رحم کی ساخت تک تباہ کر جاتا ہے۔ غرض کہ ان چاروں  
آخر الذکر حالتوں میں رحم کی طرف دوران خون عارضی طور پر تیز ہو جانے سے رحم کی ساخت  
میں ورم ہو جاتا ہے :

ورم رحم کے اقسام۔ اب تک یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ رحم کی ساخت میں غیر  
معمولی طور پر اجتماع خون ہونا ورم رحم کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی یاد  
رکھنا چاہیے کہ یونانی اطباء کے نزدیک ہمارے بدن کا وہ سرخ و سیال مادہ جس کو عرف عام  
میں خون کہا جاتا ہے وہ کوئی مفرد (اکیلی) چیز نہیں ہے بلکہ فی الواقع وہ چار مختلف المزاج چیزوں  
(خون۔ بلغم۔ صفرا۔ سودا) کا مجموعہ ہے جن میں سے ہر ایک کی طبیعت دوسرے سے جدا اور  
ان کی خاصیت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے ہمارے بدن کی رگوں میں یہ چاروں ملے جلے رہتے ہیں  
اس لئے یونانی اطباء کی اصطلاح میں ان کو اخلاط کہا جاتا ہے لیکن اس مجموعہ میں طبعی طور پر  
خون کی مقدار باقی اخلاط سے بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس تمام مجموعہ مرکب کو عموماً  
خون کہہ دیا جاتا ہے :

اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ رحم کی ساخت میں جمع ہو کر اس میں ورم پیدا کرنے والے مادے  
میں جو خلط غالب ہوگا۔ اور اپنی طبعی مقدار سے زیادہ یا اپنی اصلی خاصیت کی رو سے فاسد ہوگا  
ورم رحم کو اسی خلط کی طرف منسوب کر کے دموی یا صفراوی یا بلغمی یا سوداوی کہا جائیگا اور  
اسی وجہ سے یونانی اطباء کے مسلک پر ورم رحم ان چار قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان چاروں  
قسموں میں سے دموی اور صفراوی کو ورم حار کہتے ہیں جو نہایت شدید العوارض اور سخت  
تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ اسی کو ڈاکٹری اصطلاح میں ”کیورٹ“ (حار) کہا جاتا ہے اسی طرح ورم  
بلغمی اور سوداوی کو یونانی اطباء ورم باس کہتے ہیں جو نہایت خفیف العوارض اور دیر پا ہوتا ہے  
اسی کو ڈاکٹری میں ”کرائٹک“ (رضی من) کہا جاتا ہے۔ لیکن یونانی اطباء ورم بار کو پھر دو قسموں میں تقسیم  
کر کے ورم بلغمی کو ورم رخا اور سوداوی کو ورم صلب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اب ہم  
ان اقسام کو مع علامات و علاج کے جدا گانہ بیان کرتے ہیں :

علامات ورم حار (۱) پیڑو کے مقام پر بخیر معمولی ابھار مع جلن گرمی اور درد ضربانی کے محسوس ہوتا ہے (۲) مریضہ کو پیشاب اور پاخانہ کی حاجت بار بار معلوم ہوتی ہے لیکن پیشاب و پاخانہ بہت کم اور درد کے ساتھ آتا ہے (۳) بدنی حرارت معمول سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہر وقت بخار چڑھا رہا ہے جو ورم صفراوی میں تیسرے دن شدت پکڑتا ہے (۴) بخار کے ساتھ دوسرے پیاس شدید ضعف اشتہا ضعف ہضم - تے متلی اور انکائی وغیرہ عوارض بھی حسب موقع موجود ہوتے ہیں (۵) سیون کے مقام اور جنگاسوں میں سخت درد ہوتا ہے جس کی لہریں رانوں اور سرین تک پہنچتی ہیں (۶) شدت تکلیف کے باعث مریضہ کو چلنا پھرنا دشوار ہوتا ہے بلکہ دیر تک بیٹھ بھی نہیں سکتی ہے (۷) اکثر اوقات پنڈلیوں میں کھنچاؤ کا سار دھوتا ہے اور کبھی کبھی رحم کے اندر بھی تشنج کی تکلیف محسوس ہوتی ہے (۸) اگر ورم - رحم پچھلی طرف ہو تو درد کمر کی طرف زیادہ محسوس ہوتا ہے اور براز مشکل سے آتا ہے - اسی طرح اگر ورم رحم کے سامنے کی طرف ہو تو پیڑو کی طرف درد زیادہ محسوس ہوتا ہے اور پیشاب مشکل سے آتا ہے (۹) بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مریضہ شدت تکلیف کے باعث اپنے پاؤں کو سیدھا پھیلا کر نہیں بیٹھ سکتی ہے بلکہ وہ پاؤں کو شکم کی طرف سکیڑے ہوئے چت پڑی رہتی ہے - اور یہ اکثر اس حالت میں ہوتا ہے جبکہ ورم مذکور بڑھ کر رحم کے طبقہ مصلیہ رسیس کوٹ یعنی اس کی غشاء صفاتی تک پہنچ جاتا ہے (۱۰) اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرض شروع ہونے سے دو چار دن کے بعد علامات مذکورہ بالا میں قدرے خفت پیدا ہو جاتی ہے اور رحم سے ایک قلم کی رطوبت بہنے لگتی ہے - یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ ورم مذکور رحم کی اندرونی جھلی میں بھی پیدا ہو جائے :

علاج (۱) ہر روز صبح کو یہ نسخہ پلائیں - گل بنفشہ - مکوہ خشک - پرسیاوشاں - تخم خیاریں - ہر ایک ۷ ماشہ - مویر منقہ ۹ دانہ غلاب ۵ دانہ - گاؤ زبان ۵ ماشہ - رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح کو مل چھان کر آب کاسنی سبب مرق ۳ تولہ - آب مکوہ سبب مرق ۴ تولہ اضافہ کر کے خمیرہ بنفشہ ۴ تولہ اس میں حل کریں اور پلائیں (۲) شام کے وقت خمیرہ گاؤ زبان ایک تولہ - ورق نقرہ ایک عدد میں لپیٹ کر ہمراہ شیرہ مویر منقہ ۹ دانہ شیرہ مکوہ خشک ۷ ماشہ - عرق برنجاسف ۷ تولہ - عرق گاؤ زبان ۵ تولہ میں تیار کر کے خمیرہ بنفشہ ۴ تولہ اس میں حل کر کے صاف کریں اور پلائیں (۳) ہر روز

کم سے کم دو مرتبہ یہ ضما پیڑو کے مقام پر لگائیں صفتہ۔ مکوہ خشک ایک تولہ۔ مغز راتاس و ماش  
آرد جو۔ گل بابونہ۔ اکلیل الملک۔ رسوت۔ صندل سرخ۔ بالچٹر گل سرخ۔ طحلب رکائی، ہر ایک  
۷ ماشہ آب مکوہ سبز۔ آب کاسنی سبز بقدر حاجت، میں پیس کر۔ سرکہ خالص ۶ ماشہ روغن گل ایک تولہ  
سفیدی بیضہ مرغ ایک عدد اضافہ کر کے نیم گرم ضما کریں (۴۴) دو تین دن کے بعد یہ نسخہ قابلہ سے  
استعمال کرائیں صفتہ۔ مرہم داطلیون ایک تولہ۔ آب کاسنی سبز۔ آب مکوہ سبز بقدر حاجت سفیدی  
بیضہ مرغ ایک عدد۔ روغن ایک تولہ۔ سب کو اچھی طرح سے ملا کر رکھیں اور اس میں سے بقدر ضرورت  
لے کر اس میں باریک کپڑے کی تہی آلودہ کر کے اندام نہانی کے اندر رکھیں (۴۵) اسی طرح سے حمل حدود ۱۰  
بھی اس مرض کے لئے بہت نافع ہوتا ہے۔

اندام نہانی میں استعمال کرنے کی دواؤں کے متعلق یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر رحم  
رحم کے پچھلے حصہ میں ہو تو ان دواؤں کا استعمال مقعدہ کے راہ سے بھی ہونا چاہئے کیونکہ رحم کا  
وہ حصہ معاً مستقیم سے قریب ہے اس لئے مقعدہ کے راہ سے استعمال کی ہوئی دوا کا اثر مقام  
ماؤف تک بہت جلد اور باسانی پہنچ سکے گا لیکن قابلہ کو لازم ہے کہ اس دوسرے طریق استعمال  
پر زیادہ اصرار نہ کرے بلکہ اس کی منفعت ظاہر کر کے اسے مریضہ کی مرضی پر چھوڑے۔ کیونکہ بعض  
مستورات اس کو نہایت معیوب سمجھتی ہیں یہاں تک کہ وہ ایسے طبیب اور قابلہ کی طرف اپنا علاج  
رجوع کرنا پسند نہیں کرتی ہیں۔ جو انھیں مقعدہ کے راہ سے ادویات کے استعمال کرانے پر مجبور کرنا چاہیں  
مذکورہ بالا تمام تدابیر کان کے موقع پر عمل میں لانے سے بفضلہ تعالیٰ بہت جلد مرض روکھت  
ہونے لگتا ہے اور اگر دوران علاج میں ضرورت تنقیہ تو حسب موقع (فصد۔ یا جونکوں۔ یا مہل  
وغیرہ کے ذریعہ سے تنقیہ کرا دینا چاہئے تاکہ بعد تنقیہ کے جلد تدابیر کا اثر بہت جلد عمدہ ظاہر ہونے  
لگے ان سب باتوں کے علاوہ مریضہ کو آرام سے رکھنا۔ مکان لباس۔ اور آب و ہوا کی صفائی کا لحاظ  
رکھنا۔ گرم غذاؤں سے پرہیز اور سرد غذاؤں کو اختیار کرنا ضرور ہے۔ آتش جو نہایت مفید غذا ہے  
انجام پر لگ نو سس عموماً اس مرض کا انجام چار طور پر ہوتا ہے ۱) اگر تمام تدابیر عمدہ طور پر  
میسر آئیں تو ہفتہ عشرہ میں ورم تحلیل ہو کر مریضہ بالکل تندرست ہو جاتی ہے (۲) اگر محض ورم  
جلد وار آرد جو۔ مکوہ۔ گل ارمنی۔ رسوت صندلین کو فتنہ بخیتہ باب کشیز سبز مکوہ سبز مرستہ حمل کنند ۲۰ منہ

دواؤں کے استعمال میں یا کسی دوسری تدبیر میں بے ضابطگی ہو جائے تو لطیف مادہ تحلیل ہو کر کثیف باقی رہ جاتا ہے اور مقام ماؤف میں سختی باقی رہ جاتی ہے (۳) کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ورم کا مادہ پک کر سپ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ ورم بھوٹ کر زخم ہو جاتا ہے جس میں سے سپ نکلتی رہتی ہے اور زخم کا باقاعدہ علاج کرنے سے نفع ہوتا ہے (۴) شاذ و نادر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قابلہ یا معالج یا مریض اور بیمار داروں کی غلطی سے ورم مذکور میں سرطانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور آخر کار علاج مشکل ہو جاتا ہے ۛ

**علامات ورم رخوار** (۱) مریضہ کے پیرو اور اس کے قرب وجوار میں نقل شدید اور قدرے درد محسوس ہوتا ہے (۲) چلنے پھرنے میں مریضہ کو پاؤں کی حرکت میں کسل معلوم ہوتا ہے (۳) پاؤں کے پٹھوں میں قدرے تناؤ کے ساتھ خدر رخن کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے (۴) پیرو کے مقام پر غیر معمولی بھار مع نرمی کے پایا جاتا ہے اور ٹلس زیادہ گرم نہیں ہوتا (۵) مریضہ کا مزاج ملنچی اور اس کے بدن پر ملنچیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں (۶) رطوبت پیدا کرنے والی چیزوں کے استعمال کا مدت تک اتفاق پڑنا بھی ورم کے ملنچی ہونے پر دلالت کرتا ہے (۷) اسی طرح ورم گرم کے آثار مثل بخار اور شدت گرمی و درد شدید وغیرہ کے موجود نہیں ہوتے ہیں ۛ

**علاج** - ورم ملنچی کے علاج میں بھی تمام تدابیر اسی ترتیب سے کرنی چاہئیں جو ورم گرم میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن دوائیں گرم استعمال کرائی جائیں جو مادہ ملنچی کے مناسب ہوں (۱) اچن پنچ صبح کا نسخہ یہ ہونا چاہئے صفحہ ۱۷۱ بکلی نفشہ مکوہ خشک - بادیان - پرسیاوشال - بیج کاسنی ہر ایک، ماشہ - تخم کشوٹ پوٹلی باندھ کر گدیاں ہر ایک ۵ ماشہ - مویر منقی ۹ دانہ سب کو رات کے وقت گرم پانی میں ترکیب اور صبح کو بل جھان کر خمیرہ نفشہ ۳۷ تولہ حل کر کے پلائیں (۲) شام کے لئے جو نسخہ ورم حار کے علاج میں بیان کیا گیا ہے اسی میں شیرہ بادیان، شیرہ تخم کشوٹ - پانچ پانچ ماشہ اضافہ کیا جائے (۳) اسی طرح ضماد کے نسخے میں بجائے رسوت - حنظل سرخ طبلک مصطکی - جروار - افستین - صیر زرد - وغیرہ محلاضہ گرم کا استعمال مناسب (۴) حکیم اورانی مرحوم نے اس ضماد کی بہت تعریف کی ہے اور بتدقیقہ کے میرا ذاتی تجربہ صفتہ - گوگل - اشق - سلار - بابونہ - تخم تھی ہر ایک ۳۷ ماشہ - کرنی کلمہ کے سبب پتوں کا پھوڑا ہوا پانی تخم لسی

نوعاب - موسم زرد ہر ایک تولد - روغن گل ۲ تولد - بدستور معروف تیار کر کے نیم گرم خما کریں (۵) استعمال خما دے کے نسخے میں بجائے مرہم داخلیوں کے مرہم اشق یا مرہم رسل کا استعمال بہتر ہے (۶) اگر ضرورت ہو تو گل بابونہ - افسنتین رومی - مرزنجوش - تخم کتاں وغیرہ کے خوشاندے سے آبرن کر لیا جائے (۷) مریضہ کو غذا میں بخود آب - دال اور ہر مع روٹی کے یا مونگ کی دال گرم مصالحہ ڈال کر دی جائے - اور چاول - کھجڑی - دودھ وہی وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہئے ؛  
انجام (پرگنوسس) ان ماصول پر علاج کرنے سے دو تین ہفتہ میں مریضہ کو آرام ہو جاتا ہے لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہئے کہ زیادہ گرم اور خشک دواؤں کے استعمال میں مبالغہ نہ کرنا کیا جائے کیونکہ ایسی دواؤں کے مسلسل استعمال کرنے سے جیسا کہ مادہ ورم کے تحلیل ہونے کی توقع ہوتی ہے اسی طرح اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ باوجود مناسب دواؤں کے استعمال کے (صرف ان کی مقدار اور مدت یا وقت استعمال کا لحاظ نہ رکھنے سے) مادہ کا لطیف حصہ تحلیل ہو جاتا ہے اور اس کا کثیف حصہ سخت ہو کر باقی رہ جاتا ہے - پھر ورم سخت ہو کر مدت تک مریضہ اور علاج کو پریشان رکھتا ہے اور اگر علاج میں مادہ بلغمیہ کا لحاظ نہ رکھا جائے اور چند روز تک دوا یا غذائیں سرد چیزوں کا استعمال رہے تو اس سے مرض استسقا (ڈراپسی) یا سوائلفیہ (بلے فی می آ) کا سخت اندیشہ ہوتا ہے ؛

علامات ورم صلب (۱) مریضہ کو بخار یا کوئی دوسری علامت ورم حار کی موجود نہیں ہوتی ہے (۲) ممتھام غانہ میں ورم سخت اور ثقل شدید بلا درد کے محسوس ہوتا ہے (۳) چلنے پھرنے کے وقت مریضہ کے پاؤں کا پٹنے ہیں اور جس طرف ورم زیادہ ہوتا ہے اسی طرف کے پاؤں میں

لگے صفتہ - اشق ۱ تولد ہر ایک ۲ ماشہ روغن زیتون ۲ تولد میں حل کر کے موسم زرد ۲ ماشہ اس میں اضافہ کریں اور سمندر جھاگ - رائی - زرد وند طولی گندھک - تخم انجیر ہر ایک ۲ ماشہ نہایت باریک پس چھان کر اس میں حل کر کے مرہم بنائیں ۱۲ مولف  
۱۳ صفتہ - جاد شیر زلفا - پیرودہ خشک - مرکی - مرنگ - مردار سنگ سفید ہر ایک ۳ ماشہ کندہ - زرد وند طولی ہر ایک ۲ ماشہ  
گوگل ۲ ماشہ - مردار سنگ ۲ ماشہ - اشق ۱۰ ماشہ اشق ۱۰ ماشہ موسم سفید ہر ایک ۱۰ تولد ان میں سے جو دوائیں پیسنے کے قابل ہیں ان کو نہایت باریک پیس کر چھان لیں اور گوگل کو سمندر جھاگ یا ایک تولد میں حل کریں اور باقی دواؤں کو روغن زیتون ۱۰ تولد میں گھونک لیں ہوئی دوائیں اور گوگل وغیرہ سب ملا لیں ۱۲ مولف اور علاج الامراض ؛

رغشہ کی کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے (۴) ورم جس قدر زیادہ سخت ہوتا ہے اور اس کے مادے میں جس قدر زیادہ غلظت ہوتی ہے اسی قدر مقام ماؤف میں درد کم ہوتا ہے (۵) اگر ورم کم ہوتا ہے تو رحم جانب متوم کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اگر زیادہ ہوتا ہے تو رحم جہت متوم کے خلاف جانب کو جھک جاتا ہے (۶) ایام معمولی میں حیض کا خون اپنی مقرر مقدار سے کم آتا ہے یا اس کا جریان بیقاعدہ ہوتا ہے یا اس کا اخراج بالکل بند ہو جاتا ہے۔

علاج (۱) اول چند روز تک صبح کے وقت یہ نسخہ منہج کا پلا کر مسہل دیں صفحتہ گلی بنفشہ شاہترہ تخم خطمی - پرسیا و شال - مکوہ خشک ہر ایک ۷ ماشہ - مویز منقی ۹ دانہ عنب ۵ دانہ گاؤزبان ۵ ماشہ خمیرہ بنفشہ ۴ تولہ ۲) شام کو یہ نسخہ دیا جائے - خمیرہ گاؤزبان ایک تولہ ورق لقرہ ایک عدد ہمراہ شیرہ بادیان - شیرہ مکوہ خشک - شیرہ تخم کثوث ہر ایک ۵ ماشہ - عرق بادیان - عرق مکوہ ہر ایک ۴ تولہ یا عرق برنجاسف ۷ تولہ - عرق گاؤزبان ۵ تولہ - خمیرہ بنفشہ ۴ تولہ (۳) پیڑو کے مقام پر یہ بھجیہ بندھوائی جائے صفحتہ - برگ مکوہ سبز - برگ کاسنی سبز - برگ خطمی سبز - برگ سویہ سبز - برگ کشنیز سبز - برگ نرمہ سبز - برگ گل سرخ تازہ ہر ایک ایک تولہ سب کو نیم کوفتہ کر کے شل بھجیہ کے پکائیں - یا بھجیہ ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر گرم تو بے پر رکھیں اور اوپر سے کوئی سرپوش ڈھک کر تو بے کے نیچے نرم آنچ کریں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سرپوش اٹھا کر دو کو پلٹے رہیں جب وہ بھرتہ کی طرح پک کر نرم ہو جائے اس وقت روغن گل ایک تولہ اس میں ملا کر نیم گرم باندھیں - رات کو اس بھجیہ کا باندھنا بہت مفید ہوتا ہے (۴) دن میں دو یا تین مرتبہ ضماد جالینوس - یا ضماد شیریش والایا ضماد روغن سرسوں والہ معمولہ مطب حضرت خازق الملک دام اقبالہم زیر ناف پیڑو کے مقام پر نیم گرم لگائیں (۵) مرہم زعفران بطریق معروف وایہ سے استعمال کریں (۶) ان تمام تدابیر کے علاوہ اگر تنقیہ کی ضرورت ہو تو مطبوخ افیتمون سے تنقیہ کرنا مناسب ہوتا ہے۔

(۷) ڈاکٹروں کا قول ہے کہ اگر صلابت رحم بوجہ زہر آتشک کے ہو تو اس کے لئے وہ دوائیں استعمال کرائی جائیں جو آتشکی زہر کو خون میں سے نکلانے کے واسطے مخصوص ہیں جیسا کہ سب کلورائڈ آف مرکوری رسکپورہ گرین تنہا یا ہمراہ آیوڈائڈ آف پوٹاسیم کے یا صرف آیوڈائڈ

آف پوٹاسیم ایک گرین سے سگریٹ تک ہمراہ نفور شاہترہ کے دی جائے تو یہ بھی نہایت فائدہ کرتی ہے۔ یہ نسخہ حکیم شفاء الدولہ مرحوم نے بھی اپنی کتاب رجاء شفاء فیہ میں لکھا ہے۔ (۸) غذائیں مریضہ کو مقوی اور لطیف زود ہضم کھلانی چاہئیں گوشت حلوان کی بخنی یا شورما چپاتی کیسا تھ عمدہ غذا ہے۔ دودھ کی گیرنی کا بھی مضائقہ نہیں۔ آتش جو گوشت حلوان کے ساتھ پکا کر دینا بہت فائدہ کرتا ہے اور غذائیت کے ساتھ دوا کا بھی کام دیتا ہے (۹) ورم رحم کی تمام صورتوں میں زوال مرض کے بعد رحم کی ساخت کو قوت دینے والی دوائیں فرزجہ کے طور پر استعمال کرانی چاہئیں۔ ورنہ چند روز کے بعد جب حیض کا زمانہ آتا ہے اس وقت عود مرض کا خوف ہوتا ہے کیونکہ ان ایام میں جب حسب معمول رحم کی طرف دوران خون زیادہ ہوتا ہے تو رحم کی ساخت اپنی کمزوری کے باعث مادہ کو قبول کر لیتی ہے اور پھر دوبارہ رحم میں ورم ہو جاتا ہے اس لئے اختتام علاج کے بعد مقویات رحم کا استعمال ضروری ہے فرزجہ مقوی رحم کا نسخہ یہ ہے باجپٹر۔ جاوتری۔ صغیر۔ قشار کندر فلاح اذخر۔ مرزنجوش۔ گل شنبو۔ پوست بیخ کبرجہ السرد گلاب زیرہ ہر ایک ۳ ماشہ نہایت باریک کوٹ چھان کر روغن نارون میں ملائیں اور باریک آؤن کے ساتھ بطور فرزجہ کے استعمال کریں ضماد جالینوس۔ سخت قسم کے تمام ورموں کو تحلیل کرتا ہے خصوصاً معدہ اور عضلات شکم کی پرانی سختی کو دور کرنے میں جالینوس کا مجرب ہے صلابت رحم کے لئے بھی مفید ثابت ہوا ہے صفحہ۔ سنوٹھ۔ جاوشیر۔ ہر ایک ۶ ماشہ ایلوہ مصفی ہر روزہ خشک۔ عک الک انباط ہر ایک ۹ ماشہ۔ سب کو باریک کوٹ چھان لیں اور یوم سفید ا۔ تولہ کو روغن سوسن ہاتولہ میں گھلایا کر اس میں کٹی ہوئی دوائیں ملا رکھیں ۴

ضماد شیریش۔ اونٹنی کا دودھ۔ بھیر کا دودھ۔ روغن بیدارنجیر (ارتڈی کاتیل) ہر ایک ۲۰ تولہ نرم آریج پر پکائیں۔ جب گاڑھا ہو جائے اس وقت آگ پر سے اتار کر سنوٹھ۔ اجوائن لسی ہر ایک تین ماشہ باریک پسیر اس میں ملا رکھیں ضماد روغن سوسن۔ سلا رس۔ ایلوہ مصفی زوفار خشک ہر ایک ۳ ماشہ مصطکی۔ زعفران بابونہ۔ اکلیل الملک۔ حماما۔ ہر ایک ۳ ماشہ۔

۱۔ یہ ایک قسم کا خوشبودار گوند ہے جسکا رنگ سفید قدرے زردی مائل شفاف ہوتا ہے اسکی ماہیت میں اطباء کا اختلاف ہے اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عک البطم کا دوسرا نام ہے اور اسحاق ابن عمران طبیب کا قول ہے کہ یہ پتے کے درخت کا گوند ہے ورحیلہ اعظم مؤرخن ۱۲۱۱

فرزجہ مقوی رحم

ضماد جالینوس

ضماد شیریش

اذخر حب بلساں ہر ایک ۶ ماشہ - اشق ۷ ماشہ - موم سفید - ماشہ - کوٹنے کے لائق دواؤں کو باریک کوٹ چھان لیں اور سلا رس مصطفیٰ اشق کو شراب اور سرکہ خالص بقدر حاجت میں تر کر کے گھول رکھیں۔ پھر موم سفید کو روغن سوسن ۴ تولہ میں پگھلا کر اس میں کھولی ہوئی دوائیں ڈال دیں اور آج سے اتار کر لپی ہوئی دوائیں بھی اسی میں ملا رکھیں :

مطبوع اقیتمون - گل بنفشہ - گل سرخ - شاہترہ تخم کاسنی - سنارنگی - اقیتمون ہر ایک ۵ ماشہ بادرنجبویہ - پرسیا و شاں - بسفنج - فستقی - گاؤ زبان ہر ایک ۵ ماشہ عناب ۵ دانہ مویر منقہ - ۹ دانہ - اعلیٰ ۲ تولہ - سواد اقیتمون کے سب دوائیں رات کو گرم پانی میں ترکیب - صبح کو خوب جوش دیکر آخر جوش میں اقیتمون باریک کپڑے میں ڈھیلی پوٹی باندھ کر ڈال دیں اور سر پوشش سے ڈھک کر آج پر سے اتار لیں جب دوا سرد ہونے کے قریب پہنچے مل چھان کر اس میں گلقد ۴ تولہ - خمیرہ بنفشہ ۴ تولہ حل کر کے چھان لیں اور مریضہ کو پلائیں - یہ نسخہ مسہل کا ہے - اس سے پہلے منفع کا نسخہ پلانا چاہئے اور اکثر ایسا بھی کہتے ہیں کہ یہی نسخہ بلا سنارنگی اور بسفنج کے چند روز بطور منفع کے پلایا جاتا ہے اور نفج کے بعد اس میں سنارنگی وغیرہ بڑھا دیجاتی ہے اور کبھی مسہل میں مغز الماس - تربد سفید - غاریقون وغیرہ بھی شامل کی جاتی ہیں اور باریت کو حب اقیتمون کھلا کر صبح کو یہ نسخہ بلا الماس کے پلایا جاتا ہے

حب اقیتمون - ہلیہ سیاہ ۹ ماشہ - بسفنج - اسطوخودوس - اقیتمون ہر ایک ۶ ماشہ غاریقون مصفی ۴ ماشہ - سلاجور و منقول ۳ ماشہ - سقمونیا انگریزی (سکے مونی) ۱۰ ماشہ - سب کو نہایت باریک کوٹ چھان کر پانی میں گوند لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنا رکھیں - مقدار خوراک ۷ ماشہ سے ۹ ماشہ تک ہے :

فصل پانچویں تشحیم الرحم رے - ٹی - ڈی جی نے ریشن آف یوٹرس (یعنی رحم کی ساخت کا چربی میں بدل جانا - کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جب کسی سبب سے خون میں چربی کے اجزاء رفینی سیلز زیادہ ہو جاتے ہیں اور رحم کی ساخت میں رفتہ رفتہ جمع ہو کر منجمد ہوتے جاتے ہیں تو اس میں چربی کی مقدار یوں مازیدہ ہوتی جاتی ہے - اور ظاہر ہے کہ جس عضو کی اصلی خلقت میں چربی کا ہونا بالکل بے موقع یا بیکار ہو اور کسی جہت سے اسکے حق میں مضر ہو سکی



ساخت میں ایسے بیکار اور مفسد اجزاء (چربی) کا جمع ہو جانا بدون اس عضو کی اصلی قوت میں ضعف پیدا ہونے کے ممکن نہیں ہے ایسی حالت میں گو نطاہر اس عضو رحم کی جسامت و بارت اور وزن اصلی مقدار سے کسی قدر بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن فی الواقع اس کی اصلی ساخت کے رابطی و عصبانی اور عضلاتی ریشے چربی میں دب جاتے اور کامل پرورش نہ ہو سکنے کے باعث (روز بروز مضمحل ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ کچھ مدت کے بعد رحم کی تمام ساخت چربی کی مملوم ہونے لگتی ہے اس کی اندرونی تجویف نہایت تنگ بلکہ تقریباً بند ہی ہو جاتی ہے اس کی ساخت میں بچک باقی نہیں رہتی۔ اسلئے کچھاؤ اور تناد کے ذریعہ سے اس کا جسم بڑھنے کے قابل نہیں رہتا ہے اس حالت میں یا تو عورت بالکل بانجھ ہو جاتی ہے۔ اور یا اس کو استقاط حمل کا عارضہ دائمی ہو جاتا ہے اسباب ۱) خون میں چربی کا مادہ زیادہ ہو جانا کیونکہ بدن میں چربی کی پیدائش خون میں چربی دار مادے کی موجودگی پر موقوف ہے (۲) ابتداء میں بدن کا زیادہ فربہ ہونا۔ کیونکہ اس عمر میں رحم نہایت چھوٹا اور ضعیف اور اس کی اصلی حرارت ضعیف ہونے کے باعث چربی کو تحلیل کرنے سے عاجز ہوتی ہے اس لئے رحم چربی میں دب جاتا ہے (۳) کسی سبب سے رحم میں کمزوری پیدا ہو جانا جیسے کہ عام بدن کی کمزوری سے یا بکثرت اولاد ہونے سے یا بکثرت استقاط حمل یا کثرت جماع سے اکثر ہوتا ہے (۴) غذائیں گھی دودھ اور مرغیوں کا بکثرت استعمال کرنا اور عیش و آرام سے رہنا (۵) قواعد حفظ صحت کے موافق ریاضت کی عادت بالکل نہ کرنا۔

علامات (۱) ابتداء عمر سے نہایت فربہ اندام ہونا۔ یا ضعف رحم کے اسباب لاحق ہونے کے بعد فربہ بدن اور اس کے اسباب کا واقع ہونا (۲) باوجود جوانی اور نطاہر ہر طرح سے تندرست ہونیکے حیض بالکل بند ہونا (۳) خون میں چربی کا مادہ زیادہ موجود ہونا (۴) یہ بھی ممکن ہے کہ تمام بدن زیادہ فربہ نہ ہو اور صرف رحم پر ہی چربی غالب ہو جائے تو اس حالت میں احتباس حیض اور خون میں چربی کے اجزاء کی زیادتی رحم کے چربی دار ہونے کا پورا قرینہ ہے (۵) ایسی عورت اکثر بانجھ ہوتی ہے یا اسے عسر حمل کا عارضہ ہوتا ہے اور ہمیشہ وقت مقررہ پر استقاط حمل کی عادی ہوتی ہے۔ علاج (۱) بدن کی چربی تحلیل کرنے اور فربہ ہی منفرد کو زائل کرنے کی سب سے بہتر تدبیر یہ ہے کہ مرضیہ کو ایک مدت تک کسی سخت ریاضت میں مبتلا رکھا جائے (۲) غذا مقدار میں بہت کم اور تاثیر میں

ایسی ہونی چاہئے جو خون کی رطوبت اور چکنائی کو تحلیل اور خشک کرنے والی ہو۔ جیسے مینہ روٹی بلا گھی کے یا روئے کی یا بھوسی دار اور چکی ٹکلیں روٹی (۳) مریضہ کو ہدایت کرنی چاہئے کہ چند روز فاقہ پر صبر کرے یا روزے رکھے اور گھی دودھ وغیرہ مرغن غذاؤں کا استعمال بالکل ترک کر دے۔  
 (۴) بہتر ہے کہ مریضہ کو بعض فکری مشاغل میں چند روز کے لئے مبتلا رکھا جائے (۵) اور ضرورت محسوس ہو تو سب سے پہلے چند روز تک مریضہ کو منفعیات بلغم پلا کر تفتیہ بلغم کا اچھی طرح سے کیا جائے نسخہ منضج۔ بادیان۔ پرسیا و شال اصل السوس مقشر۔ تخم کثوث۔ مکوہ خشک۔ بنج اخضر۔ انیسون تخم کرفس ہر ایک ۵ ماشہ۔ سب کو رات کے وقت گرم پانی میں ترک کر کے صبح کو جوش دیں اور بل چھان کر مہری ۴ تولہ حل کر کے پلائیں۔ تقریباً ایک ہفتہ تک دوا پلانے کے بعد جب آثار نضج مادہ کے ظاہر ہو جائیں تو اسی منضج کے نسخے میں سناہکی۔ تربد سفید ہر ایک ۵ ماشہ۔ غار بقون۔ ۳ ماشہ۔ منضج فلوں ۲ تولہ تربخین ۴ تولہ۔ گلقد ۴ تولہ۔ شیرہ مخمر یا دام شیریں، عدد اضافہ کر کے مہل دیں۔ اسی طرح تین مہل دیئے جائیں اور مہلوں کے درمیانی دنوں میں شیرہ بادیان۔ شیرہ عناب۔ عرق بادیان۔ شربت بنفشہ۔ تخم ریحان بطور مقرر پلائیں (۶) بعد تفتیہ کے دوا الک صغیر کا استعمال چند روز تک کرنا چاہئے۔ اسی سے چربی تحلیل ہو کر فرہی زائل ہو جاتی ہے (۷) تخم کرفس۔ انیسون۔ بادیان۔ تخم کاسنی۔ اجوان دیسی تخم مہیتی۔ اسارون کا جو شانہ ایسے موقع پر خون کی چربی کم کرنے کے لئے اور اس کے قوام کو قدرے قیق کر کے اجرا حیض کیلئے نہایت مفید انجام اگر علاج عمدگی کے ساتھ میسر ہو سکے اور موافق آجائے تو چند روز میں مرض زائل ہو جاتا ہے خون کی چربی کم ہو کر اور اس کا قوام قدرے رقیق ہو کر حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے عورت حاملہ اور صاحب اولاد ہونے کے لائق ہو جاتی ہے اور اگر علاج کی طرف پورے طور سے توجہ نہ کی جائے یا کسی وجہ سے علاج موافق نہ آئے اور مایوس ہو کر علاج ترک کر دیا جائے تو رحم کی حالت بالکل خراب ہو کر احتباس حیض کی شکایت بدستور قائم رہتی ہے پھر اس کے عوارضات میں سے اکثر شکایتیں مریضہ کو آئے دن گھیرے رہتی ہیں۔ ممکن ہے کہ رحم کی مشارکت سے خصبۃ الرحم بھی کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسی عورت ہمیشہ کے لئے اولاد سے محروم رہنے کے علاوہ طح طح کی تکالیف کے باعث اپنی زندگی سے بیزار رہتی ہے :

نسخہ کرفس ہر ایک ۵ ماشہ

**فصل چہٹی۔** منغل رحم راٹروپی آف دی یوٹرس یعنی رحم کا چھوٹا ہونا۔ کبھی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کسی عورت کا رحم اس کے قد و قامت کی نسبت سے اور اپنی اصلی جسامت کی طبعی مقدار سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اور اس سبب سے اس کو قلت حیض عسر حیض، خنساں حیض، عسر حمل، کثرت استقاط حمل وغیرہ عوارض کی اکثر شکایت رہتی ہے۔ جہاں تک تجربہ سے ثابت ہوا ہے اس مرض کے اسباب چار قسم کے پائے جاتے ہیں جن کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے :

۱۔ اپیدائشی نقصان۔ یہ نقصان مادہ منویہ کی کمی سے یا اعضا کی ابتدائی ساخت کو بنانے والی قوت کے قصور سے ابتداء پیدا کُنش میں واقع ہوتا ہے جیسا کہ اعضاء ظاہری میں سے ہاتھ پاؤں یا آنکھ ناک۔ کان۔ گردن۔ سر وغیرہ کا چھوٹا پیدا ہونا۔ یا اعضاء اندرونی میں سے معدہ جگر مثانہ۔ گردہ۔ دماغ۔ دل۔ پھیپہرہ۔ تلی وغیرہ کا چھوٹا پیدا ہونا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی عضو کی ساخت ابتداء پیدا کُنش میں اپنی مناسب مقدار سے بہت ہی چھوٹے پیمانہ پر مخلوق ہوتی ہے تو بدن کی قوتِ نامیدہ زنازل ڈی ولیپ مینٹ یعنی بدن کو بڑھانے والی قوت اس عضو کو بڑھا کر مقدارِ واجب تک پہنچانے سے ہمیشہ قاصر رہتی ہے۔ اس لئے ایسے عضو کا فعل ہمیشہ ناقص رہتا ہے اسی طرح رحم کے نقصان خلقت کی حالت میں بھی اس کا فعل ہمیشہ ناقص رہتا ہے :

**علامت۔** اگر کسی عورت کو ابتداء شباب اور زمانہ بلوغ سے ان امراض کی شکایت ہو جن کا بیان اوپر کیا گیا ہے اور اس کو بار بار استقاط حمل کا اتفاق ہوا ہو۔ اور استقاط حمل ہمیشہ مدتِ حمل کے کسی ایک ہی مہینہ میں واقع ہوتا ہو۔ پھر تفتیش احوال سے یہ بھی اچھی طرح ثابت ہو جائے کہ جن امراض کی مریضہ کو ابتداء شباب سے شکایت ہے ان امراض کے اکثر اسباب میں سے کوئی ظاہری سبب اس مریضہ میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح استقاط حمل کے موقع پر بھی ہمیشہ خیال کیا جائے تو اس کا کوئی ظاہری سبب بروئے تحقیقات ثابت نہ ہو سکے اور استقاط حمل ہمیشہ ایک وقت مقرر پر

۱۔ رحم کی طبی مقدار جسامت اور اس کی شکل جوانی کی عمر میں مثل ناشپاتی کے مثلث ہوتی ہے اس کی طوالت اور پر سے نیچے تک قریب ۱۲ انچ کے اور عرض بالائی خراج سرے کے تو دیک ایک جانب سے دوسری جانب تک قریب دو انچ کے ہوتا ہے اور دیانت قریب ایک انچ کے اور وزن پونے تین تولہ سے تین تولہ تک ہوتا ہے لیکن ایام حیض اور حمل کے زمانہ میں رحم کی جسامت اور وزن نسبت معمولی حالت کے عارضی طور پر کسی قدر بڑھ جاتے ہیں اس کا تفصیل بیان کتابِ ہائے پہلے حصہ میں ہو چکا ہے ۱۲ مولف

ہوتا ہو۔ تو ان تمام امور سے طبیب کو سمجھ لینا چاہئے کہ مریضہ کا رحم ابتداً پیدائش میں اپنی مقدار واجب سے چھوٹا مخلوق ہے۔

**علاج۔** اگرچہ اکثر حالتوں میں یہ مرض بھی مثل دیگر پیدائشی امراض کے لاعلاج سمجھا جاتا ہے لیکن اگر ابتدائے شباب میں کسی طرح اس کا ٹھیک پتہ لگ جائے اور خرابی زیادہ نہ ہو تو مناسب تدابیر کامیابی کی امید کی جاسکتی ہے اس لئے ایسی حالت میں عورت کو اچھی غذائیں کھلانا عمدہ اور صاف ہوا میں سکونت رکھنا قواعد حفظ صحت کے موافق جمی پرورش اور معتدل ریاضت کا لحاظ رکھنا چاہئے اگر اس عضو رحم کی ساخت میں اس کی مقدار واجب سے قصوری سی کمی ہوگی تو ممکن ہے کہ بدن کے دوسرے اعضاء کی افزائش کے ساتھ یہ خاص عضو رحم بھی نشوونما راہ لے لے گی، حاصل کر کے اپنی مقدار مطلوب تک پہنچ جائے اس کے علاوہ اگر عورت اپنے شوہر کے پاس لازمی طور پر بود و باش رکھے تو اس سے بھی قدرتی طور سے تمام اعضاء تناسل کی قوتوں میں ایک خاص تحریک پیدا ہوتی ہے اور ان کی طرف دوران خون ایک خاص اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے ان اعضاء کی پرورش اور نشوونما میں ترقی ہونے کی قوی امید کی جاسکتی ہے خصوصاً اگر عورت اپنے شوہر پر اور نطفے سے نچلے بدن پر ایسے تیلوں کی مالش کرے جن سے اعضاء کی ساخت میں خون اچھی طرح جذب ہو سکے اور اعضاء میں توتل پیدا ہو۔ چنانچہ اس غرض کے لئے روغن سرخ میں مشک ملا کر یا روغن قسط میں زعفران ملا کر یا روغن جنہلی میں قدرے قرفیون اور زعفران ملا کر مالش کرنا بہت مفید ہے۔ اور اگر اس قسم کی تدابیر سے ناکامی ہو تو صرف ان عوارض کی اصلاح کرنی چاہئے جو صخر رحم کے باعث مریضہ کو لاحق رہتے ہیں۔

(۲) رحم کی پرورش کا نقصان۔ عام قاعدہ ہے کہ جب کسی عضو سے اس کے لائق کام نہیں لیا جاتا ہے یا اس عضو کی طرف غذائی مادہ لانے والی عروق میں کسی قسم کی خرابی لاحق ہو جاتی ہے تو اس کی پرورش میں نقصان ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح رحم سے اگر وہ کام بالکل نہ لیا جائے جس کے لئے

۱۔ روغن قسط کا نسخہ یہ ہے۔ قسط تلخ چھڑیلہ۔ تاج قلعی۔ باجھڑ تیز بابت چرائتہ بیخ سوسن۔ سلا رس ہر ایک ایک لہ۔  
 ۲۔ مکی لوگ ہلک و ماشہ سب کو یکو قتر کر کے ایک سیر پانی میں نرم آنچ سے پکائیں جب ایک تہائی پانی باقی رہ جائے مل چھان کر تیل کا  
 ۳۔ تیل ۱۲ اضافہ کر کے پھر بدستور پکائیں جب پانی جل کر صرف تیل باقی رہ جائے صاف کر کے شیشی میں رکھیں ۱۲ مولف

قدرت نے اسے پیدا کیا ہے یا وہ رگیں جو رحم کی طرف مادہ غذائیہ لانے کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ ان کی تھوہین کی وجہ سے بند ہو جائے۔ یا کسی مرض میں دستکاری کرتے وقت ان تمام عروق کو بالکل کاٹ دیا گیا ہو۔ یا ان کی عام جڑ کو باندھ دیا گیا ہو تو ان اسباب سے رحم کی پرورش میں نقصان واقع ہو سکتا ہے اور اس سبب سے صغیر رحم کا مرض لاحق ہو سکتا ہے:

علامات (۱) کچھ مدت تک رحم کا بالکل بڑھا جیسا کہ مجرورہ کی حالت میں ہوتا ہے (۲) کسی ایسی دستکاری کا مقدم ہونا جس سے رحم کی عروق کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہو (۳) انسداد عروق کے اسباب کا پایا جانا۔ جیسے خون میں غلظت ہونا یا اس میں چربی دار مادے کی زیادتی ہونا (۴) عروق رحم پر کسی دائمی ضغطہ اور دباؤ کا واقع ہونا جیسا کہ رحم کی ساخت میں چربی کی زیادتی سے یا رحم میں نہایت سختی پیدا ہوجانے کی حالت میں ہو سکتا ہے:

علاج۔ اگر کچھ مدت تک مجرورہ سے رحم چھوٹا رہ گیا ہے تو شادی کے بعد اس کی اصلاح ہوجانی ممکن ہے اور اگر کسی دستکاری میں رگیں کٹ گئی ہیں تو یہ صورت لا علاج ہے اگر رحم میں چربی کی زیادتی یا صلابت پائی جائے تو اس کا علاج سابقہ فصلوں میں درج ہے اور اگر خون میں غلظت ہو تو اسباب غلظت رسود یا بلغم کی زیادتی کو تحقیق کر کے اس کا علاج کرنا چاہئے:

(۳) رحم کی ساخت میں تحلیل نہ ہونے سے بھی اس کا حجم گھٹ جاتا ہے اور یہ تحلیل دو طرح کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک تحلیل طبعی ہے اور دوسرا غیر طبعی۔ تحلیل طبعی کی یہ صورت ہے کہ جسطرح سے بڑھاپے میں تمام اعضا کی ساخت مرجھا کر اس کا حجم گھٹ جاتا ہے اور مقننہ سیک کے موافق بدن کے اجزاء کے تحلیل ہوجانے سے اسکے نرم حصوں کی ساخت سکڑ کر اور مرجھا کر چھوٹی ہوجاتی ہے۔ اسی طرح بڑھی عورتوں کا رحم بھی بڑھاپے میں چھوٹا ہوجاتا ہے اور تحلیل غیر طبعی کسی مرض کے باعث یا کسی فعلی کی عادت سے ہوتا ہے جیسا کہ رحم سے ایک مدت تک بکثرت خون جاری رہنے سے یا رحم میں مدت تک زخم وغیرہ رہنے سے اس کی ساخت سکڑ جاتی ہے یا بطور مستورات کو کثرت جماع سے یا خراب عادت میں ایک مدت تک مبتلا رہنے سے واقع ہوتا ہے ان کا رحم اپنی طبعی مقدار سے کبھی چھوٹا ہوجاتا ہے:

اسباب (۱) بڑھاپے میں چونکہ بدن کی پرورش کرنے والے اجزاء (غذائی مادہ میں سے)

بہ نسبت تحلیل ہونے والے اجزاء کے بدن کو بہت کم حاصل ہوتے ہیں۔ اس لئے تمام اعضاء کی جسامت اپنی معمولی مقدار سے گھٹ جاتی ہے۔ اسی طرح رحم بھی چھوٹا ہو جاتا ہے (۲) جب کسی مرض کے سبب کسی عضو کی ساخت اس قدر تحلیل یا فنا ہو جاتی ہے کہ اس کے فنا شدہ اجزاء کی برابر جدید اجزاء غذائی مادے سے حاصل نہ ہو سکیں تو اس عضو کی ساخت اصلی حالت سے کم ہو جاتی ہے۔ یہی حال رحم کی ساخت کا سمجھنا چاہئے (۳) جب کسی بڑا طور عورت کے اعضاء تناسل کثرت جماع وغیرہ کے باعث ہمیشہ مشقت میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کی پرویش غذائی مادہ سے پورے طور پر نہیں ہو سکتی ہے تو ان کی ساخت کثرت تحلیل کے سبب سے بہت گھٹ جاتی ہے اور ان کی جسامت معمولی مقدار سے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔

علامات۔ یہ سب صورتیں اپنے اسباب کے تقدم سے تشخیص کی جاسکتی ہیں۔ اس لئے اسباب کو دریافت کرنا چاہئے :

علاج۔ بڑھاپے کی عمر کا نقصان لا علاج ہے باقی سب صورتوں میں اچھی غذائیں کھانا اور مناسب تدابیر سے بد عادات کو چھڑانا چاہئے :

(۴) انقباض رحم۔ یعنی رحم کا سکڑ جانا۔ رحم کے اندر زخم پیدا ہو جانے کے بعد جب مندل ہو جاتے ہیں یا کسی عصبی تشنج کے باعث رحم کی ساخت سکڑ کر اس کی مقدار چھوٹی ہو جاتی ہے :

اسباب (۱) جب کسی عضو میں ایک مدت تک زخم رہتے ہیں اور اس کی ساخت گل کر اور پیپ وغیرہ کی صورت میں تبدیل ہو کر ضائع ہو جاتی ہے اور اس عضو کی اصلی رطوبات تحلیل ہو جاتی ہیں تو زخموں کے مندل ہو جانے کے بعد اس عضو پر خشکی غالب آتی ہے اور اس کی ساخت سکڑ کر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اندمال قروح کے بعد یہی حال رحم کا ہوتا ہے (۲) چونکہ ہر عضوی ساخت میں کچھ نہ کچھ عصبی ریشے ضرور ہوتے ہیں۔ اس لئے عصبانی تشنج کے سبب سے نرم اعضاء کی مقدار جسامت گھٹ جاتی ہے۔ یہی حال رحم کا سمجھنا چاہئے :


علامات (۱) اندمال قروح کا مقدم ہونا (۲) رحم میں عصبی تشنج کا واقع ہونا اور قائم رہنا (۳) اگر مرض پرانا نہ ہو تو مریضہ کو اپنے رحم میں اینٹھن کا سادہ محسوس ہونا :

علاج۔ اگر انقباض رحم اندمال قروح کے بعد پیدا ہوا ہے تو اگرچہ اس کا اپنی اصلی حالت پر آنا اور


مقدار جسامت کا بڑھ جانا غیر ممکن ہے۔ کیونکہ قروح رحم کی حالت میں جو اجزاء رحم کی ساخت کے ضائع ہو گئے ان کا دوبارہ عود کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی عضویں تری اور نرمی پیدا کرنے والے روغنوں کی مالش پیروپر کرنا اور اسی قسم کے فزجوں کا استعمال کرنا کسی قدر ضرور مفید ہوتا ہے اور اگر یہ مرض عصبی تشنج کے باعث پیدا ہوا ہو تو اس کو دفع کرنے کی مناسب تدابیر عمل میں لائی جائیں اگر وہ عصبی تشنج رفع ہو جائے تو رحم اپنی اصلی حالت پر آ سکتا ہے۔

**فصل ساتویں۔** سرطان رحم (یوٹرائن کینسر) یہ رحم کے ورم صلب کی ایک خاص قسم ہے جس کا مادہ سودا سوختہ ہوتا ہے اور وہ مادہ رحم کے طبقہ عضیہ (مسیکولر کوٹ) میں اور اس کی تمام رگوں میں جمع ہو کر اس کی ساخت کو تباہ کرنے لگتا ہے اس ورم میں باوجود سختی کے درد شدید اور جلن ہوتی ہے۔ اس ورم کے قرب وجوار کی رگیں موٹی نیلی اور خراب مادے سے بھری ہوئی نظر آیا کرتی ہیں چونکہ اس ورم اور اس کے گرد کی رگوں کی اجتماعی صورت مثل کیکڑے کے ہوتی ہے اس لئے اس ورم کو یونانی اطباء کی اصطلاح میں سرطان رحم کہا جاتا ہے اکثر یہ ورم فم رحم یا عنق رحم (سرکس یوٹرائن) کے قریب ہوتا ہے اور کبھی قاع الرحم (فڈس) یعنی رحم کے انتہائی حصے میں یا دیامیانی حصے میں ہوتا ہے اور کبھی اس کے ساتھ اندام نہانی کی ساخت بھی مبتلا ہو جاتی ہے۔ یونانی اطباء کے نزدیک یہ مرض کبھی ورم حار کے بعد پیدا ہو جاتا ہے جبکہ اس کے علاج میں پورے طور پر احتیاط نہ کی جائے اور مادہ حارہ کی تسکین حدت میں کمی کی جائے۔ اس لئے معالج کو گرم ورموں کے علاج میں اس بات کا خوب لحاظ رکھنا چاہئے کہ اس کی کسی غلطی سے ورم سرطان کی طرف منتقل نہ ہو جائے

تصویر نمبر ۳۹ سرطان رحم کی مع اندام نہانی کے



تصویر نمبر ۴۰۰ سرطان رحم کی معائنہ نام نہانی کے



**اسباب** - یہ ورم اکثر ورم حار کے بعد حادث ہوتا ہے جبکہ ورم کا مادہ پورے طور پر تحلیل نہ ہو سکے اور محلات حارہ کے اثر سے اس میں اختراقی کیفیت اور فساد و تآکل کی خاصیت پیدا ہو جائے۔ اکثر وہ عورتیں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں جن کی عمر تیس سال سے متجاوز ہو گئی ہو اور کثیر الاولاد یا کثیر الجماع ہونے کے باعث ان کے رحم کی ساخت کمزور ہو گئی ہو اور ان کے بدن میں خلط سوداوی غلیظ محترق موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ چالیس سے پچاس سال تک عمر والی عورتیں خصوصیت کے ساتھ اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں۔ کیونکہ اس عمر میں اکثر سٹروایت کا غلبہ ہوتا ہے اور مزاج میں کسی قدر حرارت بھی موجود ہوتی ہے :

ڈاکٹروں کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سرطان کنسر کا مادہ ایک خاص قسم کے سہی نہایت چھوٹے اجزاء (جرمز) ہوتے ہیں جو عضواؤں کی ساخت میں پیدا ہو کر یونٹا فیوٹا اپنی مقدار جمامت اور تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں اور عضواؤں کی ساخت کو خراب کر دیتے ہیں اور یہ حالت ایک مدت تک بدستور قائم رہتی ہے۔ پھر جب ان فاسد اجزاء کو اس قدر غذائی مادہ نہیں پہنچ سکتا جو ان کی افزائش کے لئے کافی ہو سکے۔ تو اس وقت ان میں سے بعض فاسد اجزاء خود ہی مردہ ہو کر گلنے سڑنے لگتے ہیں اور ان میں سے متغصن رطوبت بہ کر قہر ہی ساخت کو نہایت سرعت کے ساتھ فاسد کرنے لگتی ہے اور یہ فساد روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ یہ آخری صورت وہی ہے جس کو نانی اطباء سرطان متفرح کہتے ہیں :

علامات را ابتدا مرض کے وقت رحم میں ورم سخت مع گرم و سوزش اور درد شدید ضربانی کے



پایا جاتا ہے۔ اوپر پٹو کے مقام پر اکثر ایک سخت ابھار نمودار ہوتا ہے (۲) اگر اندام نہانی میں کچھ داخل کر کے ورم کو ٹپولیں تو غم رحم نہایت سخت اور اسپر پھنسیاں سی محسوس ہوتی ہیں (۳) اگر اندام نہانی کو آلہ مفتاح الفرج را سپے کیوں سے کشادہ کر کے اندرونی حالت بذریعہ آئینہ کے ملاحظہ کریں تو غم رحم کی اصلی شکل معلوم نہیں ہو سکتی اور مقام ماؤف متورم سرخ سیاہی مائل دکھائی دیتا ہے اور اسپر مثل چھتے کے سخت پھنسیاں نمودار ہوتی ہیں (۴) ورم مذکور جس قدر بڑھتا جاتا ہے اسی قدر پٹو کا ابھار ترقی کرتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض عورتوں کا شکم استسقا وائے کے ساتھ مشابہ ہو جاتا ہے (۵) جب اس ورم میں زخم ہو جاتے ہیں اس وقت اس کے گرد سختی اور پنج میں نرم حصہ جمیں جا یا باریک سوراخ ہو کر مثل اسفنج کے ہو جاتا ہے۔ اس میں سے نہایت متعفن رطوبت زردی مائل یا سیاہی مائل بہنے لگتی ہے اور وہاں کا گوشت گل کر سیاہ سیاہ ٹکڑے خارج ہوا کرتے ہیں (۶) اگر زخم کو کسی چیز سے چھوئیں یا ادنیٰ سی رگڑ لگ جائے تو اس سے خون بہنے لگتا ہے۔ اور کبھی اس قدر بکثرت جاری ہو جاتا ہے کہ جیسا افراط حیض کی حالت میں ہوتا ہے (۷) اس حالت میں زخم کے اندر ہر وقت سوئیوں کے چھتے کا سادہ دھوا کرتا ہے۔ اور یہ حالت نہ یا دتی مرض کی ہوتی ہے (۸) آخر کار درد ایسا شدید ہو جاتا ہے کہ جس میں ایک لمحہ بھر سکون و آرام نہیں ملتا ہے مریض ہر وقت بے چین اور تنگ دل رہتی ہے رات کو نیند مطلق نہیں آتی ہے (۹) کھانے سے نفرت ہوتی ہے اور اگر کچھ کھایا جائے تو وہ ہضم نہیں ہوتا۔ کثرت ریاح کے باعث اکثر شکم میں قراقر اور نفخ رہتا ہے اکثر اوقات فے اور ابکائیوں سے مریض پریشان رہتی ہے (۱۰) کافی غذا بدن کو نہ پہونچنے اور شدت تکالیف کے باعث مریض روز بروز لاغر ہوتی جاتی ہے (۱۱) شدت مرض کی حالت میں اس کا اثر کبھی شتادہ اور محار مستقیم تک پہونچ جاتا ہے۔ اس وقت مریض کو حرقت و تقطیر بول یا احتباس بول اور پھیش یا قبض شدید کی تکالیف ہونے لگتی ہے (۱۲) جب اس مرض کا ہر تمام بدن کے خون میں سرایت کر جاتا ہے اس وقت مریض کو بخار سخت اور دروید اور ان سرلاحی ہو جاتا ہے **علاج**۔ سرطان خواہ سادہ ہو یا مع زخم کے ہو اگرچہ علاج پذیر نہیں ہوتا ہے اور اس حوزی مرض سے پوری خلاصی کی امید بہت کم کی جا سکتی ہے لیکن بھیر بھی رفع تکالیف اور زیادتی مرض کی روک تھام کے لئے علاج کیا جاتا ہے اور عملگی کے ساتھ باقاعدہ

علاج میسر ہونے کی حالت میں بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے اس لئے مناسب ہے کہ (۱) مریضہ کو دلانے میں غنی خون دواؤں کا استعمال برابر جاری رکھیں (۲) شدت درد اور سوزش کے وقت مقامی دواؤں میں سے شیاف ایفون ایفونی قدرے زعفران کے ساتھ عورت کے دودھ میں گھس کر بذریعہ پچکاری کے رحم میں پہنچائیں **نسخہ شیاف** سفیدہ مانگ کا دتولہ گوند کیکڑے تولہ کیترا افیون خالص ہر ایک سوا ماشہ سب کو نہایت باریک پیس کر سفیدی بیضہ مرغ میں ملائیں اور شیاف بنا کر خشک کر کے شیشی میں رکھیں۔ یہ شیاف آشوب چشم کی حالت میں بھی درد شدید کی تسکین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح رحم کی سوزش اور درد شدید کو بھی سفیدہ ہے (۳) یہ ترکیب بھی رحم کی جلن اور درد کو تسکین دینے میں عجیب الاثر ہے صفحہ ۱۳۱ کا سنی سبز یا آب کا ہوسنیز یا آب کشنیز سبز ان میں سے جو دستیاب ہو بقدر ایک تولہ لیں۔ روغن گل ایک تولہ کے ساتھ پھول کی تھالی میں ڈال کر سیبہ کے ٹکڑے سے خوب گھسیں۔ جب سیبہ بقدر ماشہ اس میں گھسا جائے اور دوا مثل مرہم کے گاڑھی ہو جائے اس میں سفیدی بیضہ مرغ ایک عدد ملا لیں اور اس میں صاف روئی کا پھایہ آلودہ کر کے مقام ماؤف پر رکھیں۔ اس سے نوراجلن اور درد میں تسکین ہو جاتی ہے اور مرض کی زیادتی رک جاتی ہے (۴) اسی طرح مرہم سفیدہ اور مرہم کانوری کے استعمال سے بھی اس مرض کو بہت فائدہ ہوتا ہے حکیم محمد مومن خان مرحوم صفا تحفۃ المومنین نے اس کی بہت تعریف لکھی ہے۔ صفحہ ۱۳۰ موم سفید ایک تولہ روغن الہی ایک تولہ میں نرم آنچ پر گھلا کر اس میں کافی ماشہ سفیدہ کا شغری منحول ایک تولہ ملا کر خوب حل کریں جب سرد ہونے کے قریب پہنچے تو اس میں سفیدی بیضہ مرغ ایک تولہ ڈال کر خوب ملا لیں۔ اس میں سے بقدر مناسب لے کر صاف روئی کا پھایہ اس میں آلودہ کر کے زخم کی جگہ رکھیں (۵) جب سوزش اور درد میں کسی قدر سکون ہو جائے اور پہلی سی بیتابی نہ ہو تو اس وقت ایمر مومن کا استعمال مفید ہوتا ہے جن سے ورم کا مادہ تحلیل ہو جائے اور عضو ماؤف کی ساخت میں نرمی پیدا ہو۔ جیسا کہ اس غرض کے لئے مرہم رسل یا مرہم داخلیوں کا استعمال کرنا اور پیڑو کے مقام پر مادہ راتیغ وغیرہ لگانا بہت مفید ہوتا ہے نسخہ مرہم داخلیوں۔ تخم میٹھی تخم کنوچہ تخم الہی تخم خلی اسینول مسلم ہر ایک ایک تولہ رات کو پانی میں بھلو کر صبح کو ان کا لعاب گاڑھا چھان لیں مردار سنگ

شیاف ایفون کانوری

نسخہ مرہم کانوری

مرہم داخلیوں

۲ تولہ باریک پسیکر روغن زیت ۴ تولہ میں ڈال کر نرم آئینہ پر دیکھائیں اور کسی چیز سے ہلاتے رہیں تاکہ مردار سنگ تر نشین نہ ہو جائے جب تیل کا رنگ سیاہ ہو جائے اسوقت آئینہ پر سے اتار کر دواؤں کا لعاب اس میں ملائیں اور پھر نرم آئینہ پر اسقدر دیکھائیں کہ مریض کی طرح گارٹھا ہو جائے۔ نسخہ ضماد رائیج - رائیج - تخم میثی - تخم المی - تخم کرنب کلہ - بنفشہ خشک - حب الفار ہر ایک ۵ ماشہ - بابونہ - اکلیل الملک - سدرس خشک - صندل سرخ - ریشہ خطمی - تخم سویہ - کاسنی جگلی - منقر تخم باقلا - گوگل ہر ایک ۴ ماشہ - بیلج کرنب - برگ کرنب ہر ایک ۳۰ ماشہ - انجیر دلائی ۳۰ عدد ان دواؤں میں جو گوند ہیں اور پسینے کے لائق نہیں ہیں انھیں تخم میثی کے جوشاندہ میں حل کر لیں۔ اور انجیر کو شرب ووشاب میں ایک رات دن تر رکھ کر پیس لیں اور باقی خشک دواؤں کو لہایت باریک کوٹ چھان رکھیں اس کے بعد تیل کاتیل - روغن سوسن - مرغابی کی چربی ہر ایک ۴ تولہ موم سفید ۴ تولہ نرم آئینہ پر پھیلا کر اس میں سی ہوئی دواؤں ملا رکھیں اس میں سے قدرے لے کر آب کموہ سنبل میں ملائیں اور پٹیر کے مقام پر لپیٹ کریں (۶) تخم المی - تخم میثی - برگ کرنب - برگ خبازی - برگ سویہ - گل بابونہ - اکلیل الملک وغیرہ کے جوشاندے سے آئینہ کر لیں (۷) ان تمام مقامی تدابیر کے علاوہ دوران علاج میں سریشہ کو چند روز تک صبح کے وقت نفوق شاہترہ اور شام کے وقت لعاب بہدانہ - شیرہ عنب - عرق مرکب مضمی خون - شربت نیلوفر پلایا جائے اس سے خون کی صفائی اور اس کی حدت میں بہت تھپسکین ہو جاتی ہے اور خون کو فاسد کرنے والا مادہ بدن سے خارج ہونے کے قابل ہو جاتا ہے اس کے بعد مطبوخ افیتون یا مطبوخ سنا سے چند بار تنقیہ کرائیں اور تنقیہ کے بعد لعاب بہدانہ والی تبرید ملائیں لیکن اگر یہ تبرید زیادہ مدت تک پلانے کی ضرورت نہ ہو تو لعاب بہدانہ سے معدے میں رطوبت جمع ہو کر ہضم وغیرہ میں خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس میں بجائے بہدانہ کے شیرہ بادیان دیا جاتا ہے ۵ نسخہ نفوق شاہترہ کا یہ ہے - جو ایسے موقع پر نہایت مفید ثابت ہوا ہے - شاہترہ - چرائستہ - سریشہ کہ منڈی - گل نیلوفر - تخم کاسنی - تخم خیاریں ہر ایک ۴ ماشہ - عنب ۵ دانہ پوست ہلیہ زرد تولہ - تمر ہندی ۲ تولہ - سب کو دات کے وقت پانی میں تر کر کے صبح کو ل چھان کر بات سفید حل کریں۔ اور مریشہ کو پلائیں ۵

ضماد رائیج

نسخہ ضماد

نسخہ شاہترہ

مطبوع ایتیمون

بنی

علاوہ

مطبوع

نسخہ مطبوع ایتیمون کا یہ ہے۔ گل بنفشہ۔ گل نیلوفر۔ شاہترہ۔ گل سرخ۔ بسفاج۔ فستقی۔ گل اسطوخودوس ہر ایک ۵ ماشہ۔ مونیرمنقی ۹ دانہ۔ غناب۔ آلو بخارا ہر ایک ۵ دانہ۔ پوست ہلیلہ ندو۔ پوست ہلیلہ کابلی۔ سنار کی ۵ ماشہ۔ ہر ایک ۵ ماشہ۔ تمر ہندی ۲ تولہ سب کورات کے وقت تین پاؤ پانی میں ترکیبیں اور صبح کو نرم آنچ سے اسقدر پکائیں کہ پاؤ سیر پانی باقی رہ جائے اسوقت ایتیمون ۵ ماشہ کی پوٹلی باریک کپڑے میں ڈھیلی باندھ کر ڈالیں اور پچھلے سے اتار کر چاء کی طرح سے دم ہونے میں اور آدھ گھنٹہ کے بعد مل چھان کر نبات سفید ۲ تولہ سے شیریں کر کے مریضہ کو پلائیں۔

مطبوع سنا کا یہ نسخہ بہت اچھا ہے۔ سنار کی ۵ ماشہ۔ کوہ خشک۔ پر سیا و شاں ہر ایک ۵ ماشہ۔ گل بنفشہ۔ گل نیلوفر۔ گل سرخ ہر ایک ۵ ماشہ۔ تخم خطمی۔ تخم کاسنی ہر ایک ۳ ماشہ۔ انجیر ۳ عدد۔ غناب ۵ عدد۔ سیستان ۹ عدد سب کورات کے وقت ڈیڑھ سیر پانی میں ترکیبیں صبح کو نرم آنچ سے اسقدر پکائیں کہ آدھ سیر پانی باقی رہ جائے اسوقت آنچ پر سے اتار کر اس مغز فلوس ۳ تولہ اور ترنجبین ۵ تولہ اضافہ کریں پھر مل چھان کر خمیر بنفشہ ۵ تولہ اس میں حل کر کے مریضہ کو پلائیں نسخہ ضماد۔ جو مادہ دم کو تحلیل کرنے اور درد کے تسکین دینے میں مفید ہے اور تفتیہ کے بعد استعمال کرایا جائے تو اس کا فائدہ فوراً ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر میرا خاندانی مجرب ہے صفتہ برگ۔ کوہ سبز۔ برگ چولائی سبز۔ برگ کشنیز سبز۔ برگ سویہ سبز۔ برگ خطمی سبز۔ پوست خشک تازہ ہر ایک ۲ تولہ باریک پیس کر اس میں روغن گل ۲ تولہ ملائیں اور نیم گرم ضماد کریں نسخہ لٹول۔ تخم خطمی۔ تخم میٹھی۔ تخم اسی۔ گل بابونہ ہر ایک ایک تولہ برگ کرنب سبوس گندم ہر ایک ۲ تولہ سب کو ایک رات دن تک ۲ سیر پانی میں ترکیبیں نرم آنچ سے پکائیں جب ایک تہائی پانی باقی رہ جائے اسوقت چھان کر ۲۰ سیر گرم پانی میں ملائیں اور مریضہ کو چٹ لٹا کر وہ پانی باریک دھار سے مقام اوٹ پر کسی قدر فاصلہ سے گرائیں۔ پانی کی گرمی بقدر برداشت ہوتی چاہئے اور اس عمل کے بعد پانی کی تری کو اسفج یا کپڑے سے خشک کر کے مریضہ کو سرد ہوا سے محفوظ جگہ میں آرام سے بیٹھ رہنے دیں۔

سرطان متفرح۔ اگر خدا نخواستہ سرطان میں زخم ہو گیا ہو تو علاوہ تدابیر مسکنہ و درداور تبرید مذکورہ بالا کے یضما د اور آبرن بہت نافع ہوتا ہے اس کا استعمال بقدر تنقیہ کے کرنا چاہئے۔

صفقتہ ضماو۔ برگ خطمی سبز۔ برگ کرنب سبز۔ برگ مکوه سبز۔ پوست خشتخاش تازہ۔ برگ چولائی تازہ۔  
سب کو باریک پیس کر نیم گرم کریں اور روغن گل اضافہ کر کے ضماو کریں؛  
صفقتہ آبرن۔ برگ خطمی سبز۔ برگ کرنب سبز۔ برگ بنفشہ۔ تخم السی۔ سب کو پانی میں جوش  
دے کر نیم گرم آبرن کریں؛

اگر سرطان سے خون جاری ہو تو گل ارنی۔ سفیدہ رائگ عصارہ نچتہ التیس اور بارتنگ سبز  
کے تپوں کا چوڑا ہوا عرق لے کر سب کو ملائیں اور پچکاری سے رحم کے اندر پہنچائیں؛  
ڈاکٹروں نے ایسے موقع پر اس نسخہ کی بڑی تعریف کی ہے صفقتہ۔ گالک ایسڈ ۲۰ اکریں  
سلفیورک ایسڈ ۱۰ روئے ٹنگ ۵ قطرہ۔ ٹنکچر وارچنی ۱۰ ڈرام شربت خشتخاش ولاتی ایک ڈرام  
پانی ۲۔ اونس۔ یہ ایک خوراک ہے۔ ہر چھ گھنٹہ کے بعد ایسی ایک خوراک دینی چاہئے اور ٹنکچر اسٹیل  
گلیسرین دونوں مساوی لے کر اس میں لنٹ یا صاف روئی تر کر کے دہن رحم پر رکھیں  
ان دونوں نسخوں سے فوراً خون بند ہو جاتا ہے۔

اگر رحم سے متغفن رطوبت یا ریم جاری ہو تو کاربالک ایسڈ ۱۰ ڈرام پانی ۲۰۔ اونس میں ملا کر رحم  
کے اندر پچکاری کریں۔ یا کلورائیڈ آف زنگ ۲۰ گرین پانی ۲۰ اونس میں حل کر کے اس کی پچکاری  
کریں۔ یا ٹیپاسی پر مینگناس ۲۰ گرین سے ۴۰ گرین تک بینل اونس پانی میں حل کر کے پچکاری کریں  
اگر اس پچکاری کے بعد بھی رطوبت متغفنہ رحم سے جاری رہے تو اس وقت مناسب ہے کہ کوئڈ  
لکڑی کا باریک پس کر باریک کپڑے کی پوٹی میں باندھ کر اندام نہانی کے اندر رکھیں تاکہ بالفعل  
بدبو کا آنا متوقف ہو جائے۔ اور مرہم آیوڈوفارم اس وقت بہت نافع ہوتا ہے۔

صفقتہ آیوڈوفارم ایک ڈرام۔ موم روغن یا ویزلین ایک اونس میں ملا کر رکھیں اور اس میں سے  
بقدر ضرورت لے کر اس میں لنٹ یا روئی آلودہ کر کے دہن رحم پر رکھیں اور تسکین درد کے لئے  
کلورل ہائیڈریٹ ۴۰ گرین سے ۳۰ گرین تک آب پودینہ سبز ۲ اونس میں ملا کر رات کو سوتے  
وقت پلائیں تاکہ مریضہ کو نیند آجائے اور دیگر اوقات میں کلا روڈین ۲۵ قطرہ سے ۳۰ قطرہ  
تک۔ پانی ۲ اونس میں ملا کر پلائیں یا یہ نسخہ پلائیں صفقتہ۔ لاکر مارفیا میڈریاٹس ۲۰ قطرہ۔ ٹنکچر  
کلوروفارم کمپونڈ ۳۰ قطرہ۔ ٹنکچر کنس انڈیکار قنب ہندی ۲۰ قطرہ پوڈریکا۔ کنٹھا۔

کمپونڈ انسٹی گرین۔ اسپرٹ ایٹھ سلفیورک۔ ۴۰ قطرہ۔ ایسڈ ہائیڈروسیانک و ایلوٹ ۴۰ قطرہ  
 ٹینکچر ہائیوسامس ایک ڈرام۔ پانی ۱۲ ڈرام سب کو خوب حل کر کے پلائیں۔  
 ان تدابیر کے علاوہ اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ اگر دوران علاج میں قبض کی شکایت ہو  
 تو بذریعہ حقنہ کے تلمین کرائیں اور اگر احتباس بول کی شکایت پیدا ہو جائے تو بذریعہ قاناکا طیر  
 رکے تھڑے کے مریضہ کا پیشاب خارج کرا دیں ۛ

غذا۔ مریضہ کو مقوی زود ہضم اور لطیف غذا دینی چاہئے۔ جیسے دودھ انڈا۔ بخنی۔ شوربا۔ مع  
 ترکاری کے۔ آتش جو مع گوشت کے پکایا ہوا حریرہ مغز بادام۔ و مغز کدو وغیرہ کا۔  
 انجام۔ انجام اس مرض کا اچھا نہیں ہوتا۔ مریضہ کو اس مرض سے نجات ملنا سخت دشوار ہے  
 البتہ معالج اس قدر کر سکتا ہے کہ اگر اچھی تدبیر کرے اور ہمیشہ مرض کے شدائد اور اس کے  
 عوارض کی روک تھام کرتا رہے تو امید ہوتی ہے کہ مریضہ دو سال تک زندہ رہ سکے۔ آخر گوشتید  
 تکالیف اور سیلان مواد سے مریضہ سخت کمزور ہو کر مر جاتی ہے ۛ

فصل مٹھویں۔ اکلکۃ الرحم ریوڈنٹ السرا یہ ایک خاص قسم کا زخم رحم کا ہے جو اکثر فم رحم  
 میں پیدا ہوتا ہے۔ ابتدا میں اس زخم کے کنارے ایسے ناہموار اور دندانہ دار ہوتے ہیں جیسا کہ  
 کسی مقام پر چوہے کے کاٹنے سے اس کے دانتوں کا نشان معلوم ہوا کرتا ہے اسی لئے اس کو  
 انگریزی میں ریوڈنٹ السری یعنی چوہے کے کاٹنے کا ساز زخم کہتے ہیں ۛ

اسباب ۱) یہ مرض اکثر فساد خون سے خصوصاً مادہ آتشکی یا خنازیری سے ہوتا ہے۔  
 ۲) کبھی فساد مٹی سے بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بازاری عورتیں اکثر اس مرض میں  
 مبتلا ہوتی ہیں ۳) بعض مرتبہ حیض کی خرابی سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے جبکہ اس میں  
 کوئی تیزابی خراش دار مادہ مخلوط ہو۔

علامات ۱) اکثر یہ زخم سرخ چمک دار اور خشک بلا درد کے ہوتا ہے ۲) کبھی اس میں قدرے  
 سوزش اور جلن کا سا درد محسوس ہوتا ہے ۳) کبھی زخم کے قریب کا گوشت نرم اور پھولا ہوا  
 ہوتا ہے اور اس میں سے رطوبت سفید یا سرخی مائل خارج ہو اگرتی ہے ۴) یہ زخم روز بروز  
 پھیل کر فم رحم کو گلاتا جاتا ہے یہاں تک کہ چند روز میں جسم رحم تک پہنچ جاتا ہے ۵) اس وقت

مریضہ کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور حیف کا خون بھی معمولی مقدار سے زیادہ جاری ہونے لگتا ہے اس لئے آخر میں مریضہ نہایت لاغر اور ضعیف ہو جاتی ہے :

علاج را تصفیہ خون کی غرض سے نفوع شاہترہ صبح کو اور لعاب بہدانہ شیرہ غناب عرق مرکب شربت نیلوفر شام کو پلاویں (۲) اگر تنقیہ کی ضرورت ہو تو فصد یا مسہل مناسب سے تنقیہ کرائیں (۳) مقامی ادویات میں سے یہ مرہم واسطے تسکین حدت اور جلا و اندمال زخم کے نہایت مفید ہے صفحہ منفر تخم کدو شیریں بریاں ۴ ماشہ منفر تخم تربوز بریاں ۴ ماشہ دم الاخون گلنار ایک ایک ماشہ - توتیا مغسول - برگ حنا - پوست کدو دراز سوختہ ہر ایک ایک ماشہ - سفیدہ قلعی ۲ ماشہ - سب دواؤں کو نہایت باریک پسکر چھان لیں اور موم سفید ۴ ماشہ روغن گل ایک تولہ میں گھلا کر پیسی ہوئی دوائیں اس میں اچھی طرح ملائیں اور مردار سنگ ایک ماشہ قدر سے سرکہ خالص میں گھس کر اس میں مخلوط کریں اس مرہم میں سے بقدر ضرورت لیکر کپڑے یا روئی کی تہی کے ذریعہ زخم کے اندر رکھیں (۴) اگر اس مرہم سے مقام ماؤف میں کچھ سوزش محسوس ہو تو یہ مرہم استعمال کریں صفحہ سفیدہ قلعی - طباشیر ایک ایک تولہ کا فوراً ماشہ ربوت ڈیڑھ ماشہ موم سفید ۴ تولہ - روغن گل ۵ تولہ - سفیدی بیفہ مرغ ایک عدد بدستور مقرر مرہم تیار کر کے استعمال کریں (۵) اگر ان مرہموں سے نفع نہ ہو اور زخم پر قدرے بدگوشت پیدا ہو گیا ہو اور زخم زیادہ نہ پھیل گیا ہو تو اول کا شک نقرہ کے قلم سے یا نائٹریک ایسڈ اسٹریک سے یعنی تیزاب شورہ خالص جو ڈائلیوٹ نہ ہو زخم کو با احتیاط کام جلاویں اس کے بعد ادویہ مدملہ زخم مرہم مذکورہ بالا وغیرہ استعمال کریں۔

طریقہ احتیاط کا یہ ہے کہ اول اندام نہانی کو آلودہ مفتاح الفرج سے کشاودہ کر کے زخم کی حالت ملاحظہ کریں اس کے بعد کا شک مذکور کا قلم لے کر یا تیزاب شورہ کی پھریری ٹھیک زخم کے موقع پر ملیں۔ پھر فوراً زخم کو سرد پانی سے بذریعہ پچکاری کے دھوئیں تاکہ دوا کی سورش میں تسکین ہو جائے اور دوا کا اثر تندرست مقام تک سرایت نہ کر جائے۔

غذا۔ مریضہ کو غذا لطیف مقوی سریع الہضم اور ٹھنڈی دینی چاہئے۔ آتش جو خالص یا گوشت کے ساتھ پکایا ہوا۔ دودھ چاول۔ ٹھنڈی ترکاریاں خالص یا گوشت میں ڈال کر پیوئی مدنی کے ساتھ

مرہم شام گلنار

مرہم سفیدہ قلعی

انجام۔ اگر مرض کی ابتدا میں کام لیا جائے اور تمام تدابیر عمدگی کے ساتھ میسر آئیں تو امید ہوتی ہے کہ مریضہ کو چند روز میں صحت ہو جائے اور اگر مریضہ کی غفلت یا کسی دوسرے سبب سے ابتداء مرض میں علاج نہ ہو سکے اور جب مرض شدت پکڑ کر سارے رحم میں پھیل گیا ہو تو اسوقت علاج نہایت دشوار ہوتا ہے اور مریضہ اکثر شدت مرض کی مصائب اور ضعف سے ہلاک ہو جاتی ہے یا ورم صفاق تک نوبت پہنچ کر اس کی شدائد سے مر جاتی ہے۔

فصل نویں بواسیر رحمہر پائلز آف دی یوٹرس، یہ چھوٹے چھوٹے گول ابھار رحم پر (مثلاً مقعد کے) پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ ابھار لمبے مثل شاہ توت کے ہوتے ہیں ان کو انگریزی میں ”پالی پس آف یوٹرس“ کہتے ہیں؛

اسباب (۱) رحم کی رگوں اور اس کی ساخت میں خون سوداوی غلیظ کثیر المقدار مدت تک جمع رہنے سے اکثر یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے (۲) کبھی احتباس طمث بھی اس کا سبب بنتا ہے (۳) کبھی رحم کی اندرونی جھلی میں خراش ہونے سے اس کی رگوں میں اجتماع خون ہو کر وہ رگیں پھول جاتی ہیں اور جھلی مذکورہ متورم ہو کر بواسیر کی شکل حاصل کر لیتی ہے (۴) کبھی ورم رحم یا خصیۃ الرحم سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے؛

علامات (۱) رحم کے اندر خارش اور تنائو کا سا درد محسوس ہوتا ہے خصوصاً جبکہ بواسیر میں خون کثیر المقدار جمع ہو جائے (۲) اگر بواسیر رحم کے بیرونی جانب ہو تو اندام نہانی کے اندر انگلی داخل کرنے سے محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر رحم کے اندر گہری اور چوڑی غرق رحم کے دی کی آف سرکس یوٹرائی میں ہوتی ہے تو اسوقت اندام نہانی اور رحم کو آلہ سے بخوبی کشادہ کر کے بذریعہ آئینہ کے ملاحظہ کرنے سے ظاہر ہوتی ہے (۳) اکثر بواسیر رحم کا خون حیض کے دنوں میں آئیا کرتا ہے اور افراط طمث کے مشابہ ہوتا ہے۔ لیکن افراط طمث کی حالت میں حیض سے پہلے رحم کی خارش سوزش اور تنائو کا سا درد نہیں ہوتا۔ اور بواسیر رحم کے لئے ضروری ہے کہ سیلان خون سے پہلے یہ تینوں امور پائے جائیں اور اس کے بعد داخل ہو جائیں (۴) سیلان خون کے بعد سفیدی سرخی مائل یا سیاہی مائل رطوبت بواسیر میں سے مترشح ہو کر اکثر اوقات بہتی رہتی ہے (۵) سیلان رطوبت کی حالت میں اور چند روز



تک اس کے بعد تمام عوارض میں خفت رہتی ہے اور جب رطوبت مذکور بند ہو جاتی ہے اور ایام حیض قریب آتے ہیں اس وقت فم رحم میں خارش - سوزش اور تناؤ کا سارہ محسوس ہونے لگتا ہے علاج - اول اصلاح خون کی غرض سے چند روز تک مصفیات خون (مثل نقوع شاہترہ) پلا کر فصد یا مسهل مناسب (مثل مطبوخ اقیقہون) سے تنقیہ کرائیں۔ بعض حالتوں میں تنقیہ کے بعد چون عشبہ ہمراہ عرق عشبہ کے صبح کے وقت اور اطر فیل شاہترہ رات کو سوتے وقت چند روز تک دیا جاتا ہے اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے اس کے علاوہ مقامی ادویات میں سے روغن نرگس یا روغن سوسن بوا سیری مسوں پر لگانے سے وہ بہت جلد خشک اور تحلیل ہو جاتے ہیں اسی طرح ٹانگ ایسٹ اور روغن کوکو سے شایف بنا کر فم رحم میں رکھنا بہت فائدہ کرتا ہے اور اگر زخم ہو گیا ہو تو مرہم سفید آب کا فوری استعمال کریں اور یہ مرہم بھی نہایت مفید ہوتا ہے صفتہ - چاندی کا میل - ہلدی - مردار سنگ ہر ایک ۳ ماشہ لے کر نہایت باریک پسین اور چھان کر رکھیں پھر مرہم سفیدہ ماشہ لے کر روغن خستہ زرد آلو یا شفتالو یا روغن الی آٹھ ماشہ میں کچھ لاکر پی ہونی دوائیں اس میں ملائیں اور اچھی طرح حل کریں جب سرد ہو جائے اس وقت اس میں سے تھوڑا سا لے کر استعمال کریں - یا پلمبائی آئیوڈائیڈ و ہلک اور روغن کوکو سے شایف بنا کر استعمال کریں - اگر بوا سیری ابھار مثل شہ توت کے لمبے ہوں اور ادویہ مذکورہ سے انھیں نفع نہ ہو تو کاسٹک نقرہ کے قلم سے دلخ دیں تاکہ ابھار مذکور جل جائیں -

شایف

طریقہ دافع کا یہ ہے کہ بذریعہ آلہ کے فرج کو کشادہ کریں - آلہ اندر سے قلعی دار ہونا چاہئے تاکہ اس کی روشنی سے بوا سیر کا مقام نمودار ہونے لگے اس وقت کاسٹک کا قلم لیکر اس کو مقام مافٹ پر خوب رگڑیں اس کے بعد روغن گل بذریعہ پھر پری کے لگائیں تاکہ سوزش رفع ہو جائے اور اگر بوا سیر میں خون زیادہ جمع ہونے کے باعث اس میں تناؤ کا سارہ و شدید ہو اور اس کا رنگ سرخ ہو جائے تو ٹنکچر اسٹیل روہے کا مرکب عرق ہے) بذریعہ پھر پری کے مقام مافٹ پر لگائیں فصل دسویں - انشقاق الرحمہ ریچر آف وی یوٹرس، یعنی رحم کا شکاف اور جراحت یہ ایک نہایت خطرناک مرض ہے جس میں رحم کی اندرونی جھلی (میوس میمرین) یا اسکی عضلاتی ساخت پھٹ جاتی ہے اور عرق کے دہانے کھل جانے کے باعث بکثرت خون جاری ہونے لگتا ہے

اور عصبی اذیت کے سبب مریضہ نہایت شدید درد میں مبتلا رہتی ہے :-  
 اسباب را، عسر ولادت یا ولادت محیر طبعی اس مرض کا اکثری سبب ہوتا ہے خصوصاً جبکہ  
 قابلہ ضروری آلات کے استعمال میں احتیاط سے کام نہ لے (۲) مردہ جنین یا آئول رپلا سنٹا  
 کو رحم سے نکلانے میں بے احتیاطی کی جائے (۳) خارجی ضرب رحم پر پہونچے یا عورت پٹ کے  
 بل زمین پر گر پڑے اور اس سے رحم میں چوٹ لگے (۴) دم رحم بوجہ کثرت اجتماع خون کے یا کسی  
 خارجی صدمہ سے یا انحلاط حادہ اور تیز لابی رطوبات کی حدت سے قبل از وقت پھٹ جائے -  
 (۵) عام بدن کی کمزوری اور خشکی کے ساتھ رحم کی ساخت میں خشکی غالب ہو تو رحم میں ادنے  
 سی اذیت پہونچنے سے رحم شقی ہو سکتا ہے +

علامات را، بعد وقوع اسباب مذکورہ بالا کے رحم سے دفعۃً خون بکثرت جاری ہوتا اور  
 رحم میں شدید درد ہوتا۔ اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد در د کے دورے پڑنا رحم کے مشق  
 ہو جانے کی ظاہری علامت ہے (۲) کثرت جریان خون اور شدت درد کے باعث مریضہ بہت  
 ضعیف ہو جاتی ہے (۳) شدت ضعف کے باعث کبھی مریضہ پر غشی اور بیہوشی کی کج حالت  
 طاری ہو جاتی ہے (۴) اگر تشکاف زیادہ نہ ہو تو صرف اسقدر ہوتا ہے کہ پیڑو کے مقام پر دبائے  
 سے مریضہ کو درد معلوم ہوتا ہے اور اگر انگلی یا کوئی دوسری چیز اندام نہانی میں داخل کی جائے  
 تو وہ خون آلودہ نکلتی ہے -

علاج - اگر مریضہ زچہ نہ ہو تو ایسی دوائیں پلائیں جن سے خون کی حدت و رقت کم ہو کر سیدان  
 خون بند ہو جائے جیسے قرص کہربا اور لعاب بہدانہ - شیرہ عناب - شیرہ تخم کاہو منقشر - شیرہ  
 پنج انہبار شربت خشنخاش وغیرہ - اور پوست خشنخاش پانی میں جوش دے کر اسفنج کے ذریعہ سے  
 پیڑو کے مقام پر تکبید کرائیں - اور مار و سبر - گنارہ - افاقید - بسر - سر مہ سیاہ - پھٹکری - کندر  
 منطقی - گل منج - سب کو باریک پیس کر پیڑو کے مقام پر دھما کریں اگر ضرورت ہو تو زنگ سلفا سس  
 اور پھٹکری بریاں ایک ایک اولس - ٹانگ ایسٹرو وائس ایک سیر پانی میں حل کر کے رکھیں اور  
 آگ مفتاح الفرج کے ذریعہ نہایت آہستگی سے قرع کو کشا دہ کر کے نہایت احتیاط کے ساتھ رحم  
 کے اندر اس کی پچکاری کریں اس سے بہت جلد خون بند ہو جاتا ہے اسکے علاوہ کندر دم الاخوین

ضماد جالب دوم

فرض جالب دوم

اندر روت - جوز السرو - مازو سبز کو باریک پس کر بارتنگ سبز کے پانی میں ملا کر اس کا فرجہ کرنا بھی مفید ہے۔ ان تمام تدابیر کے بعد خون بند ہو جائے تو اندمال زخم کے لئے یہ مرہم استعمال کرنا چاہئے۔ صفحہ - مرغ کی چربی - گائے کی نلی کا مغز - موم سفید - روغن بنفشہ - یا روغن گل سب کو پگھلا کر مرہم تیار کریں۔ اور یہ مرہم بھی بہت مفید ہے۔ صفحہ - سفیدہ نانگ - مردار سنگ باریک پس کر موم سفید روغن گل میں پگھلا کر اس میں ملائیں پھر کا فوراً سفیدی بقیہ مرغ کی اضافہ کر کے خوب حل کریں اور اس میں روئی یا لٹا آلودہ کر کے مقام جراحت پر رکھیں مریضہ کو آرام سے نرم بستر پر لیٹی رہنے دیں۔ اس کے بازو چھایتوں - رانوں کو سیلان خون کی حالت میں باندھے رکھیں۔ غذا میں ٹھنڈی ترکاریاں اور دودھ چاول کم شیرینی کے ساتھ دیں۔ آتش جو بھی نہایت مناسب ہوتا ہے اور ضعف کی حالت میں دوا اور غذا کے طور پر تقویات کا استعمال ضروری ہے اگر مریضہ زچہ ہو تو اس کا علاج زچہ خانہ اصول پر کرنا چاہئے۔ ٹھنڈی دوائیں اس کو نہایت مضر ہوتی ہیں اس لئے ان سے اجتناب نہایت ضروری ہے۔ غذا بھی کم از کم ایک ہفتہ تک اکثر حالتوں میں سخت مضر ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں صرف یہی تدبیر کافی ہوتی ہے کہ مریضہ کو بستر نرم پر نہایت آرام سے لٹائیں اور کسی قسم کی حرکت نہ کرنے دیں۔ تسکین درد کے لئے پوست مخشاش کے جو شانہ سے تمکید کریں۔ ایسی تدابیر عمل میں لائیں جن سے رحم سکڑا رہے۔ رحم کے اندر خون جمع نہ ہونے دیں اور حاسات خون بقدر مناسب استعمال کریں۔ اگر شکاف تھوڑا سا ہو تو بے نوزوف اسی تدبیر سے چند روزیں آرام ہو جاتا ہے اور اگر زیادہ ہوتا ہے تو ہتھکاری کرنی پڑتی ہے۔

**فصل گیارھویں قرحہ رحم (یوٹرائن السر) یعنی رحم کا زخم۔** کبھی رحم کے اندر زخم ہو کر اس سے ریم یا کچھ جاری ہو جاتا ہے کثرت سیلان مواد اور درد وغیرہ عوارض کی تکلیف سے مریضہ نہایت ضعیف اور ناتوان ہو جاتی ہے۔ اگر زخم صرف اندرونی سطح پر ہوتا ہے اور زیادہ گہرا نہیں ہوتا تو عوارض اور تکالیف بھی کم ہوتی ہیں اور اگر زخم زیادہ ہو کر رحم کے عضلاتی طبقہ تک پہنچ جاتا ہے تو جلد عوارض اور تکالیف بشت ہوتی ہیں اور رحم کے قرب وجوار والے

مرہم نانگ شفا دار رحم

اعضاء میں درم ہو جاتا ہے۔

**اسباب** (۱) اکثر یہ زخم رحم کے اندر پھنسیوں یا ورم کے پختہ ہو کر پھوٹنے سے پیدا ہو جاتا ہے

(۲) کبھی جراحت اور شگاف رحم کے بعد کبھی زخم ہوتا ہے خصوصاً جبکہ اندامال جراحت کے لئے عمدہ نڈا پیر عمل میں نہ لائی گئی ہوں اور مانع عفونت اشیاء کا استعمال نہ کیا گیا ہو (۳) کبھی سرطان رحم یا اکٹھ رحم سے زخم پیدا ہو جاتے ہیں اس وقت پیپ نہایت متعفن سیاہی مائل جاری ہوتی ہے (۴) کبھی عورتوں کا سوزاک بڑھ کر اندام نہانی سے رحم تک پہنچ جاتا ہے اور رحم کے اندرونی سطح پر سوز کی قروح پیدا ہو جاتے ہیں (۵) کبھی رحم کے اندر آتشکی مادہ سے زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ علامات (۱) پھنسیوں - ورم یا جراحت کا پہلے ہونا اور پیپ پیدا ہونے کے آثار ظاہر ہونا۔ پیپ خارج ہونے سے پہلے تپ اور درد پیس وغیرہ عوارض میں شدت ہونا۔ اس کے بعد رحم سے ریم جاری ہونا قرحہ رحم کی قوی علامت ہے (۲) سرطان رحم کے متفرح ہونے کی علامات کے بعد رحم میں سوزش اور درد شدید ہونا اور سیاہی مائل غلیظ اور متعفن ریم کا جاری ہونا قرحہ سرطانی کا گواہ ہے (۳) سوزاک کے تعدد اور اس کے اشتداد سے قروح کا سوز کی ہونا ثابت ہو سکتا ہے (۴) آتشکی علامات کے وجود سے زخموں کا آتشکی ہونا معلوم ہو سکتا ہے (۵) ان علامات خاصہ کے علاوہ زخم کی عام علامات سے اس کے وجود کا یقین ہو سکتا ہے جیسے سیلان ریم - درد عفونت مقام ماؤف - تپ خفیف مع درد سر - ہر وقت مریضہ کی کمر - پٹلیوں رانوں میں درد محسوس ہونا (۶) ان علامات کے علاوہ مریضہ روز بروز لاغر اور ضعیف ہوتی جاتی ہے بھوک بہت کم اور ہضم ضعیف ہو جاتا ہے (۷) حیض بے قاعدہ آتا ہے کبھی ایک آدھ روز اگر بند ہو جاتا ہے اور کبھی چند روز تک بکثرت خون جاری رہتا ہے۔

علاج - رحم کے زخم خواہ کیسے ہی سادہ اور کسی خاص قسم کی سمیت سے بالکل معرا ہی کیوں نہ ہوں لیکن ان کے علاج میں عام طور پر خون کی اصلاح اور تسکین حدت ضروری ہے اس سے عموماً زخموں کا اندامال آسانی اور سرعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لئے مریضہ کو اس کے مزاج کے موافق مصفیات خون اور مبررات مسکنہ کا استعمال کرائیں چنانچہ اگر مریضہ جوان اور گرم مزاج ہو تو نقوع شاہترہ گل نیلوفر اور شربت نیلوفر کے ساتھ صبح کو اور لعاب بہدانہ شیرہ عذاب عرق مرکب مصفی خون شام کو پلائیں اور اگر مریضہ کا مزاج زیادہ گرم نہ ہو تو صرف نقوع شاہترہ یا عرق عشبہ وغیرہ مصفیات کا استعمال کرائیں اگر تنقیہ کی ضرورت ہو تو قصد یا سہل مناسب تنقیہ کرائیں بعض حالتوں میں خاص

مقام موقوف اور اس کے قرب و جوار سے خون کم کرنے کے لئے مریضہ کے پیروی یا کرم یا خاص رحم پر جو نکلیں لگانا بھی رہا اتفاق رائے یونانی اطباء اور ڈاکٹروں کے بہتر علاج سمجھا جاتا ہے۔ غذا بھی لطیف سرخی الہضم اور ایسی ہونی چاہئے جس سے عمدہ صاف اور ستھرا خون پیدا ہو۔ جیسے بکری کا گوشت اور سبز ترکاریاں گیہوں کی روٹی دودھ چاول۔ آتش جو۔ مونگ کی دال وغیرہ۔ ضعف کی حالت میں انڈے کی زردی اور گوشت کی بخنی مناسب ہے۔ ان عام تدابیر کے علاوہ مقامی ادویات کا استعمال بھی اندمال قروح کے لئے ایک بڑا رکن اور اہم امور میں سے ہے۔ چنانچہ اگر زخم بالکل سادہ اور کسی خاص قسم کی سمیت سے خالی ہوں تو پہلے بخم الہی اور شہد کے جوشاندہ سے زخموں کو بذریعہ پککاری کے صاف کریں اور اگر قرحہ سرطانی ہو تو اس کے تصفیہ اور تسکین سوزش و درد کے لئے شہد اور دودھ کی پککاری یا آتش جو اور شہد کی پککاری نہایت مفید ہوتی ہے اور اگر درد شدید ہو تو پککاری کی دواؤں میں قدرے افیون اور زعفران بھی شامل کرنا پڑتا ہے اور اگر بدبو دار مواد مثل گوشت کے دھوؤں کے زخم سے بہتا ہو تو پوست انار۔ گلاب۔ کرمازج۔ جب الاس۔ جفت بلوط۔ مسور۔ چاول بقدر مناسب لے کر پانی میں جوش دیں اور صاف کر کے اس میں روغن گل ملا کر زخم کے اندر حقنہ کریں۔ اگر زخم سوزاک کا ہو تو اس کے لئے توتیا اور پٹھری کے پانی سے پککاری کرنا مناسب ہوتا ہے۔ اور آتشکی زخموں کے لئے برگ نیب کے جوشاندہ سے پککاری کرنا بہتر ہے۔ پھر تصفیہ قروح کے بعد اندمال قروح کے لئے مناسب مرہموں کا استعمال بذریعہ بتی کے زخموں پر کرنا ضروری بات ہے۔ جیسا کہ مرہم باسلیقون یا مرہم خل وغیرہ۔ یہ اسوقت ہے جبکہ زخم کم زخم کے قریب ہو اور مرہم بذریعہ بتی کے وہاں تک پہنچ سکتا ہو اور اگر زخم رحم کی تجلیف میں اس قدر اندر ہو کہ مرہم بذریعہ بتی کے وہاں تک پہنچانا دشوار ہو تو ادویات مدللہ قروح کو قیق کیس کے بذریعہ پککاری کے رات دن میں چند بار زخم کے اندر پہنچانا چاہئے۔ نسخہ مرہم باسلیقون۔ زفت رومی۔ راتینج ہر ایک پونے چار تولہ۔ بہروزہ خشک ۷ ماشہ۔ سب کو بایک پیسکر روغن زیت بقدر حاجت میں ملائیں اور استعمال کریں۔

نسخہ مرہم خل۔ مردار سنگ ایک تولہ باریک پیسکر موم سفید ایک تولہ اور روغن گل ۷ تولہ میں ملائیں اور قدرے سرکہ خالص اس میں حل کر کے استعمال کریں۔ اگر زخم متعفن اور میلا ہو تو چند روز میں

اس کے استعمال سے مندرجہ ہو جاتا ہے۔ اگر زخم بوجہ سوزاک یا آتشک کے ہوں تو ان کا علاج ان اصول پر کیا جائے جو ان امراض کے بیان میں بتائے گئے ہیں۔

**فصل بارہویں انسداد رحم الرحمہ** راٹرے سیا آف دی آس یوٹری ایجی رحم کا منہ بند ہو جانا۔ اگر کسی سبب سے رحم کے منہ کا سوراخ بند ہو جاتا ہے تو اگرچہ اس عورت کے ساتھ جماع کرنے میں کوئی دشواری یا تکلیف نہیں ہوتی ہے لیکن مرد کا مادہ منویہ رحم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے اور بعد جماع کے وہ اندام نہانی سے بہ کر نکل جاتا ہے اس لئے بیجاری عورت حاملہ نہیں ہو سکتی اور ہمیشہ کے لئے اولاد کو ترستی رہتی ہے اسی طرح سے حیض کا معمولی خون ہر مہینہ پر اس کے رحم میں جمع رہتا ہے جس کے باعث احتباس حیض کے متعلق تمام شکایتیں پائی جاتی ہیں۔

**اسباب** را کوئی غلیظ اور چپکاؤ دار مادہ رحم کے اندر آ کر منجمد ہو جائے (۲) رحم کے اندر کوئی ریشہ دار ساخت پیدا ہو کر اسے بند کر دے (۳) رحم کے اندر کسی سبب سے زخم پیدا ہو گئے ہوں اور اندام کے وقت رحم باکل بند ہو جائے (۴) رحم کے اندر گوشت زائدا یا رسولی پیدا ہو کر اسے بالکل بند کر دے۔

**علامات** را قابلہ اندام نہانی میں انگلی داخل کر کے معلوم کر سکتی ہے (۲) آہ مفتاح الفرج کے ذریعہ سے پورے طور پر اس کی تصدیق ہو سکتی ہے (۳) رحم کے اندر حیض کا خون رکنا رہنے سے عورت کو تکلیف اور احتباس حیض کی دیگر شکایات موجود ہوتی ہیں (۴) گزشتہ حالات کے دریافت کرنے سے مرض کے اسباب کا بخوبی پتہ چل سکتا ہے۔

**علاج**۔ اس مرض کے سبب کو تلاش کر کے اس کے موافق علاج کرنا چاہئے مثلاً اگر کوئی چپکاؤ دار گاڑھا مادہ رحم کے سوراخ میں جمع ہو کر وہاں منجمد ہو گیا ہو تو اس کو گھیلانے اور صاف کرنے کے لئے ایسی دوائیں بطور فرج کے استعمال کریں جن میں جلا اور صفائی کرنے کی تاثیر موجود ہو اور سوزش پیدا نہ کریں۔ اس غرض کے لئے فرج چند روز استعمال کرنے سے بہت منصفی ہوتا ہے صفتہ۔ شہد خالص ۲ تولہ۔ گائے کا دودھ ۵ تولہ۔ زعفران باریک پسا ہوا اور ماشہ ہلدی نیم کوفتہ ۳ ماشہ۔ سب کو نرم آچ پر خوب پکائیں جب گاڑھا ہو جائے ہلدی کو اس میں سے نکال کر اس میں صاف روئی کی بٹی آلودہ کر کے رحم کے منہ میں رکھیں اسی طرح جو اگلا اور

موزین مشق کا فریضہ بھی مفید ہے۔ اور ملک لاہوری۔ شہد خالص۔ گائے کے مسکین ملا کر فریضہ کھانے سے بھی نفع ہوتا ہے۔

اگر رحم کے منہ میں گوشت زائد پیدا ہونے سے اس کا سوراخ بند ہو گیا ہو تو مرہم رنگار بند ریجہ ہتی کے رکھیں یا دستکاری سے گوشت زائد کو علیحدہ کر کے زخم کا علاج مناسب مرہموں سے کریں۔ اسی طرح اگر اندال زخم کے سبب رحم کا منہ بند ہو گیا ہو تو اس کا علاج بھی بند ریجہ دستکاری کے کیا جاتا ہے ۛ

**فصل تیسرے میں سیلان رحم** ریوٹرائن یورکیوریا، یہ ایک مشہور عارضہ ہے جس میں اکثر عورتیں مبتلا ہوتی ہیں ان کے رحم سے غیر معمولی رطوبت سفید لیسدار ہمیشہ جاری رہتی ہے اور وہ بہت ناتوان ہو جاتی ہیں۔ اکثر کمزور و درویش ہوتا ہے۔ بھوک بہت کم لگتی اور ہضم خراب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ فی الواقع یہ کوئی مستقل مرض نہیں ہے بلکہ اکثر تو رحم کی اندرونی جھلی میں ورم فرمن ہونے سے لاحق ہوتا ہے اور کبھی بوا سیر رحم کے سبب ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو چند ضروری فوائد کی غرض سے جدا گانہ بیان کرنا مناسب سمجھا ہے (۱) ورم فرمن غشاء اندرونی رحم کی حالت میں چونکہ مریضہ کو رحم کے اندر کوئی درو یا سوزش وغیرہ عوارضات کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس لئے وہ قائلہ سے یا طبیعت صرف سیلان رطوبت کے متعلق چارہ جوئی کرتی ہے اور بعض ناواقف طبیب بھی مریضہ کے حسب درخواست محض رطوبت کو خشک کرنے والی اور سیلان کو روکنے والی ادویات استعمال کرتے اور اکثر معالجہ میں ناکام میاب رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عارضہ باوجود مستقل مرض نہ ہونے کے ایسا دیر پا اور مشکل سے زوال پذیر ہونے کے باعث بذات خود اپنے خاص نام (سیلان رحم) سے عام طور پر مشہور ہو گیا ہے (۲) اکثر عورات کو سیلان ہتی کی شکایت ہوتی ہے جو سیلان رطوبت کے ساتھ مشابہ ہے۔ اس لئے قابلہ کو ان دونوں مرضوں کے درمیان فرق معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ طبیعت سے بیان کرنے میں غلطی نہ کر سکے۔

(۳) سیلان رطوبت فرج اور سیلان رحم کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔

(۴) بوا سیر رحم کی حالت میں جو رطوبت جاری ہوتی ہے اس میں اور سیلان رحم والی رطوبت میں بھی فرق کرنا لازم ہے ۛ

سیلان رحم کے علاج میں ناکامی کی وجہ

۵) بثور رحم و سرطان الرحم و قروح رحم کی حالت میں جو رطوبت بہتی ہے اس میں اور سیلان رحم میں بھی امتیاز کرنا ضروری ہے اس لئے اب ہم ان علامتوں کو بیان کرتے ہیں جن سے مرض سیلان الرحم کی تشخیص پورے طور پر ہو سکے گی اور اس میں اور دیگر امراض مذکورہ میں بخوبی فرق کیا جاسکے گا۔

علامات فاروقہ یہ ہیں (۱) منی سفید زردی مائل - غلیظ - بے غفونت ہوتی ہے اور سیلان رحم والی رطوبت سفید رقیق یا قدرے گاڑھی اور متعفن ہوتی ہے۔ رطوبت سائلہ اکثر یا مہیض کے قرب وجوار میں بکثرت خارج ہوتی ہے اور اس کے دیگر لوازم مثل درد و غیرہ بھی اسی وقت بشدت ہوتے ہیں اور سیلان رحم میں مہیض کو اکثر ضعف ہضم و قبض کی شکایت رہتی ہے اور بھوک بہت کم لگتی ہے بخلاف سیلان منی کے اس مرض میں مہیض کو سواضع عام بدن اور درد کم کے مذکورہ بالا شکایتوں میں سے کوئی زیادہ نہیں ہوتی (۲) سیلان فرج اور سیلان رحم میں یہ فرق ہے کہ فرج سے بہنے والی رطوبت سفید اور غلیظ ہوتی ہے اور سیلان رحم والی رطوبت رقیق ہوتی ہے (۳) بواسیر رحم کی حالت میں بہنے والی رطوبت سرخی مائل یا سیاہی مائل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بواسیر کی دیگر علامات موجود ہوتی ہیں اور سیلان رحم کی رطوبت سفید رقیق ہوتی ہے اور بواسیری علامات موجود نہیں ہوتی ہیں (۴) بثور رحم سے مترشح ہونیوالی رطوبت بہت تھوڑی اور زردی مائل یا سرخی مائل رقیق مع سوزش و خارش رحم کے ہوتی ہے بخلاف سیلان رحم کے کہ اس کی رطوبت کثیر المقدار اور سفید ہوتی ہے اور سوزش رحم خارش وغیرہ عوارض بثور کا وجود اس کے ساتھ نہیں ہوتا (۵) سرطان رحم سے بہنے والی رطوبت رقیق مثل گوشت کے دھوؤں کے یا سیاہ مثل گاد کے اور سخت متعفن مع درد شدید کے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دیگر علامات سرطانی موجود ہوتی ہیں بخلاف سیلان رحم کے کہ اس میں کوئی ایسی شدید تکلیف نہیں پائی جاتی (۶) قرحہ رحم سے بہنے والی ریم اور سیلان رحم والی رطوبت میں یہ فرق ہے کہ سیلان رحم کی حالت میں کوئی علامت قرحہ کی موجود نہیں ہوتی اور قرحہ سے بہنے والی ریم اکثر سفید گاڑھی اور زیادہ متعفن مع قدرے درد رحم کے ہوتی ہے بخلاف سیلان رحم کے کہ اس میں یہ امور موجود نہیں ہوتے :



علاج اگرچہ سیلان رحم کا علاج تیسری فصل میں بیاں ہو چکا ہے لیکن بعض مجرب نسخے اس موقع پر بھی لکھے جاتے ہیں۔ مسفوف نافع سیلان رحم۔ مغز تخم تمر ہندی کو نیل و رخت ڈھاک کو نیل و رخت کیکر۔ صندل سفید مصطکی۔ گل سرخ ایک ایک تولہ نبات سفید ۱۰ تولہ سب کو باریک پیسکر مسفوف بنائیں اور اس میں سے بقدر ۷ ماشہ لیکر گائے کے دودھ کے ساتھ بھانک لیا کریں۔ ایضاً مجربات شریفیہ میں سے ہے گل ہر فری۔ کبریا شمع چھ ماشہ لیکر نہایت باریک پیس لیں اس میں سے بقدر نصف ماشہ کے لیکر انڈے کی زردی نیم برشت میں ملا کر صبح و شام کھالیا کریں۔ ایضاً۔ تج۔ گل پستہ۔ گوکھرو۔ گوند ڈھاک۔ مجیٹھ۔ ہر ایک ۳ ماشہ کوٹ چھانکر سب کے برابر چکی کھانڈ ملا کر مسفوف بنائیں اس میں سے بقدر ۳ ماشہ لیکر تازہ پانی کے ساتھ بھانک لیا کریں۔ اگر بد مزہ معلوم ہو تو اس میں ہموزن مونگ بھنی ہوئی کا آٹا ملا لیں۔

ضماد۔ سیلان رحم۔ قشار کندر۔ زیرہ سیاہ۔ پوست انار ہر ایک چھ ماشہ کوٹ چھان کر انار کے سببہتوں کے عرف میں ملا کر پیڑ و اور پشت کے مقام پر ضا د کریں۔ ایضاً چھال کچال چھال مولسری۔ مازو بخت بلوط۔ ماین خورد۔ پوست انار۔ پوست کیکر چھ ماشہ کوٹ چھان کر پوست انار کے جوشاندے میں ملا کر ضا د کریں

حمول مانع سیلان رحم۔ مازو سبز تخم حماض۔ ہر ایک ۷ ماشہ۔ جوز المسرو خبث الہدید مدبر ہر ایک ساڑھے تین ماشہ نہایت باریک پیس کر نگاہ رکھیں اور خبث بلوط۔ گلنار تین تین ماشہ کے جوشاندے میں کپڑا کر کے اس میں مخلوط کر کے اندام نہانی میں رکھیں۔ ایضاً۔ اقا قیا۔ گلنار۔ مازو سبز۔ سک دودو ماشہ۔ بالچھڑ۔ پٹنگری بریاں ایک ایک ماشہ کوٹ چھان کر بد ریخہ پوٹی کے اندام نہانی میں رکھیں ۲

فصل چودھویں۔ سیلان منی۔ مردوں کی طرح عورتوں کی منی بھی کبھی ان کی نثر گاہ سے بے موقع بہنے لگتی ہے۔

۱۴۵ اس نسخہ میں خبث الہدید ہے اور ڈاکڑوں نے مرکبات آہن کے استعمال کو مرض سیلان رحم میں سخت مضر بتایا ہے اسکے متعلق میلر خیال ہے کہ غالباً اس نسخہ کے دوسرے اجزاء اس کیلئے مصطلح ہوتے ہیں یا نسخہ سیلان رحم کی اس قسم کو نفع کرنا ہو جو عام بدن کی کمزوری یا ضعف مجددہ کے باعث لاحق ہو سکتی ہے مولف۔

سیلان رحم کے چند تجربات

سیلان منی کے چند تجربات

اسباب - عام بدن کی کمزوری - گردوں - رحم خصیۃ الرحم کا قعق - اچھی غذا کا نہ ملنا مدت تک رنج و غم کے صدقات میں مبتلا رہنا۔

علامات - بدن کی لاغری - کمر میں درد ہونا - دل دھڑکنا - سر میں درد ہونا - کسل حرکات بھوک کم لگنا - ضعف ہضم۔

علاج - مریضہ کو متقویٰ اور زود ہضم غذا کھلائیں اور یہ سفوف نہایت محرب اور مفید ہے۔  
صفقتہ - ستاور - موچرس - گوکھرو - تال مکھانا - مجیٹھ - نرگجور - موصلی سیاہ - پھلی لیکر ہمدہ لکڑی - ست گلو - دانہ الاچی خورد - طباشیر - ثعلب مصری - تخم خنشاں سفید - گوند لیکر کثیرا قلعی کشتہ - ہر ایک ۴ ماشہ - صندل سفید - گوند صاک - ہر ایک ۵ ماشہ تخم خرفہ ۹ ماشہ - کوٹ چھان کر سب کے برابر شکر سفید ملا کر سفوف بنائیں اس میں سے بقدر ۷ ماشہ لیکر ہمراہ گائے کے دودھ کے پھانک لیا کریں - ایفما ستاور - موچرس - گوکھرو - پھلی لیکر تال مکھانا - تخم سروالی - سنگھاڑہ خشک - مجیٹھ - چھال سینھل - چھال مولسری - نرگجور - کندر موصلی سفید - موصلی سیاہ - کنزازج - سمندر موکھ - ناگر موٹھ - سورنجان - طباشیر - ہر ایک ۴ ماشہ سب کو جدا جدا کوٹ چھان کر سب کے برابر شکر سفید ملا کر سفوف بنائیں اور اس میں سے بقدر سات ماشہ لیکر ہمراہ دودھ گائے تازہ کے پھانک لیا کریں - زیادہ سرد اور ترش چیزوں سے اور تیل - گڑ - تیز مرچ سے پرہیز کریں

فصل پنجم ہوں - اجتماع الرطوبة فی الرحم یا استسقاء الرحم یعنی رحم کے جوف میں پانی کا جمع ہونا - رحم کے اندر بعض مرتبہ فضلی رطوبات استقدر کثیر المقدار جمع ہو جاتی ہیں کہ رحم ان سے پر ہو کر بہت بڑھ جاتا ہے اور مریضہ کا پیٹ مثل استسقاء رزقی کے ہو جاتا ہے - پہلے احتباس میض ہوتا ہے - اس کے بعد پیٹ کے مقام پر ابھار محسوس ہونے لگتا ہے - آخر کار جب رحم کے اندر زیادہ رطوبت بھر جاتی ہے اسوقت رحم رفتہ رفتہ جوف عانہ سے جوف شکم کی جانب اونچا ہونے لگتا ہے اس حالت سے خود مریضہ اور دوسرے اشخاص کو حمل کا خیال گذرتا ہے - اس کے بعد شکم کی کلائی استقدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ جیسی مریض استسقاء رزقی میں ہوتی ہے - مریضہ ضعیف ہو جاتی ہے سانس کئے لگتا ہے۔

بھوک اور منہم خراب ہو جاتا ہے۔ معدہ انتوں خصوصاً رحم کے اندر بکثرت ریاح کی پیدائش اور دور درمی کے دورے بشدت ہونے لگتے ہیں۔ کبھی خود بخود یا علاج کرنے سے متعفن طوبت رحم سے بہ کر مریضہ کی حالت رو بصحت ہو جاتی ہے۔ کبھی تشخیص مرض اور علاج کامل نہ ہو سکے کے باعث مریضہ کی حالت روز بروز خراب ہوتی جاتی ہے اور شدت ضعف و عسر تنفس کی تکلیف اور اعضا کو غذائہ پہنچنے کے باعث مریضہ ہلاک ہو جاتی ہے۔

اسباب (۱) رحم کی ساخت اور اس کی اندرونی تھیلی میں رواج احتباس حیض کے اجتماع خون ہو کر اس سے رطوبت (آب خون یا سیرم) مترشح ہونے لگتی ہے۔ اگر گرم رحم کسی سبب سے سکڑ جائے اور وہ رطوبت رحم کے اندر جمع ہوتی رہے تو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے (۲) خون میں طوبت کی زیادتی اور مزاج کا بلغمی ہونا (۳) رحم کی قوت دافعہ کا نہایت ضعیف ہونا (۴) حرارت غریزی اور قوت بدنی کا ضعف (۵) جگر اور گردوں کے فعل کی خرابی سے خون میں مائیت کی زیادتی ہونا۔

علامات (۱) احتباس حیض کے بعد پیڑو کے مقام پر ابھارا اور رحم کے اندر امتلائی نقل پایا جاتا ہے (۲) دم رحم کی علامات موجود نہیں ہوتیں (۳) مریضہ کی حرکت کے ساتھ رحم کے اندر پانی کی حرکت محسوس ہوتی ہے (۴) باوجود گزرنے مدت کے رحم کے اندر بچہ کی حرکت محسوس نہیں ہوتی اور نہ مریضہ کے پستان پر کوئی علامت حل کی نمودار ہوتی ہے (۵) اس مرض میں شکم کی کلانی اسکے زیرین حصے سے شروع ہو کر اوپر کی جانب بڑھتی ہے اور استسقاء میں شکم کا بڑھنا جگر اور ناف کے گرد سے شروع ہوتا ہے (۶) باوجود جلد شکم میں تناؤ ہونے کے اس میں پانی کی چمک محسوس نہیں ہوتی جیسی کہ مرض استسقاء میں ہوتی ہے (۷) مریضہ کو ابتداء مرض سے پیشاب بکثرت اور بار بار بلا سوزش کے آتا ہے۔

علاج۔ چونکہ اس مرض کا ابتدائی سبب احتباس حیض ہوتا ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ سب سے پہلے احتباس حیض کے اسباب دریافت کر کے ان کے موافق اجراء حیض کی تدابیر عمل میں لائی جائیں اور چونکہ اکثر احتباس کا سبب خون کا غلیظ ہونا بوجہ غلبہ بلغمیت یا سوداویت کے ہوتا ہے اس لئے مناسب ہے کہ تعین سبب کر کے تفتیح عام بدن اور عضو خاص رحم کا کرایا جائے۔ اور جو رطوبات محتبسہ رحم کے اندر موجود ہوں ان کے اخراج و تحلیل و تخفیف کی تدبیر کی جائے۔

اور آئندہ ان کی پیدائش کو روکنے کے لئے مقویات رحم کا استعمال کھانے پینے کے علاوہ مقامی ادویات کے طور پر بھی کرایا جائے۔ ان تمام تدابیر کے علاوہ یہ ضاد واسطے تحلیل اور خشک کرنے رطوبات کے مجرب اور سریع التأثير ہے۔ صفتہ۔ بالچٹر۔ سمندر جھاگ۔ سونٹھ۔ ترمس۔ زیرہ سیاہ ہر ایک ۶ ماشہ۔ بورہ ارمی خاکستر ہرن کی مینگنیوں کی خاکستر بکری کی مینگنیوں کی ہر ایک ایک تولہ۔ افیون خالص ایک ماشہ۔ سب کو ہرے دھنیے کے عرق میں پیس کر قدرے سرکہ اضافہ کر کے نیم گرم ضاد کریں ایضاً بکری کی مینگنیوں کی راکھ جنگلی ایلے کی راکھ۔ انگور کی لکڑیوں کی راکھ ایک ایک تولہ۔ بورہ ارمی۔ گندھک چھ ماشہ۔ سب کو باریک پس کر پانی میں ملا کر قدرے سرکہ خالص اضافہ کر کے نیم گرم ضاد کریں اور کنگی سفید کا حمول کرنا واسطے اخراج رطوبت رحم کے بہت نافع ہے ایضاً۔ باڈرنک۔ سمندر جھاگ ایک ایک ماشہ۔ بہرہ خشک۔ نیک لاسوری دو دو ماشہ باریک پیس کر تین پوٹلیاں بنائیں ان میں سے ایک فم رحم کے نیچے اور دوسرے دونوں طرف رکھیں۔ اسی طرح معجون کندر اور دوا اللک کھانا مسکیم علی گیلانی نے بہت مفید بتایا ہے۔ اور اگر مریض زیادہ ضعیف نہ ہو تو قدرے ریاضت اور تپ کرنا بہت سودمند ہوتا ہے۔ غذا مریضہ کو ایسی دینی چاہئے جس سے بلغم زیادہ پیدا نہ ہو اور موجودہ رطوبت خشک ہونے لگے جیسے بھنا ہوا گوشت۔ کباب وغیرہ ۶

ضاد محل رطوبات رحم

نسخہ زجری رحم

فصل سولہویں۔ نفخة الرحمہ رفانی سومٹرا یعنی رحم کے اندر ہوا بھر جانے سے اسکا پھول جانا۔ اس مرض کو انگریزی میں ”کنیریس ڈس مشن آف یوٹرس“ یعنی رحم کا بڑھ جانا ہوا بھرنے سے بھی کہتے ہیں کیونکہ اس مرض میں رحم کے اندر بکثرت ریا ح پیدا ہو کر اسکا سفدر پھلا دیتی ہیں کہ مریضہ کو اور دوسرے دیکھنے والوں کو شکم کے بڑھ جانے سے حمل یا استسقا طبعی کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ اس حالت میں مریضہ کو رحم کے اندر جنین کا سا ثقل تو محسوس نہیں ہوتا لیکن جب ریا ح حرکت کرتی ہیں وہ حرکت مثل حرکت جنین کے معلوم ہو کرتی ہے۔ اور جب ابتلا ریا ح سے رحم زیادہ پھول کر اپنے اصلی مقام سے اوپر کو بڑھتا اور جوف شکم کا جال ہے اسوقت شکم اور سینے کے عضلات میں کچا وٹ پڑنے سے مریضہ کو سانس مشکل آتا ہے اور شکم کے اندر دنی اعضا پر دباؤ پڑنے سے ان کو ضرر پہنچتا ہے مثلاً گردوں پر دباؤ پڑنے سے ان میں

پیشاب کی پیدائش کم ہو جاتی ہے اور مثانہ پر دباؤ پڑنے سے مریضہ کو پیشاب مشکل سے اور بار بار آتا ہے۔ اسی طرح معائنہ مستقیم پر دباؤ پڑنے سے براز بند شواری اور مڑوڑ کے ساتھ آیا کرتا ہے اور اس حالت میں عورت حاملہ نہیں ہو سکتی اور اگر حاملہ کو یہ مرض لاحق ہو تو اسقاط حل ہو جاتا ہے ۴

**اسباب (۱)** اس مرض کا بڑا سبب رحم کی کمزوری ہے جس کے باعث وہ فضلات کو اچھی طرح دفع نہیں کر سکتا (۲) ضعف حرارت غریزہ کیونکہ ایسی حالت میں جو غذا رحم کے لئے پہنچتی ہے اس میں حرارت غریزہ پر پورے طور پر تصرف کرنے اور اس کو مفہم کرانے سے قاصر رہتی ہے اسلئے رتج پیدا ہو کر تجویف رحم کے اندر بند رہتی ہے (۳) اگر پیدائش جنین کا مادہ رحم کے اندر پہنچ کر خاص اپنی خرابی یا رحم کی خرابی سے یا کسی دوسرے سبب سے فاسد اور متعفن ہو جائے اور وہ رحم سے خارج نہ ہو سکے تو اس سے فاسد بخارات پیدا ہو کر غلیظ ریا ح بن جاتے ہیں (۴) اسقاط حل کے بعد اگر کوئی جبروتیہ کار رحم کے اندر باقی رہ جائے اور خارج نہ ہو تو وہ رحم کے اندر متعفن ہو جاتا ہے اور اس سے ریا ح پیدا ہو کر اس مرض کو پیدا کرتی ہیں (۵) اسی طرح حیض یا نفاس کا خون رحم کے اندر اگر جمع ہو کر متعفن ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ریا ح پیدا ہو جاتی ہیں (۶) رحم کی اندرونی جھلی میں اگر ورم مزمن ہو جائے اور کسی وجہ سے فم رحم بند ہو جائے تو اس حالت میں رحم کی اندرونی جھلی سے رطوبت مترشح ہو کر وہاں جمع ہو جاتی ہے۔ اور متعفن ہو کر مرض مذکور کا باعث ہوتی ہے (۷) نفاح استیاء کے کھانے سے بھی کبھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے یا اس میں زیادتی ہو جاتی ہے ۵

**علامات (۱)** پیڑو کے مقام پر ابھار محسوس ہوتا ہے جو ترقی کر کے شکم تک پہنچ جاتا ہے اور مریضہ کی پستان میں درد پیدا ہو جاتا ہے (۲) ابھار کے مقام پر انگلیوں کی ضرب لگانے پر رپکشن سے ڈھول کی سی آواز آتی ہے۔ یہ آواز ایسی ٹھوس نہیں ہوتی کہ جیسی حمل کی حالت میں ٹھونکنے سے آتی ہے (۳) باوجود کلائی شکم اور تناؤ کے مریضہ کو رحم کے اندر ثقل حل کا سا نہیں معلوم ہوتا (۴) اگر اندام نہانی میں انگلی داخل کر کے فم رحم تک پہنچائی جائے اور دوسرے ہاتھ سے رحم کو اوپر اُدھر اور نیچے کو دبایا جائے تو رسولی کی طرح رحم کی حرکت محسوس ہوتی ہے (۵) مریضہ کو شکم اور جگساہ تک تناؤ کا درد محسوس ہوتا ہے (۶) کبھی ریا ح کی حرکت سے رحم میں درد شدید

ہوتا ہے جو مریضہ کو بیتاب کر دیتا ہے (۷) نفاخ چیزوں کے استعمال سے مرض میں ترقی اور تکلیف میں شدت ہو جاتی ہے (۸) اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جماع کے وقت رحم سے ہوا کے خارج ہونے کی آواز آتی ہے (۹) رحم میں جب رت کی زیادہ مقدار جمع ہو جاتی ہے تو اکثر سامنے کو جھکنے سے یا اجابت کے وقت زور لگانے سے یا چھینکنے یا کھانسنے اور قے کرنے سے ایک بلند آواز کے ساتھ اندام نہانی کے راہ بہت سی رت خارج ہو جاتی ہے :

علاج (۱۰) اگر مریضہ کو زیادہ تکلیف ہو تو سب سے بہتر اور فی الفور نفع دینے والا علاج تو یہ ہے کہ بخول دار سلائی رٹروکار جو خاص اسی غرض سے بنایا گیا ہے کو فم رحم کے اندر داخل کر کے مریضہ کو کسی دوا وغیرہ کے ذریعہ سے چھینک لانیکی تدبیر کریں۔ اگر وہ سلائی موجود نہ ہو تو بجائے اس کے رٹروکار کا قانا طپر کے تھے ٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں (۱۱) روغن تارپین۔ روغن سداب۔ روغن سویہ۔ ان میں سے جو دستیاب ہو سکے نیم گرم کر کے بقدر ضرورت لیکر پیڑ اور پشت کے مقام پر ملا کریں اور آہستہ آہستہ ملیں (۱۲) گڑ بچہ والا ضماد بھی شدت درد کے وقت نہایت سریع المنفعت ہوتا ہے صفقتہ۔ گڑ بچہ ۲ تولہ۔ ناکیسر ایک تولہ تخم سویہ زیرہ سیاہ ہر ایک ہاشمہ۔ سب کو باریک پیس کر شیشی میں رکھیں اور ضرورت کے وقت اس میں سے ایک تولہ لیکر پانی میں گھول لیں اور نیم گرم کر کے ضماد کریں (۱۳) اسی طرح روغن تارپین رٹروکار ٹامن آئل پندرہ یا بیس قطرہ پودینہ سبز کا پانی ۲ تولہ ملا کر پلانا بھی مفید ہوتا ہے (۱۴) سہاگہ۔ ارکٹ۔ دونوں کو چند مرتبہ پلانے سے رحم کے عضلی طبقہ پر خاص تحریک ہوتی ہے جس سے فم رحم کشادہ ہو کر اس کے اندر جو فضلات ہوتے ہیں وہ سب اچھی طرح سے خارج ہو جاتے ہیں (۱۵) یہ جمول بھی ریح رحم کو بہت جلد کلیل اور خارج کر دیتا ہے صفقتہ بادیان۔ انیسون۔ تخم کرفس۔ برگ سداب۔ سختہ۔ ہر ایک ۳ ماشہ لیکر سب کو نہایت ہلکے پیس لیں اور شہد خالص ایک تولہ گرم کر کے پسی ہوئی دوائیں اس میں ملا لیں اور چھو بار سے کی گٹھلی کے برابر لمبی تپی بنا کر اندام نہانی کے اندر فم رحم میں رکھ دیں۔

(۱۶) نسخہ آبرزن۔ نافع نفخہ الرحم و محلل ریح۔ صفقتہ۔ گل بابونہ۔ اکیل الملک۔ بالچھڑ۔ تخم سداب۔ تخم سویہ۔ مرزنجوش۔ ناکیسر۔ زیرہ سیاہ۔ اجوان دیسی۔ پودینہ خشک ایک

ضماد گڑ بچہ والا

جمول محلل بادیان آبرزن محلل ریح

ایک تولہ کھاری نمک ۳ تولہ سب کو ۱۰ اسیر پانی میں جوش دیکر صاف کر لیں اور جب نیم گرم بقدر برداشت طبیعت کے رہے اسوقت کسی بڑے ٹپ میں ڈال کر اس میں بیس یا پچیس اسیر گرم پانی ڈال دیں اور مرلیضہ کو اس میں بٹھائیں (۸) اس کے بعد مرلیضہ کا بدن خشک کر کے یہ تکمید کر لیں تو بہت جلد نفع ہوگا۔ صفتہ - سونٹھ - اجوائن - گہوں کی بھوسی ہر ایک ۷ ماشہ - کھاری نمک ایک تولہ سب کو نیم کوفتہ کر کے دو پوٹلیاں بنائیں اور تولے پر گرم کر کے سینک کریں (۹) پینے کے لئے یہ نسخہ بہت نافع ہے صفتہ - جوارش کمونی سات ماشہ ہمراہ شیرہ بادیان - شیرہ تخم کٹوٹ - شیرہ انیسوں - شیرہ تخم کرفس ہر ایک ۳ ماشہ عرق بادیان ۸ تولہ عرق الاچی ۳ تولہ گلقدہ ۲ تولہ - اسی طرح پیپرمنٹ بقدر ۴ چاول پان میں رکھ کر کھلانا بھی مفید ہے۔

ان تمام تدابیر کے علاوہ ایسی تدابیر بھی نہایت ضروری ہیں جن سے رحم کا تنقیہ ہو کر اس کی ساخت میں قوت پیدا ہو جائے تاکہ پھر اس میں ریاہ پیدا نہ ہونے پائیں۔ اس غرض کے لئے یہ سفوف اور جوشاندہ نہایت مفید ہے صفتہ سفوف - پودینہ خشک - بادیان - ہر ایک ۳ ماشہ - مرڈارید - عاقرقرہ ہر ایک ۴ ماشہ - زرنباہ - تخم کرفس - دوج ترکی - درخ عقرنی - جائفل - پیل - دارچینی - الاچی خورد ہر ایک ۷ ماشہ - سونٹھ - مصطلی ہر ایک دس ماشہ - کوٹ چھان کر سب کے برابر شکر سفید ملا کر سفوف بنائیں۔ خوراک ۷ ماشہ سے ۹ ماشہ تک ہے۔ صفتہ جوشاندہ - بائرننگ اہل - تخم کرفس - زرنباہ - اصل السوس منقشر - سونٹھ - سیاہ دانہ - مغز تخم کڑھرا ایک ۳ ماشہ - شہد خالص ۲ تولہ تین پاؤ پانی میں جوش دیں جب ایک ثلث پانی باقی رہ جائے اسوقت صاف کر کے مرلیضہ کو پلائیں۔

اگر مرلیضہ کا مزاج گرم ہو یا موسم شدت گرمی کا ہو تو بجائے نسخہ مذکورہ بالا کے یہ نسخہ مناسب ہوتا ہے صفتہ - تخم خلی - تخم خرپڑہ - بادیان ہر ایک ۷ ماشہ - انیسوں - ساوج ہندی - چھڑیلہ ہر ایک ۳ ماشہ - نبات سفید ۲ تولہ بدستور مذکورہ بالا لپکا کر پلانا چاہئے۔

اگر یہ دونوں جوشاندے موافق نہ آئیں اور ان سے گرمی کی شکایت پیدا ہو تو مارا اصول مع روغن بیدانجیر کے نہایت مفید ہوتا ہے صفتہ - بچ کاسنی - بچ بادیان اصل السوس تخم کرفس - بچ کبریتین تین ماشہ - نبات سفید ۲ تولہ بدستور مقرر جوش دے کر پلائیں۔

نسخہ

سفوف تقوی رحم

جوشاندہ تقوی رحم


نسخہ مارا اصول

یہ جوارش بھی واسطے تحلیل ریاح رحم کے مفید ہے صفتہ - زرنباو - درونج عقربی جائیفل  
الایچی خورد - الایچی کلاں ملونگ اجوان - سونٹھ - تخم کرفس ہر ایک چھ ماشہ - زیرہ سسرک  
میں مدبر کیا ہوا دس ماشہ چند بیدستر ڈیڑھ ماشہ - سب کو کوٹ چھان کر شہد خالص ۱۱ تولہ  
میں ملا لیں - خوراک ساڑھے چار ماشہ ہے ۛ

غذا - گوشت روٹی - قلیہ - کباب دال ارہر مع گرم مصالح کے اور نفارخ چیزوں سے  
پرہیز کرنا لازم ہے ۛ

**فصل سترہویں انقلاب الرحم** (انورشن آف دی یوٹرس) یعنی الٹ جانا رحم کا  
یہ ایک بڑا سخت حادثہ ہے جس سے نہایت خوفناک عوارض پیدا ہوتے ہیں اور اکثر مرلیفہ  
ہلاک ہو جاتی ہیں حقیقت اس مرض کی یہ ہے کہ کسی خارجی صدمہ سے یا قرب والے اعضاء کے  
دباؤ سے یا وضع حمل کے وقت قابلہ کی بے احتیاطی سے جبکہ رحم بہت کشادہ ہو تو قاع الرحم  
رفٹس (چہار طرف سے سمٹ کر اور الٹ کر) رحم کے حلقہ میں سے باہر کی طرف آجاتا ہے اور  
رحم کا اندونی سطح جو اس کی تجلیف میں ہوتا ہے پلٹ کر اندام نہانی کے اندر ایک نرم رسولی کی  
طرح گول محسوس ہونے لگتا ہے اور فم رحم غائب ہو جاتا ہے - جیسا کہ درزی کسی پھیلی کو سینے کے  
بعد الٹ دیتا ہے لیکن کبھی تو رحم کی اندرونی جھلی ڈھیلی ہو کر اس کے عضلاتی طبق سے علیحدہ ہو جاتی  
اور صرف مہی باہر کو پلٹ آتی ہے اور کبھی رحم کا تمام جسم الٹ آتا ہے ایسی حالت میں یا تو رحم  
کے رباطات پہلے ہی سے ڈھیلے ہوتے ہیں یا وہ نہایت شدت سے

(نصیر شہزادہ - انقلاب الرحم - پہلا درجہ)



کچھ ہوئے ہوتے ہیں - یا شدت تناؤ کے باعث  
ٹوٹ جاتے ہیں ۛ

مراتب کئی اور زیادتی کے اعتبار سے اس مرض  
کے چار درجے ہیں -

پہلا درجہ اس درجہ میں رحم کا الٹا ہوا حصہ رحم  
کی گردن (سرکوس یوٹرائی) تک آجاتا ہے اور گردن  
کاجوف بہت پھیل جاتا ہے اس درجہ میں






اندام نہانی کے اندر انگلی داخل کرنے سے انقلاب معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔

دوسرا درجہ۔ اس درجہ میں رحم کا اٹا ہوا حصہ رحم کی گردن سے تجاوز کر کے فم رحم کے حلقہ میں آ جاتا ہے اور اندام نہانی میں انگلی داخل کرنے سے فم رحم ہو کر مثل حلقہ کے محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور اس حلقہ میں رحم کا اٹا ہوا حصہ پھنسا ہوا معلوم ہوتا ہے تیسرا درجہ۔ اس درجہ میں رحم کا تمام حجم الٹ کر اور فم رحم کے وسیع حلقہ میں سے نکل کر اندام نہانی کے اندر آ جاتا ہے

اور اندام نہانی بہت پھیل جاتا ہے اسوقت فم رحم بالکل غائب ہو جاتا ہے اور اگر اٹے ہوئے رحم اور اندام نہانی کے درمیان انگلی یا سلائی داخل کی جائے تو فم رحم اور اندام نہانی کی حد مشترک تک پہنچ کر وہ رک جاتی ہے اس سے آگے نہیں جاسکتی۔

چوتھا درجہ۔ اس کے علاوہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رحم پلٹ کر اندام نہانی سے بالکل باہر نکل آتا ہے اور جب یہ عرصہ تک باہر لٹکا رہتا ہے تو اکثر بیرونی ہوا کے اثر سے خشک اور سخت ہو جاتا ہے اور کپڑے وغیرہ کی رگڑ سے اس میں زخم بھی ہو جاتے ہیں کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اٹے ہوئے رحم پر سکی گردن سخت دباؤ پڑنے سے رحم کی ساخت مروار پڑ جاتی ہے۔



اقسام۔ اسباب کے لحاظ سے اس مرض کی دو قسمیں ہیں جن کو ہم مع اسباب علامات و علاج کے جداگانہ بیان کرتے ہیں۔

پہلی قسم وہ ہے جو دفعۃً لاحق ہوتی ہے یہ قسم نہایت خطرناک اور سخت تکلیف دینے والی ہوتی ہے اور اکثر رچہ پن کی حالت میں واقع ہوتی ہے۔

اسباب۔ عموماً اس کے دو سبب ہوتے ہیں را رحم کا تشنج قوی۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت جب رحم کا منہ اچھی طرح کھلا ہوا اور اس کا حلقہ خوب پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت رحم کو اخراج جنین کے لئے جس قدر سکڑنا چاہئے تھا اگر اس اندازہ سے زیادہ شدت اور قوت کے ساتھ رحم میں تشنج ہو جائے تو رحم دفعۃً الٹ کر بچہ کے ساتھ فم رحم کے وسیع حلقہ میں سے باہر نکل آتا ہے اور اندام نہانی کے اندر انگلی داخل کرنے سے گول اور نرم رسولی کی طرح محسوس ہوا کرتا ہے ایسی حالت میں رحم کے رباطات کی کشش اور صفاق البطن رپڑی ٹوٹی ام کا اسکے ساتھ تعلق قائم رہنا اس کو اندام نہانی اور فرج کے راہ بالکل باہر آ جانے سے روکتا ہے (دیکھو تصویر نمبر ۲۴ صفحہ ۱۱۹) اور اگر صفاق البطن جرم رحم سے علیحدہ ہو جائے اور اس کے رباطات ٹوٹ جائیں یا مرض کے تندر توج واقع ہونے کی حالت میں وہ رباطات رفتہ رفتہ بہت ڈھیلے ہو جائیں تو رحم اندام نہانی سے بالکل باہر آ سکتا ہے (دیکھو تصویر نمبر ۲۴ صفحہ ۱۱۹) لیکن اگر یہ تغیر شدید اور حادثہ عظیم دفعۃً واقع ہو جائے تو اس حالت میں مریضہ شدت درد کے باعث فوراً ہلاک ہو جاتی ہے اور کسی تدبیر کا موقع نہیں ملتا یا تدبیر بے سود ہو جاتی ہے۔

(۲) اخراج مشیمہ رپلا سنٹا وغیرہ کے وقت قابلہ کی عجلت اور بے موقع حرکت بھی گاہے انقلاب الرحم کا سبب ہو جاتی ہے اور یہ ایسے موقع پر ہوتا ہے جبکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد مشیمہ کے بطور خود خارج ہونے میں معمول سے زیادہ تاخیر ہو جائے اور مشیمہ کا تعلق رحم کے ساتھ پورے طور پر باقی ہو۔ اس وقت جاہل اور نادان قابلہ مشیمہ کے اخراج میں نامناسب جلدی کرے اور بدستی سے اس کو کھینچ لے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مشیمہ کے ساتھ رحم کا تمام جسم پلٹ کر اندام نہانی کے اندر آ جاتا ہے جیسا کہ مندرجہ بالا تصویروں میں دکھایا گیا ہے۔ کیونکہ جس طرح مشیمہ کا عارضی تعلق رحم کی اندرونی جھلی کے ساتھ ہوتا ہے اس سے زیادہ قوی وہ قلعی




مذکورہ بالا قدرے خفت کے ساتھ پائے جا یا کرتے ہیں۔

علاج تشخیص مرض کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو انقلاب کو بذریعہ دستکاری کے درست کر کے رحم کو اس کے اصلی مقام پر پہنچانا چاہئے۔ کیونکہ رحم کی یہ انقلابی حالت جس قدر مدت تک باقی رہتی ہے اس مدت تک مریضہ کو سخت تکلیف میں مبتلا رہنے کے علاوہ علاج میں دشواری ہوتی ہے اس لئے کہ بعد انقلاب کے جس قدر مدت گزرتی جاتی ہے اسی قدر رحم کا حلقہ سکڑ کر تنگ ہو جاتا اور الٹا ہوا رحم سخت ہوتا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں رحم کے انقلاب کو درست کر کے اس کے اصلی مقام پر پہنچانا ایک تو خود معالج کو بہت مشکل ہوتا ہے دوسرے مریضہ ادھر تو تکالیف مرض سے بچپن ہوتی ہے ادھر عمل دستکاری سے اس کی تکلیف استفردو بالا ہو جاتی ہے کہ مریضہ ایسے ضعف کی حالت میں ہرگز اس کی تاب نہیں لاسکتی اس لئے مجبوراً مریضہ کو بیہوشی کی دوا رکلو و فارم (سنگھا کر دستکاری کرنی پڑتی ہے اگرچہ ایسی نازک رشتہ ضعف کی حالت میں بیہوشی کی دوا سنگھانا خطرہ سے خالی نہیں لیکن مجبوراً معالج کو احتیاط کے ساتھ اس کا کرنا ہی پڑتا ہے۔

طریقہ دستکاری کا یہ ہے کہ مریضہ کو نرم بستر پر آرام سے چت لٹائیں اسکے پیروں کو موڑ کر گھٹنے اسی طرح کھڑے کریں کہ دونوں رانوں کے درمیان کچھ فاصلہ رہے اس وقت قابلہ کو چاہئے کہ مریضہ کے پیروں کی طرف بیٹھ کر ایک ہاتھ سے اس کے پیڑ کو دبائے تاکہ رحم کے رباطات کا تناؤ کم ہو جائے اور رحم کو اوپر چڑھانے کے وقت وہ اپنے اصلی مقام سے اونچا نہ چڑھ جائے پھر دوسرے ہاتھ اور انگلیوں کو اوپر رحم کو روغن گل یا روغن چنبیلی سے خوب چکنا کر کے اپنے ہاتھ کی بند مٹھی سے رحم کے درمیانی حصہ کو نہایت ہوشیاری کے ساتھ اوپر کی طرف دھکیلیے۔

دیکھو تصویر نمبر ۴۶ و ۴۷ صفحہ ۱۵۶ پر



رحم کو اوپر کی طرف چڑھاتے وقت قابلہ کو چار باتوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہئے (۱) سب سے پہلے اسے اپنے ہاتھ کسی مانع عقونٹ رانٹی سپ ٹک، عرق سے اچھی طرح دھو لینے چاہئیں (۲) رحم کو چڑھاتے وقت قابلہ کے ناخن سے رحم کے سطح پر خراش یا کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے (۳) رحم کو چڑھاتے وقت قابلہ کو جوف عانہ کرپوس کے محور کا خیال رکھنا لازم ہے تاکہ رحم بلا مزاحمت اعضاء مجاورہ کے ٹھیک اپنے اصلی مقام پر پہنچ سکے (۴) جب رحم کا انتہائی حصہ (فڈس) درونی نم رحم کے حلقہ میں سے گزر کر اوپر چڑھ جائے تو پہلے ایک جانب کی قاذف نالی (دنی پونی ان ٹیب) کے سوراخ کے پاس ایک انگلی یا دو انگلیوں سے دباؤ ڈال کر رحم کے ایک گوشہ کو اس کی جگہ پر قائم کرنا چاہئے۔ پھر اسی طرح دوسری جانب کی قاذف نالی کے سوراخ کے پاس انگلی کا دباؤ ڈال کر دوسرے گوشہ کو بھی اس کی جگہ پر قائم کرنا چاہئے۔

تدبیر بعد دستکاری۔ اسکے بعد جب رحم کے اپنے اصلی مقام پر پہنچ جانے کا اطمینان ہو رہے طور پر ہو جائے تو صاف روئی کی نرم گدی روغن گل اور قدرے گلاب میں تر کر کے اندام نہانی کے اندر رکھیں اور شمرگاہ کے اوپر دوسری گدی رکھ کر لنگوٹ کی طرح پیٹی باندھ دیں اور مریضہ کے سرین کو نرم تکیہ سے اونچا کر کے اس کو ایک رات دن رچو بیس گھنٹہ تک ایک حالت

۱۵ اگر ایک یا دو قطرے کار مالک آئل کے بھی اس میں شامل کر لئے جائیں تو بہتر ہوگا۔ ۱۲ مؤلف

میں جت لیٹی رہنے دیں اور اس مدت میں مریضہ کا پیشاب دو تین مرتبہ باذریعہ قاتا طیسر رکے تختے ٹر کے نکال دیں اور تیمار داروں کو تاکید رہے کہ مریضہ کو اپنی کسی سروری حاجت کیلئے خفیف سی حرکت بھی کرنے کا موقع نہ دیں۔ اس کے تمام حوائج کو اسی حالت میں پورا کر دیں کیونکہ ایسی حالت میں خفیف سی حرکت بھی مریضہ کے لئے مضر ہوتی ہے۔

طیب کو چاہئے کہ وہ ایسی تدبیر بھی عمل میں لائے جس سے مریضہ کو اتفاقاً چھینکنے یا ہچکی وغیرہ کا موقع پیش نہ آنے پائے۔ مریضہ کے پاس خوشبودار چیزیں اور عطر موجود رہے رفع درو کے لئے مناسب اشیاء سے تمکید کرانا بھی بہتر ہے۔ اور تقویت کے لئے جواہر مہرہ یا حب جواہر خمیرہ گاو زبان میں دنیا مناسب ہے۔ ڈاکٹر لوگ ایسے موقع پر ایضہ کی پچکاری جلد کے نیچے دیتے یا قدرے برا نڈی ہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایسی تدبیر عمل میں لائی جائیں جن سے مریضہ کو نیند آجائے تو نہایت مناسب ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ مریضہ کو ایسی حالت میں غذا دینا یونانی اطباء کے نزدیک سخت مضر ہے۔ دوا اور غذا کے بجائے معمولی کاڑھا دینا چاہئے اور پلانے یا ضا د کرنے یا تمکید کرنے کی ادویات میں کوئی ایسی چیز ہرگز شامل نہ کی جائے جس سے ان فضلات کے رک جانے کا احتمال ہو جو بعد وضع محل کے زچہ کے بدن سے قدرتی طور پر خارج ہو کر تے ہیں کیونکہ ان کے رک جانے (احتباس نفاس) سے اکثر شدید اور مہلک امراض کے وقوع کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ ان امور کو مدنظر رکھنے کے علاوہ اکثر خالتوں میں کسی دوسری تدبیر کی ضرورت نہیں ہوتی اور مریضہ کی حالت وقتاً فوقتاً رو بصحت ہوتی جاتی ہے پھر دوسرے دن پٹی کو آہستگی کے ساتھ کھول کر اندام نہائی کے اندر سے گدی کو نکالیں اور رحم کے اندر لگ کر کچھ منجھنوں یا فضلات نفاس کا حصہ موجود ہو تو اس کو بذریعہ پچکاری کے دھو کر دوسری گدی رکھ کر بدستور سابق پٹی سے کس دیں۔

پھر تیسرے دن ایسا ہی کریں۔ اس کے بعد مریضہ کو شراب میں یا کسی دوسرے مناسب آبن میں بٹھائیں اور شپت وعاء پر قابض و مقوی اعصاب اشیاء کا ضا د کریں۔ اور جب تک رحم کے اپنے مقام پر مستحکم ہو جانے کا یقین کامل نہ ہو جائے اس وقت تک مریضہ کو چلنے پھرنے سے منع کر دیں اور ایسی تدبیر عمل میں کہ مریضہ کو اجابت نرم ہوتی رہے۔

جلد کے نیچے پچکاری

غذا نرم۔ مقوی۔ اوزر و مضہم ہونی چاہئے۔


دوسری قسم۔ انقلاب الرحم کی وہ ہے جو رفتہ رفتہ لاحق ہوتی ہے۔ اور جب تک انقلاب زیادہ نہ ہو جائے اسوقت تک مریضہ کہ درد شدید یا کوئی دوسری سخت شکایت اور خوفناک علامت ظاہر نہیں ہوتی۔

اسباب۔ (۱) رحم کی رسوبی۔ اگر رحم کے بالائی حصہ (فندس) میں رسوبی پیدا ہو جائے تو جس طرح وہ رحم کے بیرونی سطح پر پھیلتی ہے اور باہر کی طرف بڑھ کر قریب والے احشاء (مثلاً ذی امعاء وغیرہ) کو دباتی اور اپنے لئے جگہ لیتی ہے۔ اسی طرح وہ خاص رحم کی ساخت کو بھی اس کی تجویف کی جانب دباتی ہے اور اگر رحم کی اندرونی بھلی (میوکیس میمرین) میں پیدا ہو تو اس کے

بوجھ سے رحم کا فڈس تجولیف رحم کی طرف دے  
لکتاب۔ (دیکھو تصویر نمبر ۴۸)

غرض یہ ہے کہ رحم کی رسوائی خواہ بیرونی جانب ہو یا اندر کی طرف ہو جس قدر وہ بڑھتی جاتی ہے اسی قدر رحم کا فائدہ بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کے تجلّی فی رحم میں داخل ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ رحم کا اللہ ہوا حصہ ورونی فہم رحم تک آپہنچتا ہے۔

یہ انقلاب الرحم کا پہلا درجہ ہے روکیٹوں تصور دیگر اہم  
صفحہ ۱۵۲ پر انھیں صریح رسولی اور بھی زیادہ



۲) شکم کے اندر فضلات برازی کثیر المقدار کا اجتماع یا ریاخ غلیظہ کا احتیاس - اگر کم بضم کو اکثر قبض شکم اور احتیاس ریاخ کی شکایت رہتی ہو خصوصاً جبکہ اس کا جم کسی وجہ سے کمزور اور

اس کے رباطات ڈھیٹے ہوں تو فضلات یا ریاح کے رحم پر اکثر دباؤ ڈالنے اور اس کو وقتاً فوقتاً دھکیلنے سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔

(۳) رحم کے رباطات ڈھیٹے ہونے اور کمزور ہونے کی حالت میں اگر مریضہ کو بوجھ اٹھانے یا کودنے کا اتفاق پڑے یا وہ اکثر کسی سخت محنت یا حرکت کرنے میں مصروف رہتی ہو تو وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتی ہے۔


علامات ۱) اگر اس مرض کا سبب رسولی ہو تو سب سے پہلے مریضہ کو شکم اور پیٹرو کے مقام پر بے چینی اور قدرے بوجھ اور تناؤ کا سادہ محسوس ہوگا (۲) پھر جب قدر رسولی بڑھتی جائے گی اسی قدر پیٹرو کے مقام پر ابھار اور قدرے سختی محسوس ہوگی (۳) اگر مرض کا سبب کثرت ریاح اور قبض دائمی ہو تو اس کا تقدم بھی ایک ضروری اور ظاہری علامات ہے (۴) اگر مرض کا سبب رباطات کا ڈھیٹلا اور کمزور ہونا اور مریضہ کی محنت ہو تو علامات غلبہ رطوبت کا موجود ہونا اور مریضہ کا اکثر محنت شاقہ میں مبتلا رہنا اس کا گواہ ہوگا (۵) جب فم رحم کا معتدبہ حصہ منقلب ہو جاتا ہے تو ان علامتوں کے علاوہ خاص مرض کے متعلق علامات بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ چنانچہ مریضہ کو پیٹرو اور جگکاسہ میں کھنچاؤ کا سادہ محسوس ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے پیٹرو میں سے باہر کو نکلی پڑتی ہے (۶) پہلے مریضہ کی کمر سے سرین تک اور پھر رانوں سے پنڈلیوں تک درد ہوتا ہے اور مریضہ کھڑی نہیں ہو سکتی اور نہ مطلق چل پھر سکتی ہے (۷) اندام نہانی کے اندر انگلی داخل کرنے سے انقلاب الرحم اور اس کا درجہ بخوبی معلوم ہو سکتا ہے علاج - رحم کی رسولی کا علاج ابتداء میں تو محلل ادویات سے ممکن ہے۔ لیکن ایک نوبہ کہ جب تک رسولی کی مقدار زیادہ بڑھ نہیں جاتی اس وقت تک مرض کی تشخیص ہی بہت مشکل ہوتی ہے دوسرے یہ کہ رسولی عمق بدن میں گہری واقع ہوتی ہے۔ اس لئے مقامی ادویات کا اثر پورے طور پر نہیں ہو سکتا۔ پھر جب رسولی بڑھ کر انقلاب الرحم تک پہنچتی ہے تو اکثر علاج بالدرء و خصوصاً مقامی ادویات سے، محض بے سود ثابت ہوتا ہے۔ البتہ اگر ممکن ہو تو ایسی حالت میں دستکاری کے طفیل مرض سے نجات ملنے کی کچھ توقع کی جاسکتی ہے لیکن ایسے نازک مواقع پر دستکاری کرنا نہایت دشوار امر ہے کیونکہ ایسی دستکاریوں (ہائی اپریشینز) کے لئے جو



شرائط ضروری ہیں اور دستکاری کے بعد جو احتیاطیں لازمی ہیں اکثر حالتوں میں ان کا بہم پہنچنا سخت دشوار ہے۔


یہ حال چاہے علاج کیسے ہی شکل کیوں نہ ہو یا کامیابی کی طرف سے کیسی ہی یا پھر کیوں نہ ہو پھر بھی مریضہ کی جان بچانے کے لئے کچھ نہ کچھ تدبیر ضروری کی جاتی ہے۔ چنانچہ ابتدا میں تحلیل رسولی کے لئے یہ نہایت مفید اور صاحب خلاصہ کا مجرب ہے صمغہ ہلدی، سیاہ گہوار ہلدی، تینوں مساوی کے کر نہایت باریک پس میں اور اس میں سے قدرے لیکر ٹھیکوڑ کے گھسنے پر رکھ کر اور گرم کر کے رسولی کے مقام پر باندھیں۔ ایضاً لگروندہ کے تازے پتے روغن گل سے چرب کر کے اور گرم کر کے باندھیں ایک یا دو ہفتہ میں رسولی تحلیل ہو جاتی ہے۔

ضماد شیریش بھی رسولی اور ورم صلب کو تحلیل کرنے میں یار ہا کا مجرب ہے اس کا نسخہ صفحہ ۱۲۳ پر درج ہے اور اگر انقلاب الرحم قبض شکم و احتباس ریاح کے سبب سے ہو تو ادویات رافع قبض و کاسر ریاح کا استعمال مدت تک کرائیں اور کثرت رطوبات کی حالت میں ایسی دوائیں مفید ہوتی ہیں جن سے بلغم کی پیدائش میں کمی ہو جائے اور موجودہ مادہ خشک ہو جائے اور اگر ضرورت بھی جائے تو منفع بلغم چند روز پلا کر بند کر دینا چاہیے۔ ان تدابیر کے علاوہ انقلاب کو بند راجہ و دستکاری کے درست کریں جیسا کہ قسم اول میں بیان کیا گیا ہے۔



قدر، نیچے کو پھسل کر اندام تنہائی کے اندر نظر گاہ کے ظاہری حصہ سے نہایت قریب آ جاتا ہے

اور کبھی اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ رحم اندام نہانی سے بالکل باہر نکل آتا ہے اس وقت اس مرض کو عربی میں تنور الرحم یا خروج الرحم اور انگریزی میں رپر پلپ سس یوٹرائی کہتے ہیں۔




اسباب ۱) اکثر رطوبات کے باعث رحم کے باطات کا ڈھیلا ہو جانا اور جرم رحم کا حصول کرزم ہو جانا۔ اسی لئے یہ مرض اکثر بڑھی عورتوں کو ہوتا ہے (۲) کثرت جماع یا کثرت ولادت کے باعث رحم کا ضعیف ہو جانا (۳) بیٹھ کر ہمیشتری کا اکثر اتفاق ہونا۔ کیونکہ جماع کے وقت عموماً رحم قدرے نیچے کی طرف مائل ہو جاتا ہے خصوصاً جبکہ عورت بیٹھ کر شوہر سے مقاربت کرتی ہے تو اس وقت حرکات جماعی ثقل رحم حصول لذت۔ یہ ایسے امور ہیں جو رحم کو

نیچے کی طرف معمول سے زیادہ مائل ہونے پر معین ہوتے ہیں۔ پھر جب ایک مدت تک اسی طریقہ پر جماع کیا جائے تو رحم اپنے اصلی مقام سے نیچے کو پھسل آتا ہے (۴) بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً عورت اگر اپنے بستر پر سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگے اور امور خانہ داری میں مصروف ہو جائے تو اس سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اندام نہانی کا معمول سے زیادہ فراخ ہونا۔ رحم کا ضعف اور اس کے رباطات کا ڈھیلا ہونا اس مرض کے موجب ہوتے ہیں (۵) رحم کے رباطات رواج کثرت رطوبات کے اڑھیلا ہونے کی حالت میں اگر عورت کو زیادہ چلنے پھرنے۔ کودنے۔ دوڑنے۔ بوجھ اٹھانے۔ کونٹھنے۔ یا زور سے چھینکنے کا اتفاق پڑے تو اس وقت بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے (۶) کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رحم کی گردن بوجہ دم یا بواسیر کے طویل ہو کر پہلے اندام نہانی کے اندر نیچے کو ٹٹک آتی ہے اور اس سبب سے مرض خروج الرحم لاحق ہو جاتا ہے۔

علامات ۱) مریضہ کو اپنی کمر اور سرین سے رانوں اور پٹیلیوں تک درو کچاؤ کا محسوس ہوا کرتا ہے ۲) اگر رحم اپنے مقام سے پھسل کر اندام نہانی میں آ گیا ہو تو عورت کو جماع کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر رحم شمرنگاہ کے قریب یا بالکل باہر آ گیا ہو تو مطلق جماع نہیں کیا جاسکتا ۳) مریضہ کی شمرنگاہ سے سفید رطوبت یا پانی بکثرت جاری رہتا ہے ۴) ایام حیض میں خون بکثرت جاری ہوتا ہے ۵) جب رحم شمرنگاہ سے بالکل باہر نکل آتا ہے تو مریضہ کو کھڑا ہونا اور چلنا پھرنا سخت دشوار ہوتا ہے ۶) کپڑے کی دائمی رگڑ سے کبھی رحم پر خراش یا درم ہو جاتا ہے اور گاہے رحم ہو جانے تک بھی نوبت پہنچتی ہے۔ (دیکھو تصویر نمبر ۵۱)


(تصویر نمبر ۵۱ خروج الرحم کی)




علاج۔ سب سے پہلے مریضہ کے امعاء کو فضلات برازی سے بذریعہ حقنہ کے صاف کریں اور مثانہ کو پیشاب سے بذریعہ فانتا طیبر کے تھڑے کے خالی کریں۔ تاکہ دستکاری کے وقت رحم کو اس کے مقام پر پہنچانے میں سہولت ہو جائے۔ اس کے بعد مریضہ کو نرم بستر پر جت لٹا کر اس کے گھٹنے کھڑے اور رانیں ایک دوسرے سے فاصلہ پر رکھیں۔ پھر قابلہ کو چاہئے کہ اپنے ہاتھوں کو روعن گل یا روعن جنیلی سے چکنا کر کے اور چند قطرے روعن مذکور سے رحم کو بھی چکنا کر کے اس کو ہوشیاری کے ساتھ اصلی مقام پر پہنچائے اور جب رحم اپنے مقام پر

پہنچ جائے تو باریک کپڑے یا روئی کی گدی روغن گل میں تر کر کے اندام نہانی کے اندر رکھو  
اور اس کے اوپر سے دوسری خشک گدی شمر گاہ کے اوپر رکھکر لنگوٹ کی طرح پٹی سے کس دے  
اور مریضہ کو کم سے کم چوبیس گھنٹے تک اسی طرح بستر پر لیٹے رہنے کی تاکید کرنی چاہئے :

(تصویر نمبر ۵۲ و ۵۳)





(تصویر نمبر ۵۴ پے سی ری ہاتھ میں پکڑی ہے)




اور اگر بجائے اس ترکیب کے صرف ربر کا چھلہ  
رپے سی ری، اندام نہانی کے اندر رکھا جائے  
جو اس غرض کے لئے مخصوص رہے تو اس سے  
بھی رحم کو کافی سہارا ملتا ہے معمولی پے سی ری کے

غلا وہ ایک قسم کی ڈنڈی دار پے سی ری ہوتی ہے جو بذریعہ ایک فیتہ یا چار فیتوں کے کمر کی پٹی کے  
ساتھ قائم کیجاتی ہے اس کے استعمال میں ایک بڑا نفع یہ ہے کہ مریضہ کے بستر پر پڑنے کی



چنداں ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے استعمال کی حالت میں مریضہ کو کسی قدر چلنے پھرنے

(تصویر نمبر ۵ ربرکے گولے کی)



کی اجازت دی جاسکتی ہے :  
اس کے علاوہ ایک ربرکازم گولہ  
وڈی دار ہوتا ہے جو رحم کو اس کے  
مقام پر پہنچا دینے کے بعد بجائے  
پے سی ری کے اندام نہانی کے اندر  
قلم رحم کے قریب پہنچا کر اس میں بذریعہ  
پائپ کے ہوا بھردی جاتی ہے اور

پائپ کو علیحدہ کر کے اس کی وڈی کو فیتوں کے ذریعہ سے کمر کی پٹی کے ساتھ قائم کر دیا جاتا ہے  
اس سے بھی رحم کو خوب سہارا ملتا ہے۔


لیکن یاد رکھو کہ اس گولے یا کسی قسم کی پے سی ری کو اندام نہانی کے اندر زیادہ مدت تک  
لگاتار نہیں رکھنا چاہئے۔ کیونکہ اگر مریضہ اس کی عادی نہ ہو تو اندام نہانی کی ساخت پر کسی غیر  
جنس کے دائمی دباؤ سے اس کی ساخت میں التهاب (انفلامیشن) یا ورم پیدا ہونے کا سخت  
اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لئے چاہئے کہ اس عمل (ڈریسنگ) سے کچھ دیر کے بعد اگر مریضہ کسی قدر ناگواری  
یا درد وغیرہ کی شکایت کرے تو فوراً بندش کو قدرے ڈھیلا اور پے سی ری وغیرہ کے دباؤ کو  
قدرے کم کر دیا جائے یا اسے تھوڑی دیر کے لئے نکال کر کچھ دیر کے بعد آہستگی سے دوبارہ رکھا  
جائے۔ اور اگر مریضہ کو پے سی ری وغیرہ کے رکھنے سے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہو تو ایک یا دو  
دن کے بعد اسے نکال کر اور صاف کر کے دوبارہ بدستور رکھا جائے اسی طرح اگر صرف گدی خوشگل  
میں تر کر کے رکھی گئی ہو تو اسے بھی دوسرے دن نکال کر اندام نہانی کی صفائی بذریعہ پمپ کے  
کر کے اور دوسری گدی رکھ کر بدستور بندش کر دی چاہئے۔ پھر اس عمل کے بعد مریضہ کے  
اندام نہانی میں اور قلم رحم پر ٹینکچر سٹیل بذریعہ پھیریری کے لگائیں یا سیمیٹ کا نسخہ (معمولہ مطب  
حضرت حاذق الملک دام اقبالہم) استعمال کرائیں۔ اور مازو۔ مائین۔ جب آلاس۔ گلنار  
گل سرخ۔ اذخرکی۔ جنت بلوط۔ پھلی بول۔ پانی میں جوش دے کر اور صاف کر کے ایک باٹی میں

بھرم کر لیں کہ اس کے اندر ٹھیکریں۔ اس کے علاوہ پھٹکری اور گلاب یا پلیمانی ایسٹریس۔ یا ٹانک ایسڈ پانی میں حل کر کے اس کو بذریعہ پکپکاری کے رحم میں پہنچانا بھی نہایت مفید اور مجرب ہے۔ مریضہ کے پیڑ اور پشت پر قابض ادویات کا غما کرنا اور سیفوف کھلا نہایت نافع ہوتا ہے۔ صاف ہتھ۔ خستہ آنہ۔ خستہ جامن۔ پکھان بید۔ موچرس۔ ہائیں۔ اتیس۔ نو دھ کا پھل۔ اندر جو شیریں۔ مرچ سیاہ۔ سوٹھ۔ زعفران۔ گل دھاوہ۔ ملہٹی۔ ارجن۔ برجن۔ گل سیفون۔ پوست کڑا۔ صندل سرخ۔ زعفران۔ بدھاراسب کو برابر لے کر اور کوٹ چھان کر اس میں سہ ماہی ہمراہ تازہ پانی کے پھانک لیا کریں۔ اگر تنقیر کی ضرورت سمجھی جائے تو چند روز تک منفعی بلغم پلا کر ہل بلغم سے تنقیر کرائیں۔ اگر موقع ہو تو ایچ فیکر بھی دیا جاتا ہے۔

پیرس۔ مریضہ کو حرکات قویہ اور مرطوب اشیاء کے استعمال سے منع کریں۔ جماع بھی مضر ہوتا ہے۔ خوشبو سونگھنا مفید ہے۔ مریضہ کو غذا میں گوشت۔ کباب۔ زردی بیضہ وغیرہ مفید ہوتی ہیں۔

فصل انیسویں۔ میلان مرحم رڈس پلیس منٹ آف وی یوٹرس یعنی کسی جانب کو رحم کا جھک جانا اور اس کا ٹیڑھا ہونا۔ کتاب ہذا کے پہلے حصہ میں نہیں معلوم ہو چکا ہے کہ رحم سامنے کی طرف مثانہ سے اور پیچھے کی جانب معاً مستقیم سے بذریعہ رباطات کے بندھا ہوا ہے۔ اور جانبین میں اس کو رباط عریض رباط لنگا منٹ ہونے کی ہڈیوں سے مربوط رکھتے ہیں۔ پس ان رباطات میں سے جب کوئی رباط کھینچ جائے تو کھینچے ہوئے رباط کی طرف رحم جھک جاتا ہے۔ اور اگر کسی طرف کا رباط ڈھیلا ہو جائے تو رحم اس کی مخالف جانب کو مائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی رحم کے قرب وجوار والے اعضا کا بے موقع دباؤ بھی اسے اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر کسی طرف کو جھکا دیتا ہے۔

اس بنا پر اگرچہ رحم کا میلان چاروں طرف کو ممکن ہے۔ لیکن اکثر اس کا میلان سامنے یا پیچھے کی طرف ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جب رحم سامنے کو جھکتا ہے یا کسی قدر ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا انتہائی حصہ (فندس) مثانہ پر دباؤ ڈالتا ہے اور فم رحم کا رخ معاً مستقیم کی طرف ہوتا ہے۔ اس میلان کو میلان قد امی رائٹی درشن اور فم رحم کھانے کو اعوجاج قد امی




رائی فلکشن کہتے ہیں۔

ردیکھو تصویر نمبر ۵۸ و ۵۹ اور اگر میلان پیچھے کی طرف ہوتا ہے تو اس کا انتہائی حصہ (فٹس) میلان قدامی اور معاً مستقیم پر دباؤ ڈالتا ہے اور رحم کا رخ نشانہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس میلان کو

میلان خلفی (ریٹرو وڈرشن) اور رحم کھاجانیکو انحناء خلفی ریٹرو فلکشن کہتے ہیں۔


ردیکھو تصویر نمبر ۶۰ و ۶۱ اسی طرح اگر کبھی انثناء میلان رحم دہنی یا بائیں جانب کو ہوتا ہے تو اسی طرف کے خصیۃ الرحم راو ویری، پر اور پاؤں کی طرف آنے والے اعصاب کی ٹھروں پر دباؤ پڑتا ہے۔



**اسباب (۱) رحم کے رباطات کا ڈھیلا ہو جانا۔** یا کھنچ جانا (۲) خاص رحم یا اس کے قرب وجوار والے اعضا میں ورم یا رسولی کا پیدا ہونا اور اس کا رحم کو دھکیل دینا (۳) کوٹھے یا چوڑوں کے بل گر پڑنے سے رحم پر ضرب شدید یا صدمہ پہنچنا (۴) کبھی وجہ انحناء نہ کوٹھے یا خوف سے یکایک اچھل پڑنے یا کثرت جماع سے بھی رحم کسی جانب کو جھک جاتا ہے۔

**علامات (۱) مرلیضہ کو جماع سے سخت تکلیف ہوتی ہے (۲) ایک یا تمام مرلیضہ کے پیٹرو پر رکھ کر دوسرے ہاتھ کی انگلی اندام مہانی کے اندر داخل کرنے سے قابلہ کو رحم کا جھکاؤ بخوبی**

رخصہ برسر ۶۲ میلان رحم کا امتحان



محسوس ہو سکتا ہے۔ رخصہ برسر ۶۲

(۳۱) اگر متفحاح الفرج کے ذریعہ اندام نہانی کو اچھی طرح کشاؤ کر کے پوری کیفیت دریافت ہو سکتی ہے (۳۲) سامنے کی طرف جھکنے کی حالت میں اکثر احتباس بول یا قطیر بول کی شکایت پائی جاتی ہے (۳۳) پیچھے کی طرف جھکنے کی حالت میں احتباس برائے یا پیش ہو جاتی ہے۔ یا براز کے وقت مرہبہ کو


تکلیف ہوتی ہے (۳۴) اگر دہنی یا بایں جانب کو میلان ہو تو اس جانب کے چنگاسہ۔ ران اور پٹنڈی میں شدت درد ہوگا اور دوسری جانب کو کسی قدر کم یا بالکل نہ ہوگا (۳۵) اگر میلان زیادہ ہو تو بعض مرتبہ احتباس حیف تک بھی نوبت پہنچتی ہے (۳۶) ایسی حالت میں احتناق الرحم کی علامات بھی پائی جاتی ہیں (۳۷) اگر میلان بوجہ ورم رحم کے ہو تو مریضہ کو قدرے بخار اور درمور کی بھی شکایت ہوتی ہے (۳۸) اکثر عورت کو عسر حمل اور اسقاط حمل کی شکایت ہوتی ہے۔

**علاج۔** اگر میلان زیادہ مدت سے ہو یا رباطات کے گھنچ جانے سے لاحق ہوا ہو تو سب سے پہلے رباطات میں نرمی پیدا کرنے کے لئے مریضہ کو چند مرتبہ گرم پانی میں بٹھائیں اور اگر اس پانی میں تخم خطمی۔ تخم میتھی۔ گلی بابونہ۔ سبوس گندم۔ نمک وغیرہ جوش دیا گیا ہو تو اور بھی بہتر ہوگا اسی طرح انجیر۔ تخم میتھی۔ تخم اسی۔ مغز تخم کڑ پانی میں جوش دے کر اور قدرے تل کا تیل اس میں ملا کر ہذریہ چکاری کے رحم کے اندر پہنچائیں اور اوپر سے روغن بابونہ۔ چربی بطکی۔ چربی مرغ کی چربی بکری کے گردہ کی۔ اور گائے کی ملی کا گوہ۔ ان سب کو بچھلا کر پیڑو کے مقام پر آہستہ آہستہ مالش کریں۔

اس کے بعد جب رحم کے رباطات خوب نرم ہو جائیں تو قابلہ بذریعہ دستکاری کے رحم کو سیدھا اور درست کر کے اس کے مقام پر بذریعہ گدی اور پیٹ کے اچھی طرح بندش کر دے جس کی طریقہ فصل سابق میں درج ہو چکا ہے۔ اور اگر قابلہ انگلی کے ذریعہ سے رحم کو سیدھا اور درست نہ کر سکے تو اس کو بذریعہ سلاخی ریوٹرائن ساونڈ کے جو اس کام کے لئے خاص ہے رحم کو







صفحہ ۱۷۰ پر درج ہو چکا ہے یا معجون موچرس وغیرہ۔

اور اگر میلان رحم بسبب استرخا و رباطات کے عارض ہو اور استرخا بوجہ کثرت رطوبات کے ہو تو سب سے پہلے رطوبات کو خشک اور تحلیل کرنے والی ادویات کا استعمال کرنا چاہئے اور اگر ضرورت سمجھی جائے تو چند روز منفعجات بلغم ہلکا کر مہل بلغم کے ذریعہ بدن کا تنقیہ کرایا جائے اس کے بعد رحم کو بذریعہ دستکاری کے سیدھا اور درست کیا جائے۔

اور اگر میلان رحم بسبب ورم کے ہو تو اکثر حالتوں میں صرف ورم کا علاج ہی کافی ہوتا ہے۔ اور بعد تحلیل ہونے ورم کے رحم خود بخود اپنے مقام پر آجاتا ہے چوٹ لگنے کی صورت میں سوای تدابیر متعلقہ رحم کے خاص چوٹ کا علاج بھی حسب موقع ضروری ہے۔

اگر میلان رحم بسبب کودنے یا بوجھ اٹھانے وغیرہ صدمات کے لاحق ہوا ہو تو صرف رحم کو بذریعہ دستکاری کے درست کر کے ادویہ قابضہ کا مقامی طور پر استعمال کرنا اور آئندہ کے لئے مریضہ کو ایسی حرکات سے باز رکھنا خاصہ و صا جماع سے چند روز تک منع کرنا کافی ہوتا ہے۔

فصل بیسویں - وجع الرحم - پین آف دی یوٹرس، یعنی رحم میں درد محسوس ہونا۔ چونکہ رحم کی ساخت میں عصبی ریشہ بکثرت موجود ہیں۔ اس لئے رحم پر جب کسی مودی کا اثر پہنچتا ہے تو اس میں درد کی اذیت محسوس ہوا کرتی ہے چنانچہ ایک توجیب رحم کے اندرونی سطح پر پھنسیاں نکل آتی ہیں تو پھنسیوں کے پیدا کرنے والے مادے کی حدت سے رحم میں سوزش

کاسا درد محسوس ہوا کرتا ہے۔

دوسرے۔ درم رحم کی حالت میں بھی مادہ کی حدت اور زیادتی مقدار کے باعث سوزش اور تناؤ کا سادہ محسوس ہوا کرتا ہے۔

تیسرے۔ سرطان الرحم کی حالت میں مادہ کی خباثت سے درد ضربانی شدید ہوتا ہے چونکہ۔ اکثر الرحم کی حالت میں جلن کا سادہ و شدت ہوتا ہے۔

پانچویں۔ بواسیر الرحم کے عارضہ میں بھی رحم کی ساخت اجتماع خون ہونے کے باعث تناؤ کا سادہ درد ہوتا ہے۔

چھٹے۔ رحم کے اندر شگاف یا زخم ہونے سے بھی شدت درد ہوتا ہے۔

ساتویں۔ نفقۃ الرحم کے وقت کثرت اجتماع بیاض سے رحم میں تناؤ کا سادہ و شدت ہوتا ہے آٹھویں۔ انقلاب الرحم۔ یا میلان الرحم کی حالت میں رحم مٹی وضع اصلی میں خلل پیدا ہونے کے باعث خاص رحم اور اس کے متعلقات میں سخت بے چین کرنے والا درد ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک جو ہمیں درد رحم کی بیان کی گئی ان سب کی تدبیریں ان امراض کے بیان میں مذکور ہو چکی ہیں جن کے تابع یہ وجع الرحم ہوتا ہے۔

نویں۔ جریان حیض کے وقت اکثر لڑکیوں کو بعد یلوع کے پہلی مرتبہ حیض جاری ہونے سے دو چار دن پہلے اور ایام حیض میں رحم کے اندر اجتماع خون کے باعث تشنجی یا تناؤ کا سادہ و ہوا کرتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ جب ان کی طبیعت ہر مہینہ میں اس عارضہ کی نوگر ہو جاتی ہے تو وہ تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ بعض عورتوں کو جریان حیض با فراغت نہ ہونے کی حالت میں کثرت اجتماع خون کے باعث رحم میں درد شدید ہوتا ہے۔

علامہ جی ایسی حالت میں رحم کے مقام پر یکمید کرنا اور اور حیض کی تدبیر عمل میں لانا مناسب ہے۔

دسویں۔ وضع حمل سے چھ پہلے رحم کے اندر تشنجی درد تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دوروں کے ساتھ اٹھا کرتا ہے جو عورت کو نہایت بیتاب کر دیتا ہے۔ چونکہ یہ درد رحم کے ریشوں کے سکڑنے سے ہوا کرتا ہے اور بچہ کو رحم کے اندر سے خارج کرنے کے لئے اس کا بار بار سکڑنا ضروری ہوتا ہے اس لئے اس قسم کا درد محتاج کسی تدبیر کا نہیں ہے البتہ شدت تکلیف کی

حالت میں بعض مناسب حیلوں سے دفع الوقتی کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ سنگ متفاطسین یا سہ ہاتھ میں لینا یا پیر کے نیچے رکھ کر زور سے دبانا۔ یا پھر کے سم کی دھونی دینا۔ یا کسی تعویذ گنڈے وغیرہ کا بندھوانا۔ یا شکم۔ عانہ۔ فرج کو مناسب روغنوں سے چکنا کرنا۔ ان کے علاوہ اور بہت سے حیلے ایسے ہیں جن کو اکثر تجربہ کار بوڑھی عورتیں خوب جانتی ہیں ان حیلوں سے اگرچہ فی الواقع درد میں کوئی معتد بہ تسکین نہیں ہوتی لیکن تاہم مریضہ کا خیال اس طرف منتقل ہو کر اس کو اپنی مصیبت کے وقت میں اس قسم کی خارجی چارہ جوئی بہت کچھ تسلی بخشی ہے۔

گیارہویں۔ عسر ولادت کے وقت کا درد شدید۔ عسر ولادت خواہ بچہ کی جانب سے بوجہ ولادت غیر طبعی کے ہو۔ یا حاملہ کی جانب سے بوجہ جوف عانہ۔ رپوس کی خرابی کے ہو۔ ہر حالت میں رحم کی ساخت پر غیر معمولی دباؤ پڑنے سے اور اس کے بار بار حرکات شدیدہ کرنے سے نہایت بیتاب کرنے والا اور مریضہ کی قوت کو سلب کرنے والا درد ہو کر رہتا ہے جو بہت تھوڑی سی مدت میں حاملہ اور بچہ کی زندگی کو معرض خطر میں ڈالتا ہے۔ اور اکثر اس صدمہ سے ماں یا بچہ یا دونوں ہلاک ہو جاتے ہیں۔

علاج۔ اس کی تدبیر یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بہت جلد عسر ولادت کو دفع کرنیکی تدابیر عمل میں لانی چاہیں جو اس کے بیان میں بتائی گئی ہیں  
بارھویں۔ احتباس میثمہ کے وقت بھی اس لئے درد شدید ہو کر رہتا ہے کہ بعد وضع حمل رحم تھک جانے کے باعث اس قدر قوی حرکت کرنے سے عاجز رہتا ہے جب قدر اخراج میثمہ کے لئے کافی ہو سکیں لیکن تاہم وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سستا کر اخراج میثمہ کے لئے اپنی باقی قوت کے موافق کچھ نہ کچھ حرکات رخا وہ کیسی ہی ناکافی کیوں نہ ہوں ضرور کرتا ہی رہتا ہے۔ ایسی حالت میں جرم میثمہ کا رحم کے اندر محتبس رہنا اور اس کی حرکات متعجبہ متواترہ یہ دونوں امر درد شدید کے موجب ہوتے ہیں۔

علاج۔ ایسی حالت میں اخراج میثمہ کے لئے یہ نسخہ نہایت مفید ہوتا ہے صفتہ۔ اجوان اجمود۔ کلونجی۔ یتھی۔ باؤ بڑنگ۔ تخم گاجر۔ قند سیاہ کہنہ پانی میں جوش دے کر گرا گرم پلا میں نسخہ دھونی کا۔ سانپ کی کینچلی۔ جنگلی کبوتر کی بیٹ۔ گوگل۔ گدھے کا سم۔

نیم کو قوت کر کے دھونی دیجائے۔ ایضاً۔ مرکی۔ بہروزہ خشک۔ جاؤ شیر۔ گندھک۔ کوٹ چھان کر گائے کے پتہ میں ملا کر قرض بنائیں۔ اور حسب موقع ان میں سے بقدر ضرورت لیکر دھونی دیں۔ باقی تدابیر احتباس شیمہ کے بیان میں مفصل درج ہیں۔

تیسرے صوبے۔ وجع بعد الولادت (آفٹر پینس) یعنی بچہ کی پیدائش کے بعد جو درد زچہ کے رحم میں ہوتا ہے اور اس کو ہندی میں گیلین کا درد کہتے ہیں۔ حقیقت اس درد کی یہ ہے کہ ولادت کے بعد چند گھنٹوں تک یا دو تین دن تک رحم وقتاً فوقتاً ڈھیلہ ہو ہو کر زور سے سکڑتا رہتا ہے رحم کی ان حرکات سے بہت درد ہوا کرتا ہے۔ فائدہ ان دردوں کا یہ ہے کہ جو خون اکثر ولادت کے بعد رحم کی دیواروں میں سے تراوش پاتا رہتا ہے۔ اور اس کا کچھ حصہ رحم کے اندر منجمد ہو جاتا ہے وہ رحم کی ان حرکات سے وقتاً فوقتاً خارج ہوتا رہتا ہے اس لئے ان دردوں کو عورت کے حق میں بہتر سمجھنا چاہئے لیکن زیادہ تکلیف کی حالت میں پھر بھی کچھ نہ کچھ تدبیر ضرور کی جاتی ہے۔

علاج۔ تسکین درد کے لئے گرم اینٹ کے ذریعہ صرف تکمید کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اور اگر درد نہایت شدید ہو تو یہ جوشاندہ پلانا چاہئے۔ پوست الملتاس۔ مشک تراشیدہ۔ پرسیا و شان۔ قند سیاه کہنہ۔ عرق گاؤربان۔ عرق مکوہ میں جوش دے کر چند بار پلانے کی ضرورت پڑتی ہو کبھی شدت درد کی حالت میں اسی جوشاندے میں قدرے پوست خشخاش بھی زیادہ کیا جاتا ہے اور پوست خشخاش کو پانی میں جوش دے کر اس سے بذریعہ اسفنج کے پٹرو پر تکمید کی جاتی ہے اور تخم السی کے جوشاندہ سے رحم میں حقن کرنا بھی مفید ہوتا ہے۔

چودھویں رعبی درد (نیورالجیا) جو صرف سورمزاج رحم کے باعث ہوا کرتا ہے۔ جب اقسام مذکورہ بالا کے اسباب میں سے کوئی سبب موجود نہ ہو اور مریضہ درد رحم کی شکایت کرے تو سمجھنا چاہئے کہ یہ درد خاص اعصاب رحم کے ایذا پانے سے ہوتا ہے اور اعصاب رحم کو اندرونی اذیت پہنچنا۔ رحم کی مزاجی خرابیوں سے ممکن ہے۔ اس لئے اسباب و علامات پر غور کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ رحم کے مزاج میں کس قسم کی خرابی واقع ہوئی ہے۔ مثلاً تمام اعضا میں درد پیدا کرنے والی مزاجی خرابیاں اکثر دو قسم کی ہوا کرتی ہیں۔ جو بذات خود اعضا میں

درو پیدا کر دیتی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی حصہ وار عضو کے مزاج میں معمول سے زیادہ گرمی پیدا ہو جائے دوسرے یہ کہ اس کے مزاج میں سردی کا اثر ہو جائے۔ یہ دونوں صورتیں عضو مذکور میں رطوبت دوسری خرابیوں کے (درو پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی قاعدہ پر قیاس کر کے علامات سوء مزاج کو تلاش کریں جن سے مزاجی خرابی کی تشخیص ہو سکے۔

علاج۔ تشخیص کے بعد سوء مزاج کی تعدیل کرنی چاہئے۔ چنانچہ سوء مزاج سرد کی حالت میں مریضہ کو دوار المسک ہمراہ بشیرہ بادیان۔ بشیرہ تخم کثوث۔ بشیرہ برگ بودینہ عرق خشک بادیان عرق غنبر۔ خمیرہ بنفشہ پلانا چاہئے۔ اور باکھڑ۔ سازج ہندی۔ اکیلل الملک۔ زعفران۔ سب کو پیس کر مرغ کی چربی۔ بطکی چربی۔ روغن ناروین۔ مرغی کے انڈے کی زردی میں ملا کر فرزجہ رکھنا چاہئے۔ اور مرگمی۔ حب الغار۔ بہرہ خشک۔ عود غرقی کی دھونی رحم میں پہونچانی چاہئے۔ اور اگر سوء مزاج گرم ہو تو مریضہ کو بشیرہ تخم کاسنی۔ بشیرہ تخم خیارین۔ بشیرہ خار خشک۔ شربت نیلوفر۔ شربت سیب۔ شربت خشتیاش وغیرہ پلایا جائے اور انڈے کی زردی روغن گل کے ساتھ ملا کر فرزجہ رکھا جائے۔ اسی طرح ٹھنڈے پانی کی بچکاری رحم میں کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی اعصاب کی حس کم کرنے کے لئے محذرات دخیل ایون یا نارفا وغیرہ کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے۔

فصل کیسیویں۔ کثرة الطمث۔ اس مرض کی دو صورتیں ہوتی ہیں (۱) ایام معمولی میں عادت سے زیادہ خون جاری ہونا۔ جسے انگریزی میں رے نوراجیا کہتے ہیں۔ (۲) جریان حیض کی مدت ایام معمولی سے زیادہ ہو جانا۔ جسے انگریزی میں (مٹراجیا) کہتے ہیں۔ اس مرض میں بکثرت خون نکل جانے کے باعث دفتہ عورت نہایت کمزور اور ناتوان ہو جاتی ہے۔ چہرہ کا رنگ زرد اور بدن پر خشکی غالب آ جاتی ہے اگر زیادہ عرصہ تک یہی حالت قائم رہے تو اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے اور مرض کمی خون (رے نی میا) ہو جاتا ہے۔ شدت حیض کی حالت میں عورت کو عسر حمل کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ آخر کو معدہ اور جگر کے افعال میں خلل واقع ہونے کے باعث کبھی مرض اسستقا و تک بھی نوبت پہونچ جاتی ہے۔ اختلاف اسباب کے لحاظ سے اس مرض کو سات قسموں پر تقسیم کر کے مع علامات و

علاج کے ذیل میں جداگانہ بیان کیا جاتا ہے۔

پہلی قسم۔ کثرت حیض جو زیادتی خون کے باعث لاحق ہو۔ ظاہر ہے کہ جب خون کی پیدائش بدن میں زیادہ اور خرچ کم ہوتا ہے یا خون کی خاصیت میں ایسا تغیر واقع ہوتا ہے۔ جس سے خون پرورش بدن کے لائق نہ رہے تو تمام بدن کی رگوں میں اس کا ذخیرہ بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔ اسوقت ہمارے بدن کا قدرتی مدبر (طبیعت انسانی) اس بارگراں سے سبکدوشی حاصل کرنے کی عرض سے خون کو مختلف مقامات سے دفع کرتا ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ خون کے تناؤ سے نازک اور نرم مقامات کی رگوں کے منہ کھل کر خون بہنے لگتا ہے۔ چنانچہ دانتوں کو ملنے یا مسواک کرنے کے وقت مسوڑوں سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ یا اونٹنی سے تحریک سے نکسیر جاری ہو جاتی ہے یا بواسیری سے پیدا ہو کر مقعدہ سے خون بکثرت نکل جاتا ہے اسی طرح عورتوں میں کثرت جریان حیض کا عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات (۱) بدن کی فربہ اور مریضہ کا نوجوان دموی المزاج ہونا (۲) بدن کا رنگ سرخ ہونا اور عروق میں امتلا پایا جانا (۳) نبض کا قوی اور عظیم ہونا (۴) اگر کثرت خون کے ساتھ کسی قدر خون کی خرابی بھی ہو تو فساد خون کی علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے بدن میں گرمی، سوزش، پٹنگے سے لگنا۔ خارش ہونا۔ پھوڑے پھسیوں کا نکلنا وغیرہ (۵) باوجود کثرت سیلان خون کے مریضہ کو زیادہ ضعف کی شکایت نہیں ہوتی۔

علاج (۱) جب تک مریضہ کے ضعف ہو جانے کا خوف نہ ہو مقامی ادویات سے خون کو بند کرنے کی تدبیر ہرگز عمل میں نہ لانی چاہئیں (۲) اگر باوجود کثرت خون کے اس میں کسی طرح کا فساد بھی پایا جائے تو مصفیات خون کا استعمال کرائیں (۳) روزہ مریضہ سے مناسب ریاضت کرائیں اور غذا میں تغلیل کرنا یا روزہ رکھنا زیادہ مناسب ہوتا ہے (۴) اگر خون کا غلبہ بہت زیادہ ہو تو ایسی حالت میں امالہ خون کی غرض سے فصد باسلیق کھولنا یا پستان کے نیچے سینگیان یعنی گاس لگانا رکپنگ (بکسی مناسب ہوتا ہے) ۵) ضماد جنطیانا جس طٹ کیلئے نہایت مجرب ہے صفتہ۔ جنطیانا باریک پسا ہوا ایک تولہ۔ مہندی کے پنے باریک پے ہوئے ایک تولہ دونوں کو پانی میں ملا کر ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر ضماد

فرز صالح میں

کر کے ایک گھنٹہ تک دھوپ میں بیٹھنا چاہئے۔ فوراً حیض کو بند کرتا ہے (۲) کچھ سفید۔ طبعاً شہرہ پست انار۔ چھالیا پرانی ہر ایک چھ ماشہ باریک پس کر اس میں سے ۵ ماشہ ہمراہ شہرہ بیخ انجبار شہرہ حب الاس۔ شہرہ تخم کاہو مقشر۔ لعاب بہدانہ۔ شربت خشخاش ملا کر پلائیں۔ (۳) مازوسبز۔ گلنار۔ سرمہ سیاہ۔ پھٹگری۔ گل ازنی۔ دم الاغین۔ سب کو باریک پسکرانگی پوٹلیاں اندام نہانی میں نم رحم کے پاس رکھیں۔

دوسری قسم۔ کثرت حیض۔ جو رقت اور حدت خون کے باعث ہو۔ کیونکہ ایسی حالت میں رگوں کے منہ کھل بکثرت خون جاری ہو جاتا ہے یا در کھوکھون کی حدت اکثر وجہ اختلاف صفر کے ہوتی ہے۔ اور کبھی قدرے سودا، محرقة کے ملنے سے بھی ہو جاتی ہے۔

علامات (۱) تمام بدن میں گرمی اور سوزش محسوس ہونا (۲) قلت اشتہا اور پیاس کی زیادتی (۳) قارورہ کی زردی اور جلن (۴) بدن میں خشکی اور بیض کی سرعت (۵) حیض کے خون کا زردی مائل رفیق یا سیاہی مائل قدرے غلیظ اور گرم مع سوزش کے خارج ہونا۔ علاج (۱) تسکین حدت کے لئے لعاب بہدانہ۔ شہرہ غاب عرق مرکب مصفی خون شربت نیلوفر کے ساتھ پلائیں (۲) غاب۔ شاہترہ۔ منڈی۔ پوست ہلیلہ زرد یا پوست ہلیلہ کابل۔ ہلیلہ سیاہ۔ افیمون۔ گل سرخ۔ گل نیلوفر وغیرہ کا نفور چند روز پلا کر مہل مناسب سے تنقیہ کرائیں (۳) جلس خون کے لئے قرص کبریا ہمراہ شہرہ بیخ انجبار۔ شہرہ تخم خرفہ سیاہ۔ شہرہ تخم بازنگ۔ شربت نیلوفر یا شربت انجبار یا شربت انار داخل کر کے پلائیں نسخہ کبریا یہ ہے۔ صفتہ۔ کشیز خشک بریاں ۵ ماشہ۔ تخم خشخاش سیاہ و سفید کبریا ۵ ماشہ۔ گسبدہ ماشہ مروریدنا سفنہ ۵ ماشہ۔ تخم خرفہ ۵ ماشہ۔ بارہ سنگہ سوختہ ۳ ماشہ۔ پوست بیضہ مرغ سوختہ ۳ ماشہ۔ صمغ عربی ۳ ماشہ۔ کثیرا ۳ ماشہ۔ گہونگہ سوختہ ۳ ماشہ۔ بزر الہیج سفید ۲ ماشہ سب کو باریک پس کر آب بارتنگ سبز میں گوندھ لیں اور بقدر ساطرے چار ماشہ کے قرص بنائیں خوراک ایک قرص ہے (۴) ایضاً مجرب۔ آملہ مقشر۔ بادیان ایک ایک ٹولہ رات کو پانی میں تر کر کے اور صبح کو مل چھان کر شکر سفید ایک ٹولہ سے شیریں کر کے پلائیں۔

خون کثرت میں



(۵) ایضاً - سفوف حالبس خون - بنسلوچن - شکر احت - دانہ الچی سفید تین تین ماشہ باریک پیسکر شکر سفید ایک تولہ ملا کر اس میں سے بقدر ۵ ماشہ ہمراہ گائے کے دودھ کے بھانک لیں - نہایت مفید اور میرا خاندانی مجرب ہے - (۶) یہ ضما و اور قرز جہ بھی بہت نافع ہے - صفتہ ضما و - پوست انار - گلنار - بلوط - جوز السرد - ماز و سبز کزما زج - آقا قیاحا لاس ہر ایک دو ماشہ - گل ارمنی ۴ ماشہ - سب کو باریک کوٹ چھان کر پوست خشنکاش کے پانی میں ملا کر پیرو پر ضما و کریں (۷) صفتہ قرز جہ - گوند کیکر - کافور ہر ایک ۲ ماشہ - گلنار ۳ ماشہ - کشنیز تازہ ۷ ماشہ - سب کو باریک پیس کر نرم کپڑا میں آلودہ کر کے اندام نہانی کے اندر رکھیں - تیسری قسم جو خون کی مائیت اور غلبہ بلغمیت کے باعث عارض ہو کیونکہ ایسے خون سے رحم کی باریک رگیں ڈھیلی اور ان کی ساخت نرم ہو جاتی اور دوران خون سست ہو جاتا ہے اسی سبب سے خون کا رقیق حصہ حیض کے راہ بکثرت جاری ہو جاتا ہے -

علامات (۱) بدن میں غلبہ بلغم کی علامات ظاہر ہونا (۲) مریضہ کا لجم و شحم ہونا (۳) ہضم کی خرابی اور اکثر ترش و کاروں کا آنا (۴) قارورہ سفید اور بکثرت آنا (۵) نبض بطی لین عریض ہونا (۶) حیض کا خون رقیق القوام اور گلابی ہونا -

علاج (۱) تنقیہ بلغم کے لئے تھے کرائیں اور منضج بلغم دے کر مہل گرم اور حب الیاج سے تنقیہ عام کرائیں (۲) غذائیں خشک مثل گوشت کبوتر یا تیتہ یا چڑیوں اور کباب وغیرہ کے دینا مناسب ہے (۳) بقدر ایک ماشہ گندھک آنولہ سار باریک کر کے ہمراہ دودھ گائے کے ایک ہفتہ تک پلانا خون حیض کو بند کرتا ہے (۴) اسی طرح رال سفید ایک ماشہ - یالاک دانہ ایک ماشہ شکر سفید ایک تولہ میں ملا کر تازہ پانی کے ساتھ بھانک لیں مجرب ہے (۵) ایضاً - قرص حالبس طمت - صفتہ - زیرہ سفید - باجھر - لونگ مصطکی ہر ایک دو ماشہ - صندل سفید - کندر - دم الاخوین - گوند کیکر - نشا شستہ - لاکھ مغسول - انیون - گل ارمنی - سندروس ہر ایک ماشہ ہلیلہ سیاہ - بہیڑہ - آملہ خشک - نجث الحدید - ماز و کزما زج - ہر ایک ماشہ - بنرر النج ایک تولہ سب کو کوٹ چھان کر پانی میں گوندہ لیں اور قرص بنا کر بقدر ۵ ماشہ ہمراہ جوشاندہ کشنیز خشک اور ساق کے دیں (۶) گدھے کی لید خشک یا بکری کی مینگنیاں جلا کر ان کی لاکھ بند لیں

ضما و حالبس خون

قرز جہ حالبس

قرص حالبس طمت

پوٹلی کے اندام نہانی کے اندر کھنا بھی خون کو روکتا ہے (۱۷) ایضاً بھڑبھڑا سنگ پھٹکری سفید۔ گل خنوم۔ گل ارمنی۔ گلزار۔ سرمہ سیاہ۔ مساوی کوٹ چھان کر بذریعہ پوٹلی کے اندام نہانی میں رکھیں (۱۸) ایضاً مقید۔ گلزار۔ گندر۔ مازو سبز۔ سرمہ سیاہ۔ اقا قیا۔ شب یانی جفت بلوط۔ جب الاس۔ کرنا زرج۔ مساوی کوٹ چھان کر پوست انار کے جوشانہ میں ملا کر پشت اور عانہ کے مقام پر لپکریں۔

چوتھی قسم۔ کثرت حیض۔ جو اعراض نفسانی کے سبب سے عارض ہو۔ چنانچہ کثرت غم و غصہ اور بے انتہا خوشی کے وقت اکثر خلاف عادت بے موقع حیض بکثرت جاری ہو جاتا ہے۔ خصوصاً نازک مزاج اور ضعیف البجہ عورتیں اس میں زیادہ مبتلا پائی جاتی ہیں کیونکہ ایسے امور کے واقع ہونے سے دوران خون میں یکایک تغیر عظیم واقع ہوتا اور تمام بدن کے رگ پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ جن سے ان کی قوت ماسکہ روکنے کی قوت ضعیف ہو جاتی ہے اور چونکہ اکثر نازک اندام عورتوں کا رحم بھی کمزور ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے موقع پر ان کے رحم سے بکثرت خون جاری ہو جاتا ہے

علامات (۱) ایسے امور کے دفعہ واقع ہو جاتے ہی بکثرت حیض کا جاری ہونا سب سے بڑی علامت اس کی ہے (۲) کثرت طمث کا کوئی دوسرا سبب نہ پایا جانا (۳) مریضہ بظاہر تندرست اور قوی ہوتی ہے اور اس کو حدت خون یا رقت خون کی شکایت نہیں ہوتی (۴) مریضہ کو بوا سیر رحم یا کسی دوسرے مرض کی شکایت نہ ہونا۔

علاج (۱) سب سے بہتر تدبیر یہ ہے کہ مریضہ کی طبیعت کو دوسرے امور کی طرف متوجہ کریں کثرت غم کی حالت میں مریضہ کے دل کو تسلی اور دلاسا دیں مفرحات کا استعمال ہر طرح مناسب ہوتا ہے غصہ کی صورت میں پسند و نصائح مناسب زیادہ کام لینا چاہئے۔ اور مریضہ کو دوسرے مشاغل میں مصروف کرنا بہتر ہوتا ہے۔ کثرت خوشی کی حالت میں مریضہ کو خوفناک نتائج کی طرف متوجہ کرنا اور خوشی کی افراط کو اس کے دل سے دور کرنا بہترین تدبیر ہے غرض کہ سب سے پہلے عوارض واقعہ کے خلاف امور کی طرف یکایک مریضہ کو متوجہ کرنا ضروری ہے اس کے بعد جس خون کی عام تدبیر عمل میں لانی چاہئیں (۲) یہ فرزجہ خون کو فوراً

خیز جانی حیض

قرص جانی

بند کرتا ہے صفتہ۔ پوست انار۔ مازوسنر۔ کہرباگل۔ گلیارمنی۔ رنگبہرحت۔ والاخوین کاغذ سوختہ  
گل ملانی افاقیا۔ گلنار۔ سب کو باربک پیسکر بندریچہ پوٹلی کے اندام نہانی میں رکھیں۔  
(۱۳) یہ قرص ایسے موقع پر نہایت مفید ہوتا ہے صفتہ۔ کثیرانشاستہ۔ گوندکیکر۔ مغز تخم خیارین  
چھہ چھہ ماشہ۔ گلنار ۴ ماشہ۔ افاقیا۔ کہربا۔ بسد۔ سوختہ مصطکی ہر ایک دو ماشہ۔ (فیون ایک ماشہ  
سب کو نہایت باریک پیسکر بارتنگ سنبر کے پانی میں ملا کر قرص بنائیں۔ خوراک ان کی ۴ ماشہ  
سے ۵ ماشہ تک ہے۔ ہمراہ شیرہ تخم خرفہ اور شربت انجبار کے  
پانچویں قسم۔ کثرت حیض۔ جو بسبب ضعف رحم کے عارض ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب  
کثرت مجامعت اور کثرت اولاد کے باعث رحم نہایت کمزور ہو جاتا اور اس کی ساخت ڈھیلی  
پڑ جاتی ہے یا س کہولت کے باعث اس کی بناوٹ سست پڑ جاتی ہے۔ یا پیدائشی طور پر۔  
کسی عورت کا رحم کمزور ہوتا ہے تو خون کے قابل الدفع فضلات جو معمولی طور سے رفتہ رفتہ رحم  
کی رگوں میں جمع ہو کر ہر مہینہ ایام مقررہ میں خارج ہوا کرتے ہیں وہ فضلات ایسی حالت میں  
رجبہ رحم کی ساخت ڈھیلی ہو، رحم کی ساخت اور اس کی رگوں کے اندر جمع ہوئے کے لئے  
محفوظ نہیں رہ سکتے اور کمزور یا ڈھیلے رحم اور اس کی متخلل رگیں اس خون کو ایک وقت میں نکال  
اپنے اندر روک نہیں سکتیں بلکہ جقدر خون کے فضلات رحم کی ساخت اور اس کی رگوں میں آتے  
ہیں اسقدر بلکہ اپنے ساتھ اچھے خون کو بھی لیکر رگوں میں سے تراوش کرتے اور بہتے رہتے  
ہیں اس وجہ سے ایام حیض کا قدرتی انتظام اور خون کا معمولی اندازہ قائم نہیں رہتا۔ اور  
ہر مہینہ میں اکثر دن ایسے گزرتے ہیں کہ جن میں عورت حیض سے فارغ نہیں ہوتی یونانی اطباء  
کی اصطلاح میں اس قسم کو خصوصیت کے ساتھ استیاضہ اور انگریزی اسے (مٹراجیا)  
کہا جاتا ہے۔ علامات (۱) کثرت اخراج خون کے باعث مریضہ نہایت ضعیف اور زانوان  
ہو جاتی ہے (۲) ادنیٰ حرکت سے خصوصاً اگر دو چار مرتبہ پیہم جماع کا اتفاق پڑے تو بے  
موقع حیض جاری ہو جاتا ہے (۳) خفیف سی حرکت سے بھی رحم اپنے مقام سے ٹل جاتا اور  
اور بیکلی ہو جاتی ہے (۴) اکثر مریضہ سیلان رحم کی آفت میں مبتلا رہتی ہے (۵) اگر حمل قرار  
پا جائے تو اسقاط ہو جاتا ہے۔

علاج (۱) چند روز ترک جماع کرنا اور مریضہ کو آرام سے رکھنا (۲) مقوی اعصاب ادویات استعمال کرنا سب سے بہتر علاج ہے (۳) ڈاکٹروں نے خاص اس قسم کے لئے برومائیڈ آف پوٹاشیم کی بہت تعریف لکھی ہے۔ اس کے استعمال سے اعصاب کو بے انتہا قوت حاصل ہوتی اور کلام ملتا ہے جن دنوں میں مریضہ کو حیض سے فراغت حاصل ہو۔ ان ایام میں برومائیڈ آف پوٹاشیم ہر روز دس گریں ہملہ عرق چرائتہ دو اونس (دو تولد) کے ملا کر تین مرتبہ کر کے پلائیں ایک ہفتہ تک متواتر پلانے سے بہت نفع ہوتا ہے۔ اور آئندہ حیض اپنی معمولی قدرتی مقدار پر بخوبی ہوتا ہے (۴) یونانی ادویات میں سے یہ سفوف نہایت عمدہ مقوی اعصاب ہے۔ صفتہ - کہر یا مصطکی - گل سرخ - بڈ - صندل سرخ - مازوسنبر - گل دہاوہ کا پھل ایتیس - مجیٹھ - موچرس - کندر - آملہ خشک - اقا قیا - دانہ الاچی خور - طباشیر - جنطیا نارومی - کشنیر خشک - رال سفید - زعفران - سب کو مساوی لے کر نہایت باریک کوٹ چھان لیں اور سب کے برابر شکر سفید ملا کر سفوف بنالیں۔ اس میں سے بقدر ۵ ماشہ لے کر ہر روز سوتے وقت ہمراہ گائے کے دودھ کے پھانک لیا کریں۔ اسی طرح کشتہ مونگا اور حبث الحدید معجون کلان میں ملا کر کھلانا بھی بہت نفع کرتا ہے۔

چھٹی قسم - کثرت حیض - جو بواسیر رحم یا ورم غشاء اندرونی رحم - یا ورم خصینہ الرحم کے سب سے حادث ہو - کیونکہ ایسے مواقع پر خاص رحم اور اس کے قرب وجوار والے اعضاء کی طرف دوران خون تیزی کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور رحم کی ساخت اور اس کی رگوں میں خون بکثرت جمع رہتا ہے - پھر جب کثرت خون کے باعث رگوں کا تناؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کے دہانے کھل کر یا مسامات پھیل کر ان کے اندر سے بکثرت خون خارج ہو کر بہنے لگتا ہے۔ علامات اس قسم کی وہی ہیں جو ورم رحم یا بواسیر رحم یا ورم خصینہ الرحم کے بیان میں مذکور ہیں۔ اسی طرح علاج بھی تقریباً وہی ہوتا ہے البتہ اگر بعد زوال سبب کے کثرت طمث کا عارضہ باقی رہے تو حاسبات خون کا استعمال کرنا چاہئے جن کے مختلف نسخے اور ترکیبیں سابق میں درج ہو چکے ہیں۔

لے اس کے علاوہ گیر و سنگبراحت والا نسخہ پینے کو اور لیپ اور آبدست کا نسخہ بھی دیا جاتا ہے ۱۲ مؤلف

سفوف مقوی رحم و اعصاب

ساتویں قسم - کثرت حیض - جو شکاف و جراحت رحم یا قروح رحم یا سرطان رحم کے باعث لاحق ہوں - اس لئے کہ رحم کے ماؤف ہونے کی حالت میں اس کی طرف دوران خون سرعت اور تیزی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے اور ایام حیض میں جریان خون بکثرت ہوتا ہے - اس قسم کی علامات وہی ہیں اور علاج بھی وہی ہے جو ان امراض کے بیان میں مفصلاً مذکور ہو چکا ہے -

فصل بائیسویں - قلت حیض یعنی حیض کی کمی - یہ مرض کثرت حیض کے خلاف ہے - عورت کو بحالت تندرستی ایام مقررہ میں جس قدر مجموعی مقدار خون کی براہ حیض خارج ہونے کی عادت تھی اس مقدار سے کم خون جاری ہو - یا جتنے دنوں تک اس کو حیض آیا کرتا تھا ان دنوں کی تعداد بھی کم ہو جائے - ان دونوں صورتوں کو قلت حیض کہا جاتا ہے - اس مرض کے نقصانات اور مضرتیں اگرچہ احتیاس حیض کی بہ نسبت کم ہیں اور اسی وجہ سے اکثر مستورات اول اول تو اس کی پرواہ نہیں کیا کرتی ہیں بلکہ شرم و لحاظ کے باعث کسی پر اس کا اظہار بھی گوارا نہیں کرتی ہیں - لیکن کچھ مدت کے بعد جب ان کو اس عارضہ کے باعث مختلف تکالیف ظاہر ہوتی ہیں تو مرثیہ اور اس کے متعلقین کو ان عوارض لاحقہ کی طرف توجہ ہوتی ہے :

ظاہر ہے کہ بدنی فضلات کا وہ قابل الدفع حصہ جس کو قدرت نے حیض کے راہ خارج کرنا عورتوں کے لئے حفظ صحت کا موجب مقرر کر کے اس میں بہت سی ضروری مصلحتوں کے مخفی راز ودیعت فرمائے ہیں اگر وہ زہریلے فضلات اپنی معمولی مقدار کی بہ نسبت بدن سے کم خارج ہوں اور کچھ مدت کے بعد ان کی معتد بہ مقدار بدن میں جمع ہو جائے تو اس سے جس طرح خاص عضو رحم کی صحت میں فتور واقع ہوتا ہے - اسی طرح عام بدن کی صحت پر بھی ان کا مفسدانہ اثر ضرور پڑتا ہے :

اسی وجہ سے قلت جریان حیض کی حالت میں اکثر مستورات کو در در رحم - صلابت رحم - ورم رحم - عسر حمل وغیرہ عوارض لاحق ہو جاتے ہیں - اس کے بعد معدہ و امحاکے افعال میں بھی خلل واقع ہوتا ہے جس کے باعث اکثر قبض شکم - ضعف ہضم - کثرت ریاح وغیرہ تکالیف میں مبتلا رہتی ہیں - اور احتیاس حیض کی وجہ سے ایک تو خون میں زہریلے فضلات مخلوط ہوتی ہیں

دوسرے یہ کہ جگر کا فعل خراب ہو جانے سے خون اور بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ تغذیہ بدن کے لائق نہیں رہتا اس سبب مریض کا بدن پھول کر اگرچہ بظاہر ہر فریبہ معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی قوت نہایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ ادنیٰ گرمی کے وقت بدن میں پٹنگے سے لگنے لگتے ہیں۔ اور چیونٹیاں سی جلتی معلوم ہوتی ہیں۔ مریض کا دل اس قدر ضعیف ہو جاتا ہے کہ ادنیٰ صدمہ سے دھڑکنے لگتا ہے۔ اکثر بعد کھانا کھانے کے دل پر گھبراہٹ ہو کر خفقان کی سی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اکثر سر میں درد اور چکر کی شکایت ہوتی ہے کبھی مریض نہایت بد مزاج اور متوحش مثل مایو لیا والے کے ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ بیہوشی ہو کر مشل اختناق الرحم کے حالت پیدا ہو جاتی ہے۔

اقسام۔ قلت حیض باعتبار اسباب کے چند قسموں پر منقسم ہے۔ پہلی قسم۔ وہ قلت حیض جو خون کی غلظت کے سبب سے ہو۔ جیسا کہ بہت فریبہ اور بلغمی یا سوداوی مزاج والی عورتوں کو ہوتا ہے۔

علامات متعلقہ مزاج بلغمی یہ ہیں (۱) مریض نہایت کچم و شیم ہوتی ہے لیکن بدن میں قوت نہیں ہوتی۔ بدن نہایت نرم اور پھلچلا ہوتا ہے (۲) ضعف ہضم۔ ترش طوکار۔ اور اکثر نفخ و قراقر شکم کی شکایت رہتی ہے (۳) گرمی اور پیاس کی شکایت نہیں ہوتی (۴) کبھی کبھی درد اور دوران سر کی شکایت ہوتی ہے (۵) کسل بدن اور کاہلی رہتی ہے۔ اور نیند نہایت غفلت کی اور بہت زیادہ آتی ہے۔

علاج (۱) سب سے پہلے مریض کو چند روز منہاجات بلغم پلا کر مہل بلغم سے تنقیہ کرائیں (۲) غذا کی کمی اور اکثر روزہ رکھنے کی ہدایت کریں (۳) اقسام ریاضت میں سے جس طرح کی ریاضت مریض کے حسب حال ہو وہی ہی ریاضت کرائیں (۴) مطلوب غذاؤں سے اجتناب ضروری ہے (۵) ایام حیض سے ایک ہفتہ پہلے یہ مطبوخ پلانا نہایت مفید ہوتا ہے۔ صفعتہ۔ مغز تخم کر۔ تخم خرپرہ۔ بادیان۔ پرسیاوشاں ہر ایک ساڑھے چار ماشہ نیم کو فتنہ کر کے ڈیڑھ پاؤ پانی میں جوش دیں اور شربت بروری م تولہ اس میں دال دیں۔ جب دو حصہ پانی جل کر ایک حصہ باقی رہ جائے اس وقت مل چھان کر ملائیں۔

اگر غلظت خون غلبہ سودا کے سبب ہو تو اس کی علامات یہ ہیں (۱) مریضہ سیاہ فام لاغر اندام ہوتی ہے۔ اور اس کے اعضاء میں کسی قدر سختی پائی جاتی ہے (۲) مریضہ کی نبض سست رہتی ہوئی اور ضعیف ہوتی ہے (۳) بھوک زیادہ ہضم ضعیف اور ڈکاریں جلی ہوئی سی آبا کرتی ہیں (۴) اکثر مریضہ کا دماغ خشک رہتا ہے۔ اور نیند بہت کم آتی ہے (۵) اکثر خوف اور دہشت کی سی حالت میں مبتلا رہتی ہے (۶) مریضہ بلا خلاق ہوتی اور اکثر قصورے صدمہ سے اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے (۷) حیض کا خون سیاہ اور غلیظ ہوتا ہے۔

علاج (۱) بعد فراع حیض کے چند روز تک یہ نسخہ پلائیں صفتہ۔ گل بنفشہ۔ گل سرخ۔ موز منقہ۔ غلاب۔ شاہترہ۔ اسطوخودوس۔ بادرنجبویہ۔ پر سیاوشاں۔ تخم حلی۔ گاؤزباں خمیرہ بنفشہ (۲) پھر بعد فصیح کے اسی نسخے میں افیتون۔ پوست ہلیلہ کابلی۔ بسفنج فستقی۔ مغز فلوکس۔ ترنجبین۔ سنابلی۔ مغز بادام شیریں اضافہ کر کے مسہل دیں (۳) معمولی تبرید کے بعد ایک ہفتہ تک یہ جو شانہ پلائیں صفتہ۔ موز منقہ۔ انجیر۔ گاؤزباں۔ تخم کاسنی۔ گل سرخ۔ افستین۔ تخم کونث۔ تخم خیارین۔ پر سیاوشاں۔ نبات سفید۔ اسی طرح کرنے سے آئندہ حیض با فراغت ہونے لگتا ہے (۴) اگر ضرورت سمجھی جائے تو ایام حیض سے دو ایک دن پہلے قصد صافن کرائیں۔ دوسری قسم قلت حیض جو میلان رحم کے باعث عارض ہوتا ہے۔ علامات اور علاج اس کا میلان رحم کی بحث میں مفصل درج ہو چکا ہے

تیسری قسم قلت حیض جو فم رحم کے تنگ ہونے اور ورم رحم کے سبب سے لاحق ہوتا ہے ورم رحم کا بیان بھی گذر چکا ہے چوتھی قسم قلت حیض جو کمی خون کے باعث ہو جیسا کہ اکثر لاغر اندام ضعیف الجسم۔ اور نقیہ عورات کو واقع ہوتا ہے۔

علاج۔ مریضہ کو اچھی ہوا میں رکھنا چاہئے۔ عمدہ غذائیں بقدر فہم کے کھلائی جائیں۔ غذا میں دودھ۔ گھی اور مناسب میوہ جات کا استعمال مفید ہے۔ زیاضت کم کرنا اور عیش و عشرت میں اکثر مصروف رہنا مناسب ہے۔

لے نقاہت وہ کمزوری ہے جو بعد کسی شدید بیماری کے باقی رہ جاتی ہے۔ مؤلف۔

پانچویں قسم - قلت حیض جو کمی فضلات کے باعث ہو۔ جیسا کہ زیادہ محنت و مشقت کرنے والی عورتوں کو ہوتا ہے۔

چھٹی قسم - قلت حیض - جو اکثر عورتوں کو ایام رضاعت میں واقع ہوتا ہے۔ چونکہ ان دونوں آخر الذکر قسموں سے کچھ مضرت نہیں ہوتی۔ اس لئے ان کا علاج بھی نہیں کیا جاتا۔

فصل تیسویں - عسر درد حیض رڈس مے فوریا یعنی حیض دشواری اور درد کے ساتھ آنا۔ اس مرض میں حیض کے آنے سے ایک دو روز پہلے اور ایام حیض میں بھی مریضہ کے رحم - پیرو اور کمر میں درد ہا کرتا ہے۔ ایسی حالت میں اکثر عورات کو قلت حیض کی شکایت بھی ہوتی ہے اور بعض مسنورات کو باوجود شکایت مذکورہ کے جریان حیض میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ اسباب کے لحاظ سے اس مرض کی پانچ قسمیں ہیں۔

پہلی قسم - نوجوان لڑکیوں کو جب پہلی مرتبہ حیض آنا شروع ہوتا ہے اور اندرونی اعضاء تناسل کی طرف دوران خون تیز ہو کر ان کی رگوں میں امتلا اور تناؤ پیدا ہوتا ہے تو ان کو اس حالت کی عادت نہ ہونے کے باعث جریان حیض سے پہلے خاص جرم رحم - پیرو کمر - راتوں اور پنڈلیوں میں درد شدید ہوتا ہے۔ چند روز تک طبیعت بے چین رہتی ہے جس کا کوئی سبب ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر جب حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ درد کی تکلیف کم ہونے لگتی ہے۔ یہ قسم علاج کی محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ دو چار مرتبہ حیض آنے سے پہلے یہ درد ہوا کرتا ہے پھر جب ان اعضاء میں ایام مقررہ پر اجتماع خون کی عادت ہو جاتی ہے تو اس وقت درد ہونا بھی خود بخود موقوف ہو جاتا ہے۔

علاج - اگر درد بہت شدید ہو تو گرم پانی کسی جانور کے مثانہ یا بوتل میں بھر کر اسے سینکنا یا جوشاندہ پوست خنخاش میں اسفنج تر کر کے اس سے تکید کرنا۔ یا سبوس گندم - ریت تک بیوٹھ وغیرہ کی پوٹلی سے تکید کرنا کافی ہوتا ہے اور اگر قلت حیض کی شکایت بھی پائی جائے تو بادیان اجوائن - داجینی - تخم خرنورد - درج ترکی - تخم کاسنی - نبات سفید کا جوشاندہ پلایا جائے۔

دوسری قسم - رحم کے چھوٹا ہونے یا اس کا منہ بند ہو جانے سے بھی حیض کے وقت درد شدید ہوتا ہے۔ یہ اکثر نوجوان لڑکیوں کو شادی سے پہلے ہوتا ہے اور شادی کے بعد رفتہ رفتہ



موقوف ہو جاتا ہے اور اگر فم رحم کا بند ہونا ورم یا اندمال زخم کے باعث واقع ہو ہو تو البتہ بغیر علاج کے رفع نہیں ہو سکتا۔

علاج۔ اگر مریضہ کا رحم چھوٹا ہو تو اس کی تدبیر وہی ہے جو مرض صغیر الرحم کے بیان میں فرج ہو چکی ہے۔ اور اگر ورم کے دباؤ یا کسی تکلیف سے فم رحم تنگ یا بالکل بند ہو گیا ہو تو ورم کا علاج نہایت ضروری ہے۔ اور اگر اندمال زخم کے سبب سے فم رحم بند ہو گیا ہو اول ایسی دواؤں کا استعمال کرنا چاہئے جن سے فم رحم میں نرمی پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ مرہم و اخیلون اور خضر ساق کاؤ چربی گردہ بکری کی چربی مرع کی۔ روغن گل۔ موم سفید۔ زردی اندے کی۔ بطور فریجہ کے اندام نہانی میں رکھیں۔ اور نرمی پیدا ہونے کے بعد اسفنج خشک کی باریک بتی فم رحم کے اندر چند روز تک رکھیں اس سے فم رحم کھل کر اس کا دہانہ پھیل جاتا ہے اور تسکین درد کے لئے پوست خنخاش اور تخم کتان کے جوشاندہ میں مریضہ کو بٹھانا یا اس سے تمسید کرنا مفید ہوتا ہے اور اجزاء حیض کے لئے تخم کتان۔ باؤ بڑنگ۔ تخم میخی۔ برگ سداب دار چینی مشطرا مشع۔ پوست املانس۔ شربت نروری کا جوشاندہ مناسب ہوتا ہے۔

تیسری قسم اکثر نازک مزاج اور لاغر اندام عورتوں کو ضعف اعصاب یا تیزی حس اعصاب کے باعث ایام حیض میں درد شدت ہوتا ہے۔

علامات (۱) اول ایک دو روز حیض آکر بند ہو جاتا ہے اور درد کی شدت ہوتی ہے۔ (۲) اس کے بعد بکثرت خون جاری ہو جاتا ہے اور رحم میں تشنجی دروشل مڑوڑ اور پیچش کے شدت محسوس ہوتا ہے (۳) مریضہ نہایت پریشان و بیقرار اور غموم و متفکر رہتی ہے (۴) کبھی اختلاج قلب اور غشی کی سی نوبت آتی ہے (۵) اکثر درد دہراور دوا کی شدت ہوتی ہے۔

علاج۔ درد شدید اور زیادہ تکلیف کی حالت میں پوست خنخاش آدھ پاؤ کے جوشاندہ میں سوڈا کاربوناٹس ایک اونس ملا کر اس سے آبن و اور تمکید کریں۔ اس کے بعد اندام نہانی میں پریشیاں رکھیں صفتہ۔ اوکسائیڈ آف زنک ہ گرین۔ اکسٹراکٹ بلاڈونا ہ گرین۔ روغن کوکویا روغن کنجد یا چربی میں ملا کر شیاہ بنائیں اس سے درد کو تسکین ہوتی ہے اور جریان حیض میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح ضاد و گڑیچ دالا معمولہ خاندان شریفی نہایت نافع ہے۔

پلاسے کی دواؤں میں سے پوست المتاس مشکط المشیع۔ پوست خنخاش کا جو شانہ نہایت مفید ہے۔ اسی طرح ایونیا کاربوناں ہ گرین نقوع پودینہ سبز ایک اونس میں ملا کر پلا نا بھی بہت مفید ہوتا ہے ایضاً۔ بورلیس رسہاگہ صاف، اگرین۔ نقوع پودینہ سبز ایک اونس میں ملا کر ہر روز تین مرتبہ پلائیں۔ ایضاً گولیاں۔ اکسٹرکٹ ہائیوسائمس و گرین۔ اکسٹرکٹ بلاڈونا و پیرے گرین۔ اکسٹرکٹ جن بنی ان رب جطیانام یا اکسٹرکٹ ٹراکسی کم بقدر حاجت کے ساتھ ملا کر گولیاں بنائیں۔ یہ گولیاں تین دن کے لئے کافی ہیں۔ ان کے تین حصے کر کے ان میں سے ایک حصہ لیکر ہر روز تین مرتبہ کھلائیں۔ ان گولیوں پر حیض با فراغت آتا ہے اور درد کو تسکین ہوتی ہے چونکہ فی قسم عسر و روجیض۔ جو میلان رحم یا انقلاب رحم کے باعث واقع ہوتا ہے کیونکہ ایسے موقع پر تجویف رحم اور اس کے منافذ کی حالت درست نہیں رہتی اس کی رگوں میں اجتماع خون زیادہ رہتا ہے۔ اس لئے علاوہ ہر وقت کی تکلیف کے ایام حیض میں اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی اور حیض کا خون بدشوری خاصتہ ہو جاتا ہے۔

علامات اور علاج۔ اس قسم کا وہی ہے جو فصل انقلاب رحم اور میلان رحم میں مفصلاً مذکور ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ تسکین درد کے لئے جو شانہ پوست خنخاش یا جو شانہ برگ قنب (بھنگ) سے پیرو پر نکسید کرنا مفید ہے۔ اگر میلان یا انقلاب زیادہ نہ ہو یا اسے درست کر لیا گیا ہو تو صرف تسکین درد کے لئے یہ شیاف اندام نہانی میں رکھنا سودمند ہوتا ہے۔ صفت۔ اکسٹرکٹ بلبائی آئیوڈائنڈ۔ اکسٹرکٹ ہلک رب شوکران، ان دونوں کو بقدر مناسب ملا کر شیاف بنائیں اور استعمال کریں۔

پانچویں قسم۔ عسر و روجیض۔ جو درم یا درم غشا اور اندرونی یا بیرونی رحم یا درم خفیر الرحم کے سبب سے عارض ہو کیونکہ ایسی حالت میں ان اعضاء کی طرف دوران خون بکثرت ہوتا ہے اس لئے ایام حیض میں رحم کی ساخت اور اس کی رگوں میں اجتماع خون بکثرت ہوتا ہے اور درم کے دباؤ سے جریان حیض میں بہت کمی ہوتی ہے۔ اس لئے ایام حیض میں درد اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔

علامات اور علاج۔ اس قسم کا وہی ہے جو فصل درم رحم میں بیان کیا گیا ہے اور درم

خصیتہ الرحم کے بیان میں آئندہ لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ تسکین درد کے لئے وہ تداویع میں لائی جائیں جو اسی فصل میں چند جگہ بیان کی گئی ہیں۔

**فصل چوبیسویں۔** احتباس حیض (اسے ٹوریا یعنی حیض کا بند ہو جانا۔ اس مرض کی تین صورتیں ہیں جو مختلف اسباب سے واقع ہوتی ہیں۔

(۱) احتباس حیض کی پہلی صورت یہ ہے کہ عورت کے اندرونی اعضاء تناسل کی جانب دوران خون ہی اس قدر نہ ہو کہ اس سے فضلات طمثیہ چھٹ کر حیض کے راہ خارج ہو سکیں۔ جیسا کہ اس عورت کو ہوتا ہے جس کا رحم یا خصیتہ الرحم یا یہ دونوں عضو اصل پیدائش میں اپنی معمولی مقدار سے بہت چھوٹے مخلوق ہوں اور تمام بدن کی طرح قوت نامیہ خاص ان اعضاء کو بڑھا کر ان کی معمولی مقدار پر نہ لاسکے۔ اس لئے وہ جوانی میں بھی اپنا طبعی کم سال حاصل نہ کر سکیں۔

یاد رہے اعضاء اصل پیدائش میں بالکل ہی معدوم و مفقود ہیں۔ ایسی عورت کو ابتداً جوانی سے آخر عمر تک کبھی حیض نہیں آتا اور اس سے اس کو مثل صحیح اخلاقت مستورات کے، کوئی جسمانی مضرت یا کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ ایسی عورت کے بدنی فضلات (جو حیض کے راہ خارج ہوتے، قدرتی طور پر دوسرے طریقوں سے خارج یا تحلیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ صورت نہایت نادر الوقوع ہے۔

اسی طرح بڑھاپے کی عمر میں بھی ایک تو بدن میں خون کا ذخیرہ اور اس کی پیدائش ہی کم ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اعضاء تناسل بھی تمام بدن کی طرح مرجھا کر برائے نام باقی رہ جاتے ہیں۔ اس لئے ان کی طرف دوران خون اس قدر نہیں ہوتا کہ اس سے طمثی فضلات چھٹ کر دفع ہو سکیں اس عمر میں بھی احتباس حیض ایک طبعی امر اور معمولی بات ہے جس سے کوئی مضرت نہیں ہوتی۔ اس لئے یہ صورت شامل امراض نہیں کی جاتی ہے۔

(۲) احتباس حیض کی دوسری صورت یہ ہے کہ رحم اور خصیتہ الرحم کی حالت درست ہو اور ان کی طرف دوران خون معمولی طور پر ہو اور فضلات طمثیہ کی پیدائش بھی بخوبی ہو لیکن مرض رتق یا انسداد رحم کے سبب سے حیض جاری نہ ہو سکے۔ ایسی حالت میں

ہر مہینہ ایام مقررہ پر اندام نہانی یا ایام رحم کی تجلیف میں خون جمع ہو کر موجب فساد اور اقسام تکالیف کا ہوتا ہے۔ مرض رتق اور انسداد فم رحم خلقی کی حالت میں ابتداء میں بلوغ سے احتباس حیض ہوتا ہے اس لئے اگرچہ یہ حالت امراض غلطیہ عسر العلاج میں سے ہے لیکن تاہم اس کا علاج ممکن ہے۔ اس کو ہم دو قسم پر بیان کرتے ہیں۔

پہلی قسم۔ احتباس حیض جو باعث مرض رتق کے لاحق ہو لیکن یا در کھوکھو کہ مرض رتق کی وہ قسم احتباس حیض کا موجب ہو سکتی ہے جس میں اندام نہانی کی تجلیف یا اسکا بیرونی دہانہ بالکل مسدود ہو۔ اس کا علاج رتق کے بیان میں ذکر کیا گیا ہے۔

دوسری قسم۔ وہ احتباس حیض ہے جو انسداد فم رحم کے باعث واقع ہوا ہو۔ اگر فم رحم کا انسداد خلقی ہو تو اس کا علاج سخت دشوار ہے۔ اور اگر فم رحم میں زخم ہو کر منہ بدل ہو جانے کے بعد انسداد ہوا ہو جیسا کہ بعد ولادت یا اسقاط حمل کے زخم ہو جاتا ہے یا کسی قسم کی غلیظہ رطوبت یا ریشہ دار مادہ فم رحم کے اندر خشک ہو کر اس کو بند کر دے تو اس کا علاج اس طرح کیا جائے کہ اول چند روز تک نرم کرنے والے مرہم استعمال کریں۔ اس کے بعد بذریعہ باریک سلائی یا کسی تہی کے فم رحم کو کھول کر روغن گل میں تہی تر کر کے اس کے اندر رکھیں چند روز تک اسی طرح عمل کرنے سے فم رحم نرم ہو جاتا اور فم رحم اپنی اصلی مقدار پر کشادہ رہتا ہے۔

(۳) احتباس حیض کی تیسری صورت جو اکثر مستورات کو واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تندرستی کی حالت میں ان کو حیض ہمیشہ بافراغت آتا ہے پھر عوارض لاحقہ باعث حیض بند ہو جاتا ہے۔ باعتبار اسباب کے اس کی سات اقسام ہیں۔ ان کو مع علامات و علاج کے ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

پہلی قسم۔ احتباس حیض جو کمی خون کے سبب سے ہو جیسا کہ لاغر اندام عورتوں کو بعد کسی مرض کے نقاہت کی حالت میں۔ یا محنت شاقہ اور فاقہ کشی میں اکثر مبتلا رہنے کے وقت یا جبکہ ان کے بدن سے بذریعہ نکسیر یا بواسیر یا فصد وغیرہ کے بہت خون خارج ہو گیا ہو تو ان کو اس وقت تک حیض بند رہتا ہے جب تک کہ ان کے بدن میں خون کا ذخیرہ

بدنی ضرورتوں کے لئے کافی جمع نہ ہو جائے۔

علامات (۱) مریضہ کا نہایت لاغر اور ضعیف ہونا (۲) بدن پر خشکی۔ بے رونقی۔ اور رنگ زرد ہونا (۳) نبض میں صلابت اور ضعف شدید پایا جانا۔ رگوں کا خالی ہونا (۴) اسباب قلت خون کا مقصد مہونا۔

علاج۔ اسی حالت میں اگرچہ احتباس حیض سے کوئی بدنی مضرت مریضہ کو نہیں ہوتی لیکن ضعف بدن کو قوی کرنا اور خون صالح انسان کے لئے سب سے زیادہ مصیبت ہے۔ اس لئے بدن کو قوی کرنا اور خون صالح وافر پیدا ہونے کی تدابیر عمل میں لانا ضروری ہیں اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ مریضہ کو مقوی اور عمدہ غذا میں بقدر برداشت قوت ہاضمہ کے خوب کھلائیں۔ آرام سے رکھیں۔ جام میں گرم پانی سے اکثر غسل کرایا کریں۔ غم و فکر سے محفوظ رکھیں۔ تمام بدن پر مکھن۔ روغن مغرکہ و۔ روغن بادام۔ روغن نارچیل۔ روغن لبوب سبتہ وغیرہ کی مالش کریں۔ ریاضت معتدل کرائیں۔ غذائیں گوشت حلوان۔ گوشت مرغ فرہ۔ پلاؤ۔ دودھ۔ انڈے کی زردی وغیرہ عمدہ اور لذیذ اشیاء مناسب ہیں۔ خربہ بدن اور قوت حاصل ہونے کے بعد یا تو حیض خود بخود جاری ہو جاتا ہے یا اجراء حیض کی مناسب تدبیریں کی جاتی ہیں۔

دوسری قسم۔ احتباس حیض جو غلظت خون کے باعث واقع ہو جیسا کہ غلبہ سودا سے یا بلغم غلیظ کے خون میں مخلوط ہو جانے سے ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں رحم کی رگوں میں سے اس گارٹھے خون کا رساؤ نہیں ہو سکتا اس لئے حیض بند ہو جاتا ہے۔

اگر خون میں سودا ویت غالب ہو تو اس کی علامات یہ ہیں (۱) بدن لاغر خشک بے رونق۔ رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے (۲) نبض سخت۔ باریک۔ باریک۔ ضعیف ہوتی ہے (۳) مریضہ کو بھوک کی زیادہ شکایت ہوتی ہے۔ اور مضم ضعیف ہوتا ہے (۴) پیٹ میں نفخ و قراقر کی شکایت ہوتی ہے (۵) ڈکار میں سوزش اور دھواں سا معلوم ہوتا ہے (۶) بعد غذا کے تجھیر اور اختلاج قلب کی سی حالت محسوس ہوتی ہے (۷) درد یا دوران سر۔ فکر فاسد۔ حوت بجا اور توحش میں اکثر مبتلا رہتی ہے (۸) اگر فصد وغیرہ کے ذریعہ خون نکالا جائے تو سیاہ اور غلیظ نکلتا ہے۔

علاج (۱) اول چند روز تک مصفیات خون اور منفجات سودا پلا کر مہل سودا سے تنقیہ

کرائیں (۲) بوقت تنقیہ عام کے ایام حیض سے دو چار دن پہلے قصد سفوت اندام یا بانض یا صافن سے کسی قدر خون روا سٹے مالہ کے انکلوادیں (۳) اس کے بعد اگر ضرورت سمجھی جائے تو ایام حیض میں خون کو رقیق کرنے والی دواؤں سے آبرن کرائیں۔ نسخہ آبرن - تخم کتان - تخم خطمی - گل بابونہ - سبوس گندم - کوہ خشک - زوفا خشک - پودینہ خشک ایک ایک تولہ لیکر سب کو پانی میں جوش دیں اور ان کا صاف پانی کسی بڑے ٹب میں ڈال کر اس میں مرصیہ کو بٹھائیں۔

اگر غلبہ بلغم کے سبب خون میں غلظت ہو کر مانع حیض جریان ہوئی ہو تو اسکی علامات یہ ہیں (۱) مرصیہ کا تمام بدن پھولا ہوا ڈھیلا - نرم ہوتا ہے (۲) نبض عریض - نرم - ضعیف اور پر ہوتی ہے (۳) ہضم ضعیف اور ترش و کاریں اکثر آتی ہیں (۴) بدن میں ثقل اور کسل و کمائی پیدا ہوتی ہے (۵) حواس کند و نسیان اور نیند بکثرت آتی ہے (۶) منہ میں صابن سا گھلا رہتا ہے۔ اور پیاس مطلق نہیں ہوتی یا عطش کا ذب رجھوٹی پیاس ہوتی ہے (۷) اگر قصد وغیرہ کے ذریعہ خون نکلے تو گاڑھا اور کم سرخ ہوتا ہے۔

علاج (۱) منضجات بلغم پلا کر سہل بلغم سے اسہال کرائیں۔ اگر ضرورت ہو تو مسہل میں حبہ لیاریج کا استعمال بھی مناسب ہے۔

نسخہ منضج بلغم - بادیان - بیج بادیان - بیج کرفس - پرسیاوشان - باد و نمبوہ - تخم کنوٹ - اصل السوس گاؤ زبان - خمیرہ بنفشہ ان دواؤں کا وزن مقرر کرنا اور ان میں حسب موقع تغیر و تبدل کرنا طبیب کی رائے پر موقوف ہے (۲) اس کے بعد ایام حیض سے ایک ہفتہ پہلے دو یا تین دن تک تخم کرفس - انیسون - بادیان - پودینہ خشک - مشکطرا مشنع - شہدخالص کا جو شانہ پلا میں (۳) آبرن - نمکید - بخور و غیرہ تدابیر خارجیہ بھی حسب موقع مناسب ہیں۔ نسخہ آبرن - گل بابونہ - اکلیل الملک - سقتر - سداب - پودینہ - مرزنجوش - تخم شبت پانی میں جوش دے کر ایک بڑے ٹب میں آبرن کریں (۴) ایام حیض سے دو تین دن پہلے قصد صافن کرنا یا پنڈلیوں پر سینگیاں لگانا مفید ہوتا ہے (۵) اجزاء حیض کی اعانت کے لئے نسخہ بھی مفید ہے - صفتہ - پوست الملتاس - پرسیاوشان - مشکطرا مشنع - قند سیاہ کہنے پانی میں جوش دے کر پلائیں۔

**تیسری قسم۔** احتباس حیض جو عروق رحم کے انسداد سے واقع ہو۔ جیسا کہ خون میں لمغم غلیظ یا چربی کا مادہ زیادہ ہو جانے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یا اندام قروح رحم کے بعد عارض ہوتا ہے۔ علامات (۱) غلبہ بغم کی علامات موجود ہوتی ہیں (۲) قواعد کیسٹری کے موافق امتحان کرنے سے پیشاب یا چربی کا مادہ معلوم ہوتا ہے (۳) اگر اندام قروح اسکا سبب ہو تو ان کا پہلے ہونا اس کی صریح علامت ہے۔

**علاج (۱)** غلبہ بغم کی حالت میں وہی علاج کرنا چاہئے جو اوپر بتایا گیا ہے (۲) خون میں چربی کا مادہ زیادہ ہونے کی حالت میں نمکین جلاب رشل ملنے شیا سلفاس کے مختلف اوقات میں اکثر دیتے رہنے سے بہت نفع ہوتا ہے (۳) اور ایسی حالت میں اجراء حیض کیلئے یہ گولیاں نہایت مفید ہوتی ہیں۔ صفحہ۔ مری۔ جاکوئیر سکینج۔ ہینگ۔ جیٹھ۔ ہر ایک چھ ماشہ سب کو باریک پسیر بسکپھرہ کی تازہ جڑ کے عرق میں ملا کر چنے کی برابر گولیاں بنالیں۔ ان میں سے تین ماشہ لیکر تازہ پانی کے ساتھ نگل لیا کریں۔

اگر اندام قروح کے سبب سے رحم کی رگیں بند ہو گئی ہوں تو یہ صورت علاج پذیر نہیں ہے البتہ احتباس حیض کی مصرتوں سے مریضہ کو محفوظ رکھنے کے لئے ہمیشہ بعد چنماہ تنقیہ بدن بذریعہ عدد واسہال کے کرتے رہیں۔ اور مریضہ کو اکثر روزہ رکھنے اور مناسب ریاضت کرنے کی ہدایت کریں۔

**چوتھی قسم۔** احتباس حیض جو رحم کی ساخت کے خشک ہو جانے اور اس کی اندرونی جھلی کے سخت ہو جانے سے اور رحم کی رگوں کے دھانے بند ہو جانے سے واقع ہو۔ جیسا کہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ رحم کے خراج میں حرارت بخفہ یا برووت یا ہیوسٹ مکتفہ غالب ہو جائے۔ اگر حرارت رحم سبب مرض کا ہو تو اس کی علامات یہ ہیں (۱) رحم کے اندر جلن اور سوزش محسوس ہوتی ہے (۲) قلت اشتہا۔ شدت عطش (۳) زروی یا سرخی اور سوزش بول کی (۴) سرعت و تواتر وضع منبرض کا (۵) قبض شکم اور خشکی برازی کی۔

**علاج (۱)** شیرہ تخم خرفہ۔ مخمر تخم کدو شیریں۔ شیرہ تخم خیابین۔ شربت نیلوفر وغیرہ سے ترید و تسکین حرارت کریں۔ شربت صندل۔ شربت لیو۔ شربت خنکاش بھی مناسب ہے۔

(۲) شیر خشت - مغز تخم کدو شیریں - تخم خبازی - بادیان - سماق - نبات سفید باریک میکسکریانی خالص میں ملا کر فرزجہ کے طور پر استعمال کریں۔

اگر برووت رحم سبب مرض کا ہو تو اس کی علامات یہ ہیں (۱) رحم کے اندر سردی محسوس ہوتی ہے (۲) مریض کو پیاس کی شکایت نہیں ہوتی اور منہم خراب ہوتا ہے (۳) پیشاب سفید اور بکثرت آتا ہے (۴) نبض سست اور ضعیف ہوتی ہے۔

علاج (۱) جوارش جالینوس یا دوا المسک اور مثل ان کے دوسری ادویات جن سے بدن میں خوشگوار حرارت پیدا ہو۔ معدہ اور جگر میں قوت ہو۔ رحم کی سردی رائل ہو استعمال کریں (۲) قرص مرکبی - تخمین رحم کے لئے بے نظیر ہے - صفنتہ - مرکبی ۹ ماشہ - ترمس سواتولہ - پودینہ خشک - برگ سداب - مشکطرا مشیع - جیٹھ - ہر ایک ۶ ماشہ - سب کو باریک کوٹ چھانکر نگاہ رکھیں اور ہینک - سکونج - جاوشیر - ہر ایک چھ ماشہ پانی میں گھول چھان لیں اور اس میں پسی ہوئی دوائیں ملا کر قرص بنالیں اور ان میں سے بقدر مناسب لے کر ہمراہ جوشاندہ اہل کے پلائیں اس کا نسخہ یہ ہے - اہل - پرسیا و شان - مشکطرا مشیع - ہر ایک ۷ ماشہ - ترمس - پودینہ خشک - ہر ایک ۵ ماشہ - نبات سفید ۳ تولہ بقدر مناسب پانی میں جوش دے کر پلائیں۔ (۳) فرزجہ سخن رحم استعمال کریں - صفنتہ - زعفران - مشک - عنبر - خود شیریں - ناگر موٹھ - لونگ - ہر ایک بقدر مناسب لے کر باریک پیسیں اور گلاب میں ملا کر ریشمی کپڑا اس میں آلودہ کر کے فرزجہ رکھیں۔

اگر بہوست رحم کے سبب سے اس کی رگیں بند ہو کر احتباس حیض واقع ہو تو اس کی علامات یہ ہیں (۱) رحم و فرج کے اندر خشکی ہوتی ہے (۲) مریض لاغر اور بدن پر خشکی و بے رونقی ہوتی ہے (۳) نبض میں صلابت اور خلویا پایا جاتا ہے۔

علاج (۱) مریض کو مرغن غذا میں کھلائیں (۲) گائے کا دودھ اور منتر بادام و مغز تخم کدو کا حیرہ پلائیں (۳) دوا بہدانہ - شیرہ مغز تخم کدو شیریں - شیرہ مغز تخم تربوز عرق گاوزبان شربت نیلوفر بہت مناسب ہے (۴) روغن مغز تخم کدو - روغن ہنقشہ - روغن نیلوفر - چربی بط کی - چربی مرغ کی ملا کر پیڑ و پر منتر مگاہ کے اندر باہر ملیں (۵) عورت کا دودھ روغن کدو

فرزجہ سخن رحم

جوشاندہ اہل قرص مرکبی

نسخہ سخن رحم



اور مکھن میں کپڑا تر کر کے فرزجر کریں (۱۶) آئرن مرطب بھی بہت نافع ہوتا ہے صفت گل نمفتہ۔  
گل نیلو فر۔ تخم خطمی۔ جو قشر۔ پوست خنکاش۔ بیری کے پتے خبازی کے پتے۔ پانی میں پکا کر  
اس میں میضہ کو بٹھائیں۔

پانچویں قسم۔ احتباس حیض جو فرہی مفرط کے سبب سے واقع ہو کیونکہ زیادہ فرہی کی  
حالت میں غلبہ بلغمیت کے باعث خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں چربی کا مادہ زیادہ ہو جاتا ہے  
ایسی حالت میں ایک تو وہ چربی کے اجزاء رحم کی باریک رگوں کے دہانے بند کر دیتے ہیں۔ بلکہ کبھی  
ایسا بھی ہوتا ہے کہ رحم کی ساخت میں اس قدر چربی زیادہ ہو جاتی ہے کہ گویا وہ بالکل چربی ہے۔  
دوسرے خون کی غلظت۔ تیسرے شکم کی احتشاء کا دباؤ رحم کے اوپر پڑتا ہے اسلئے حیض بند ہو جاتا ہے  
علامات (۱) فرہی مفرط ایسی ظاہری علامت ہے کہ اس کے علاوہ دوسری علامتوں کی  
چندان ضرورت نہیں (۲) غلبہ بلغم کی علامتیں جو قسم دوم میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ متسلم اس  
حالت میں بھی موجود ہوتی ہیں۔

علاج۔ سب سے بہتر علاج ثقیل غذا و کثرت ریاضت ہے۔ بکثرت روزہ رکھنا اور مرطب  
اشیاء سے اجتناب کرنا۔ محنت شاقہ کرنا اور پانی کم پینا بہت فائدہ کرتا ہے بھوک کی حالت میں  
حام بکثرت کرنا بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ اظرفیل صغیر یا معجون کوئی یا انیسون گلقد میں ملا کر ہمیشہ  
کھانا مفید ہے۔ دواء اللک صغیر فرہی مفرط کے ازالہ میں بے نظیر ہے۔ اس تدابیر کے علاوہ  
خاص اجزاء حیض کے لئے ایام مقررہ سے چند روز پہلے تخم کرفس۔ انیسون۔ تخم کاسنی۔ اجوائن تخم مٹی  
اسارون۔ گلقد کا جوشاندہ پلانا چاہئے۔ اس کے بعد اور ایام حیض سے دو تین دن پہلے فصد  
ہفت اندام یا فصد صافن کرائیں۔ عانہ کے مقام پر تکمید کرنا اور پنڈلیوں پر سینکیاں لگوانا بھی  
مفید ہے۔ نسخہ تکمید۔ سنبل الطیب۔ واپرینی۔ جب بلساں۔ عود بلساں۔ قسط تلخ۔ وائلاچی خور  
حائقل۔ ہر ایک چھ ماشہ سب کو نیم کوفتہ کر کے پوٹلیاں بنائیں اور تو سے پر گرم کر کے تکمید کریں۔  
نسخہ دواء اللک صغیر۔ لک مغسول۔ قسط تلخ۔ قحاح اذخر۔ ترمس۔ جب الغار۔ تخم مٹی۔ مرج  
سیاہ۔ ہر ایک ایک تولہ۔ ریونڈینی ڈیڑھ تولہ۔ کوٹ چھانکر شہد خالص ۲۴ تولہ میں ملائیں مقدار  
خوراک تین ماشہ۔

چھٹی قسم۔ احتباس حیض جو میلان رحم کے سبب سے پیدا ہو۔ یہ ایسی حالت میں ہوتا ہے جبکہ میلان رحم استفد زیادہ ہو کہ فم رحم پر دباؤ پڑ کر بالکل راستہ بند ہو جائے۔ اسکی علامتیں اور علاج فیصل میلان رحم میں مفصل درج ہیں۔

ساتویں قسم۔ احتباس حیض جو ورم رحم کے باعث واقع ہو۔ بالخصوص ورم صلب مزمن کی حالت میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کیونکہ صلابت رحم کی حالت میں اس کی رگوں پر دباؤ پڑنے کے باعث ان میں دوران خون اچھی طرح نہیں ہو سکتا۔ اور نہ خون رگوں میں مترشح ہو سکتا۔ اسلئے حیض بند ہو جاتا ہے۔ اس کی علامتیں اور علاج ورم رحم کی بحث میں مفصل درج ہو چکے ہیں۔ احتباس حیض کے نتائج۔ اگر چند روز تک احتباس حیض کی طرف توجہ نہ کی جائے یا علاج ناکافی سے کوئی نفع مرتب نہ ہو تو فضلات طمثیہ کے بدن میں رک جانے سے رفتہ رفتہ خون میں گلطھاپن اور سوداویت کا غلبہ ہو جاتا ہے جس سے وہ پرورش بدنی کے قابل نہیں رہتا۔ اور تمام بدن کا جو عضو کچھ بھی ضعیف ہو فوراً اس کے فساد سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ اس آفت کو عورتوں کے حق میں اگر تمام امراض کی جڑ کہا جائے تو بالکل درست ہے۔ کیونکہ را، ایک تو اس موذی مرض کے فساد سے خود بچا رہے رحم کا ہی محفوظ رہنا دشوار ہوتا ہے اکثر امراض رحم اسی احتباس حیض کے بدولت پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ورم رحم۔ صلابت رحم۔ بواسیر رحم۔ نفخہ رحم۔ وجع رحم۔ استسقا رحم۔ اختناق رحم۔ عقر وغیرہ امراض لاحق ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب حیض کا خون رحم کی ساخت اور اس کی رگوں میں ہمیشہ ایام ماہواری میں جمع ہوتا ہے۔ اور اس سے خارج نہیں ہو سکتا تو ضرور اس کی ساخت میں اپنا فساد برپا کرے گا۔

دوسرے یہ موذی مرض یا تو بذات خود یا اپنے اسباب و عوارضات کے باعث مرض عقر ربانچہ پن پیدا کرتا ہے۔ اور بچا رہی مریضہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتی ہے۔

(۲) رحم ماؤف کی مشارکت سے معدہ و امعاء کے افعال غراب ہو جاتے ہیں۔ مریضہ اکثر ضعیف ہضم۔ نفخ و قراقر شکم۔ مثلی کثرت تشنگی۔ کمی اشتہا کی آفت میں مبتلا رہتی ہے۔ مرض باؤگولہ جو مشہور ہے وہ اکثر عورتوں کو اسی احتباس حیض کے سبب سے لاحق ہو کر رہتا ہے۔

(۳) جگر اور گردوں کا فعل تباہ ہو جانے سے اکثر عورتوں کا جسم پھول جاتا ہے بدن ڈھیللا

اور ضعیف ہو جاتا ہے۔ پیٹ بڑھ جاتا ہے چہرہ اور پاؤں پر تہیج ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کبھی مرض استسقاء تک نوبت پہنچتی ہے۔

(۴) فساد خون کے سبب سے بعض عورتوں کو غلبہ سودا ویت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اور بعض کے بدن میں بلغمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سودا ویت کی حالت میں بدن پر خشکی۔ بے رونقی لاغری ظاہر ہوتی ہے۔ اور بعض جلدی امراض پیدا ہو جاتے ہیں جیسے واو۔ خارش پھوٹے۔ پھنسیاں۔ جلد میں گرمی سوزش۔ پتنگے سے لگتا وغیرہ۔ اور غلبہ بلغمیت کی حالت میں فربہی مفطر ہو جاتی ہے۔ پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ چلنے پھرنے اور ادنیٰ حرکت سے دم پڑھ جاتا ہے پھیپہہ میں خرابی پیدا ہو کر ضیق النفس اور کھانسی ہو جاتی ہے۔

(۵) بعض عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہو جاتی ہیں جیسے خفقان۔ اختلاج قلب۔ غشی وغیرہ۔ (۶) اکثر امراض دماغی و عصبانی بھی اس ہی احتباس حیض کا نتیجہ ہوتے ہیں جیسے درمہ شدیدہ و وار۔ سند۔ صرع۔ بالخیلیا۔ اور کبھی جنون تک بھی نوبت پہنچتی ہے۔ امراض عصبانی جیسے شخ۔ لقوہ فالج۔ استرخا وغیرہ بھی احتباس حیض سے لاحق ہو سکتے ہیں۔

(۷) ان امراض کے علاوہ بعض مستورات اس ہی احتباس حیض کے سبب سے حمیات مرمنہ یا شدید قسم کی تپوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یا ان کے خاص عضویں کوئی مرض شدید ہو جاتا ہے جیسے رعات شدیدہ۔ یا ورم گوشت یا دروچم وغیرہ۔

ان خراب نتائج پر تفصیلی نظر ڈالنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ احتباس حیض عورتوں کے لئے کس قدر خوفناک مرض ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ احتباس حیض کی ہر ایک مریضہ ان تمام عوارض میں مبتلا ہو جاتی ہے بلکہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ احتباس حیض کے باعث ان امراض میں سے کوئی سامرض پیدا ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اس موذی مرض کے باعث اکثر مستورات ان عوارض میں مبتلا دیکھی جاتی ہیں۔

فصل پچیسویں اختناق الرحم (سٹیریلا) یہ مرض جوانی کی عمر سے تقریباً ۵ برس کی عمر تک اکثر لاحق ہوتا اور دوروں کے ساتھ واقع ہوتا ہے۔ اور مرض صرع (مرگی) اور غشی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے کیونکہ اس مرض میں صرع کی طرح مریضہ گر پڑتی ہے اور اعضا میں

تشخ ہو تا ہے اور غشی کی طرح اس مرض میں بھی مریضہ کے ہاتھ پاؤں سرد نمب اور سانس کی حرکت ضعیف چہرہ کارنگ متغیر ہو جاتا ہے لیکن اس مرض میں کامل بیہوشی نہیں ہوتی۔

اسباب۔ یونانی اطباء نے اس مرض کے دو سبب بتائے ہیں ایک تو احتباس حیض یا نفاس اور دوسرے احتباس منی۔ کیونکہ یہ مرض احتباس حیض یا نفاس والی عورتوں کو یا بعد بلوغ کے ان بکرہ لڑکیوں کو جن کی شادی میں زیادہ تاخیر ہوئی ہو یا ان جوان عورتوں کو اکثر ہوتا ہے جنہیں جماع کی طرف زیادہ رغبت ہو اور کسی سبب سے وہ میسر نہ آئے۔

ڈاکٹروں نے اس مرض کے اسباب بیان کرنے میں یونانی اطباء کے بیان سے صرف اتنا اختلاف کیا ہے کہ احتباس حیض یا نفاس وغیرہ سے جو عوارض دوسرے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی مرض اختناق الرحم کے اسباب میں شمار کر لیا ہے۔ چنانچہ ان کا قول ہے کہ نازک مزاج عورتوں کو جوانی سے ۵۵ سال کی عمر تک اگر امور خانہ داری سے فارغ البالی اور عیش و عشرت کی حالت میں باوجود طبعی خواہش کے مناسب موقع پر ان کی شادی نہ ہو اور وہ ہمیشہ اسی فکر میں مبتلا رہیں تو کثرت افکار سے ان کا دماغ تھک جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی طرف دوران خون وافر ہوتا ہے لیکن کثرت افکار کے باعث اسے استقدر مہلت نہیں ملتی کہ وہ خون سے نفع اٹھا سکے۔ اس لئے دماغ کی پرورش پورے طور پر نہیں ہو سکتی اور وہ بدرجہ غایت ضعیف ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی تمام اعضا میں ضعف ظاہر ہوتا ہے چنانچہ ضعف رحم کے باعث اول تو احتباس حیض یا عسور و حیض یا کثرت حیض یا سیلان رحم کا عارضہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد قبض شکم۔ سوہمی۔ نفخ شکم ہو کر اختناق الرحم کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔

کیفیت حدوث مرض۔ ایسی حالت میں خالص رحم یا اس کے قرب وجوار والے اعضا میں جمع ہونے والا مادہ حیض و نفاس کا خون یا منی جب کچھ مدت تک رکا رہتا ہے تو اس سے دو قسم کے فساد برپا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رحم کی مشارکت سے رفتہ رفتہ معدہ و امعاء کے افعال درست نہیں رہتے یہ فہم خواب ہو جاتا ہے اور شکم میں ریلج بکثرت پیدا ہونے لگتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو مادہ رحم کے اندر جمع ہوتا ہے رفتہ رفتہ اس میں ایک خاص قسم کی زیر پٹی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس زہریلے اثر سے رحم کے عصبی ریشے رازیت کے باعث

سکڑنے لگتے ہیں اسی وجہ سے تمام رحم میں سخت انقباضی کیفیت اور اختناقی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور چونکہ رحم کے ساتھ دل اور دماغ کو عصبی مشارکت ہوا اسلئے انقباض رحم کیساتھ ہی دل میں اختلاجی حرکت اور دماغ و عصبانیت کی کیفیت پیدا ہو کر مریضہ کی حرکات اور پیروں میں فوراً اور اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے بدن اینٹھ جاتا ہے اور علم ہوسکتا ہے کہ رحم کے اندر کسی قسم کے زہریلے بخارات (گیس) پیدا ہو کر خاص رحم پر اثر کرتے اور بند رعبہ عصبی تعلق کے اختلاج طلب و تنج دماغ کا موجب ہوتے ہیں۔

عوارض بحالت دورہ مرض۔ اس بیان سے آپ کو بخوبی ظاہر ہو گیا کہ اگرچہ اختناق الرحم کی ابتداء تو رحم کی خرابی ہی سے ہوتی ہے لیکن مشارکت رحم کے باعث معدہ و امعاء اور قلب و دماغ میں بھی اس کا فساد سراپت کر جاتا ہے۔ چنانچہ نوبت شروع ہونے سے پہلے (۱) اکثر مریضہ کو متلی ہوتی ہے یا کلیجہ جلتا ہے اور شکم میں نفخ معلوم ہوتا ہے (۲) جمائیاں اور انگڑائیاں آتی ہیں۔ بدن بھاری اور سست ہو جاتا ہے (۳) دل دھڑکنے لگتا اور سانس بمشکل آتا ہے اور چہرہ پر زردی سی چھا جاتی ہے (۴) حواس اور فکر میں خلل واقع ہوتا ہے مریضہ کو کبھی گرمی اور کبھی سردی لگتی ہے (۵) سر میں قدرے درد آنکھوں میں اندھیرا سا ہو جاتا اور آنسو بھر آتے ہیں (۶) پٹیلیوں میں کمزوری اور بے چینی سی معلوم ہوتی ہے۔

اس کے بعد جب نوبت کا وقت اور بھی قریب آ جاتا ہے تو مریضہ کو پیٹرو کے مقام یا قولوں کے بائیں حصہ میں ریاح کا گولہ سا پھرتا ہوا اور اوپر کی طرف چڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جب ان ریاح کی اذیت فہم معدہ اور مخافات قلب تک پہنچتی ہے اسوقت مریضہ کا سانس گھٹنے لگتا ہے اور اختلاج قلب شدت ہونے لگتا ہے جس سے مریضہ بدحواس ہو کر ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے اور بیہودہ بکے لگتی یا ہنسنے لگتی ہے یا چیخ مار کر جھپٹن ہو جاتی اور گر پڑتی ہے اور اگرچہ طاقت بولنے کی بالکل نہیں رہتی لیکن قوت سماعت باقی رہتی ہے۔ سانس میں تنگی اور چہرہ کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ گردن پیچھے کو کھینچ جاتی اور بدن اینٹھ جاتا ہے۔ آنکھوں کو پوٹوں میں حرکت اختلاجی ہوتی ہے لیکن آنکھ کے ڈھیلے اپنی جگہ قائم وغیرہ متحرک ہوتے ہیں اسکے بعد جب دورہ ختم ہو چکنا ہے اسوقت مریضہ کا پیشاب بکثرت خطا ہو جاتا ہے اور نہایت گہرا اور لمبا سانس بیکر مریضہ ہوش میں آ جاتی ہے لیکن درد سر شدید اور اعضا شکنجی کی شکایت کرتی ہے۔

یا در کھوکھ کو یہ عوارض جو کچھ بیان کئے گئے شدت مرض کی حالت میں پائے جایا کرتے ہیں۔ اور اگر مرض اور بھی زیادہ شدید ہو تو اس کے دورے بہت جلد جلد پڑتے اور زیادہ دیر تک ہتھڑی ہیں ایسی حالت میں یہ مرض مہلک اور خوفناک ہوتا ہے۔ اگر مرض خفیف ہو تو نوبت زیادہ مدت کے بعد پڑتی ہے اور جلد افاقہ ہو جاتا ہے۔ اور نیز نوبت نوبت عوارض اس قدر خفیف ہوتے ہیں کہ صرف حص و حرکت میں قدرے فتنہ پڑتا ہے اور سانس میں تنگی ہوتی ہے۔ گلا پھول جاتا ہے رخسارے سُرخ ہو جاتے ہیں پپوٹوں میں حرکت اختلاجی ہوتی ہے اور مریض بول نہیں سکتی۔

عوارض بحالت وقفہ۔ اختناق الرحم کی نوبتوں کے درمیانی زمانہ میں علاوہ عوارض متعلقہ رحم اور ضعف ہضم وغیرہ کے (۱) بعض عورتوں کو اکثر اختلاج قلب۔ گرانی سر۔ دروسر کی شکایت رہتی ہے (۲) بعض کو روشنی کی بالکل برداشت نہیں ہوتی (۳) بعض عورتوں کے پستان میں سخت تناؤ کا سادہ رہتا ہے (۴) بعض مستورات کی پشت میں سخت درد ہوتا ہے۔ (۵) بعض کو احتباس بول ہوتا ہے (۶) بعض مستورات کے جسم میں کسی خاص مقام کی حس اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ اس مقام کو دبائے یا کوئی چیز لگانے سے فوراً نوبت مرض شروع ہو جاتی ہے اور اگر اس مقام پر کوئی مخدر چیز مثل برف یا اینتھر کے، لگائی جائے تو نوبت رک جاتی ہے۔ (۷) بعض عورتوں کو بعض رنگوں کے دیکھنے سے فائدہ اور بعض رنگ کے دیکھنے سے نقصان ہوتا ہے (۸) بعض عورتوں کی آواز بڑھ جاتی ہے (۹) بعض عورتوں کے دل میں ذات الجنب کا خیال جم جاتا ہے (۱۰) بعض کو فالج کا خیال دھم (۱۱) بعض خیال کرتی ہیں کہ انکے شانہ میں پتھری پیدا ہو گئی ہے ان تمام عوارض کے متعلق ڈاکٹروں کی رائے تو یہ ہے کہ اکثر عورتیں اول تو فریب کے طور پر اپنے آپ کو ان امراض میں مبتلا بتایا کرتی ہیں۔ لیکن کچھ مدت کے بعد ان کے دل میں یہ وہی خیالات اچھی طرح جم کر واقعی طور پر ان امراض میں سے کسی مرض کو پیدا کر دیتے ہیں۔

لیکن ہمارے خیال میں عموماً عورتوں پر فریب کا الزام لگانا خصوصاً ایسے شدید موزی مرض کی حالت میں اٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غالباً کچھ غیر مناسب نہ ہوگا کہ اول تو عموماً عورتوں میں شدید مرض و تکالیف کے برداشت کرنے کی قابلیت ہی کم ہوتی ہے اسلئے وہ تھوڑی تکلیف سے بھی مردوں کی نسبت زیادہ متاثر ہوا کرتی ہیں اس کے علاوہ ضعف دماغ اختلال ذہن اور

فساد و تفکر اس مرض کیلئے لازم ہیں۔ اس وجہ سے واقعی طور پر ان کے ذہن میں یہ خیالات فاسد رہ جاتے ہیں۔ اس لئے ان کو دیدہ و دانستہ فریب کرنے سے بالکل بری سمجھنا چاہئے۔ تشخیصی علامات۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اختناق الرحم اور مرگی کے دورے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس لئے ان دونوں مرضوں میں فرق کرنا علاج کے لئے نہایت ضروری ہے تاکہ علاج میں غلطی واقع نہ ہو۔ ان دونوں مرضوں میں تشخیصی علامات کا فرق ذیل کے نقشہ سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے۔

نمبر شمار	اختناق الرحم کی علامتیں	صرع کی علامتیں
۱	نوبت کے وقت کامل بیہوشی نہیں ہوتی	کامل بیہوشی ہوتی ہے
۲	چہرہ زرد یا سرخ۔ کچھاوٹ نہیں	چہرہ اودا۔ ہولناک۔ ایک جانب کو کچھا ہوا
۳	منہ بند۔ زبان اپنی جگہ پر	دانت کھلے ہوئے۔ زبان باہر نکلی ہوئی
۴	آنکھیں بند۔ پوٹوں میں حرکت اختلاجی اور ڈھیٹے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں	آنکھیں نصف کھلی ہوئیں۔ ڈھیٹے متحرک پتلی اوپر کو چڑھی ہوئی۔
۵	کف بالکل نہیں ہوتا ہے	کف سفید یا سرخی مائل جاری ہوتا ہے۔
۶	سانس ضعیف خراٹے کی آواز بالکل نہیں آتی ہے۔	سانس مشکل آتا ہے خراٹے کی آواز شدت ہوتی ہے۔
۷	بدن اینٹھ جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں زور سے سکڑتے اور پھیلتے ہیں۔	ایک جانب تشنج زیادہ اور دوسری طرف کم ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ (۱) اگر مریض بالکل بیہوش ہو (۲) چہرہ اودا اور تشنج (۳) زبان نکلی ہوئی ہو (۴) منہ سے کف جاری ہوں (۵) سانس خراٹے سے چلتا ہو (۶) آنکھوں کی پتلیاں اوپر کو چڑھی ہوئی ہوں (۷) بدن میں ایک طرف تشنج زیادہ اور ایک طرف کم ہو تو مرض صرع ہی اختناق الرحم نہیں ہے۔

علاج نوبت کے وقت سب سے زیادہ خیال رکھنے کی لائق یہ بات ہے کہ اگر مریضہ حاملہ ہو یا اس کا مزاج بہت گرم ہو تو سنگھانے یا فم رحم پر لگانے کی ادویات زیادہ گرم اور تیز نہ ہونی چاہئیں۔ اور فوری محکات کے استعمال سے بھی استفاط حمل کا خوف ہے ان تمام باتوں کا لحاظ رکھ کر بحالت نوبت فویل کی تدبیر عمل میں لائی جائیں (۱) مریضہ کی رانوں اور بازو پر زور سے بندش کر دیں (۲) ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں پر نمک اور رائی اچھی طرح زور سے ملیں (۳) مریضہ کے چہرہ پر ٹھنڈا پانی زور سے چھڑکیں (۴) پیاز اور لہسن یا کا فور یا ایمونیا کی ہوا سنگھائیں۔ یا جندبیدستر۔ بچھکنی۔ جاوشیر یا ایک پیسکرناک میں نفوخ کریں (۵) گندھک اور گوگل کی دھونی ناک کے سامنے کریں (۶) روغن چنبلی۔ روغن گل۔ روغن بادام میں قدرے مشک حل کر کے فرج کے اندر اور فم رحم پر ملیں یا پودینہ کوہی۔ لونگ۔ مرچ سیاہ زعفران کا فرزجہ کریں (۷) پٹرو کے مقام پر اور رانوں کے اندرونی جانب خالی سینگیوں لگائیں۔ (۸) مریضہ کا نام لے کر اس کے کان میں زور سے پکاریں (۹) حکیم شہداء الدولہ مرحوم نے اس عمل کی نہایت تعریف کی ہے کہ بیہوشی کے وقت مریضہ کی ناک اور منہ کو تھوڑی دیر تک ہاتھ سے بند کر لیں۔ اس عمل سے مریضہ کا سانس گھٹ کر اس کا دل گھبراتا ہے اور وہ فوراً ہوشیار ہو جاتی ہے (۱۰) اگر اختناق الرحم کا باعث احتباس منی اور ترک جماع ہو تو اس حالت میں اگر جماع میسر آئے تو یہ فعل نہایت مفید اور زوال نوبت کی بہتر تدبیر ہے (۱۱) اگر احتباس حیض کے باعث یہ مرض لاحق ہو تو فرغیوں اور مرچ سیاہ کا فرزجہ کرنا بہت مفید ہے۔ یہ تمام تدبیریں جو کچھ بیان کی گئی ہیں ان میں سے جو تدبیر ہو سکے وہ محض ازالہ نوبت کے لئے کارآمد ہے لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نوبت کے وقت مریضہ کو بیہوش سمجھ کر کوئی فعل یا حرکت مریضہ کے خلاف طبع عمل میں نہ لانی چاہیے کیونکہ وہ بالکل غافل اور بیہوش نہیں ہوتی بلکہ صرف اس کی حرکات اس کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں اور وہ بولنے پر بالکل قادر نہیں ہوتی ہے

علاج بعد زوال نوبت۔ اگر مریضہ حاملہ نہ ہو تو اختناق الرحم کا ابتدائی سبب دریافت اور تشخیص کر کے اس کے موافق تدبیر کریں۔



مثلاً اگر اختناق الرحم کا سبب احتباس منی اور ترک جماع ہو جیسا کہ اکثر بیوہ عورتوں یا باکرہ لڑکیوں کو واقع ہوتا ہے تو سب سے بہتر اس کی تدبیر یہ ہے کہ رواج کے موافق مریضہ کی شاوی کر دی جائے۔ اور اگر بروئے تحقیقات یہ بات ثابت ہو کہ احتباس حیض کے باعث یہ مرض لاحق ہوا ہے تو احتباس حیض کے اسباب تلاش کر کے اسکے موافق علاج کرنا چاہئے چنانچہ اگر احتباس حیض کا سبب مرض رتق یا انسداد رحم ہو تو اس کی تدابیر عمل میں لائی جائیں جو ان امراض کے بیان میں تفصیل کے ساتھ درج ہو چکی ہیں اور اگر یہ لاعلاج ثابت ہوں تو مریضہ کی حفظ صحت کے لئے ہمیشہ بذریعہ فصد کے بمقدار مناسب خون نکلوادیا کریں تاکہ اس قسم کی آفات سے محفوظ رہے۔

اور اگر میلان رحم یا ورم رحم کے سبب سے احتباس ہو کہ مرض اختناق الرحم کا لاحق ہونا ثابت ہو تو ان امراض کا علاج کرنا چاہئے جو اپنے مواقع پر درج ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر رحم کی ساخت اور اس کے مزاج میں خلل واقع ہونے کے باعث احتباس ہو کہ اختناق الرحم کا موجب ہو جائے تو اس کا علاج کرنا چاہئے جو اس کے بیان میں درج ہے۔ اور اگر غلبہ بلغمیت یا فربہ منفطر کے باعث احتباس حیض ہو کہ یہ مرض پیدا ہوا ہو تو لطافات خون اور منضجات بلغم ہلکا کر سہل بلغم سے مع حب ایاج یا حب لونغا یا حب صطیحون کے تنقیہ کرانا چاہئے اس کے بعد معجون مشرودیطوس۔ یا دھرتنا۔ یا معجون غیاثی همراه جو شانہ انیسون۔ یا ماوالاصول کے بہت نافع ہے اور یہ دوا بھی نفع کرتی ہے۔ صفتہ۔ غاریقون پونے دو ماشہ دوا المسک ۵ ماشہ یا شہد خالص تولہ میں ملا کر ہر روز کھالیا کریں۔ ایضاً۔ حمام کرنا اور گندہک کے پانی سے آہزن کرنا بھی مفید ہے۔

نسخہ معجون دھرتنا۔ جو قرا بادین قادری اور تحفہ سے نقل کیا گیا ہے یہ معجون رحم کی سردی کو دفع کرتی اور احتباس حیض و ولول کے لئے مفید ہے۔ شکم سے ریح غلیظہ کو تحلیل کرتی اور جکرو تلی کے سد سے کھولتی ہے۔ سرد مادہ کے بخاروں اور کھانسی اور سستی اعضا کو اور بلغم کی زیادتی سے سانس رک جانے کو فائدہ مند ہے۔ صفتہ۔ تخم حرمل ڈیڑھ مثقال۔ لبان ذکرہ مصطکی حب لبان

۱۔ نوٹ ایک من طبی و دوا کل۔ ایک درم ۳ ماشہ کا۔ ایک استار سارے چار مثقال کا۔ اور قبل شیخ ۲۔ درم کا اور ایک مثقال ۳۔ ماشہ کا ہوتا ہے

زعفران - اکلیل الملک - باچھڑ - مرچ سیاہ - ہر ایک دس درم - ریونڈ چینی - زراوند طویل -  
 زراوند مدحرج ہر ایک بیس درم - انیسون - مونٹھ - قسطرغ - سیلجہ ہر ایک تین استار - لونک ہر دو درم  
 کلکی سفید - گل سرخ - کلونجی ہر ایک چھ استار - صبر مقوڑی مغسول چودہ درم - زرباود و روج  
 عقربی ہر ایک ۴ درم - سب کو باریک کوٹ چھان کر تمام دواؤں سے سہ چند شہد خالص مصفی  
 میں ملائیں اور چینی کے برتن میں محفوظ رکھیں - مقدار خوراک ۳ ماشہ سے ۵ ماشہ تک ہے -  
 نسخہ معجون نعیمی منقول قرا بادین قادری سے صفتہ - زعفران عاقر قرحا - زرر البنج -  
 فریون - خولجان - الاچی کلان - دار فلفل - جذبد ستر ہر ایک ایک تولہ کوٹ چھان کر سہ چند  
 شہد خالص میں معجون بنالیں - خوراک تین ماشہ ہے -

نسخہ ماء الاصول کہ بعد تنقیہ کے اس مرض میں بہت نافع ہوتا ہے - صفتہ پوست بچ کر فس -  
 پوست بچ باویان - انیسون - قسط شیریں - راسن - مشکطرا مشع ہر ایک ۱۰ ماشہ - پنچ اذخرہ -  
 قفاح اذخرہ ہر ایک ۴ ماشہ - باچھڑ مصطلی ہر ایک پانچ ماشہ - جما - دار چینی سیلجہ جب بلساں -  
 عود بلساں - ہر ایک ۷ ماشہ - مونیر منقی ۱۰ تولہ - سب کو دو سپر پانی میں استقدر جوش دیں کہ چہارم  
 پانی باقی رہ جائے پھر اس کو صاف کر کے رکھ لیں - یہ تین خوراکیں ہیں جو تین دن کے لئے  
 کافی ہیں - ہر روز اس کی ایک خوراک معجون دھسٹا چار ماشہ - روغن بادام تلخ ایک ماشہ  
 کے ساتھ دینی چاہئے -

اور اگر مریضہ کا مزاج گرم یا اس کے بدن میں سودا ویت غالب ہو تو گرم اشیاء سے  
 اجتناب چاہئے اور بجائے تدابیر مذکورہ بالا کے مطبوخ افتیمون سے تسکین کرانی چاہئے - اور  
 شکم سیری کے وقت جو شانہ تخم سویہ سے کبھی کبھی تے کرانی مفید ہوتی ہے - اگر خون غالب  
 اور بدن قوی ہو تو فصد باسلیق بھی مفید ہوتی ہے - پنڈلیوں پر سینگیان بھری ہوئی لگانا  
 بھی مناسب ہوتا ہے -

یاد رکھو کہ اگر مرض اختناق الرحم حاملہ کو لاحق ہو تو اس کے لئے فصد یا مسهل قوی اور  
 مدرات حیض یا بطور فرجہ کے یا کسی خراش پیدا کرنے والی چیز کا استعمال کرنا - یا کسی محرک قوی کا  
 عمل میں لانا سخت مضر ہوتا ہے - اس لئے مناسب ہے کہ اگر وضع حمل کے دن قریب ہوں تو

دورہ کے وقت مناسب تدابیر سے کام لیکر مریضہ کو محض گلغندہ اور مصطلکی مہینہ مناسب کھلائیں۔ اس سے بہت نفع ہوتا ہے اور بعد وضع حمل کے مرض خود بخود زائل ہو جاتا ہے (بشرطیکہ اجزاء نفاس کی تدابیر سے غفلت نہ کی جائے) اور اگر وضع حمل میں زیادہ مدت باقی ہو تو لطیف غذائیں دینی چاہئیں اور گلغندہ مصطلکی کی مداومت کرائیں۔ اور اگر نوبت مرض کی جلد جلد آتی ہو اور مریضہ جوان قوی اور اس کے بدن میں خون کا غلبہ ہو اور حمل کا زمانہ بھی تین مہینہ سے بعد اور آنکھوں میں مہینہ سے پہلے ہو۔ تو ایسی حالت میں بوقت ضرورت فصد کرانا یا سہل ضعیف دینا جائز ہے۔

غذا ہر حالت میں مقوی۔ زود ہضم اور سبک ہونی چاہئے۔ جیسے گوشت حلوان پھوزہ مرغ تیتڑ۔ بٹیر۔ چڑیاں اور گرم مزاج کے لئے پالک یا کدو دراز سے اصلاح کر کے دینا چاہئے۔ پچھیسویں فصل عیض را سٹرال ایٹھ یعنی عورت کا بالکل حاملہ نہ ہونا یا بچہ ہونا ظاہری کہ عورت کا قطعاً حاملہ نہ ہونا کبھی مرد کی خرابی سے ہوتا ہے اور کبھی یہ قصور عورت کی جانب سے واقع ہوتا ہے۔ لیکن امراض نسواں کے بیان میں صرف وہی بآئینہ مراد ہونا چاہئے جس کا سبب محض عورت ہی کی جانب سے ہو۔ چنانچہ اس ہی خیال کو مدنظر رکھ کر اس موقع پر عقر کے اسباب و علامات اور علاج مفصل بیان کئے جاتے ہیں۔

اس مرض کے اسباب استقد کرثیر التعداد ہیں کہ اگر ان کو سلسلہ وار علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے تو ان کا بیان بہت طویل ہونے کے سبب، یاد رکھنا بہت دشوار ہوگا۔ اسلئے ہم ان تمام اسباب کو تسہیل بیان کی غرض سے اور طلبہ کو حفظ مضامین میں سہولت پیدا کرنے کے واسطے پانچ جماعتوں میں تقسیم کر کے بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں (۱) اعضا تناسل کی ساخت کے پیدائشی نقصانات (۲) اعضا تناسل کی ساخت کے عارضی نقصانات (۳) بعض امراض رحم (۴) عوارضات جسمی (۵) امور خارجی کی خرابی۔

پہلی جماعت اعضا تناسل کی ساخت کے پیدائشی نقصانات۔ اس جماعت میں وہ تمام خرابیاں داخل ہیں جو اعضا تناسل کی اصلی ساخت میں ابتداء پیدائش سے ہی واقع ہوئی ہوں۔ ایسی خرابیاں اکثر پانچ قسم کی دیکھی جاتی ہیں (۱) پردہ بکارت کا سخت دبیر اور

بالکل بے سوراخ ہونا (۲) اندام نہانی روی جاننا کا بالکل یا آخری حصہ مسدود یا نہایت تنگ ہونا (۳) رحم کا معدوم ہونا یا قلم رحم کا بالکل بند ہونا (۴) خصیتہ الرحم راو ویری کا مخلوق نہ ہونا (۵) قاذوف نالیوں رنی پوپین ٹیونز کا معدوم یا مسدود ہونا۔

یہ سب پیدائشی نقصانات ایسے ہیں جن سے عورت بائجنہ ہوتی ہے اس لئے کہ ان میں سے پہلی دو صورتوں میں تو عورت بالکل جماع کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ اور تیسری صورت میں اس کے ساتھ جماع کیا جاسکتا ہے۔ لیکن استقرار حمل کا مادہ (مرد کی مٹی) رحم کے اندر نہیں پہنچ سکتا۔ ان تینوں قسم کے نقصانات کا بیان ان کے موقع پر (مرض رفق کے بیان میں ہو چکا ہے۔ باقی دو آخر والی صورتوں میں اگرچہ عورت کے ساتھ بخوبی جماع کیا جاسکتا ہے اور مادہ منویہ اس کے رحم تک بلاتا مل پہنچ جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ حیضاری اولاد کی نعمت سے ہمیشہ کے لئے محروم اور بالکل یا بوس رہتی ہے۔ کیونکہ جب یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ حمل قرار پانے کے لئے مرد کے مادہ منویہ کے ساتھ عورت کے مادہ تولید یعنی اس کی مٹی (راووم) کا رحم کے اندر باہم ملنا ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ خصیتہ الرحم کے مخلوق نہ ہونے کی حالت میں اس ضروری مادے (راووم) کی پیدائش ممکن نہیں۔ اسی طرح اگرچہ خصیتہ الرحم موجود ہوں اور ان میں مادہ تولید کی پیدائش بھی ہو تو قاذوف نالیوں کے معدوم یا مسدود ہونے کی صورت میں اس مادے (راووم) کا رحم کے جوف تک پہنچنا محال ہے۔ پھر ایسی عورت کو استقرار حمل کی کس طرح امید ہو سکتی ہے۔

علامات۔ چونکہ ظاہری اعضاء کے خلقی نقصانات کو قابلہ خود دیکھ کر سبب مرض کو بخوبی جان سکتی ہے۔ اس لئے ان صورتوں میں کسی جدید علامت کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ان کی تشخیص کے لئے صرف قابلہ کا مشاہدہ کافی ہوتا ہے۔

اب ہم صرف ان علامتوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن سے رحم اور خصیتہ الرحم اور اسکے تعلقات کی خرابیوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس فن کے ماہر لوگوں نے اب تک ایسی نو علامتیں دریافت کی ہیں۔

(۱) تشریح بعد وفات (پوسٹ مارٹم) سے ان اعضاء کا ہونا یا نہ ہونا یقینی طور پر

ثابت ہو سکتا ہے۔ کیونکہ زندگی کی حالت میں ایسے پوشیدہ اندرونی اعضاء کے عدم یا وجود کا قطعی فیصلہ کر دینا اور صرف چند قیاسی باتوں کی بنا پر کسی بے گناہ بیچاری عورت پر ہمیشہ کے لئے اولاد سے محروم رہنے کا یقینی حکم لگا دینا جیسا کہ ایک لائق اور معتبر طبیب کے خلاف نشان ہے اسی طرح اس کے احاطہ علم کی قدرت سے بھی خارج ہے۔

(۲) بظن (کلائٹورس) کا خلقتہ معدوم ہونا۔ کیونکہ جن عورتوں کے اندرونی اعضاء پائل خصوصاً رحم۔ قاذوف نالیاں خلقتہ معدوم ہوتے ہیں یا ان میں کوئی بڑا بھاری نقصان ہوتا ہے اکثر ان کے ظاہری اعضاء تناسل میں بظن معدوم ہوتا ہے۔

(۳) اکثر ایسی عورتوں کے بعض اعضاء میں خصوصاً ان کے چہرہ میں، مرد کی سی شبابہت پائی جاتا کرتی ہے۔

(۴) ان کے بالائی لبوں پر مردوں کی موچھوں کی طرح سے بکثرت باریک رواں ہوتا ہے۔

(۵) ان کی آواز مثل مردوں کے بھاری اور سخت ہوتی ہے۔

(۶) باوجود سن بلوغ کے ان کی پستان میں دوسری عورتوں کا سا ابھار نہیں ہوتا۔

(۷) بعد بلوغ کے زیادہ عمر گزرنے پر بھی حیض کی آمد بالکل نہیں ہوتی اور نہ اس سے کوئی سخت نقصان ہوتا ہے۔

(۸) دوسری عورتوں کی طرح ان کو جماع کی طرف بالکل رغبت نہیں ہوتی۔

(۹) ان کو جماع سے کوئی حظ حاصل نہیں ہوتا اور نہ کبھی ان کو انزال ہوتا ہے۔

علاج۔ اس جماعت کی تمام صورتوں میں سے صرف رتق کی ایک حالت قابل علاج سمجھی جاتی ہے۔ کیونکہ پردہ بکارت میں سوراخ کر دینے سے فعل مجامعت اور مادہ منویہ مرد کا رحم تک پہنچنا ممکن ہے جس سے استقرار حمل کی امید کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام صورتیں ایسی سخت دشوار ہیں جن کا اصلی علاج بذریعہ دستکاری یا استعمال ادویہ کے طبیب کی قدرت سے خارج ہے۔ البتہ اگر مرضیہ کو ان اسباب مذکورہ کے باعث کوئی دوسری تکلیف راحت یا حس حیف کے لوازمات میں سے پیدا ہو جائے جیسا کہ احتباس حیف کے باعث اکثر عورتیں صلابت رحم ورم رحم۔ میلان رحم۔ وجع الرحم۔ ضعف ہضم۔ قلت اشتہا۔

نفع مشکم - کثرت شریاح - امراض جگر و امراض قلب یا امراض دماغ یا امراض قسا خون وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور آئے دن طرح طرح کی سخت تکالیف اور زنی نئی مصیبتوں میں گرفتار رہتی ہیں تو ان عوارض کے دفعیہ کے لئے حسب موقع تدابیر مناسبہ عمل میں لائی جاسکتی ہیں تاکہ ان عارضی تکالیف سے مریضہ کو سبکدوشی حاصل ہو جائے

دوسری جماعت - اعضا تناسل کی ساخت کے عارضی نقصانات جو کسی مرض کے باعث پیدا ہو گئے ہوں - اس فن کے ماہروں نے مدت و دوا تک بیشمار تجربے کر کے ثابت کر لیا ہے کہ زنانہ اعضا تناسل کی ساخت کے ایسے عارضی نقصانات جن کے باعث عورت بانجھ ہو سکتی ہے - وہ مندرجہ ذیل نو قسم کے ہوتے ہیں -

(۱) شرمگاہ کے لبوں کے باہم جڑ جانے سے بانجھ ہونا -

اسباب - اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شرمگاہ میں انقلاب (انفلامیشن) یعنی سوزش اگر زیادہ دنوں تک رہے یا اس کے لبوں میں کسی سبب سے زخم ہو جائیں تو اندام کے وقت مریضہ یا قابلہ کی غفلت سے فرج کے لب جڑ جاتے ہیں جس سے اندام نہانی کا سوراخ بالکل بند ہو جاتا ہے - اور عورت بالکل قابل جماع نہیں رہتی اور حیض بھی نہیں خارج ہو سکتا - پھر ایسی حالت میں بھلا وہ بچاری کس طرح حاملہ اور صاحب اولاد ہو سکتی ہے -

علامات - یہ خرابی ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ خود مریضہ اور اس کا خاوند اس کی شکایت کیا کرتے ہیں اور قابلہ کے ذریعہ سے طبیب کو اس کی اطلاع ہو سکتی ہے - دریافت کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مریضہ کی شرمگاہ میں پہلے زخم یا انفلامیشن ہو چکے ہیں اور ان ہی کا بے موقع اندام اس مرض کا سبب ہے -

علاج بذریعہ دستکاری کرنا چاہیے (دیکھو بیان التصاق الشفتین کا)

(۲) اندام نہانی کی تجویف بند ہو جانے سے بانجھ ہونا -

اسباب - اندام نہانی میں ایک مدت تک انفلامیشن یا زخم رہیں - یا مریضہ کو شدید

لہ چانچہ ولادت غیر طبعی کے وقت کسی رگڑ یا خراش کے پیدا ہونے سے اندام نہانی یا فم رحم میں زخم ہو کر بے موقع اندام نہانی سے اندام نہانی کی تجویف یا فم رحم کا سوراخ بالکل بند ہو جاتا ہے - ۱۲ مؤلف

قسم کا سوزاک ہو جائے تو زخموں کے مندر مل سوتے وقت مریضہ یا قابلہ کی غفلت سے اندام نہانی کی اندرونی جھلی آپس میں چپٹ کر اس کی تجویف بند ہو جاتی ہے۔ اس لئے وہ حاملہ نہیں ہو سکتی۔

علامات (۱) مریضہ قابل جماع نہیں ہوتی۔ حیض کا اخراج بالکل بند ہو جاتا ہے (۳) قابلہ اندام نہانی کے بند ہونے کو انگلی سے معلوم کر سکتی ہے (۴) دریافت کرنے سے اسباب متقدمہ کا پتہ چل سکتا ہے۔

علاج۔ اس کا علاج بھی بذریعہ دستکاری کے کرنا چاہئے (دیکھو بیان رلق کا) (۳) فم رحم کے بند ہو جانے سے بانجھ ہونا۔ رحم کا منہ اگر کسی وجہ سے بند ہو جاتا ہے تو اگرچہ عورت کے ساتھ جماع کرنے میں کوئی وقت یا تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن مرد کا مادہ منویہ رحم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور در بعد جماع کے اندام نہانی سے بہ کر خارج ہو جاتا ہے۔ اس لئے بچا پڑی عورت حاملہ نہیں ہو سکتی اور ہمیشہ اولاد کو ترستی رہتی ہے۔

اسباب (۱) کوئی غلیظ اور چپکاؤ دار مادہ فم رحم کے اندر اگر بند ہو جائے (۲) یا کوئی ریشہ دار ساخت فم رحم کے اندر پیدا ہو کر اسے بند کر دے (۳) فم رحم کے اندر گوشت زائد پیدا ہو جائے (۴) یا کسی سبب سے زخم ہو گئے ہوں اور اندام کے وقت فم رحم بالکل بند ہو جائے۔

علامات (۱) قابلہ اندام نہانی میں انگلی داخل کر کے معلوم کر سکتی ہے (۲) آئہ مفتاح الفرج کے ذریعہ سے پورے طور پر اس کی تصدیق ہو سکتی ہے (۳) رحم کے اندر حیض کا خون رکنا رہنے سے عورت کو تکلیف اور احتباس حیض کی دیگر شکایات موجود ہوتی ہیں (۴) دریافت کرنے سے اسناد فم رحم کے اسباب متقدمہ کا پتہ چل سکتا ہے۔

علاج۔ اس کا علاج بھی بذریعہ دستکاری کے کرنا چاہئے (دیکھو بیان رلق کا صفحہ ۱۴۸ پر اور بیان اسناد فم رحم کا صفحہ ۱۴۸ پر)۔

(۴) رحم کے سخت ہو جانے سے یا سکرط جانے سے بانجھ ہونا۔ کسی سبب سے رحم کی تمام ساخت یا صرف اس کی اندرونی جھلی نہایت سخت ہو جاتی ہے اور اس میں نرمی لچک

رہنے کی قابلیت بالکل باقی نہیں رہتی۔ جس کا موجود ہونا جرم رحم کی تمدستی پر موقوف اور قابلیت استقرار حمل کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اگر کچھ مدت تک یہ حالت قائم رہے تو رحم کی طرف دوران خون موقوف ہو کر اس کی ساخت بیکار ہو جاتی ہے اور عورت بالکل بانجھ ناقابل علاج ہو جاتی ہے۔

اسباب (۱) رحم کی ساخت میں کسی غلیظ کثیف مادہ کا نفوذ کر جانا (۲) بلغمی رطوبات کا جرم رحم میں جذب ہو کر منجمد ہو جانا (۳) رحم کے اندر کسی قسم کے زخم ہو کر ان کا مندمل ہو جانا۔ اور اس کی ساخت کا سکر جانا (۴) وضع حمل کے بعد کسی قسم کی غرابی پیدا ہو جانا (۵) رحم میں مہم سوداوی کا موجود ہونا۔

علامات (۱) مریضہ کو احتباس حیض کی شکایت ہوتی ہے (۲) اس کے متعلق دیگر عوارض موجود ہوتے ہیں (۳) قابلہ مریضہ کے پیڑ کو ہاتھ سے دبا کر صلابت رحم کو معلوم کر سکتی ہے۔ (۴) آگہ مفتاح الرحم کے ذریعے رحم کی اندرونی جھلی کی حالت بخوبی معلوم ہو سکتی ہے (۵) دریافت کرنے سے اسباب متقدمہ کا پتہ چل سکتا ہے۔

علاج۔ اگر مریضہ کو ایک مدت تک پلانے اور کھلانے کی ادویات استعمال کرائی جائیں اور خارجی استعمال کی ادویات مختلف طریقوں سے رابرین۔ ضاؤ۔ مالش۔ فرزجہ وغیرہ استعمال کرائی جائیں تو ایک مدت تک ان کے استعمال کرنے سے کسی قدر کامیابی کی امید کی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ مرض بہت پرانا نہ ہو گیا ہو۔ اور اگر ہر طرح سے مناسب تدابیر عمل میں لائی جائیں تو ان سے نفع کی امید رکھنی کچھ سچا نہیں ہے (دیکھو میان صلابت رحم اور احتباس حیض کا) (۵) رحم کے چربی میں بدل جانے سے بانجھ ہونا۔ جب رحم کی ساخت چربی میں بدل جاتی ہے تو اس کی تجویف نہایت چھوٹی بلکہ بالکل بند ہو جاتی ہے۔ رحم کی جسامت۔ و بازت اور وزن اگرچہ کسی قدر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کی اصلی ساخت چربی میں دب کر بالکل مضحل ہو جاتی ہے اور اس میں لچک بالکل نہیں رہتی۔ اس لئے وہ ضرورت کے وقت بڑھ نہیں سکتا اور نہ اس کی تجویف میں کسی طرح سے حل کی گنجائش ہو سکتی ہے اور حیض کا خون

لے جیسا کہ غلط سودا جس میں احتراق وغیرہ کے باعث کسی قدر مدت پیدا ہو کر قابل نفوذ ہو جائے ۱۲۔



بالکل بند ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں عورت بوجہ ذیل حاملہ نہیں ہو سکتی۔

**اسباب** راہ چربی کے دباؤ سے رحم کی رگیں دب جاتی ہیں۔ اور ان کی تحریف میں چربی کے مادہ سے سدے پڑ جاتے ہیں۔ اس لئے حیض کا خون رحم کے اندر نہیں آ سکتا اور عورت کو احتباس حیض کی شکایت دائمی ترقی کے ساتھ قائم رہتی ہے اور حیض کا خون رحم کے اندر نہ آ سکنے کی حالت میں استقرار حمل نہ ہونا ظاہر ہے (۲) رحم کی تحریف یا تو بالکل بند ہو جاتی ہے یا اس میں کسی طرح استقرار گنجانش نہیں ہو سکتی جبکہ استقرار حمل اور پرورش جنین کے لئے ضروری ہے (۳) ایسی حالت میں مریضہ کو اکثر فرہی منفط اور کلانی شکم کا عارضہ بھی ہوتا ہے۔ اس لئے مروجہ مادہ منویہ کا رحم کے اندر پہنچنا اور پھر وہاں اتنی مدت تک ٹھہرا رہنا دشوار ہوتا ہے کہ قہنی مدت میں استقرار حمل ہو سکے (۴) خون میں چربی کا مادہ زیادہ ہونے اور فرہی منفط کی حالت میں معدہ اور جگر وغیرہ کے افعال میں بھی حسب مراتب ضرور خلل واقع ہو جاتا ہے اور بدن میں اخلاط صالحہ کا وجود کم ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ممکن ہے کہ عورت کے اعضا، تناسل، خیمینہ الرحم وغیرہ کا فعل بھی خراب ہو جائے اور مادہ تولید کی پیدائش استقرار حمل کے قابل نہ ہو سکے (۵) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتائف نالیوں (فیلوپائی) ان ٹیوبز کا منفذ کسی خارجی دباؤ سے یا اپنے ذاتی انسداد کے باعث بند ہو جائے اور مادہ تولید رحم کے اندر نہ پہنچ سکے اسلئے عورت حاملہ نہ ہو سکے۔

**علامات** (۱) ایسی عورت کو اکثر فرہی منفط اور کلانی شکم کا عارضہ ہوتا ہے (۲) ضعف رحم کی علامات موجود ہوتی ہیں (۳) حیض بند ہو جاتا ہے (۴) مریضہ کے خون کا امتحان قواعد کیسٹری سے کیا جائے تو اس میں چربی کا مادہ پایا جاتا ہے۔

**علاج** (۱) ایسی حالت میں مریضہ کو بکثرت ریاضت کرنی چاہئے (۲) غذا مقداریں بہت کم اور تاثیر میں خون کی رطوبت یا چکنائی کم کرنے والی اور خشک ہونی چاہئے (۳) سب سے بہتر یہ ہے کہ چند روز تک مریضہ روزے رکھے اور کھجور یا دودھ کا استعمال ترک کر دے (۴) دواء الکک صغیر کا استعمال فرہی منفط کو زائل کرتا ہے (۵) اس نسخہ کے استعمال سے چربی کا مادہ پگھل کر تحلیل ہو جاتا ہے اور اجزاء حیض کے لئے مفید ہے صفتہ تخم کر فس

جوشانہ خرم رحم

انیسون - اجوائن دیسی تخم میٹھی - اسارون ہر ایک ساڑھے تین ماشہ گلقد ۲ تولہ مقدار مناسب پانی میں جوش دیکر اور چھان کر مرصیہ کو دونوں وقت پلایا جائے (۶) اگر ضرورت ہو تو سب سے پہلے مرصیہ کو چند روز منضجات بلغم پلا کر تنقیہ بلغم کا کرادیا جائے (مفصل علاج کے لئے دیکھو بیان تشیم الرحم کا)

۶) خصیتہ الرحم کی ذاتی خرابی سے بانجھ ہونا۔ خصیتہ الرحم میں کسی سبب سے التهاب الانفلا میشن یعنی سوزش وغیرہ ہو جانے کے بعد یا کسی دوسرے مرض کے اثر سے یا ان کی پرورش کرنیوالی رگوں میں خلل آنے کے سبب ان کی پرورش میں نقصان آنے لگتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند روز کے بعد ان کی ساخت سکر کر بہت چھوٹی رہ جاتی اور نہایت سخت کٹھلی سی ہو جاتی ہے اور ان میں مادہ تولید (اووم) کی پیدائش بالکل موقوف ہو جاتی ہے ایسی حالت میں عورت کو جماع کی طرف رغبت بالکل باقی نہیں رہتی اور جماع کے وقت کبھی اس کو انزال ہونا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب مادہ تولید کی پیدائش قطعاً بند ہو جائے تو انزال کس چیز کا ہو اور کس چیز کا ہو اور کس غرض کو پورا کرنے کے لئے اس کے دل میں جماع کی خواہش پیدا ہو۔

اسباب (۱) خصیتہ الرحم میں انفلا میشن ہونا (۲) خون میں کوئی ایسی خاصیت موجود ہونا جو اعضا تناسل کی پرورش اور مادہ تولید کی پیدائش کے خلاف ہو (۳) خصیتہ الرحم کے عروقی سلسلہ میں خرابی واقع ہو جانا۔

علامات (۱) عورت کو جماع کی خواہش اور کبھی انزال نہ ہونا خصیتہ الرحم کی خرابی کا سچا گواہ ہے (۲) قابلہ مرصیہ کے پٹرو پر مقام رحم کے جانبین میں ہاتھ سے ٹٹول کر اور دبا کر معلوم کر سکتی ہے خصیتہ الرحم سکر کر اور سخت ہو کر مثل ایک کٹھلی یا گرہ کے محسوس ہوتے ہیں (۳) دریافت کرنے سے امراض متقدمہ کا پتہ چل سکتا ہے۔

علاج - اگر مرض پرانا نہیں ہوا ہے اور خصیتہ الرحم کی ساخت میں کچھ نرمی اور درست ہونے کی قابلیت باقی ہے تو صلابت رحم کے قواعد کے موافق ایک مدت تک علاج کرنے سے کسی قدر کامیابی کی امید کی جاسکتی ہے۔ ورنہ یہ خرابی ایسی نہیں ہے کہ کسی علاج سے

انزال ہو سکے۔ اس لئے اس مرض کو لا علاج سمجھنا چاہئے۔ البتہ جو خرابیاں یا دیگر عوارض اس مرض کے لئے لازم ہوتے ہیں ان سے نجات ملنا بذریعہ مناسب تدابیر کے ممکن ہے۔  
 (۱) خصیتہ الرحم پر کاذب جھلی کے پیدا ہونے سے بانجھ ہونا۔ یا درکھو کہ خصیتہ الرحم ایک باریک اور نازک غلاف ریٹونیکا البوجی فی آ میں ملفوف رہتے ہیں جس کا ایک سرا ان کو رحم کے ساتھ باندھے رکھتا اور اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے۔ جب مادہ تولید (اووم) خصیتہ الرحم میں تیار ہو جاتا ہے تو اس نازک غلاف کو پھاڑ کر قاذف نالیوں کے راہ بخولیف رحم میں جا پہنچتا ہے اور جب خصیتہ الرحم کے اوپر (سواء اصلی غلاف کے) دوسری کاذب جھلی ریشہ دار ساخت کی مضبوط پیدا ہو جاتی ہے تو مادہ تولید اس کو نہیں پھاڑ سکتا۔ اس لئے اول تو چند روز وہ مادہ خصیتہ الرحم میں اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے اور پھر یا تو اس میں کوئی دوسرا مرض پیدا کرتا ہے اور یا بتدریج وہیں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ خصیتہ الرحم کے اندر مادہ تولید کی پیدائش موقوف ہو کر آخر کار خاص ان کی ساخت بھی گھٹنے لگتی رہے اسوقت عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ شروع میں تو عورت کو جماع کی خواہش ہوتی ہے لیکن انزال بالکل نہیں ہوتا اور پھر وہ خواہش ہونی بھی موقوف ہو جاتی ہے۔

**اسباب** (۱) خصیتہ الرحم کی کمزوری (۲) خون کی خرابی (۳) خصیتہ الرحم میں کمرانک انفلا میشن ہونا (۴) ریشہ دار مادہ کا اجتماع۔

**علامات**۔ اوقات مرض کے موافق ایسی چند علامتیں ہیں جن سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ خصیتہ الرحم کے گرد کاذب جھلی پیدا ہو گئی ہے (۱) اسباب مرض کا پہلے موجود ہونا۔ (۲) خصیتہ الرحم میں انفلا میشن کے عوارض پائے جانے (۳) حیض کی خرابی موجود ہونی (۴) ان علامتوں کے بعد عورت کو انزال ہونا بالکل موقوف ہو جاتا ہے (۵) لیکن شروع میں چند روز تک اسے جماع کی خواہش بدستور باقی رہتی ہے (۶) پھر چند روز کے بعد رفتہ رفتہ خواہش جماع بھی موقوف ہو جاتی ہے (۷) اس وقت خصیتہ الرحم سکڑ کر بہت چھوٹے اور سخت ہو جاتے ہیں۔

**علاج**۔ اگر ابتداء مرض میں نہایت کوشش سے علاج کیا جائے اور تخفیف سبب کے بعد

مناسب تدبیر عمل میں لائی جائیں تو یہ مشکل کامیابی کی امید ہو سکتی ہے۔ اور کاذب جھلی پیدا ہو جانے کے بعد مرض لاعلاج ہو جاتا ہے کیونکہ نہ دستکاری سے اسکی اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ وہ دواؤں سے زائل ہو سکتی ہے۔

(۸) انسداد قاذف سے بامعجزہ ہونا۔ جب کسی مرض کے خراب نتیجہ اور مفسد اثر سے قاذف نالیوں کی تجولیف بند ہو جاتی ہے تو عورت کو باوجود جماع کے کبھی انزال نہیں ہوتا اور مادہ تولید خصینہ الرحم سے تجولیف رحم میں نہیں پہنچ سکتا۔ اس لئے عورت حاملہ نہیں ہو سکتی۔

اسباب (۱) قاذف کی تجولیف میں کسی غلیظ یا چپکاؤ دار مادے (میوس یا مادہ تولید وغیرہ) کے چپٹ جانے یا منجمد ہو جانے سے اس میں سدہ واقع ہو سکتا ہے (۲) قاذف کی اندرونی جھلی (میوس میمبرین) میں التهاب (انفلامیشن) ہو جانے کے بعد اس کے باہم چپٹ جانے سے بھی تجولیف بند ہو جاتی ہے (۳) قاذف کی ساخت میں ورم ہونے سے یا اس میں قرحہ ہونے کے بعد اندام کے وقت گوشت زائد پیدا ہو جائے (۴) کسی خارجی رسولی کے دباؤ سے یا اس کی خاص تجولیف میں رسولی پیدا ہونے سے بھی تجولیف بند ہو جاتی ہے۔

علامات (۱) اسباب انسداد کا موجود ہونا (۲) ان اسباب کے متعلق شکایات کا پایا جانا (۳) باوجود ان باتوں کے عورت کو انزال ہونا بالکل موقوف ہو جاتا ہے (۴) لیکن خصینہ الرحم میں مادہ تولید کی پیدائش جاری رہنے کے باعث اسے خواہش جماع بدستور باقی رہتی (۵) کبھی جوف عانہ میں مادہ تولید کے جمع ہونے اور اس کے فاسد ہونے سے ورم صفاق یا کوئی دوسرا مرض بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

علاج (۱) اگر قاذف نالیوں میں کسی غلیظ رطوبت کے انجماد سے سدہ پڑ گیا ہے تو مریض کو چند روزیہ نسخہ پلایا جائے صفتہ۔ بادیان۔ انیسون۔ تخم کرفس۔ تخم حلبہ۔ تخم خربزہ۔ پرباوشاں شربت بزوری۔ اور اگر ورم موجود ہے تو اس کا علاج وہ کرنا چاہئے جو بحث ورم میں لکھا گیا ہے۔ اور اگر گوشت زائد یا رسولی وغیرہ کے باعث قاذف کی تجولیف بند ہو جائے تو یہ صورت لاعلاج ہے۔ کیونکہ نہ وہ دستکاری سے درست ہو سکتی ہے اور نہ دواؤں کے استعمال سے کچھ نفع کی امید کی جاسکتی ہے۔

(۹) قاذف نالیوں کے جھالروا سروں کے ریشوں کے زائل ہو جانے سے بانجھ ہونا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قاذف نالیوں کی ساخت میں ورم حاد ہو جانے سے یا کسی تیزابی مادہ کے ان پر گزرنے سے۔ یا آتشکی زہر کے اثر سے ان کے جھالروا سروں کے ریشے گل کر زائل ہو جاتے ہیں اور اسوجہ سے خصیتہ الرحم کے سطح پر بوقت ضرورت ان کی گرفت بخوبی نہیں ہو سکتی اس لئے وہ خصیتہ الرحم سے مادہ تولید کو چوس کر اپنے اندر نہیں لے سکتے۔ اور مادہ تولید ان کے راہ سے تحلیف رحم میں نہیں پہنچ سکتا اور عورت کے حاملہ نہ ہونے کا سبب ہوتا ہے۔

اسباب (۱۰) قاذف میں ورم حاد ہونا (۱۱) نیزابی مادہ کا انصباب (۱۲) زہر آتشکی عیض علامات (۱۳) اسباب مرض کا مقدم ہونا (۱۴) اسباب مرض کے متعلق عوارض کا مقدم ہونا (۱۵) عورت کو بوقت جماع یا دیگر اوقات میں انزال نہ ہونا۔ علاج۔ ان ریشوں کے زائل ہونے سے پہلے اگر اسباب مرض کو تشخیص کر کے علاج کیا جائے امید ہے کہ اس خرابی کے پیدا ہونے تک نوبت نہ پہنچے۔ لیکن ان کے زائل ہونے کے بعد ان کی جدید پیدائش یا ان خرابیوں کا انسداد نہیں ہو سکتا۔ جو ان ریشوں کے زوال سے لاحق ہوتی ہیں اس لئے یہ صورت لا علاج ہے۔

(نوٹ) یاد رکھو کہ عورت کے خصیتہ الرحم موجود نہ ہونے کی حالت میں یا ان کی ساخت کے خراب و بیکار ہو جانے کی صورت میں چونکہ مادہ تولید کی پیدائش نہیں ہو سکتی اسلئے عورت کو جماع کی طرف بالکل رغبت نہیں ہوتی اور نہ اس کو انزال ہونا ہے اور خصیتہ الرحم پر کاؤب جھلی پیدا ہونے کی حالت میں یا قاذف نالیوں کے معدوم یا مسدود ہونے یا انکی جھالروا کے ریشے زائل ہو جانے کی صورت میں چونکہ خصیتہ الرحم میں مادہ تولید کی پیدائش بدستور جاری رہتی ہے اس لئے عورت کو جماع کی طرف رغبت ہوتی ہے لیکن اس انزال بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ عورت کا یہ فعل اس وقت تکمیل پاتا ہے جبکہ خصیتہ الرحم کی ساخت بالکل درست ہو۔ اس میں مادہ تولید اپنے وقت پر بخوبی پیدا ہوتا ہو۔ قاذف نالیوں کی ساخت اور ان کی تحلیف اور ان کے جھالروا سروں کے تمام ریشے درست ہوں تو بوقت

مادہ تولید خبیثہ الرحم میں بالکل تیار ہو جاتا ہے اسوقت قاذف نالیوں کا جھالروا سر خبیثہ الرحم کے ٹھیک اس مقام پر آچمکتا ہے جہاں مادہ تولید تیار ہوا ہے اور اس کی جھال کے ریشے مادہ مذکور کے گرد آ جاتے ہیں اور اس کی تجویف کا کشادہ حصہ مادہ تولید کے مقابل رہتا ہے پھر جب وہ جھالروا ریشے اس مادہ پر چاروں طرف سے دباؤ ڈالتے ہیں تو انکی تحریک اور طبیعت کے جوش سے ایک قسم کی گدگدی سی پیدا ہو کر گرانی ان ویسیکل پھٹتا ہے اور مادہ مذکور خبیثہ الرحم سے قاذف نالیوں کے کشادہ حصہ میں آتا ہے۔ پھر قاذف نالیوں کی ساخت کے عضلاتی ریشے مسکیولرفانی برز اپنی طبعی (غیر ارادی) حرکات کے ذریعہ سے یکے بعد دیگرے نمبر وار سکڑنے ہوئے مادہ مذکور کو جوف رحم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جو حرکت بروقت انزال عورت کو اپنے اندرونی اعضا تناسل میں محسوس ہو ا کرتی ہے۔ وہ درحقیقت مادہ تولید کے منتقل ہونے اور قاذف نالیوں کے عضلاتی ریشوں کے سکڑنے کی حرکت ہوتی ہے۔

تیسری جماعت بعض امراض رحم۔ اس جماعت میں رحم کے وہ امراض داخل ہیں جن کے لاحق ہونے سے عورت استقرار حمل کے قابل نہیں رہتی ہے۔ ایسے امراض کا تفصیلی بیان شروع کرنے سے پہلے ہم ان شرائط کا ذکر مناسب سمجھتے ہیں جو استقرار حمل کے لئے نہایت ضروری ہیں ان تمام شرائط کو مدنظر رکھنے کے بعد آپ بخوبی فیصلہ کر سکیں گے کہ ان امراض کے سبب سے استقرار حمل کیوں غیر ممکن ہے۔

شرائط (۱) مرد اور عورت کے مادہ منویہ میں کوئی ایسی خرابی موجود نہ ہو جس سے وہ استقرار حمل کے قابل نہ رہ سکے۔ غرضیکہ وہ تمام غیوب ذاتیہ سے مبرا ہو (۲) رحم کا مزاج درست ہو اور تمام کیفیات مفسدہ سے محفوظ ہو تاکہ مادہ منویہ رحم کے اندر پہنچ کر فاسد اور بیکار نہ ہو جائے (۳) رحم ہر قسم کی آلائش اور فضلات رو بہ متغفنہ سے پاک صاف ہو تاکہ اسکے اندر کوئی مفسد خارجی مادہ منویہ میں مل کر اسے خراب و بیکار نہ کر دے (۴) رحم کی ساخت

شرائط استقرار حمل

۱۔ مادہ تولید خبیثہ الرحم میں تیار ہوتا ہے تو اسکی سطح پر باریک جلی کے نیچے شل آبد کے نمودار ہوتا ہے آبد ناما جسم کو

گرانی ان ویسیکل کہتے ہیں ۱۲ مؤلف -

درست ہو اور اس میں کوئی خرابی استقرار حمل کے منافی موجود نہ ہو (۵)، مادہ منویہ بلا کسی رکاوٹ کے بہت جلد رحم کے جوف میں پہنچ جائے (۶)، مادہ منویہ کو رحم کے اندر پہنچنے کے بعد ضروری امداد خون حیض وغیرہ سے کافی طور پر مل سکے (۸) ان کے علاوہ دیگر مانعات حمل موجود نہ ہوں جیسے عوارض نفسانیہ مثل غم غصہ اور خوف وغیرہ کے۔

شرائط مذکورہ بالا کے معلوم کرنے کے بعد آپ کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ ان آٹھ شرطوں میں سے پہلی اور آٹھویں شرط کو صحت یا مرض رحم سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ بات تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ مادہ منویہ کی پیدائشی درستی مرد اور عورت کے خصلوں کی صحت اور عام بدنی تندرستی پر موقوف ہے اور اس مادہ کی خرابی ان کے خصلوں اور عام بدن کے بعض امراض سے ہوا کرتی ہے۔ اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مادہ منویہ کی پیدائشی خرابی کو امراض رحم سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے۔ باقی رہی آٹھویں شرط۔ وہ تو بالکل ہی اس سے متعلق نہیں ہے کیونکہ وہ امور خارجیہ میں سے ہے البتہ درمیانی چھہ شرطیں ایسی ہیں جو رحم کی صحت کے ساتھ بالکل وابستہ ہیں۔ اسی لئے اکثر امراض رحم کی حالت میں ان شرائط کا وجود نہ پایا جانے کے سبب سے عورت حاملہ نہیں ہوا کرتی ہے۔

اب ہم ان امراض کو پانچ قسموں میں تقسیم کر کے بیان کرتے ہیں (۱) وہ امراض جنکے باعث مادہ منویہ لا رحم میں پہنچکر فاسد اور بیکار ہو جاتا ہے جیسے رحم کے مزاج میں کوئی خرابی۔ رگرمی۔ سردی۔ تری۔ خشکی وغیرہ پیدا ہونا (۲) وہ امراض جن کے سبب سے رحم کے اندر فضلات روہی کی آلائش موجود رہتی ہے جو مادہ منویہ کے ساتھ مل کر اسے استقرار حاصل کر دیتی ہے جس سے وہ استقرار حمل کے قابل نہیں رہتا ہے اور نیز ان ہی امراض کے باعث رحم کی ساخت بھی ماؤف ہو جاتی ہے جیسے رحم کے اندر کسی تیزابی رطوبت یا فضلات غلیظہ کا جمع ہو جانا۔ یا دیگر امراض جیسے سرطان الرحم۔ قروح الرحم۔ کلثہ الرحم وغیرہ۔ (۳) وہ امراض جن کے سبب سے مادہ منویہ جوف رحم کے اندر نہیں پہنچ سکتا ہے جیسے انقلاب الرحم۔ میلان الرحم۔ استسقاء رحم۔ بواسیر رحم (۴) وہ امراض جن کے سبب سے

۱۲ کیونکہ استسقاء رحم کی حالت میں رحم کا منہ بند رہتا ہے ۱۲ منہ

مادہ منویہ رحم کے اندر سے بہ کر بہت جلد خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے سیلان منی۔ سیلان رحم۔ نفخہ رحم۔ کثرت ریاہ (۵) وہ امراض جن کے سبب سے مادہ منویہ کو وہ امداد نہیں مل سکتی جو استقرار حمل کے لئے ضروری ہے جیسے احتباس حیض۔ صلابت رحم۔ تشحم رحم وغیرہ۔ اس کے بعد اب ہم بالتفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام امراض عقر کا باعث کیوں ہوتے ہیں اور ان کا علاج کس طرح کرنا چاہئے تاکہ عورت اولاد کے لائق ہو سکے۔

(۱) رحم کے مزاج کی حرارت زیادہ ہو جانے سے بانجھ ہونا۔ جب رحم کا اصلی مزاج خراب ہو جاتا ہے اور اس میں طبعی اندازہ سے زیادہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے تو مادہ منویہ خواہ کبسا ہی اعلیٰ درجہ کا ہو رحم کے اندر پہنچ کر اس کے لطیف اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں یا یہ کہا جائے کہ اس کا جوہر اعلیٰ یا خلاصہ (اسپرے ٹوزوا۔ اور اووم) جسے استقرار حمل کے لئے جزو اعظم کہنا چاہئے۔ وہ جسم مردہ کی طرح بالکل بیکار اور خراب ہو جاتا ہے۔ اور کسی طرح استقرار حمل کے قابل نہیں رہتا ہے۔

اسباب (۱) کھانے پینے میں گرم اشیاء کا بکثرت استعمال کرنا (۲) عمر جوان اور بدن کا مزاج اصلی گرم یا مائل بحرار ت ہونا (۳) گرم آب و ہوا میں رہنے کا اکثر اتفاق پڑنا (۴) محنت۔ مشقت ریاضت وغیرہ کا زیادہ اتفاق پڑنا (۵) غلط فہمی یا نادانی سے کسی گرم چیز کا بطور فرج وغیرہ کے استعمال کرنا۔

علامات (۱) اگر گرمی پیدا کرنے والے اسباب کا مقدم ہونا (۲) خون حیض کا گرم۔ گاڑھا اور سیاہ ہونا (۳) عانہ کے مقام پر بالوں کی کثرت (۴) عورت کو اپنے رحم اور اندام نہانی کے اندر گرمی محسوس ہونا (۵) جماع کے وقت شوہر کو بھی اندام نہانی کی گرمی ناگوار معلوم ہونا (۶) اندام نہانی میں انگلی داخل کر کے قابلہ بھی اس گرمی کی تصدیق کر سکتی ہے (۷) اگر مریضہ کو تمام بدن میں گرمی کی عام شکایت ہو تو وہ لانگرا اندام۔ ضعیف۔ زرد رنگ اور مضحل ہوگی۔ اسے بھوک بہت کم اور پیاس زیادہ لگتی ہوگی۔

علاج (۱) گرمی پیدا کرنے والے خارجی اسباب کو دور کرنا چاہئے (۲) مریضہ کو چند روز یہ نسخہ تبرید کا پلائیں۔ صفتہ۔ شیرہ تخم خیارین۔ شیرہ خارخک۔ شیرہ مغز تخم کدوئے شیریں۔



شیرہ مغز تخم تر بوڑھریک ۳ ماشہ۔ شیرہ عناب ۵ دانہ۔ عرق گاؤزباں ۲ تولہ شربت نیلوفر ۲ تولہ (۳) اس کے علاوہ شربت لیموں۔ شربت سیب۔ شربت فالسہ۔ شربت صندل۔ شربت خشخاش وغیرہ۔ ان میں سے جو مناسب ہو قدرے لیکر پانی میں حل کر کے پلانا بھی کافی ہو سکتا ہے (۴) حیض سے فارغ ہونے کے بعد یہ فرزجہ سفیدے صفحہ موم سفید چربی بٹکی۔ چربی مرغی کی روغن گل میں گھلا کر اس میں روغن مغز تخم کدو و صندل سفید گھسا ہوا۔ انڈے کی سفیدی ملائیں اور قابلہ سے استعمال کر لیں (۵) اگر ضرورت ہو تو پیڑو کے مقام پر کوئی سروضما و لگائیں جیسے رسوت خالص۔ گل سرخ۔ صندل سفید۔ طحلب (کافی) برگ کاسنی سبز جرادہ کدو سفید وغیرہ (۶) اگر عام بدن میں گرمی کی شکایت اور صفرا کا غلبہ ثابت ہو تو سب تدابیر سے پہلے مناسب ادویات کے ساتھ اس کا تنقیہ کرنا چاہئے جیسے گل نبشہ۔ گل نیلوفر۔ عناب۔ آلو بخارا۔ تخم خباری۔ تخم کاسنی۔ تخم خیاری بن تھر مہندی وغیرہ (۷) غذائیں تمام گرم چیزوں سے پرہیز کرنا چاہئے اور سرد تر کاریاں بلا گوشت کے یا بکری کے گوشت میں پکا کر کھلائیں جیسے کدو سفید۔ کلڑی۔ پالک۔ خرفہ وغیرہ کا ساگ۔

(۲) رحم کے مزاج میں سردی پیدا ہوجانے سے بانجھ ہونا۔ جب رحم کے اندر سردی پیدا ہوجاتی ہے تو مادہ منویہ اس میں داخل ہوتے ہی منجمد کشیف اور خراب ہوجاتا ہے۔ اس کے لطیف اجزاء ٹھٹھکرا کر کشیف یا منجمد ہو کر بالکل بیجان ہوجاتے ہیں اور قابل استقرار حمل کے نہیں رہتے ہیں۔ بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ سردی کے باعث مادہ منویہ میں ایک خاص قسم کی سمیت پیدا ہوجاتی ہے۔ پھر اگر یہ خراب مادہ رحم کے اندر محتبس رہ جاتا ہے تو اس سے مریضہ کو صرع کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ یا مرض احتناق الرحم پیدا ہوجاتا ہے جس کا مفصل بیان پہلے ہو چکا ہے (دیکھو احتناق الرحم کا بیان) اسباب (۱) کھانے پینے میں سرد اشیاء اور ترشیوں کا بکثرت استعمال کرنا (۲) بدن کا اصلی مزاج سرد اور عمر کا جوانی سے تجاوز کرنا (۳) سرد ملک میں زیادہ رہنے کا اتفاق ہونا (۴) نادانی سے کسی سرد چیز کا استعمال بطور فرزجہ وغیرہ کے کر لینا۔

علامات (۱) سردی پیدا کرنے والے اسباب کا مقدم ہونا (۲) خون حیض کا قریق۔ کم

سرخ ہونا۔ اور تھوڑا تھوڑا زیادہ مدت تک آتے رہنا (۳) پیرو پر بال کم اور باریک ہونا۔  
(۴) عورت کو اپنے رحم کے اندر سردی اور اکثر اہٹ سی محسوس ہونا (۵) اگر تمام بدن کا  
مزاج سرد ہو تو عورت کا بدن بادی سے پھولا ہوا۔ کمزوری کے ساتھ بدن میں فربہ ہی اور  
طبعیلا پن۔ رنگ سفیدی مائل ہوگا۔ ہضم خراب اور پیاس ندار۔

علاج (۱) سردی پیدا کرنے والے اسباب کا دفعہ کرنا چاہئے (۲) مریضہ کو چند روز  
دو المسک یا فزودیلٹوس وغیرہ گرم معجونیں یا کوئی دوسری مناسب دوا کھلائی جائے۔  
(۳) بعد فراغ حیض کے یہ فزرجہ قابلہ سے استعمال کرائیں۔ صفقہ۔ سنبل الطیب۔ سازج  
ہندی۔ قرومانا۔ اکلیل الملک۔ زعفران۔ بطکی چربی۔ مرغی کی چربی۔ انڈے کی زردی  
بدستور مقرر استعمال کریں (۴) رحم کی سردی دفع کرنے کے لئے یہ دھونی بھی مفید ہے۔  
صفقہ۔ ہڑتال سرخ۔ مرئی۔ جوز السرو۔ میچہ یا بسہ۔ بہروزہ خشک۔ لوبان۔ جب الغار۔  
بدستور مشہور دھونی دیں (۵) اکثر ورت پڑے تو پیرو پر مجھے ناری (کیپ پنگ گلاس) لگانا  
بھی اکثر مفید ہوتا ہے (۶) اگر تمام بدن میں سردی کی عام شکایت ہو اور غلبہ بلغم کی علامات  
پائی جائیں تو سب علاوہ سے پہلے بلغم کا تنقیہ کرنا ضروری ہے (۷) تمام سرد اشیاء سے پرہیز  
رکھنا اور غذا میں گرم حیوانات کا گوشت جیسے کبوتر کا بچہ۔ مرغ۔ بٹیر۔ تیترو وغیرہ غلہ جات  
میں سے وال ابرہ۔ چنا۔ گرم مصالحہ وغیرہ سے اصلاح کر کے کھایا کریں۔

(۳) رحم کے مزاج میں خشکی ہو جانے سے باخجہ ہونا۔ رحم کے مزاج میں خشکی غالب ہونے  
کی حالت میں جب مادہ منویہ اس کے اندر پہنچتا ہے تو اس کے رطوبی اجزاء خشک ہو جاتے  
ہیں جو اس کے قوام کو درست اور اس کے اصلی جوہر کو تحلیل سے محفوظ رکھنے والے یا  
جوہر اصلی کا فدیہ اور اس کی غذا میں صرف آنے والے ہیں۔ اور قدرت نے ان رفیق اجزا  
کو اصلی جوہر کے ساتھ ان ہی منافع کی غرض سے شامل کر رکھا ہے۔ اس لئے مادہ منویہ  
اپنے رفیق اجزاء کے خشک ہو جانے کی حالت میں استقرار حمل کے قابل نہیں رہتا۔

اسباب (۱) ایک مدت تک خشک غذاؤں کے کھانے کا اتفاق پڑے جیسے بارہ  
مکا۔ چنا وغیرہ (۲) فاقہ کشی یا مسلسل روزہ رکھنے کا زیادہ اتفاق ہو (۳) عورت کا مزاج

فربہ جن رحم

نحوہ دھونی

رحم کا سرد مزاج خشک

سوداوی ہو اور سن جوانی سے تجاوز کر جائے (۴) محنت و مشقت بکثرت کرنا۔ یا نعم و فکر میں مبتلا رہنا۔ یا ورکھو کہ اگرچہ ان اشیاء کے زیادہ استعمال سے خون کا گڑھا پیدا ہونے یا پورے طور پر بدل مایختل نہ ہونے کے باعث تمام بدن میں خشکی اور سودا ویت کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے رحم ضعیف ہو جاتا ہے تو بالخصوص رحم میں خشکی زیادہ غالب آجاتی ہے (۵) کسی ایسی دوا کا فرزہ کے طور پر بکثرت استعمال کرنا جس سے اندام نہانی میں خشکی رہے اور جماع کے وقت حصول لذت کا باعث ہو۔ یا ایسی دوا کا فرزہ کرنا جو استنقرار حل کی مانع ہو۔ جیسے شہم انداز اور پٹکری۔ یا چوہے کی مینگنیوں شہد کے ساتھ یا ہاتھی کی لید وغیرہ ان اشیاء کے استعمال سے رحم میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔

علامات (۱) خشکی پیدا کرنے والے اسباب کا مقدم ہونا۔ خون حیض کا گڑھا سیاہی مائل اور بہت کم مقدار ہونا (۲) فرج اور اندام نہانی کا ہر وقت خشک رہنا (۳) ایسی عورتوں کو بعض مرتبہ جماع کے وقت کسی ترچہ یا روغن کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے (۴) اگر عام بدن میں خشکی غالب ہوگی یا سودا کا غلبہ ہوگا تو بدن لائغر خشک۔ بے رونق رنگ سیاہی پائل یا کمند ہوگا۔

علاج (۱) ہر قسم کے وہ اسباب جن سے خشکی پیدا ہوئی ہے سب سے پہلے ان کو دور کرنا ضروری ہے (۲) مریض کو چند روز گلے کا تازہ دودھ مصری سے شیریں کر کے یا بکری کا دودھ شربت غناب کے ساتھ پلائیں (۳) مغز بادام شیریں مقشر مغز تخم کدو شیریں۔ مغز تخم تر بو زنبات سفید باریک پیسکر چینی کی طرح ہر روز صبح کو چٹائیں یا کمازہ کہن مصری کے ساتھ کھلائیں (۴) روغن گل۔ روغن بادام۔ روغن کدو وغیرہ کی مالش پیرو کے مقام پر اور فرج کے اندر باہر رانوں تک چند روز تک برابر کرائیں (۵) عورت کا دودھ غلاب بہدانہ واسپنول کے ساتھ بطور فرزہ استعمال کریں (۶) مرطب اور فرہ کرنے والی غذائیں جو مرغن اور لذیذ اور شیریں ہوں کھلائیں (۷) اگر ضرورت ہو تو پہلے سودا کا تقبیض یا بواسیر کرائیں (۸) رحم کے مزاج میں تری زیادہ ہو جانے سے بانجھ ہونا۔ رحم کے مزاج میں تری غالب ہونے سے ایک تو یہ خرابی ہوتی ہے کہ اس کی اکثر قوتیں خصوصاً قوت ماسکہ ضعیف

ہو جاتی ہے جس کے باعث مادہ منویہ رحم میں پہونچکر وہاں ٹھہر نہیں سکتا اور استقرار حمل کے وقت سے پہلے ہی وہ رطوبات رحم کے ساتھ مخلوط ہو کر باہر کو بہ آتا ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ بچہ کی پیدائش کا مادہ جب رحم کے اندر پہونچے تو وہاں کی رطوبات فضلیہ کے ساتھ مخلوط ہو جانے کے سبب سے اس میں استقرار حمل کی قابلیت بہت کم رہ جائے بالکل معدوم ہو جائے۔

اسباب (۱) ایک مدت تک زیادہ مرطوب اور زیادہ مرغن غذائیں بکثرت کھائی جائیں جیسے دودھ۔ بالائی۔ کھیر۔ مغزیات کے تر حلوے۔ خرپرہ۔ تربوز اور دوسرے تر میوے وغیرہ (۲) ناز و نعم کے ساتھ ہمیشہ آرام سے رہنا۔ اور معمولی ریاضت میں بھی کمی کرنا (۳) بدن کا عام مزاج بلغمی اور سن ابتداء شباب کا ہونا (۴) مرطوب ملک میں رہنے کا اکثر اتفاق پڑنا (۵) کسی وجہ سے مرطوب روغنوں کی مالش تمام بدن پر یا خاص زیر ناف۔ پیڑ و رانوں پر کرنا۔ یا شرمگاہ اور اندام نہانی کو اکثر چکنا چکنا رکھنا۔

علامات (۱) رطوبات پیدا کرنے والے اسباب کا مقدم ہونا (۲) خون حیض بکثرت آنا اور کم سرخ رقیق ہونا (۳) پیڑ و پر بال بہت کم اور باریک ہونا (۴) شرمگاہ اور اندام نہانی میں ہر وقت تری رہنا (۵) مقاربت کے وقت اندام نہانی سے زیادہ رطوبت خارج ہونا (۶) تمام بدن میں چربی دار فرہی اور اعضاء میں نرمی ہونا۔ رنگ پر رونق اور مفیدی اٹل ہونا۔ علاج (۱) رطوبت پیدا کرنے والے تمام اسباب کو حسن تدبیر کے ساتھ دور کرنا چاہئے۔

(۲) اگر ضرورت ہو تو مادہ بلغم کا تنقیہ مناسب ادویات کے ساتھ دوسری تدابیر سے پہلے کیا جائے (۳) ایسے موقع پر جبوب ایسج کا استعمال بھی اکثر بغرض اسہال بلغم یا بغرض خشک و تحلیل کرنے رطوبات فضلیہ کے کیا جاتا ہے اور بہت مفید ہوتا ہے (۴) مریضہ کو کبھی کبھی تھے کرنا بھی اکثر بہت مفید ہوتا ہے (۵) خشک غذائیں جیسے بھنا ہوا گوشت۔ مع گرم مصالحہ کے اور بستی روٹی مفید ہوتی ہے (۶) شحم حنظل۔ انتر روت۔ سماق۔ مرکی۔ زعفران۔ پھٹگری شہد کے ساتھ ملا کر فرجہ کریں (۷) گل سرخ۔ بالچھڑ۔ تچ۔ صعتز۔ سگ۔ نکھ۔ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے رحم کے اندر بطور حقنہ کے استعمال کریں۔

(۵) رحم کے اندر فاسد رطوبات کے جمع ہونے سے بانجھ ہونا رحم کے اندر کبھی بلغمی رطوبت فضلیہ غلیظہ القوام ہو جاتی ہے اور کبھی مادہ صفراویہ رقیق جس میں ایک خاص قسم کی تیزابی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی مادہ سوداویہ جس میں نہایت تیز ترشی ہوتی ہے ان تین قسموں کی فاسد رطوبات میں سے جو کوئی رطوبت رحم کی بحولیف میں موجود ہو اور مادہ منویہ وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ مخلوط ہو کر اس میں استقرار حمل کی قابلیت باقی نہیں رہتی اور اس کے لطیف اجزاء میں سے زندگی کی قوت فنا ہو کر وہ بالکل مردہ ہو جاتے ہیں اور ان رطوبات کے ساتھ بطور فضلہ کے بہ کر جوف رحم سے خارج ہو جاتے ہیں اس لئے عورت حاملہ نہیں ہو سکتی ہے۔

علامات (۱) استحالت میں بھی تقریباً وہی علاماتیں پائی جاتی ہیں جو رحم کے مزاج کی خرابیوں میں بیان کی گئی ہیں (۲) بلغمی رطوبات جمع ہوں تو رحم میں سوزش نہیں ہوتی (۳) صفراوی رطوبات ہوں تو رحم میں گرمی اور جلن محسوس ہوتی ہے (۴) سوداوی رطوبات ہوں تو رحم میں خارش اور تیزی سی محسوس ہوا کرتی ہے (۵) رات کو اندام نہانی میں فم رحم کے قریب سفید کپڑا رکھ کر سوز ہیں۔ صبح کو وہ کپڑا نکال کر سکھالیں۔ بعد سوکھنے کے اگر کپڑے کا رنگ سفید اور اس میں کلمپ کی سی سختی ہو تو یہ بلغمی رطوبت کی علامت ہے اور اگر اس میں قدرے زردی پائی جائے تو صفراویت سمجھنی چاہئے۔ اور اگر اس کا رنگ میلایا قدرے سیاہی پائل ہو جائے تو یہ خلط سوداوی کی علامت ہے۔

علاج۔ بروئے تشخیص جس قسم کا مادہ ثابت ہو اسی کا تئیبہ کرانا چاہئے۔ اس کے بعد رحم کو قوت پہنچانے کے لئے مزاج کے موافق خوشبودار اور مقوی ادویات بطور فرجہ یا حقنہ وغیرہ کے استعمال کریں۔ اسی طرح کوئی مقوی معجون یا سفوف کھلائیں اور برہنہ کی تاکید کریں (۶) رحم کے اندر کپڑے پیدا ہو جانے سے بانجھ ہونا۔ بعض یونانی اطباء سے منقول ہے کہ انہوں نے ایسی بانجھ عورتوں کا بھی علاج کیا جن کے رحم یا اندام نہانی کے اندر ایک خاص قسم کے کپڑے موجود تھے جو دین ان المعاء المستقلیم (اسمال تھرڈ درم) یعنی چمنوں سے بھی زیادہ باریک اور چھوٹے تھے۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو اندام نہانی یا

رحم کی اندرونی جھلی کی چپٹوں (روچیر) میں ان کیٹروں کی سکونت پائی گئی معلوم ہوا کہ یہ گرم مادہ منویہ کے اکثر حصہ کو کھالیتے ہیں اور کچھ باقی مادہ ان کے فضلات کے ساتھ مل کر بالکل خراب اور بیکار ہو جاتا ہے اس لئے استقرار حمل نہیں ہو سکتا اور عورت بانجھ ہوتی ہے۔

**اسباب** (۱) رحم یا اندام نہانی کے اندر فضلات غلیظہ بلغمیہ کا ایک مدت تک جمع رہنا (۲) تنقیہ رحم اور تصفیہ اندام نہانی کا خیال نہ رکھنا (۳) کھانے پینے میں ایسی چیزوں کا بکثرت استعمال رکھنا جن سے کچے بلغم کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے (۴) رحم یا اندام نہانی کے اندر اقسام مذکورہ بالا کے فضلات غلیظہ جمع ہو کر کسی وجہ سے متعفن ہو جائیں اور کیڑے پیدا ہو جائیں

**علامات** (۱) گرمیوں کی حرکت یا کاٹنے سے رحم یا اندام نہانی کے اندر خارش ہوتی ہے۔ (۲) خارش کے وقت کبھی اندام نہانی سے ایک خاص قسم کی رفیق رطوبت خارج ہوتی ہے۔ (۳) اندام نہانی سے بہنے والی رطوبت کو اگر تیز بہارت سے بغور دیکھیں یا بذریعہ آلہ خوردہ بن کے ملاحظہ کریں تو نہایت باریک چھوٹے چھوٹے کیڑے اس میں دکھائی دیتے ہیں (۴) جماع اور انزال کے بعد رحم کی خارش تھوڑی دیر کے لئے موقوف ہو جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد مادہ منویہ مع رطوبت کے رحم سے یہ کر خارج ہو جاتا ہے (۵) جماع کے بعد جب یہ رطوبت خارج ہوتی ہے اگر اس وقت ایک باریک اور صاف کیڑا اندام نہانی میں رکھ لیا جائے تو اس کیڑے پر بھی ان کیڑوں میں سے ایک دو کیڑے اکثر مل سکتے ہیں۔

**علاج** (۱) سب سے پہلے بلغم کا تنقیہ کرنا چاہئے (۲) مریض کو اندام نہانی کے صاف رکھنے کی تاکید کرنی چاہئے (۳) بلغم پیدا کرنے والی اشیا سے پرہیز کرنا ضروری ہے (۴) کیڑوں کے مارنے کے لئے برگ خاصا یہ میں خشک کر کے نہایت باریک کوٹ چکان کر قدرے موم سفید کے ساتھ ملا کر قہر زجہ کے طور پر استعمال کریں (۵) مولیٰ نازہ چھین کر اس کا ٹکڑا اندام نہانی میں رکھیں (۶) مولیٰ کے پتوں کا پھوٹا ہوا عرق بذریعہ پچکاری کے اندام نہانی اور رحم کے اندر پہنچاویں (۷) گواشیا کے نفور (انفیوژن) یعنی خیساندہ کی پچکاری بھی بہت مفید ہے۔ (۸) سرطان رحم سے بانجھ ہونا۔ کبھی سرطان رحم ایسا خفیف طور پر لاحق ہوتا ہے کہ اسکی شائد اور تکالیف بہت کم ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسی حالت میں رحم کی ساخت خراب ہو جاتی ہے۔

اور اس کی صحت قائم نہیں رہتی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ قرب رحم کے باعث خصیتہ الرحم کا فعل بھی خراب ہو جائے اور اس میں مادہ تولید اچھی طرح سے تیار نہ ہو سکے۔ اس لئے عورت میں استقرار حمل کی قابلیت باقی نہیں رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ اطباء نے اس مرض کو اسباب عققر میں شمار کیا ہے ورنہ اگر اس مرض کی شدت کے وقت لاحق ہونے والے عوارض اور تکالیف کا لحاظ کیا جائے تو ایسے خطرناک موقع پر مریضہ کے بانجھ ہونے کا خیال نہیں ہو سکتا بلکہ اس موزی مرض کی شدت کے وقت تو مریضہ کو ان تکالیف کی سب سے زیادہ شکایت ہوتی ہے جو سرطان رحم کے لوازمات میں سے ہیں۔ ایسی حالت میں مریضہ تیار داروں۔ قابلہ اور طبیب معالج کی توجہ ان شدائد کے دور کرنے کی طرف مصروف ہوتی ہے۔ بہر حال اس صورت میں مرض سرطان رحم کا علاج کرنا اور اس کی تکالیف کا حقیقی الامکان السداد کرنا لازم ہے۔ اگر مرض خفیف ہو اور فضل الہی سے وہ زائل ہو جائے تو اس کے بعد عققر کی تدابیر کا موقع آ سکتا ہے (تشخیص مرض اور علاج کے لئے دیکھو بیان سرطان رحم کا)۔

(۸) آکلہ رحم سے بانجھ ہونا۔ یہ مرض چونکہ قسم رحم (آس یوٹرائی) اور اس کے قریب والے حصہ میں اکثر لاحق ہوتا ہے اور اس کے اکثر اسباب فساد خون یا خنازیری مزاج یا خون حیض کی خرابی سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے اس مرض کی حالت میں نہ تو رحم ہی استقرار حمل کے قابل رہتا ہے نہ عورت کا مادہ تولید خصیتہ الرحم میں اچھی طرح تیار ہوتا ہے اور نہ مرد کا مادہ منویہ پورے طور پر رحم کے اندر داخل ہو سکتا ہے بلکہ اگر کسی قدر مادہ منویہ رحم کے اندر پہنچ بھی جائے تو وہ رطوبات فاسدہ کے ساتھ مل کر بالکل خراب اور بیکار ہو جاتا ہے جو اکثر اس حالت میں مقام ماؤف کی ساخت سے مترشح ہو کر تجویف رحم میں جمع رہتی ہیں اسی سبب سے اس مرض کو اسباب عققر میں شمار کیا گیا ہے (تشخیص مرض اور علاج کے لئے دیکھو بیان آکلہ رحم کا)۔

(۹) اقروح رحم سے بانجھ ہونا۔ رحم کے اندر اگر زخم ہو جائیں تو ان کے سبب عورت کے حاملہ نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک تو بحالت موجود ہونے زخموں کے چند وجوہ سے حمل کی امید نہیں کی جاسکتی (از زخموں سے بہنے والی رطوبت پسپ) رحم کی تجویف میں تھوڑی

یا بہت ضرور جمع رہتی ہے اس لئے مادہ منویہ رحم کے اندر پہنچ کر اور اس مٹری ہوئی رطوبت سے مل کر استقرار حمل کے قابل نہیں رہتا (۲) رحم کی ساخت رزخموں کے باعث استقرار حمل کے قابل نہیں رہتی (۳) ممکن ہے کہ اس حالت میں خصینہ الرحم کے اندر مادہ تولید کی پیدائش بالکل موقوف یا بہت کم ہو جائے یا وہ استقرار خراب پیدا ہو کہ استقرار حمل کے قابل نہ ہو سکے (۴) ممکن ہے کہ قروح رحم کی حالت میں زیادہ تکلیف ہونے کے باعث مرضیہ مقاربت سے نفرت کرے اور اس کو اس فعل سے کوئی خط حاصل نہ ہو وے۔ اس لئے ایسی حالت میں عورت کو استقرار حمل کی امید کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ لیکن قروح رحم کی حالت میں چند روز تک عارضی طور پر عورت کے حاملہ نہ ہونے کو اصطلاح اطباء میں یا عرف عام کے لحاظ سے بانجھ ہونا ر عقر نہیں کہا جاسکتا۔ اور نہ اس وقت علاج میں عقر کا خیال پیش نظر ہوتا ہے بلکہ اس وقت نومریضہ تیمار داروں۔ قابلہ اور طبیب معالج کی توجہ ازالہ قروح کی طرف مصروف ہوتی ہے۔ اس لئے اس صورت کو اسباب عقر میں شمار کرنا صرف ترتیبی بیان سمجھنا چاہئے ر علاج کے لئے دیکھو بیان قروح رحم کا)

دوسری صورت یہ ہے کہ اگر زخم زیادہ گہرے۔ دیر پا۔ یا خراب قسم کے ہوں تو ان کو بالکل آرام ہو جانے اور اندام پانے کے بعد خاص رحم کی ساخت یا اس کی اندرونی جھلی میں ایسی سختی پیدا ہو جاتی ہے جس کے باعث احتباس حیض یا قلت حیض یا عسر حیض کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اور جب ایسی حالت میں رحم کے اندر مادہ منویہ پہنچے تو ممکن ہے کہ اسکو خون حیض سے کافی امداد یا تقویت حاصل نہ ہو سکے کے باعث حمل قرار نہ پاسکے اور بیچاری عورت ہمیشہ کے لئے اولاد سے محروم رہا بنجھ رہے اس لئے قابلہ اور طبیب معالج کو لازم ہے کہ وہ اسباب عقر کو تلاش کرتے ہوئے اس امر کی تفتیش ضرور مد نظر رکھے کہ عورت پہلے کسی وقت قروح رحم کی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر پہلے اس کو یہ عارضہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد حاملہ ہونا موقوف ہو گیا ہے تو صلابت رحم کے اصول پر علاج کرنا اور رحم کی ساخت میں نرمی پیدا ہونے کی تدبیریں عمل میں لانی چاہئیں ر علاج کے لئے دیکھو بیان صلابت رحم کا

قروح رحم سے بانجھ ہونے کی دوسری وجہ



(۱۰) انقلاب رحم سے بانجھ ہونا۔ اس مرض کی وہ قسم جو رفتہ رفتہ واقع ہوتی ہے اسکی ابتداء میں جب تک کہ علامات شدت مرض کی ظاہر ہونے نہیں پاتی ہیں اسوقت تک باوجود حسب عادت جماع میسر ہونے کے عورت اور اس کے خاوند کو حل نہ ٹھہرنے سے تعجب ہوتا ہے اور اس حالت پر حقیقتہً زمانہ گزرتا جاتا ہے اسی قدر مرض عقر کا احتمال قوی ہوتا جاتا ہے اس حالت میں حل قرار نہ پانے کے یہ اسباب ہوتے ہیں (۱) رحم کی تجولیف درست نہیں رہتی (۲) اس کا منہ اکثر بند رہتا ہے (۳) مادہ منویہ کا رحم کے اندر پہنچنا اور وہاں ٹھہرنا دشوار ہوتا ہے (۴) جب مرض ترقی کرتا ہے اور رحم کا جسم بالکل پلٹ کر رحم کے اندر آ جاتا ہے یا زیادہ لٹک کر اندام نہانی تک آ جاتا ہے تو ایسی حالت میں عورت کے ساتھ جماع نہیں کیا جاسکتا اور نہ بچے کی پیدائش کا مادہ وہاں ٹھہر سکتا ہے اس لئے عورت استقرار حل کو بالکل قابل نہیں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اطباء نے اس مرض کو عقر کے اسباب میں شمار کیا ہے۔

اس حالت میں انقلاب رحم کی علامتیں موجود ہوتی ہیں اور قابلہ اندام نہانی میں انگلی داخل کر کے اسے بخوبی معلوم کر سکتی ہے۔ (علاج کیلئے دیکھو بیان انقلاب رحم کا)

(۱۱) میلان رحم سے بانجھ ہونا۔ جب رحم کسی طرف کو زیادہ جھک جاتا ہے تو ذیل کے اسباب استقرار حل کے مانع ہوتے ہیں (۱) رحم کا منہ اور اس کی تجولیف اپنے ٹھیک موقع پر قائم نہیں رہتے (۲) مرضیہ کو جماع کے وقت سخت ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے (۳) رحم کا منہ اور تجولیف دونوں کچھ نہ کچھ ضرور بند ہو جاتے ہیں (۴) جب رحم کسی طرف کو زیادہ ٹیڑھا ہو جائے تو ممکن ہے کہ اس کا منہ اور تجولیف دونوں ایسے بند ہو جائیں کہ مرد کے مادہ منویہ کو رحم کے اندر جانے کا راستہ نہ مل سکے۔ اسی وجہ سے اکثر مرضیہ کا حیض بھی رک جاتا ہے (۵) ممکن ہے کہ رحم جھک جانے سے قاذوف نالیوں پر کچا دباؤ پڑنے کے باعث ان کا منفذ راستہ ایسا بند ہو جائے کہ عورت کا مادہ تولید رحم کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ان اسباب کا خیال کر کے اطباء نے میلان رحم کو بھی اسباب عقر میں شمار کیا ہے۔

کیونکہ ایسی حالت میں عورت استقرار حل کے قابل نہیں رہتی ہے تشخیص مرض اور علاج کے لئے دیکھو بیان میلان رحم کا)

(۱۲) استسقاء رحم سے بانجھ ہونا۔ جب رحم کی تجویف میں فضلات رقیقہ بھر کر اس میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس حالت میں رحم کا منہ بالکل بند رہتا ہے اسلئے نہ تو مادہ منویہ رحم کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس کا مزاج اصلی تندرستی کے اندازہ پر قائم رہتا ہے۔ بلکہ ایسی حالت میں یہ بھی ممکن ہے کہ خصیتہ الرحم کا فعل بھی خراب ہو جائے اور اس میں مادہ تولید (اووم) کی پیدائش پورے طور پر نہ ہو سکے۔ اس لئے استسقاء رحم کو اسباب عقر میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ ایسی حالت میں بھی عورت کو استقرار حمل کی امید نہیں ہو سکتی ہے۔

تشخیص مرض اور علاج کے لئے دیکھو بیان استسقاء رحم کا

(۱۳) بواسیر رحم سے بانجھ ہونا۔ اس مرض کے باعث رحم کا منہ اکثر بند و سخت و دردناک رہتا ہے۔ عورت کو ہر وقت اور خصوصاً جماع سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مادہ منویہ کا رحم کے اندر داخل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اکثر اوقات بواسیر میں سے فاسد رطوبت تراوشش پاکر اندام نہانی کے راہ ہتی رہتی ہے جس کے ساتھ ملنے سے مادہ منویہ استقرار حمل کو قابل نہیں رہتا۔ کبھی ورم خصیتہ الرحم کے باعث بواسیر رحم کا مرض پیدا ہو جاتا ہے تو اس حالت میں یہ بھی ممکن ہے کہ عورت کے مادہ تولید کی پیدائش میں بھی خلل واقع ہو۔ ان تمام وجوہات سے مرض بواسیر رحم عقر کا سبب ہو سکتا ہے تشخیص مرض اور علاج کے لئے دیکھو بیان بواسیر رحم کا

(۱۴) سیلان منی سے بانجھ ہونا۔ جب عورت کا مادہ تولید بے موقع رحم سے خارج ہو کر اکثر شرمگاہ سے بہنے لگتا ہے تو اس صورت میں عورت کو حمل نہ ٹھہرنے کے دو سبب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت کے مادہ تولید کا رحم کے اندر ٹھہرنا اور وہاں مرد کے مادہ منویہ کے ساتھ ملنا استقرار حمل کے لئے ضروری ہے جو سیلان منی کی حالت میں ممکن نہیں ہے بلکہ عورت کا مادہ تولید مرد کے مادہ منویہ کو بھی اپنے ساتھ لیکر تجویف رحم سے بہ نکلتا ہے۔

دوسرے یہ کہ عورت کا مادہ تولید اکثر اس حالت میں رحم سے خارج ہو کر بہا کرتا ہے جسکے خصیتہ الرحم کے اندر اس کی پیدائش میں کسی وجہ سے کوئی سخت نقصان واقع ہوا ہو

چونکہ وہ مادہ اپنے پیدا کنی نقصان کے باعث استقرار حمل کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لئے رحم کے اندر وہ ٹھہر نہیں سکتا ہے۔

اور اگر ایسے ناقص مادہ کو بلا اصلاح کے کسی تدبیر سے روکا جائے تو کسی سخت مرض کے پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ اس بیان سے آپ کو معلوم ہوا کہ ایسے ناقص مادہ کا رحم سے خارج ہونا ایک قدرتی اور مفید فعل ہے اور اس کو روکنا نہیں چاہئے۔ البتہ اسکی اصلاح کرنا طبیب کا فرض ہے۔ پھر ایسی حالت میں مرد کا مادہ منویہ کس طرح جوف رحم میں ٹھہر سکتا ہے۔ اور اس کے نہ ٹھہرنے کی حالت میں استقرار حمل کی امید رکھنی بالکل عقل سے بعید ہے۔ اس لئے اطباء نے اس مرض کو اسباب عقر میں شمار کیا ہے علاج کیلئے دیکھو بیان سیلان مٹی کا،

(۱۵) سیلان رحم سے بانجھ ہونا۔ چونکہ اس مرض میں رحم کی اندرونی جھلی بہو کس میمبرین سوزش مزمن میں اکثر مبتلا رہنے کے باعث رحم کی صحت بالکل خراب رہتی ہے اور رحم سے بہنے والی رطوبات اس کی تجویف میں اکثر جمع رہتی ہیں۔ اس لئے جو مادہ منویہ رحم کے اندر پہنچتا ہے فوراً خراب اور بیکار ہو کر استقرار حمل کے قابل نہیں رہتا۔ پھر ان بہنے والی رطوبات کے ساتھ رحم سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرض میں عورت کو استقرار حمل نہ ہو سکے کے باعث اطباء نے اس مرض کو اسباب عقر میں شامل کیا ہے لیکن یاد رکھو کہ سیلان رحم جب تک نہایت شدت اور کثرت کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک پورے طور پر عقر کا موجب نہیں ہو سکتا کیونکہ رات دن کے تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اکثر عورتیں جو ایک مدت تک اس مرض میں معمولی طور پر مبتلا رہتی ہیں وہ سب کی سب اولاد سے محروم نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان میں سے اکثر حاملہ اور صاحب اولاد ہوتی ہیں البتہ یہ شکایت اکثر سنی اور دیکھی جاتی ہے کہ ان کو استقرار حمل میں معمول سے زیادہ تاخیر ضرور واقع ہوتی ہے۔ یا ان کا حمل باوجود احتیاط اور حفاظت کے اکثر ساقط بھی ہو جاتا ہے اس لئے ہمارے نزدیک اس مرض کی معمولی حالت کو اسباب عقر حمل میں یا اسباب اسقاط جنین میں شمار کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ علاج کیلئے دیکھو بیان سیلان رحم کا،

(۱۶) نفخہ رحم سے بانجھ ہونا۔ یاد رکھو کہ یہ مرض دو وجہ سے استقرار حمل کو مانع ہو سکتا ہے

ایک تو اپنی موجودہ حالت کے لحاظ سے۔ دوسرے اپنے اسباب کے لحاظ سے۔  
 اول یہ کہ نفخۃ الرحم اپنی موجودہ حالت کے اعتبار سے اس لئے استقرارِ حمل کا مانع  
 ہوتا ہے کہ مرض کی حالت میں رحم کے اندر بکثرتِ ریاح بھرے ہوئے اور اس کا منہ بند  
 رہتا ہے جس کے باعث ایک تو مادہ منویہ رحم کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے اور اگر  
 کسی قدر داخل بھی ہو جائے تو اسے ریاح فوراً باہر کو دفع کر دیتے ہیں۔ اس لئے عورت  
 یا تو بالکل حاملہ نہیں ہو سکتی یا بدشواری اگر کبھی حاملہ ہو بھی جائے تو اکثر حمل ساقط ہو جاتا ہے۔  
 دوسرے یہ کہ نفخۃ الرحم کے اکثر اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے استقرارِ حمل کی  
 امید ہرگز نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس مرض میں رحم کی تمام قوتیں اور اس کی حرارت غریزی  
 (اینی مل ہیٹ) یعنی اصلی حرارت نہایت ضعیف ہو جاتی ہیں وہ رحم کے مادہ غذائیہ کو  
 اچھی طرح سے ہضم کرنے اور اس کے فضلات کو دفع کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ اس ہی وجہ  
 سے اس میں بکثرتِ ریاح پیدا ہو کر ہر وقت بھرے رہتے ہیں ۲ جب خون حیض کے  
 جاری ہونے کا موقع آتا ہے اس وقت رحم اپنے ضعف کے باعث خون حیض کے کالے پیر  
 قاور نہیں ہو سکتا اور اس سے ریاح بکثرت پیدا ہونے لگتے ہیں (۳) اسقاطِ حمل یا وضعِ حمل  
 کے بعد کچھ حصہ شمشہ کا رحم کے اندر باقی رہ جاتا۔ یا کسی قدر خون نفاس کا رحم کے اندر چلانا  
 اور پھر اس سے ریاح کا پیدا ہونا یہ سب امور جس طرح کہ ضعفِ رحم کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہیں  
 اسی طرح سے ضعفِ رحم کو اور بھی زیادہ بڑھانے والے ہیں۔

پھر بھلا جب کسی عورت کا رحم اس قدر ضعیف ہو کہ وہ اپنے رات دن کے معمولی کام  
 (اپنی پرورش وغیرہ کو) بھی انجام نہ دے سکتا ہو تو مادہ منویہ کی ضروری اصلاح یا جنین  
 (فی ٹش) کی پرورش کی جلیل القدر خدمت جو استقرارِ حمل کے موقع پر اس کے ذمہ لازمی  
 ہوتی ہے ایسے ضعف کی حالت میں اس سے کس طرح ممکن ہے اسی وجہ سے اطباء نے  
 اس مرض کو اسبابِ عقر میں شمار کیا ہے (علاج کے لئے دیکھو بیانِ نفخۃ الرحم کا)

(۱۴) صلابتِ رحم سے بانجھ ہونا۔ اس مرض کی تمام حالتیں استقرارِ حمل کی مانع نہیں  
 ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ اکثر عورتیں جن کے رحم میں تھوڑی سی سختی ایک مدت دراز سے موجود

ہوتی ہے یا رحم کے بعض حصہ میں صلابت پائی جاتی ہے۔ وہ اکثر حاملہ اور صاحب اولاد ہوتی ہیں لیکن جن عورتوں کو صلابت رحم کا ایسا سخت عارضہ ہوتا ہے کہ ان کے رحم کی تمام ساخت یا اس کا تمام اندرونی طبقہ (میوس میمبرین) ورم سوداوی کے سبب سے یا پرانے زخموں کے اندمال پانے کے بعد استقرار سخت ہو جائے کہ احتباس حیض تک نوبت پہنچے اور سختی کے باعث حیض کا خون رحم کی رگوں سے بالکل تراوش نہ پاسکے تو ایسی حالت میں عورت کے حاملہ ہونے کی کسی طرح امید نہیں ہو سکتی ہے۔

کیونکہ ایک تو ایسی عورتوں کو (ورم صلب رحم کے باعث اکثر میلان رحم کا عارضہ ہو جاتا ہے جس کے باعث مادہ منویہ رحم کے اندر پہنچ نہیں سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کسی قدر مادہ منویہ رحم میں پہنچ بھی جاتا ہے تو رحم کے اندر اس کو خون حیض کی ضروری امداد حاصل نہ ہو سکے کے باعث وہ بذات خود استقرار حمل کے لئے کافی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کچھ مدت کے بعد وہ رحم سے فضلہ کے طور پر خارج ہو جاتا ہے۔

تیسرے یہ کہ اگر صلابت رحم کا مرض بہت پرانا ہو جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ رحم کی شرکت سے نصیبتہ الرحم کے فعل میں خرابی پیدا ہو جائے اور اس میں مادہ تولید کی پیدائش خراب یا بالکل موقوف ہو جائے۔ ان وجوہات سے ورم صلب رحم کا اگر کم ہو تو اسباب عسر حمل میں اور اگر زیادہ ہو تو اسباب عقر میں شمار کیا جاتا ہے (علاج کے لئے دیکھو بیان صلابت رحم کا) (۱۸) احتباس حیض سے بانجھ ہونا۔ اگر کسی جوان عورت کا کسی وجہ سے حیض بالکل بند ہو جاتا ہے اور علاج سے غفلت کرنے کے باعث یا علاج کی ناموافقت سے ایک مدت تک مرض باقی رہتا ہے تو علاوہ دوسری تکالیف کے جو احتباس حیض کے ساتھ لازم ہیں۔ وہ بیماری اولاد کی نعمت سے بالکل محروم اور ہمیشہ کے لئے بانجھ ہو جاتی ہے۔

کیونکہ اس مرض میں ایک تو یہ بات ہے کہ جب مادہ منویہ رحم کے اندر پہنچتا ہے۔ اس وقت رحم کے اندر اس کو خون حیض سے مدد نہیں مل سکتی جو استقرار حمل کے لئے ضروری ہے اور کیلادہ قلیل المقدار مادہ استقرار حمل کے لئے کافی نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے وہ بطور فضلہ کے رحم سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ جن اسباب احتباس حیض کا

مرض لاحق ہوتا ہے۔ ان کی مفسد تاثیر سے یہ مادہ منویہ بالکل فاسد اور پیکار ہو کر استقرار حمل کے قابل نہ رہے اور فضلہ کی طرح رحم سے خارج ہو جائے اس لئے احتباس حیض کو اسباب عقر میں شمار کیا گیا ہے (علاج کے لئے دیکھو بیان احتباس حیض کا)

(۱۹) رحم کے چربی میں بدل جانے سے بانجھ ہونا۔ ایسی حالت میں عورت کے بانجھ ہونے اور اولاد سے محروم رہنے کے چند سبب ہوتے ہیں (۱) اسے احتباس حیض کا عارضہ ہوتا ہے جس سے نطفہ کو استقرار حمل کے لئے کافی امداد نہیں مل سکتی ہے (۲) ایسی حالت میں اکثر مریضہ کو فرہی منفرد اور کلانی شکم و کثرت بیاح کی شکایت ہوتی ہے اس لئے مادہ منویہ کا رحم کے اندر پہنچنا اور پھر اس کا رحم کے اندر ٹھہرنا دشوار ہونے کے باعث استقرار حمل نہیں ہو سکتا ہے ایسی حالت میں جو رحم کے اندر استقرار حمل اور پرورش جنین کی گنجائش نہیں رہتی ہے اور نہ اس کی ساخت کہنچاؤ اور تناؤ پیدا ہو کر بڑھنے کے قابل رہتی ہو اس لئے اکثر تو استقرار حمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اتفاقاً حمل قرار بھی پا جائے تو ممکن ہے کہ علامات حمل کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی ایک مضغہ گوشت یا پیچھے چمڑے کی صورت میں رحم سے اس طرح خارج ہو جائے کہ اسے اسقاط حمل قرار نہ دیا جاسکے۔

لہذا ہم اس مرض کو عقر یا عسر حمل کے اسباب میں شمار کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر استقرار حمل کے کچھ دنوں بعد اور جنین کی جسامت کسی قدر بڑھ جانے کے بعد وہ ساقط ہو اور اس کے ساتھ ہی مریضہ کو اسقاط حمل کے سے عوارض لاحق ہوں تو اسے اسقاط حمل کہا جائے گا۔ اور اس حالت میں اس مرض کو اسقاط حمل کے اسباب میں شمار کیا جائیگا۔

علاج کے لئے دیکھو بیان تشحم رحم کا

جماعت چوتھی عوارضات جسمی۔ اس جماعت میں تمام وہ خرابیاں داخل ہیں جو تمام بدن یا کسی عضو خاص میں لاحق ہو کر عورت کے حاملہ نہ ہو سکے کا باعث ہو سکتی ہیں جیسے (۱) عام بدن کے مزاج میں کوئی خاص خرابی (۲) مرض فساد خون یا آتشکی زہر (۳) ضعف اعضاء (۴) فرہی منفرد (۵) کلانی شکم (۶) بڑھا پا۔

اب ہم ان کو ذیل میں تفصیل کے ساتھ درج کرتے ہیں۔

(۱) عام بدن کے سوہ مزاج سے بانجھ ہونا۔ اس سے ہماری مراد وہ مزاجی خرابی نہیں ہے جو عورت کے بدن میں کسی خاص مرض کو پیدا کر کے اس کے ضمن میں ظاہر ہو جائے کیونکہ ایسی حالت میں عارضی طور پر کچھ مدت کے لئے عورت کا حاملہ نہ ہونا عقرب (بانجھ پن) کی حد میں داخل نہیں ہے اور نہ کسی مرض ظاہری کی موجودگی میں خود مریضہ کو یا اس کے تیمار داروں یا معالج کو مرض عقرب کا خیال یا اس کا علاج مد نظر ہوتا ہے۔ بلکہ اس وقت میں تو مریضہ کو مرض موجودگی کی تکالیف سے بچانا اور زائلہ مرض کی تداویر عمل میں لانا سب کو مد نظر ہوتا ہے جیسے مرض دق میں دوسرے درجہ کے بعد یا مرض سل میں جبکہ مریضہ نہایت ضعیف اور ناتوان ہو جائے۔ یا مرض آتشک میں اس کی شدت کے وقت۔

بلکہ عام بدن کی مزاجی خرابی سے ہماری مراد اس وقت وہ خرابی ہے جو کسی مرض کی صورت میں ظاہر نہ ہوئی ہو۔ اس قسم کی خرابی اکثر ایسی پوشیدہ ہوتی ہے کہ مریضہ اور اس کے متعلقین کو سوائے اس کے اور کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے کہ عورت بانجھ اور اولاد کو بالکل محروم رہے اور جس طبیب سے چارہ جوئی کی جاتی ہے تو اسے بھی اس پوشیدہ خرابی کی تشخیص میں کمال دقت پیش آتی ہے اس وقت اگر وہ نقیض حال کی غرض سے تمام اسباب عقرب کو اور ان کی تفصیلی علامات کو دریافت کرنا شروع کرتا ہے تو بالآخر اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مریضہ کے اعضا تناسل بیرونی یا اندرونی میں کوئی خرابی نہیں ہے اور امراض رحم میں سے کوئی مرض نہ بالفعل موجود ہے نہ پہلے کبھی لاحق ہو چکا ہے۔ مریضہ کی بدنی حالت و ہمت ہے زیادہ فربہ یا لاغرا و ضعیف بھی نہیں ہے خارجی امور میں سے بھی کوئی سبب استقرار حمل کا مانع ہو موجود نہیں ہے اس وقت طبیب کو یقین کر لینا چاہئے کہ اس مریضہ کے عقرب کا سبب اس کے بدن کی عام سوہ مزاجی ہے۔

**اسباب۔** مزاجی خرابی کے اثر سے عورت کا بانجھ ہونا تین طرح سے ہوتا ہے (۱) بعض بانجھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بدن میں جتنی غذائی مادہ موجود ہوتا ہے یا کھانے پینے سے ہمیشہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ ان کا بدن تمام غذائی مادہ کو اپنی پرورش میں صرف کر لیتا ہے اور ان کے اعضا تناسل میں غذائی مادہ استقرار نہیں پہنچتا جس سے

مادہ تولید کی پیدائش کافی طور پر ہو سکے اس لئے ان کے بدن میں مادہ تولید کی پیدائش ضرورت سے بہت کم ہوتی ہے ایسی عورتیں فربہ اندام۔ بظاہر نہایت تندرست قد آور اور آزاد خیال ہوتی ہیں بعض بانجھ عورتوں کے بدن میں اگرچہ مادہ تولید کی پیدائش بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ان کی مزاجی خرابی کے اثر سے مادہ تولید میں ایسی حشرابی موجود ہوتی ہے کہ اگر کسی طرح اس کی اصلاح ہو جائے تو وہ حاملہ ہو سکتی ہیں اور اگر اس مادہ کی اصلاح نہ ہو سکے تو استقرار حمل ممکن نہیں ہوتا ہے چنانچہ تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ایسی عورت کا نکاح کسی ایسے مرد کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کے مزاج میں عورت کے مزاج کی سی خرابی موجود ہوتی ہے تو وہ عورت ہمیشہ اولاد سے محروم اور بانجھ رہتی ہے کیونکہ اس حالت میں مادہ تولید کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے اور اگر ایسی عورت کا نکاح کسی ایسے مرد کے ساتھ کیا جائے جس کے مزاج میں اس خرابی کی اصلاح کرنیکی قابلیت موجود ہو تو وہ عورت حاملہ اور صاحب اولاد ہو سکتی ہے کیونکہ اس حالت میں مادہ تولید کی اصلاح ہو کر وہ استقرار حمل کے قابل ہو جاتا ہے (۳) بعض بانجھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مزاجی خرابی کے باعث ان کے بدن میں مادہ تولید نہایت فاسد اور بیکار پیدا ہوتا ہے جو کسی طرح استقرار حمل کے قابل نہیں ہوتا ہے اکثر ایسی عورتیں صفراوی یا سوداوی مزاج کی ہوتی ہیں یا ان کے بدن میں کسی قسم کی زہریلی تاثیر موجود ہوتی ہے۔

علاج (۱) اگر باوجود بدن کی فزہی اور کثرت غذا کے عورت کے بدن میں مادہ تولید کی پیدائش کم ہو تو اسکو بکثرت روزہ رکھنے اور ورزش کی ہدایت کرنی چاہئے اور ایسی ادویات کا استعمال کرنا چاہئے جس سے اعضا تناسل قوی ہو کر مادہ تولید کو اچھی طرح سے تیار کرنے لگیں اس غرض کیلئے اکثر تودری سرخ کو دو دھ میں جوش دیکر پلا یا کرتے ہیں اور بہت نفع ہوتا ہے (۲) اگر علامات سی ثابت ہو جائے کہ مادہ تولید کی خرابی قابل اصلاح ہے تو نوعیت فساد کو دریافت کر کے اسکے موافق اصلاح میں کوشش کرنی چاہئے (۳) اگر معلوم ہو جائے کہ مادہ تولید بالکل فاسد اور بیکار ہے تو عورت کے مزاج کی موافق خلط غالب کا تنقیہ کرنا اور اس کے بدن کی زہریلی تاثیر کو دفع کرنا ضروری ہے (سید ہے کہ بعد مناسب تدابیر کے وہ صاحب اولاد ہو جائے گی۔)

(۲) فساد خون یا آتشکی زہر سے بانجھ ہونا۔ جب خون میں کسی قسم کا فساد یا آتشکی



زہر موجود ہوتا ہے تو اس حالت میں اکثر عورتوں کے بدن میں مادہ تولید کی پیدائش نہایت کم ہو جاتی ہے جو استقرار حمل کے لئے کافی نہ ہو سکے۔ یا مادہ تولید ایسا فاسد پیدا ہوتا ہے جس میں استقرار حمل کی قابلیت نہیں ہوتی ہے۔

علامات۔ فساد خون یا آتشکی زہر کی علامتیں جو پہلے کئی موقعوں پر لکھی گئی ہیں ان سے تشخیص مرض کرنی چاہئے۔

علاج۔ مصفیات خون اور آتشکی زہر کو زائل کرنے والی دواؤں کا استعمال اور انکے موافق پرہیز کرنا چاہئے (دیکھو بیان آتشک کا)

(۳) ضعف اعضاء سے بانجھ ہونا۔ جب عورت کے عام اعضاء نہایت ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں خواہ وہ کمزوری اور خافت پیدائشی ہو یا عارضی طور پر کسی مرض کے باعث پیدا ہو گئی ہو تو ان دونوں صورتوں میں تمام اعضاء ظاہری کی طرح عورت کو اعضاء باطنی بھی نہایت ضعیف ہونے کے باعث اپنے کام سے قاصر رہتے ہیں۔ اس لئے اس کے بدن میں مادہ تولید کی پیدائش بالکل موقوف یا نہایت کم ہو جاتی ہے اور اسی سبب سے عورت حاملہ نہیں ہو سکتی ہے۔

علامات (۱) عورت نہایت لاغر۔ نحیف البدن۔ نازک مزاج ہوتی ہے (۲) کمزوری کے باعث جماع سے خائف رہتی اور شوہر سے علیحدہ رہنے کو پسند کرتی ہے (۳) مادہ تولید کی پیدائش نہ ہونے یا کم ہونے کے باعث اس کو جماع کی طرف رغبت نہیں ہوتی اور نہ اس کو کبھی انزال ہوتا ہے۔

علاج (۱) مرغن اور لذیذ غذائیں بقدر مضہم ہونے کے اچھی طرح کھلائی جائیں (۲) دودھ وغیرہ کا استعمال مدت تک رکھنا نہایت مفید ہوتا ہے (۳) انڈے کی زردی نیم برشت نہایت اعلیٰ درجہ کی غذا ہے (۴) اگر ضرورت ہو تو مقوی دوائیں اور بدن کو فربہ کرنے والی معجونیں بھی استعمال کرائیں (۵) عیش و آرام سے زندگی بسر کرنا اور ہمیشہ خوش رہنا رنج و غم کا اثر دل پر نہ ہونے دینا بھی بدن کو خوب فربہ اور قوی کرتا ہے۔

(۴) فربہ ہی مفراط سے بانجھ ہونا۔ فربہ ہی دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو چربی کی زیادتی سے

جیسا کہ اکثر آرام طلب اور خوش خوراک عورت میں پائی جاتی ہے اور دوسری گوشت کی زیادتی سے۔ جیسا کہ اکثر ان عورتوں میں ہوتی ہے جو نہایت خوش خوراک اور ورزش بدنی کی عادی ہوں۔ اگرچہ دونوں قسم کی فرہی جب حد سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کے سبب سے عورت بانجھ ہو سکتی ہے لیکن جو فرہی منفرط چربی کی زیادتی سے ہوتی ہے۔ وہ اکثر عقر کا باعث ہوتی ہے اور جو فرہی گوشت کی زیادتی سے ہوتی ہے۔ اس کے سبب سے عورت کا بانجھ ہونا بہت کم دیکھا جاتا ہے۔

کیونکہ جو عورت چربی کی زیادتی سے نہایت فرہ اندام ہوتی ہوتی ہے اس کا بدن بادی سے پھولا ہوا اور مزاج سرد ملغبی ہوتا ہے اس کی صحت ہمیشہ خراب رہتی ہے چنانچہ اس کے تمام اعضاء خصوصاً معدہ اور جگر کا فعل خراب ہونے کے سبب سے اس کو ضعف ہضم کثرت ریاح اور قراقر شکم کی شکایت رہتی ہے۔ اس کے دیگر اعضاء میں بھی غذائی مادہ کی رطوبت اچھی طرح سے تحلیل نہیں ہو سکتی ہے جس کے باعث بدن میں بوجھ سا معلوم ہوتا ہے اور ہر وقت طبیعت میں سستی اور کاہلی رہتی ہے۔ اسی طرح اس کے اعضاء تناسل کے فعل میں بھی ہمیشہ فتور اور خرابی رہتی ہے وہ مادہ تولید جنین کو اچھی طرح سے تیار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لئے وہ استقرار حمل کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ اور عورت بانجھ ہوتی ہے۔

اور جن عورتوں کے بدن میں گوشت کی زیادتی سے فرہی ہوتی ہے ان کا بدن بہ نسبت دوسری عورتوں کے سخت اور قوی ہوتا ہے ان کا مزاج اکثر دموی ہوتا ہے۔ ان کے اعضاء نہایت چست اور حرکات سبک ہوتے ہیں ایسی عورتیں بہت کم بانجھ ہوتی ہیں۔ کیونکہ ایک تو ان کے بدن میں فرہی حد افراط تک نہیں پہنچتی ہے جو کم اول کی طرح مانع استقرار حمل کی ہو سکے۔ دوسرے جس طرح کہ ان کے تمام اعضاء فرہ قوی ہوتے ہیں اسی طرح ان کے اعضاء تناسل بھی قوی ہوتے ہیں۔ البتہ ایسی فرہ عورتیں صرف اس حالت میں بانجھ ہو سکتی ہیں جبکہ ان کے تمام بیرونی اعضاء کی ورزش دائمی رہے۔ مثلاً رہنے کے باعث غذائی مادہ میں سے اکثر حصہ کو اپنی ضرورت کے موافق اپنی ورزش

میں پورا صرف کر لینے کے عادی ہو گئے ہوں اور ان کے اعضاء تناسل کو غذائی مادہ کا استقدروا فر حصہ نہ مل سکے جو ان کی پرورش سے بچ کر مادہ تولید جنین کی تیاری میں صرف ہو سکے چونکہ ایسی عورتوں کے بدن میں مادہ تولید جنین کی پیدائش بالکل نہیں ہوتی یا ضرورت سے بہت کم ہوتی ہے اس لئے وہ بانجھ ہوتی ہیں جیسا کہ اکثر عورتوں کو دیکھا گیا ہے جو ورزش کرتی ہیں کاتھانہ دکھا کر اپنی گذران کرتی ہیں ہندوستان میں نمٹوں کی ایک قوم ہے جن کی عورتیں اس قسم کے ورزش کرتی ہیں اور ان میں سے اکثر بیچاریاں صرف اسی سبب سے بے اولاد ہوتی ہیں۔

علاج۔ اگر فرہی منفرط چربی کی زیادتی سے ہو تو (۱) عورت کو کسی محنت اور مشقت کے کام میں پھنسا دینا چاہئے (۲) بکثرت روزے رکھنے یا فاقہ کشی کی ہدایت کریں (۳) کھانے میں خشک غذائیں جیسے بیسی روٹی بلا گھی دودھ کے یا بھوسی دار آٹے کی روٹی۔ یا باجرے کی روٹی۔ ان میں سے جو مناسب اور موافق مزاج کے ہو تجویز کرنی چاہئے (۴) معجون لک صغیر بہت نافع ہوتی ہے (۵) اگر ضرورت سمجھی جائے اور موقع ہو تو چند روزیہ نسخہ پلایا جائے۔ صفیہ۔ انیسون۔ بادیان۔ تخم کٹوت۔ گل بابونہ مصطکی۔ تخم کرفس۔ اجوان لسی۔ گلقد۔ ان دواؤں میں سے بقدر مناسب لے کر پانی میں جوش دے کر مل چھان کر ہر روز صبح پلایا جائے۔

اور اگر فرہی گوشت کی زیادتی سے ہو تو (۱) ورزش موقوف کریں (۲) غذاکم اور مرطوب کھلائیں (۳) عورت کو آرام سے رکھیں (۴) تبدیل خیالات اور خاوند کی خدمت میں رہنا بہت مفید ہوتا ہے (۵) اگر دوا کی ضرورت ہو تو اس کام کے لئے تو دری سرخ دودھ میں جوش دے کر چند روز پلانا بہت نافع ہے۔

(۵) کلانی شکم سے بانجھ ہونا۔ اگرچہ اکثر حالتوں میں تو کلانی شکم کا عارضہ بھی فرہی منفرط کا ایک شعبہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے۔ لیکن بعض موقع پر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بدون فرہی منفرط کے بعض عورتوں کا صرف شکم ہی بادی سے بہت بڑھ جاتا ہے

ملہ بیجون ہندوستانی دواخانہ دہلی سے نہایت عمدہ بنی ہوئی ملتی ہے ۱۲ مؤلف

چونکہ پیٹ زیادہ بڑھ جانے کی حالت میں اکثر معدہ اور جگر کے افعال خراب ہوتے ہیں ضعف منہم کثرت ریاح - قراقر شکم - قلت اشتہا کی شکایت ہوتی ہے۔ تھوڑی حرکت کرنے سے سانس چڑھ جاتا ہے دل دھڑکنے لگتا ہے۔ غرض کہ بدن کی عام صحت میں خرابی موجود ہوتی ہے۔ اس لئے مادہ تولید جنین کی پیدائش بھی کامل طور سے ممکن نہیں ہوتی اور اس میں استقرار حمل کی قابلیت موجود نہیں ہوتی ہے کہ کلانی شکم کی حالت میں جماع کے وقت مرد کا مادہ منویہ رحم کے اندر پہنچنا مشکل ہوتا ہے اور اگر کسی قدر پہنچتا بھی ہے تو کچھ تو کثرت ریاح - کچھ پیٹ کا رحم پر دباؤ - کچھ رحم کے اندر رطوبات فضلیہ کا موجود ہونا۔ یہ سب خرابیاں مل کر مادہ منویہ کو خراب کر کے بہت جلد رحم سے خارج کر دیتی ہیں اور ان وجوہات سے عورت کو حمل نہیں بٹھیر سکتا اور وہ بچاری بانجھ ہوتی ہے۔

علاج - مثل فرہی مفرط کے کرنا چاہئے۔ اور جوارش جالینوس یا جوارش زرعوئی یا جوارش مصکی - یا جوارش کمونی - اس غرض کے لئے بہت مفید ہے۔ صرف اجوائن دیسی اور مرج سیاہ اگر بعد غذا کے دونوں وقت تھوڑی سی کھایا کریں تو یہ بھی بہت نافع چیز ہے (۶) بڑھاپے سے بانجھ ہونا۔ جب عورت زیادہ بوڑھی اور سن رسیدہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے تمام اعضا تناسل اپنے کام سے عاجز رہتے ہیں اس کے رحم میں پرورش جنین کی قابلیت اور نصیبہ الرحم میں مادہ تولید کے پیدا کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی ہے اس لئے بڑھاپا بھی بظاہر اسباب عقم میں سے ایک بڑا قوی سبب معلوم ہوتا ہے لیکن غور کرنے سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جب عقم ایک مرض کا نام ہے اور مرض غیر طبعی حالت ہوتی ہے تو اس کا سبب طبعی انخطاط قوت (بڑھاپا) کس طرح ہو سکتا ہے اس لئے میرے خیال میں اسے بیان ترتیبی سمجھنا چاہئے۔

جماعت پانچویں - امور خارجی - اس جماعت میں تمام وہ خارجی امور داخل ہیں کہ اگر وہ اکثر واقع ہوتے رہیں تو استقرار حمل کے مانع ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسے امور کے اکثر واقع ہونے سے عورت کا ایک مدت تک حاملہ نہ ہونا ہمارے نزدیک اس کو بانجھ نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ خارجی امور کے باعث عارضی طور پر حاملہ نہ ہونا اور عورت میں استقرار حمل

کی قابلیت نہ ہونا۔ ان دونوں صورتوں میں بہت بڑا فرق ہے لیکن چونکہ نتیجہ دونوں کا اکثر ایک (حاملہ نہ ہونا) ہی ہوتا ہے۔ اس لئے تمام اطباء کی طرح ہم بھی ان امور کو اسباب عقر کے ذیل میں بیان کرتے ہیں جیسے (۱) جماع بے وقت (۲) حرکت بعد جماع (۳) کثرت جماع (۴) عادت جلق (۵) کثرت غم و غصہ (۶) کثرت آسائش و آرام طلبی (۷) ہمیشہ سرد پانی سے استنجا کرنے کی عادت (۸) آب و ہوا کی خرابی۔ اب ہم ان کو ذیل میں بالتفصیل درج کرتے ہیں (۱) جماع بے وقت سے بانجھ ہونا۔ یاد رکھو کہ ایام حیض سے ایک ہفتہ پہلے اور ان سے ایک ہفتہ بعد عورت کے خصیتہ الرحم میں تولید جنین کا مادہ تیار اور موجود رہتا ہے۔ اس لئے طالب اولاد کے لئے یہ دونوں ہفتے جماع کے وقت مقرر کئے گئے ہیں۔ کیونکہ ان ہفتوں میں مقاربت کرنے سے مرد کا مادہ منویہ عورت کے مادہ تولید کے ساتھ مل کر حمل قرار پاسکتا ہے اور ان دونوں ہفتوں کے درمیان والے دنوں میں جماع کرنا طالب اولاد کے لئے جماع بے وقت سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس درمیانی زمانہ میں مادہ تولید جنین کا خصیتہ الرحم میں اکثر ایسا تیار نہیں رہتا ہے کہ وہ رحم کے اندر داخل ہو کر اور مرد کے مادہ منویہ کے ساتھ مل کر استقرار حمل کا باعث ہو سکے۔ اس لئے ان درمیانی دنوں میں اکثر جماع کرنے سے سوا، حظ مجامعت کے اور کوئی منفعت نہیں ہوتی بلکہ رحم نہایت کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے اور زنانہ اعضا و تناسل کی طرف دوران خون کے بے وقت تیز ہو جانے سے اکثر عورتیں بعض امراض اعضا و تناسل میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے مطب میں بعض غیر محتاط عورتیں ایسی بھی آتی ہیں جنہیں صرف وقت کی پابندی نہ کرنے سے ہی اکثر اوقات ورم رحم یا میلان رحم وغیرہ امراض کی شکایت گھیرے رہتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ ایسے بے وقت جماع کی ہمیشہ عادت کر لینے سے عورت کا حاملہ نہ ہونا یا اس کا بالکل بانجھ ہو جانا ایک ادنیٰ خرابی ہے۔

علاج۔ اگر جماع بے وقت کرنے سے زنانہ اعضا و تناسل میں خرابی پیدا نہ ہوئی ہو تو صرف اس عادت کا ترک کرنا اور وقت مناسب پر مقاربت کا پابند رہنا استقرار حمل کیلئے کافی ہوتا ہے اور اگر زمانہ دراز تک جماع بے وقت کی عادت کرنے سے عورت کے

اعضاء تناسل میں کوئی مرض پیدا ہو گیا ہو تو اس مرض کی تشخیص اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ ازالہ مرض سے پہلے استقرار حمل کی امید رکھنی فضول ہے۔

(۲) حرکت بعد جماع سے بانجھ ہونا۔ اکثر اطباء نے لکھا ہے کہ اگر بعد جماع کے عورت فوراً بستر سے کھڑی ہو جائے اور تیزی کے ساتھ چلنے یا کودنے لگے یا کسی سخت رپٹ میں مصروف ہو جائے تو اکثر اس کو استقرار حمل نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس حالت میں ممکن ہے کہ مرد کا مادہ منویہ عورت کے مادہ تولید خین کے ساتھ ملنے سے پہلے ہی رحم سے خارج ہو جائے یا بعد ملاقات اور باہمی اختلاط کے وہ دونوں رحم سے خارج ہو جائیں یا حرکت کی حرارت سے ان کے لطیف اجزاء رحم کے اندر ہی تحلیل ہو جائیں۔ اور باقی ماندہ حصہ استقرار حمل کے قابل نہ رہے اس لئے بعد جماع کے فوراً عورت کا حرکت کرنا یا کسی ریاضت بدنی میں مصروف ہو جانا اکثر حالتوں میں استقرار حمل کا مانع ہو سکتا ہے۔

لیکن یاد رکھو کہ اس قسم کی حرکات یا دوسرے قوی التاثر حیلوں سے عورت کا حاملہ نہ ہونا یا ہمیشہ ہی طریقہ اختیار کر لینے سے ایک مدت تک اس کا حاملہ نہ ہونا ایسا امر نہیں ہے جس سے عورت کو بانجھ کہا جاسکے۔ کیونکہ عورت کے اعضا تناسل میں استقرار حمل کی قابلیت موجود ہونے کے باعث بعض موقع پر اس سے زیادہ قوی تدبیریں بھی (اگر کی جائیں تو) بالکل بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ اور حمل قرار پا جاتا ہے۔ اس لئے کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ اس قسم کی حرکات کو اسباب عققر میں شمار کیا جائے البتہ عمر حمل کے اسباب میں شمار کیا جاسکتا ہے علاج۔ اگر یہ بات خوب ثابت ہو جائے کہ حاملہ نہ ہونے کا سبب حرکت بعد جماع ہے تو عورت کو ایسی حرکت سے باز رکھنا چاہئے اور ہدایت کرنی چاہئے کہ بعد فراغ جماع کے تھوڑی دیر اسی حالت میں بستر پر لیٹی رہے۔ امید ہے کہ اس تدبیر سے وہ حاملہ ہو جائے گی۔

(۳) کثرت جماع سے بانجھ ہونا۔ تجربہ سے یہ بات بخوبی ثابت ہو چکی ہے کہ اکثر عورتیں صرف کثرت جماع سے ہی بانجھ ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ بعض کبیوں یا فاحشہ عورتوں کی حالت سنی گئی ہے کہ وہ اپنی بداعمالی میں رات دن مبتلا رہنے کے زمانہ میں اولاد سے ہمیشہ محروم رہیں اور جب انہوں نے حرام کاری سے توبہ کر کے نکاح کیا تو حاملہ ہو گئیں۔ اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ پہلی حالت میں ان کا حاملہ نہ ہونا صرف کثرت جماع کے سبب سے تھا۔ کثرت جماع سے اندام نہانی میں اکثر التهاب (انفلامیشن) ہو جاتا ہے۔ اس میں رطوبات فاسدہ پیدا ہونے لگتی ہیں جو مادہ منویہ کو خراب کر دیتی ہیں یا رحم ضعیف ہو جاتا ہے یا وہ بعض امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لئے پہلے تو عورت کو چند روز تک عسر حمل کا مرض ہوتا ہے اور کچھ مدت کے بعد وہ بالکل باخجہ ہو جاتی ہے۔

علاج سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کثرت جماع سے باز رکھا جائے اس کے بعد اگر اندام نہانی یا رحم کی خرابی ثابت ہو تو اس کا علاج کرنا چاہئے اور تقویت رحم کے لئے کھانے کی دوائیں اور قزرجہ وغیرہ استعمال کرنے چاہئیں۔

۴) مساحقت کی عادت سے باخجہ ہونا۔ بعض نوجوان مستورات کو شادی نہ ہونے کے زمانہ میں آزاد مزاج اور فارغ البال رہنے سے یا صحبت بد حاصل ہونے کے سبب سے یا ان کے رحم یا خصیتہ الرحم میں سوزش۔ خراش یا اجتماع خون ہونیکے باعث جماع کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ اور جماع میسر نہ ہونے کی حالت میں ان کو بعض آوارہ مردوں کی طرح باہمی مساحقت (مصنوعی جماع) کی عادت ہو جاتی ہے۔ اور ایک مدت تک اس فعل قبیح میں مبتلا رہنے سے ان کے اندام نہانی کی ساخت میں اجتماع خون یا انفلامیشن ہو جاتا ہے۔ اس میں فاسد رطوبات کی پیدائش ہونے لگتی ہے۔ ان کا رحم نہایت ضعیف ہو جاتا ہے اور ان وجوہات سے ان میں استقرار حمل کی قابلیت باقی نہیں رہتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لئے باخجہ ہو جاتی ہیں۔

علاج۔ اگر صحبت بد اور آزاد مزاجی سے جلق یا مساحقت کی عادت ہو گئی ہو تو نصیحت کر کے یہ بد عادت چھڑانی چاہئے۔ کاروبار خانگی میں مصروف رکھیں اور چند روز کسی ہوشیار ضعیفہ کے ساتھ سخت بستر پر سلائیں۔ اگر اندام نہانی میں سوزش ہو یا اجتماع خون ہو تو کاسٹک لگائیں گرم چیزیں نہ کھانے پینے دیں۔ اگر خصیتہ الرحم وغیرہ میں سوزش ہو تو اس کا علاج باقاعدہ کریں اگر کسی علاج سے کامیابی نہ ہو اور عورت بکثرت خواہش جماع ہونے کے باعث اپنی عادت کو کسی طرح ترک نہ کر سکے تو بظہر (کلے ٹورس) کو قطع کرنا پڑتا ہے۔

اس کے بعد خواہش جماع بہت کم ہو کر عادت جلق بالکل چھوٹ جاتی ہے۔  
 (۵) کثرتِ غم و غصہ کی عادت سے بانجھ ہونا۔ غم اور غصہ میں بکثرت مبتلا رہنے کی  
 حالت میں انسان کی جسمانی صحت ہمیشہ خراب رہتی ہے۔ اس کا بدن خشک اور لاغر۔ اس کا  
 رنگ سیاہ اور نہایت بے رونق ہو جاتا ہے۔ طبیعت ہر وقت سست رہتی ہے۔ اخلاط  
 میں احتراق ہو کر سودا ویت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ہمیشہ طبیعت کے متفکر رہنے  
 سے آدمی کو اپنی زندگی شاق ہو جاتی ہے۔ نہ اسے کھانے پینے کی طرف رغبت رہتی ہے نہ  
 اس کا سونا جاگنا ٹھیک رہتا ہے نہ وہ امور خانہ داری میں اچھی طرح مصروف رہ سکتا ہے  
 نہ وہ کسی کام کو پورے طور پر انجام دے سکتا ہے۔ غرض ہر طرح سے اس کی طبیعت مگر اور  
 زندگی سے بیزار رہتی ہے۔

اور ظاہر ہے کہ ایسے تمام امور کا اثر مردوں کی نسبت عورتوں پر زیادہ پڑتا ہے  
 خصوصاً جو عورتیں صفراوی مزاج۔ ضعیف الخلق۔ تنگ ظرف۔ بد مزاج۔ چڑچڑی ہوئی  
 ہیں۔ ان کی صحت پر ان امور کا مفسد اثر اور بھی خراب ہوتا ہے اور جب صحت بدنی خراب  
 ہوتی ہے تو ان کے عام افعال خصوصاً افعال تغذیہ میں فتور واقع ہونا کوئی بڑی بات  
 نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی عورتیں اکثر امراض رحم مثل قلت حیض۔ عسر حیض۔ احتباس  
 حیض۔ ورم مزمن رحم۔ صلابت رحم وغیرہ میں مبتلا رہتی ہیں۔ اور ان امراض کے باعث  
 ان میں استقرارِ حمل کی قابلیت باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لئے وہ بچائیاں ہمیشہ کے لئے  
 اولاد کی نعمت سے محروم اور بانجھ ہو جاتی ہیں۔

علاج۔ عورت کو غم اور غصہ سے حتی الامکان روکنا چاہئے۔ اور غم اور غصہ کے تمام  
 اسباب کو رفع کرنا چاہئے۔ سیر و تفریح سے طبیعت خوش رکھنا دل خوش رکھنے والے  
 قصوں اور حکایات کا اکثر چرچا رکھنا۔ خانہ داری کے مشاغل میں ہمیشہ مصروف رکھنا۔  
 تمام کنبہ میں اخلاص و محبت پیدا کرنے والے معاملات کو ترقی دینا۔ کھانے پینے میں لذیذ  
 اور مرغین غذاؤں کا استعمال رکھنا چاہئے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مرض امراض مذکورہ  
 میں سے پیدا ہو گیا ہو تو اس کا علاج باقاعدہ کرنا لازم ہے۔



(۶) کثرت آسائش و آرام طلبی سے بانجھ ہونا۔ ہمیشہ آرام و آسائش کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ گھر کے کاموں میں مصروف نہ رہنا۔ مناسب ریاضت بدنی اور ورزش جسمانی کی طرف بالکل توجہ نہ کرنا۔ ہر طرح سے بدن کو آرام طلب کر دینا صحت جسمانی کا ایسا زبردست دشمن ہے کہ اس کے مفاسد سے بدن ہرگز محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جسم نازک اور ہر مرض کے قابل ہو جاتا ہے۔ خصوصاً عورتوں کی صحت پر ایسے امور کی تاثیر بہت زیادہ پڑتی ہے۔ اکثر ان کا بدن بادی سے پھول جاتا ہے۔ پیٹ بہت بڑھ جاتا ہے۔ بدن میں چربی زیادہ ہو جاتی ہے۔ مزاج میں بلغم کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ بھوک بہت کم اور بھم خراب ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں نفخ اور قراقر کی اکثر شکایت رہتی ہے۔

ایسی حالت میں جس طرح بدن کے ظاہری افعال میں فتور واقع ہوتا ہے اسی طرح مادہ تولید کی پیدائش میں بھی خلل پڑ جاتا ہے۔ ان وجوہات سے آرام طلب عورتوں کو اکثر عسر حمل کی شکایت ہوتی ہے اور بعض بچاریاں تو بالکل ہی اولاد سے محروم ہو جاتی ہیں۔ کبھی ان کو بعض امراض رحم لاحق ہو جاتے ہیں۔ جیسے سیلان رحم۔ سیلان منی۔ استسقاء رحم۔ نفخہ رحم۔ انزلاق رحم۔ اختناق رحم۔ کثرت حیض۔ قلت حیض۔ عسر حیض۔ احتباس حیض وغیرہ اور کبھی رحم کی ساخت میں چربی کی زیادتی ہو جاتی ہے اور ان امراض کے سبب سے عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔

علاج۔ عورت کو ورزش جسمانی کی طرف متوجہ کرنا اور اس کے فائدے سمجھانے چاہئیں۔ گھر کے معمولی کاموں میں مشغول رہنے کی ہدایت کرنی چاہئے کیونکہ عورتوں کے لئے یہ بھی کافی ریاضت ہے اگر بدن میں بادی اور پھول اپن زیادہ ہو تو روزے رکھنا اور خشک غذاؤں کا استعمال کرنا بہتر تدبیر ہے۔ اگر نفخہ شکم اور کثرت ریاح کی شکایت ہو تو جوارش جالینوس اور معجون کمونی یا نمک سلیمانی مناسب ادویات میں سے ہیں۔ اجوائن دیسی۔ مرچ سیاہ نمک سیاہ تینوں تھوڑی تھوڑی لیکر بعد غذا کے دونوں وقت چند روز تک برابر کھاتے رہنا بہت فائدہ کرتا ہے۔ اگر کوئی مرض امراض رحم میں سے لاحق ہو گیا ہو تو اس کا علاج کرنا چاہئے۔

۷۔ سرد پانی سے استنجا کرنے کی عادت سے بانجھ ہونا۔ اگر کسی عورت کو ہمیشہ سرد پانی سے استنجا کرنے کی عادت ہو جائے تو اس سے ایک مدت میں رفتہ رفتہ پانی کی سردی کا اثر

اول اندام نہانی پر اور پھر خاص رحم کی ساخت پر ایسا قوی ہوتا ہے کہ ان مقامات کی اندرونی جھلی سخت ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ اس میں اجتماع خون ہو کر انفلامیشن کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ رحم کی ساخت میں خلل واقع ہونے سے عسر حیض یا احتباس حیض کا مرض ہو جاتا ہے کبھی رحم کی شرکت سے خصیتہ الرحم بھی متبدلے مرض ہو جاتے ہیں۔ اور مادہ تولید کی پیدائش میں خلل پڑ جاتا ہے۔ یا رحم کی خرابی کے باعث مادہ منویہ رحم کے اندر پہنچ کر ایسا خراب اور بیکار ہو جاتا ہے کہ اس میں استقرار حمل کی قابلیت باقی نہیں رہتی۔ اس لئے ہمیشہ وہ رحم سے فضلہ کے طور پر بہ کر خارج ہو جاتا ہے اور عورت بانجھ ہوتی ہے۔

علاج (۱) سرد پانی سے استنجا کرنے کی عادت چھڑانی چاہئے (۲) گل بابونہ اکیل الملک سنبل الطیب۔ پرسیا و شال ایک ایک تولہ۔ سادج ہندی ۷ ماشہ سب کو ایک من پانی میں جوش دیکر بدستور مقرر آبن کر ایں (۳) اس کے بعد روغن حنا۔ روغن بابونہ۔ روغن زعفران بانجھ۔ فہر زجہ کے طور پر استعمال کریں (۴) اگر کوئی مرض امراض رحم وغیرہ میں سے موجود ہو تو اس کا علاج حسب قاعدہ کریں۔

(۸) آب و ہوا کی ناموافقیت سے بانجھ ہونا۔ آب و ہوا کے موافق نہ آنے سے جس طرح کہ اکثر لوگوں کو طرح طرح کے ظاہری امراض ہو جاتے ہیں اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر کسی مرض جسمانی کی عام شکایت نہیں پیدا ہوتی ہے البتہ اعضا تناسل کے امراض میں سے کوئی ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ جس کا کوئی سبب سوا ناموافقیت آب و ہوا کے دوسرے نہیں ہوتا کبھی آب و ہوا کی ناموافقیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس کے مفسد اثر سے گریہ اعضا تناسل میں کوئی مرض ظاہر نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کے اندرونی افعال میں کوئی ایسی خرابی ضرور پیدا ہو جاتی ہے جس سے صرف اولاد کی پیدائش بند ہو جاتی ہے چنانچہ بعض صاحب اولاد مستورات کو جب کسی وجہ سے تبدیل وطن کا اتفاق ہوتا ہے تو دوسرے ملک کی آب و ہوا موافق نہ آنے سے ان کے اولاد پیدا ہونی موقوف ہو جاتی ہے اس کے سوا کوئی دوسری شکایت ان کو نہیں ہوتی طبیب اگر آب و ہوا کی ناموافقیت کا خیال نہ کرے تو اس کو ایسی حالت میں سخت حیرانی ہوتی ہے اور بلا سمجھے علاج کرنے سے

سوائے ناکامی اور بدنامی کے کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔

علاج۔ اگر آب و ہوا کی ناموافقیت ثابت ہو جائے تو اس کے لئے تبدیل آب و ہوا سے بہتر اور کوئی تدبیر نہیں ہے۔ اگر آب و ہوا کی مخالفت سے عورت کے اعضا تناسل میں کوئی مرض پیدا ہو گیا ہو تو اس کا علاج کرنا لازم ہے۔ اکثر عورت کو ایسے موقع پر حیض کے متعلق مختلف شکایتیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ پورے طور پر ان کی تحقیقات کر کے مناسب حال تدبیریں کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

ستائیسویں فصل۔ عسر حمل مشکل سے حل قرار پانا۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بعض مستورات کو عام عادت کے برخلاف اور توقع سے بہت کم۔ کبھی اتفاقاً استقرار حاصل ہوجاتا ہے۔ ان کے دل میں ہمیشہ اولاد کی تمنا اور بچہ کی ماں بننے کی خواہش رہتی ہے۔ لیکن باوجود تمام اسباب ظاہری مہیا ہونے کے اس خلل اور لغت میں ان کا حصہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس لئے وہ عام رواج کے موافق اکثر عاملوں کے تعویذ گنڈوں کی طرف زیادہ توجہ رہتی ہیں۔ حالانکہ یہ بھی مرض عقربا بچہ پن کی طرح ایک مرض ہے جس کے اسباب تقریباً عقر کے سے ہوتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ عقر کے اسباب قوی ہوتے ہیں اور اس مرض کے اسباب عقر کے نسبت ضعیف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب ہم اس مرض کے اسباب کو چار جماعتوں میں تقسیم کر کے بیان کرتے ہیں (۱) پردہ بکارت یا اندام نہانی کی خرابیاں (۲) بعض امراض رحم و خصیتہ الرحم (۳) عوارض بدنی (۴) امور خارجی۔

جماعت اول۔ اس جماعت میں عسر حمل کے تمام وہ اسباب شامل ہیں جن کا تعلق امراض شرمگاہ یا اندام نہانی کی خرابیوں سے ہے۔ جیسے (۱) پردہ بکارت کی سختی (۲) بعض اقسام رتق (۳) ضیق اندام نہانی (۴) سیلان رطوبت (۵) خروج اندام نہانی (۶) زیادتی حس اندام نہانی (۷) اندام نہانی کے زخم اور نا صورت وغیرہ۔

ان میں سے پہلی پانچ حالتوں کا بیان مرض عقر کی بحث میں پورے طور پر کر دیا گیا ہے اس لئے اس موقع پر ان کے دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اسباب عسر حمل کی حالت میں نسبت عقر حمل کے ضعیف ہوتے ہیں۔ اس لئے عسر حمل کی

حالت میں ان کا علاج بھی ایسا ہی ضعیف اور ہلکا کرنا کافی ہوتا ہے۔ باقی رہیں دو احسن الذکر صورتیں سوان کا بیان اس جگہ کیا جاتا ہے۔

(۱) زیادتی حس اندام نہانی سے عسر حمل ہونا۔ اس حالت میں بعض عورتوں کے اندام نہانی کے دہانہ پر چاروں طرف چھوٹے چھوٹے مسوں یا پھنسیوں کی قطار ہوتی ہے جن میں جماع کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اور بعض مستورات کے اندام نہانی یا اس کے دہانہ پر وضع حمل کے وقت قدرے زخم ہو کر جب مندل ہو جاتا ہے تو قدرے گوشت زائد سخت پیدا ہو کر اس کے نیچے حسی عصب کے ریشے بند ہو جاتے ہیں اور جماع کے وقت ان ریشوں پر دباؤ پڑنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے اسی سبب سے عورت جماع سے متنفر ہوتی ہے۔ اور یہ نفرت عسر حمل کا باعث ہوتی ہے۔

علاج۔ (۱) اگر اندام نہانی کے دہانہ پر گوشت زائد یا مسے پیدا ہو گئے ہوں تو انہیں قطع کریں (۲) اگر پھنسیاں موجود ہوں تو ان پر ادویہ محلکہ کا استعمال کریں (۳) زیادتی حس کو دفع کرنے کے لئے افیون یا بلاؤنا وغیرہ مخدر ادویات کا ضدا کریں (۴) پوست خشخاش کے جوشاندے سے اندام نہانی اور شرمگاہ پر تکمید کرنا یا اندام نہانی میں اس کی پچکاری کرنا بھی فائدہ کرتا ہے۔

(۲) اندام نہانی کے زخم اور نا صورت سے بانجھ ہونا۔ جب اندام نہانی میں سادہ زخم یا نا صورت ہوں یا اس میں تشکی یا سوزا کی نہر بیلے زخم موجود ہوں تو زخموں کا مواد اور میل وغیرہ کی آلاش اس میں اکثر موجود رہتی ہے۔ اس لئے مادہ منویہ رحم کے اندر داخل ہونے سے پہلے مواد کے ساتھ مخلوط ہو کر اور خراب اور بیکار ہو کر اندام نہانی سے خارج ہو جاتا ہے اس حالت میں اکثر عورت کو استقرار حمل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اندام نہانی میں مواد کی آلاش بہت کم ہو اور اس کی زیر بلی خاصیت ضعیف ہو تو کبھی اتفاقاً کسی قدر مادہ منویہ رحم کے اندر صحیح و سالم پہنچ جاتا ہے اور بدشواری حل ٹھہر جاتا ہے۔ اس لئے اطباء نے اندام نہانی کے زخموں کو مرغن عقریا عسر حمل کے اسباب میں شمار کیا ہے۔

علاج۔ اگر اندام نہانی میں سادہ زخم ہوں تو زخموں کو صاف رکھنا اور معمولی مرہموں کا

استعمال کرنا کافی ہوتا ہے۔ اور اس غرض کے لئے برگ نیب اور شہد کے بوشاندے سے زخموں کو دھونا اور مرہم باسلیقون یا مرہم خل کا استعمال کرنا مفید ہوتا ہے۔ اور اگر زخم میں ناصوبہ ہو گیا ہو یا تشکی یا سوز کی زخم ہوں تو ان کا علاج اپنے موقع پر درج ہو چکا ہے۔

جماعت دوسری۔ اس جماعت میں عسر حل کے تمام وہ اسباب مذکورہ ہوں گے جو امراض رحم یا خصیتہ الرحم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کی وجہ سے عورت کو بدشواری حل قرار پاتا ہے جیسے (۱) صغیر رحم (۲) صلابت رحم (۳) میلان رحم (۴) بوا سیر رحم (۵) نفخہ رحم (۶) سیلان رحم (۷) سیلان مٹی رحم (۸) قلت حیض (۹) کثرت حیض (۱۰) امراض خصیتہ الرحم۔ ان سب امراض کا بیان مرض عقر کے اسباب میں بخوبی کیا گیا ہے۔ ان کے متعلق اس جگہ صرف استفسار سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ امراض اگر قوی ہوں تو مرض عقر کو پیدا کریں گے اور اگر خفیف ہوں تو ان سے عسر حل عارض ہوگا۔ اور اس حالت میں علاج بھی عقر کے علاج سے خفیف کرنا چاہئے۔

جماعت تیسری۔ اس جماعت میں عسر حل کے تمام اسباب کا بیان تفصیل کے ساتھ کیا جائیگا جو عام بدن کی خرابیوں سے تعلق رکھتے اور عوارضات جسمی کہلاتے ہیں۔ جیسے (۱) نوعمری (۲) جوانی کا اتار (۳) ضعف بدنی اور نقاہت (۴) سوء مزاج اعضاء (۵) فزہی مفرطہ (۶) کلانی شکم (۷) امراض فساد خون۔

(۱) نوعمری۔ نوعمری سے سن بلوغ کا ابتدائی حصہ رچڑتی جوانی مراد ہے جس میں اگرچہ اعضاء تناسل کے افعال شروع ہو جاتے ہیں اور عورت استقرار حمل کے قابل ہو جاتی ہے لیکن اس عمر میں اعضاء تناسل کے تمام افعال پورے طور پر کامل نہیں ہو چکے ہیں۔ اس لئے نوعمری میں (۱۲) سال سے (۱۹) سال تک عورت بہت کم حاملہ ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ سن بلوغ کی ابتدا سب عورتوں میں یکساں نہیں ہوتی کیونکہ اس میں عورت کی جسمی حالت۔ خورد و نوش کی کیفیت۔ طرز معیشت اور مقام سکونت کی آب و ہوا وغیرہ خارجی اسباب کو بہت بڑا دخل ہے۔

چنانچہ قرہ اندام۔ قوی الجسم۔ خوش خوراک۔ آرام طلب۔ خوش دل۔ آزادی پسند۔

(۲) جوانی کا آثار۔ اس عمر میں جس طرح تمام جسمانی قوتیں ضعیف ہونے لگتی ہیں اسی طرح اعضا و تناسل کے افعال میں بھی روز بروز کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اور عورت میں حاملہ ہونے کی قابلیت پہلے کی بہ نسبت کم ہونے لگتی ہے۔ نقشہ مندرجہ بالا سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ گرم ملک میں رہنے والی اکثر عورتیں ۳۵ سال کی عمر سے ۴۵ سال کی عمر تک بہت کم حاملہ ہوتی ہیں اور سرد ملک میں رہنے والیاں ۴۰ سال کی عمر سے ۵۰ سال کی عمر تک اور معتدل ملک (خصوصاً وسط ہندوستان) میں سکونت رکھنے والی مستورات ۳۵ سال کی عمر سے ۵۵ سال کی عمر تک بہت کم حاملہ اور صاحب اولاد ہوتی ہیں۔ خصوصاً جبکہ اس عمر سے پہلے ان کو خدا نے زیادہ اولاد عطا کی ہو۔ کیونکہ اولاد والی عورتوں کی قوتیں اکثر اس عمر میں ضعیف ہو جاتی ہیں۔ اور ۴۵ سال کی عمر کے بعد اکثر متوسط قوت والی عورتوں کا حیض بند ہو جاتا ہے اس لئے وہ اولاد کے قابل بالکل نہیں رہتی ہیں۔ پچاس یا پچھپن سال کی عمر میں خبیثہ الرحم سکڑ کر بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں اور، میں مادہ تولید کی پیدائش اکثر موقوف ہو جاتی ہے۔ تمام بدن میں بڑھاپے کے آثار خوب ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

اگرچہ بعض ڈاکٹروں کا بیان ہے کہ حیض بند ہونے کے بعد بھی کچھ مدت تک عورت میں حاملہ ہونے کی قابلیت باقی رہتی ہے۔ چنانچہ ایک عورت کو ۴۵ سال کی عمر میں حیض بند ہو چکا تھا۔ اس نے دو برس کے بعد ۴۷ برس کی عمر میں مرد سے مقاربت کی اسے خیال تھا کہ اب حمل نہ ٹھیرے گا۔ پھر بھی وہ حاملہ ہو گئی۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض عورتیں ۵۰ اور ۶۰ بلکہ ۶۵ سال کی عمر تک صاحب اولاد ہوتی ہیں۔

لیکن یہ سب اتفاقی واقعات ہیں جو کہ جی قوتوں کے تفاوت اور آب و ہوا کے اختلاف سے کبھی پیدا ہوتے ہیں ورنہ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ ۳۵ سال کی عمر سے ۵۵ سال کی عمر تک دس سال کے زمانہ میں عورت کو استقرار حمل بہت کم ہوتا ہے۔ اس لئے اتری ہوئی جوانی کے زمانہ کو اسباب عمر حمل میں شمار کیا گیا ہے اس کے بعد عورت بوڑھی ہو جاتی ہے۔

علاج۔ اگر عمر حمل محض عمر کے زیادہ ہو جانے سے ہو اور عورت کے اعضا و تناسل میں کوئی مرض نہ ہو تو درجہ مقوی غذاؤں کا استعمال رکھیں جن سے تمام بدن اور خصوصاً اعضا و تناسل

میں قوت پیدا ہو جائے (۲) بدن کو ضعیف کرنے والے اسباب سے اجتناب رکھیں (۳) قواعد حفظ صحت کی پورے طور پر پابندی کرنے سے عورت زیادہ عمر تک بچہ کی ماں بن سکتی ہے۔ (۴) بعض مرتبہ کوئی فرزند معین حمل بھی مفید ہوتا ہے۔

(۳) ضعیف بدن و تقاہت جو عورت ابتداء پیدائش سے نہایت ضعیف البدن لاغر اندام اور نحیف ہوتی ہے۔ یا کسی مرض میں مدت تک مبتلا رہنے کے باعث زوال مرض کے بعد ناطاقتی کچھ دنوں تک باقی رہتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں جسمی کمزوری کے سبب سے اس کو عسر حمل کا عارضہ ہوتا ہے۔

اسباب (۱) عام جسمی کمزوری کے سبب سے اعضا و تناسل اپنا کام پورے طور پر نہیں کر سکتے ہیں (۲) خستہ الرحم میں مادہ تولید کی پیدائش بقدر کفایت نہیں ہو سکتی ہے۔ (۳) ضعف بدنی کے سبب سے عورت کو فعل جماع کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔

علامات (۱) عورت کی لاغری اور ناتوانی ایسی ظاہر علامت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری علامت کی ضرورت نہیں ہے (۲) عورت کو مقاربت کی طرف رغبت بہت کم ہوتی ہے (۳) مقاربت سے تکلیف ہونے کے باعث اس کو نفرت ہوتی ہے اور حرکات جماعی کی تکلیف سے ڈرتی رہتی ہے۔

علاج۔ بدن کو فروہ اور قوی کرنے کے لئے عمدہ اور مرغین لذیذ غذائیں کھلائیں۔ اچھی آب و ہوا میں رکھیں۔ تمام قوانین حفظ صحت پر عمل کرائیں۔ بدن فروہ کرنے والی مرکب ادویات اور لذیذ حلوے کھلائیں۔ بریضہ مرغ کا حلوہ بدن کو بہت قوی اور فروہ کرتا ہے ہر وقت طبیعت کو خوش رکھنا عیش و آرام سے رہنا۔ قدر سے ورزش کرنا بھی بہت مفید ہوتا ہے۔

(۴) سوء مزاج اعضا۔ جب عورت کے مزاج میں کوئی کیفیت رگرمی سردی۔ فحشگی تری، اسقدر غالب ہوتی ہے کہ اس کے اعضا و تناسل اور مادہ تولید میں اس کیفیت کا اثر ظاہر ہونے لگے تو اس حالت میں اگر اس کے شوہر کا مزاج ایسا ہے کہ اس کا مادہ منویہ اس خرابی کی اصلاح کر سکتا ہے تو استقرار حمل کے متعلق اس خرابی کا کوئی معتدبہ اثر ظاہر نہیں ہونے پاتا ہے۔ اور اگر شوہر کا مزاج ایسا ہے کہ اس سے اس خرابی کی اصلاح

بالکل نہ ہو سکے تو اکثر عورت بالکل بانجھ ہوتی ہے۔

اور اگر کبھی کسی سبب سے اتفاقاً عارضی طور پر مادہ تولید کی اصلاح ہو جائے اور ایسی حالت میں جماع کا اتفاق پڑے تو استقرار حمل ہو جاتا ہے اور اگر پھر وہ اصلاح کبھی نہ ہوئی تو استقرار حمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک خاص صورت عسر حمل کی ہے جو اکثر سو، مزاج اعضا سے۔ یا یہ کہو کہ میاں بیوی کے مزاج میں طبعی ناموافقیت پائی جانے کے سبب سے واقع ہوتی ہے۔

**اسباب۔** عام بدن یا اعضا و تناسل کے مزاج میں کسی کیفیت کے زیادہ ہو جانے سے عورت کا مادہ تولید بھی اکثر فاسد اور خراب ہو جاتا ہے اگر یہ خرابی زیادہ نہ ہو اور آب دہویا بعض غذاؤں وغیرہ سے یا مرد کے مادہ منویہ سے اس کی اصلاح ممکن ہو استقرار حمل ہو جاتا ہے ورنہ عورت کو حمل نہیں رہ سکتا۔

**علامات (۱)** مزاج میں جس قسم کی خرابی ہو اسی کے متعلق علامات تمام بدن میں یا صرف اعضا و تناسل میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے گرمی، سردی، خشکی، تری کی علامات جو بار بار بیان ہو چکی ہیں (۲) مادہ تولید میں خرابی ہونے کی شناخت اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کو پانی پر ڈالا جائے اگر وہ پانی پر تیرتا رہے تو وہ قابل تولید نہیں ہے (۳) کاہو یا لکڑی کے درخت کی جڑوں میں عورت سے چند روز تک پیشاب کرائیں اگر وہ درخت خشک ہو جائے تو سمجھنا چاہئے کہ عورت کے مادہ تولید میں بھی خرابی ضرور ہے (۴) ایک پیالہ میں مٹی بھر کر اس میں پانچ یا سات دانے جو یا باقلا کے بودیں اور عورت اس میں پیشاب کرے اگر پیشاب کی تری سے دانے مذکور نہ اگلہ سکیں تو یہ بھی مادہ تولید کے خراب ہونے کی علامت ہے (۵) عورت کے رحم میں قسط یا عود یا سندروس کی دھونی دیں اگر اس کی بو عورت کے منہ یا ناک میں نہ آئے تو اس سے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ عسر حمل عورت کی جانب سے ہے۔

**علاج (۱)** عورت کے مزاج میں جس قسم کی خرابی ثابت ہو اس کے موافق مناسب تدابیر کرنی چاہئیں۔ مثلاً اگر کسی خلط غیر طبعی کا غلبہ ہو تو اس کا بدن سے اخراج یا اس کی



اصلاح (تعدیل) کرنی لازم ہے (۲) اعضا تناسل اور مادہ تولید میں اگر کوئی خاص خلل رہی ہو تو اس کی اصلاح ضروری ہے (دیکھو بیان سور مزاج رحم کا)

(۵) فربہی مفراط و طح عسر حمل کا سبب ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب عورت نہایت فربہ اندام ہوتی ہے تو ایسی حالت میں جس طرح اس کے تمام بدنی اعضا کے افعال تغذیہ میں خلل ظاہر ہوتا ہے اسی طرح اس کے اعضا تناسل میں مادہ تولید جنین کی پیدائش بھی کامل نہیں ہوتی ہے اس لئے وہ مادہ ہمیشہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے بلا تامل استقرار حمل ہو سکے بلکہ جب کبھی اتفاقاً کسی سبب سے مادہ تولید کی پیدائش طبعی طور پر کامل ہو جاتی ہے یا بعض اسباب عادیہ یا اتفاقیہ کے سبب سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس سے استقرار حمل ہو جاتا ہے ورنہ عورت اکثر حمل سے محروم رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ فربہی مفراط کی حالت میں عورت کے ساتھ فعل مقاربت کی تکمیل یا قاعدہ بہت دشوار ہوتی ہے اور مرد کا مادہ منویہ نہایت دشواری سے رحم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس لئے عورت بہت کم حاملہ ہوتی ہے۔ ان دونوں وجوہ سے اطباء نے فربہی مفراط کو اسباب عسر حمل میں شمار کیا ہے۔

علاج (۱) عورت کو اکثر اوقات ریاضت معتدل میں مشغول رہنا چاہئے (۲) انتظام خانہ داری وغیرہ مناسب تفکرات میں مصروف رہنا لازم ہے (۳) عیش و آرام طلبی و کاہلی سے ہر وقت بیکار پڑے رہنا مضر ہے (۴) اکثر خشک غذاؤں کا استعمال کرنا کم غذا کھانا یا روزے بکثرت رکھنے مناسب ہیں (۵) مرطوب و مرغین غذاؤں اور دودھ یا گھی وغیرہ زیادہ کھانے سے پرہیز رکھنا ضروری ہے (۶) اگر ضرورت ہو تو چند روز منضجیات بلغم پی کر مہل بلغم سے تنقیہ کرانا چاہئے (۷) بعض ایسی ادویات جو بدن کو دبا کر دے اور فربہی مفراط کے زائل کرنے میں قوی تاثیر ہیں جیسا کہ معجون لک وغیرہ ان کا استعمال کرنا مفید ہوتا ہے (۸) تھوڑی سی اجوائن دیسی نمک سیاہ کے ساتھ بعد غذا کے دونوں وقت کھانا بہت مفید ہے (۹) اگر یہ فرزجہ استعمال کیا جائے تو اس سے اکثر کامیابی کی امید ہوتی ہے۔ صفتہ جاذفل سماشہ۔ تخم پیاز۔ تخم سویہ۔ تخم جبرجہ جاتری اندر جو شیریں

فربہی مفراط عسر حمل کی طبیعت

انضاد و کسری وجہ

فرزجہ عسر حمل

ایک مائشہ مشک خالص ایک رقی۔ سب کو نہایت باریک پسیر شہد میں ملائیں اور اس سے قدرے لیکر یا ایک کپڑا آلودہ کر کے حیض سے فارغ ہونے کے بعد استعمال کریں (۶) کلانی شکم۔ جب عورت کا پیٹ بادی سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو مرد کا مادہ منویہ رحم کے اندر مشکل پہنچتا ہے۔ اور اگر کسی قدر مادہ منویہ پہنچ بھی جاتا ہے تو وہ اعضا شکم کے دباؤ سے رحم میں ٹھہر نہیں سکتا اور استقرار محل سے پہلے وہ رحم سے خارج ہو جاتا ہے اس لئے کلانی شکم کی حالت میں عورت بہت کم حاملہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کلانی شکم کو اسباب عسر حمل میں شمار کیا ہے

علاج مثل فرہی مفراط کے کرنا چاہئے۔ یونانی طب کی اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ مقاربت کے وقت عورت کو پیٹ کے بل لٹانا کلانی شکم کی حالت میں استقرار محل کا باعث ہوتا ہے اور عجون حلیت کا استعمال بھی مفید ہے۔

(۷) امراض فساد خون۔ ظاہر ہے کہ جب خون میں کسی قسم کی خرابی ہوتی ہے اور وہ پورے طور پر بدنی پرورش کے قابل نہیں ہوتا ہے تو اس حالت میں اعضا و تناسل کی پرورش اور مادہ تولید جنین کی پیدائش میں بھی تھوڑا یا بہت خلل ضرور پڑتا ہے۔ اس صورت میں اگر مادہ تولید بہت ہی فاسد اور خراب پیدا ہوتا ہے تو عورت بالکل بانجھ ہوتی ہے اور اگر مادہ تولید میں کم خرابی ہوتی ہے کہ اس کی اصلاح کبھی اتفاقاً کسی سبب سے ہو سکے تو عورت حاملہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ اصلاح نہ ہو سکے تو حاملہ نہیں ہوتی اس لیے یہ اطباء نے فساد خون کو بھی اسباب عسر حمل میں شمار کیا ہے

علامات (۱) بدن میں معمول سے زیادہ گرمی ہونا (۲) کبھی کبھی جلد میں سوزش اور پتنگے سے لگنا اور چیونٹیوں کے کاٹنے کا سادہ دیا ان کے چلنے کی ہی حرکت محسوس ہونا۔ (۳) اکثر بدن میں پھنسیوں یا پھوڑوں کے نکلنے کی شکایت پائی جاتا (۴) بدن کے رنگ میں تغیر اور جلد میں خشکی اور بے رونقی ہونا (۵) خون میں کسی خاص زہر کی علامات کا پایا جانا جیسے آتشکی زہر وغیرہ۔

علاج (۱) اگر بدن میں خون کی مقدار زیادہ ہو اور عمر اور حالت بدن وغیرہ فصد کے

مانع موجود نہ ہوں تو فاسد خون کو بذریعہ قسط کے نکالنا سب تدابیر سے مقدم اور بہتر سمجھنا چاہئے (۲) دواؤں اور غذاؤں کے ذریعہ سے خون کی اصلاح ضروری ہے (۳) اگر بدن میں گرمی کی زیادہ شکایت ہو تو مناسب تبرید کے ساتھ عرق مصفی خون کا استعمال مفید ہوتا ہے (۴) اگر آتشکی نہر خون میں ہو تو اس کا خاص علاج کرنا چاہئے (۵) مفسد خون اشیاء سے پرہیز لازم ہے۔

جماعت چوتھی۔ اس جماعت میں عسر حمل کے تمام وہ اسباب مذکور ہوں گے جو کبھی اتفاقاً پیش آتے اور امور خارجی کہلاتے ہیں جیسے (۱) کثرت جماع (۲) حرکت بعد جماع (۳) جماع بے وقت (۴) عادت مساحت (۵) کثرت غم و غصہ وغیرہ (۶) تغیرات موسم۔ (۷) صرف گوشت خوری۔

(۱) کثرت جماع۔ تجربہ سے یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی ہے کہ کثرت جماع میں عسر حمل رہنے سے استقرار حل دشوار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے پہلے سال میں اکثر عورتیں حاملہ نہیں ہوتی ہیں اور چند روز کے بعد جب فعل جماعت میں کسی قدر کمی کی جاتی ہے تو وہ حاملہ ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر رحیم خاں صاحب نے اپنی مشہور کتاب (طب جمعی) میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان عورت صرف کثرت جماع کے باعث ہی ایک مدت تک حاملہ نہ ہو سکی تھی اس لئے اس کا خاوند اسے بانجھ خیال کرنے لگا تھا۔ لیکن دریافت حالت اور تشخیصی علامات کی رو سے عورت کا تندرست ہونا ثابت ہوا۔ ایک مرتبہ وہ عورت اتفاقاً قیہ مرض عسر الحیض میں مبتلا ہوئی اور علاج سے آرام ہو گیا۔ دوران علاج میں چند روز اس کا خاوند اس کے ساتھ مقاربت کرنے سے باز رہا۔ پھر وہ حاملہ ہو گئی اس سے معلوم ہوا کہ مدت تک اس کے حاملہ نہ ہو سکنے کا سبب صرف کثرت جماع ہی تھا۔

اسباب (۲) کثرت جماع سے اکثر عورت کا رحم ضعیف اور ان کے اندام نہانی میں التهاب (انفلامیشن) ہو جاتا ہے (۲) اندام نہانی میں خراب قسم کی رطوبت جمع رہتی ہے اور اکثر وہاں متعفن ہو کر بہا کرتی ہے (۳) سیلان رطوبت کا عارضہ پیدا ہو کر عسر حمل کا موجب ہو جاتا ہے (۴) ایسی عورتوں کو اکثر امراض رحم کے متعلق مختلف شکایتیں رہا کرتی ہیں۔

علاج۔ سب سے بہتر یہ علاج ہے کہ کثرت جماع سے پرہیز کیا جائے۔ اگر اندام نہانی میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو تو اس کا علاج کرنا چاہئے اور شکایات متعلقہ امراض رحم اگر موجود ہوں تو ان کے دفعیہ کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔

(۲) حرکت بعد جماع۔ جماع کے بعد اگر فوراً عورت اپنے بستر سے کھڑی ہو جائے یا کودنے لگے یا کوئی دوسری حرکت قوی کرنے لگے تو ممکن ہے کہ بچہ کی پیدائش کا مادہ ایسی حرکات کے باعث فوراً رحم سے خارج ہو جائے یا اس کے لطیف اجزاء رجن میں قوت حیات اور استقرار حمل کی قابلیت ہے تحلیل ہو جائیں یا اور باقی ماندہ اجزاء میں استقرار حمل کی قابلیت کم ہو تو استقرار حمل نہایت مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے اطباء نے حرکت بعد جماع کو اسباب عسر حمل میں شمار کیا ہے

علاج۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عسر حمل کا سبب حرکت بعد جماع ہے تو عورت کو ہدایت کرنی چاہئے کہ بعد جماع کچھ دیر تک اسی حالت میں اپنے بستر پر آرام سے لیٹی رہے اور کسی قسم کی حرکت نہ کرے امید ہے کہ اس ندرت پر عمل کرنے سے وہ حاملہ ہو جائے گی۔

(۳) جماع بے وقت۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ استقرار حمل کے لئے صرف مرد کا مادہ منویہ کافی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے لئے عورت کا مادہ تولید جنین (اووم) بھی ضروری جزو ہے اور یہ مادہ زنانہ اعضا تناسل میں ہمیشہ بقدر کفایت موجود نہیں رہتا ہے۔ یہ بات خوب ثابت ہو چکی ہے کہ ایام حیض کے ایک ہفتہ پہلے سے لیکر اس زمانہ کے تقریباً ایک ہفتہ بعد تک مادہ تولید جنین زنانہ اعضا تناسل میں پورے طور پر تیار رہتا ہے اور ان ایام کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ استقرار حمل کا مادہ عورت کے اعضا تناسل میں بالکل مہیا رہے۔ اس لئے ان خالی ایام میں جماع کرنے سے عورت نہایت شاذ و نادر طور پر اتفاقاً شاید کبھی حاملہ ہو جاتی ہو۔ ورنہ اکثر تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ وقت کا خیال نہ رکھنے سے جماع کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا ہے اور عورت کے دل میں بچہ کی ماں بننے کی تمنا ہمیشہ رہتی ہے۔ اس لئے اطباء نے جماع بے وقت کو عسر حمل کے اسباب میں شمار کیا ہے۔

علاج۔ طالب اولاد کو لازم ہے کہ ان ایام میں مباشرت کرنے کی عادت رکھے جو ایام تجربہ کار اطباء نے اس کام کے لئے مقرر کر دیے ہیں۔ ورنہ اسے عدم استقرار حمل یا عسر حمل کی شکایت نہیں کرنی چاہئے۔

(۴) عادت مساحقت۔ عقر کے بیان میں ہم یہ بات اچھی طرح بتا چکے ہیں کہ اس فعل قبیح کی عادت کرنے سے زنانہ اعضا تناسل میں کیسی کیسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کن وجوہ سے نا عاقبت اندیش عورات کو اس فعل ناجائز کی عادت ہو جاتی ہے اب ہمیں صرف یہ کہنا باقی ہے کہ اگر عورت اس ناپاک فعل کو مدت دراز تک کرتی ہے تو اس فعل قبیح کے اثر سے اس کے اعضا تناسل میں بہت خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لئے بانجھ ہو جاتی ہے اور اگر یہ فعل بہت کم کیا ہو تو اس کا ضعیف اثر اگرچہ بالکل بانجھ نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی اسے عسر حمل کی شکایت ضرور ہو جاتی ہے اسلئے وہ اپنی مدت عمر میں بہت کم حاملہ ہوتی ہے۔ اور اولاد کی خدا داد نعمت سے اسکو بہت کم حصہ ملتا ہے۔ علاج۔ اگر زنانہ اعضا تناسل کے کسی مرض سے عورت کو یہ عادت بد ہو گئی ہو تو مستقل طور پر سب سے پہلے اس کا علاج کرائیں۔ ورنہ اس مرض کے برے نتائج سے عورت کو مطلع کر کے اس کام سے ہمیشہ اجتناب رکھنے کی ہدایت کریں (باقی علاج دیکھو عقر کی بحث میں)

(۵) کثرت غم و غصہ وغیرہ۔ غم۔ رنج۔ غصہ وغیرہ کی مصیبت میں اکثر مبتلا رہنے والی مستورات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بہ نسبت خوش طبع اور فرحت و مسرور میں زندگی بسر کرنے والی عورتوں کے بہت کم صاحب اولاد ہوتی ہیں۔ رنج و غم دائمی کا اثر جس طرح کہ آدمی کے ظاہری افعال میں تغیر پیدا کرتا ہے اسی طرح اس کے تمام افعال متعلق پرورش بدنی وغیرہ میں بھی فتور و اُلد تیا ہے۔ ایسی حالت میں اعضا تناسل کسی طرح آفت سے نہیں بچ سکتے اس لئے مادہ تولید کی پیدائش بھی پورے طور پر ہونی مشکل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مدت دراز تک ایسی مصیبتوں میں مسلسل گرفتار رہنے والی عورتیں اکثر اولاد سے محروم رہتی ہیں۔ اور اگر بہت زیادہ مدت تک وہ ان مصیبتوں میں مبتلا نہ رہیں تو بھی ان کو عسر حمل کی شکایت ضرور ہوتی ہے۔

علاج۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ عسر حمل کا سبب صرف کثرت رنج و غم اور طبیعت کا دائمی طلال ہی ہے اور اس کے علاوہ عورت ہر طرح تندرست ہے تو رنج و غم کے اسباب کو رفع کرنا اور سیر و تفریح سے ہمیشہ دل کو خوش رکھنا چاہئے اور اسے انتظام خانہ داری میں مصروف رکھنا اور دل میں خوشی پیدا کرنے والے قصوں میں طبیعت کو مشغول رکھنا مفید ہوتا ہے۔ مقوی اور مرغن غذا میں کھلانا۔ دودھ اور مٹی کا زیادہ استعمال کرنا بھی فائدہ کرتا ہے۔

۶) تغیرات موسم۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ہر جگہ آب و ہوا کے موسمی تغیرات کے سبب سے ہر موسم میں خاص خاص قسم کے امراض لاحق ہوتے رہتے ہیں اور کسی سال میں موسمی امراض دہیضہ اور موسمی بخار وغیرہ کی زیادہ کثرت رہتی ہے اور کسی سال میں موسمی امراض بہت کم لاحق ہوتے ہیں اور عام صحت عمدہ حالت میں رہتی ہو اسی طرح بعض مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ ان ہی موسمی تغیرات کے باعث اکثر عورتوں کو اسقاط حمل کا عارضہ پیشتر لاحق ہوتا ہے اور کسی سال میں عورتیں اس مصیبت سے محفوظ رہ کر اپنی میعاد مقررہ پر وضع حمل سے بامراد فارغ ہوتی ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی سال میں صرف آب و ہوا کے خاص تغیرات موسمی کے باعث بہت کم عورتیں حاملہ ہوتی ہیں۔ اور کسی سال میں یہ موسمی تغیرات استقرار حمل کے مانع نہیں ہوتے۔ ان واقعات پر نظر کر کے اطباء نے موسمی تغیرات کو بھی عسر حمل کے اتفاقیہ اسباب میں شمار کیا ہے علاج۔ موسمی تغیرات کی حالت میں جن مفسد اجزاء کے اختلاط سے آب و ہوا کا اثر استقرار حمل یا حاملہ عورتوں کے لئے مخالف ہوتا ہے ان کو پورے طور پر دریافت کر لینا عام لوگوں کے لئے سخت دشوار ہے۔ اور اگر بالفرض ان مفسد اجزاء کا یقینی علم کسی طریقہ سے ہو بھی جائے تو ان کے مخالف اثر کو بدن سے دور کرنے اور آئندہ کے لئے اس اثر سے بالکل محفوظ رکھنے کی تدبیر ہر شخص کو میسر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لئے ایسی بذاتروں سے محفوظ رہنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسے موسمی تغیرات کے وقت تبدیل آب و ہوا کی غرض سے چند روز کے لئے مقام سکونت کو بدل دیا جائے اور ان مقامات میں

سکونت اختیار کی جائے۔ جہاں کی ہوا صاف اور ایسے مفسداثرات سے پاک ہو۔  
 (۷) صرف گوشت خوری۔ تجربہ اور تفتیش حالات سے یہ بات بخوبی ثابت ہو چکی  
 ہے۔ کہ جس قوم میں صرف گوشت کھانے کا بکثرت رواج ہوتا ہے یا ان کی زندگی کا دار و مدار  
 صرف حیوانی غذاؤں پر ہوتا ہے اس قوم کی عورتیں اکثر بہت کم حاملہ ہوتی ہیں۔ اور اسی  
 وجہ سے اس قوم کے لوگوں میں توالد و تناسل بہ نسبت دوسری قوموں کے بہت کم ہوتا ہے  
 اور ان کی اولاد تعداد میں بہت کم ہوتی ہے۔

اگرچہ ان لوگوں کی اولاد بھی کچھ بہت زیادہ نہیں ہوتی جو صرف نباتی غذاؤں سے اپنی  
 زندگی بسر کرتے ہیں لیکن پھر بھی بہ نسبت گوشت خور قوم کے وہ زیادہ صاحب اولاد  
 ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ صاحب اولاد وہ لوگ ہوتے ہیں جو گوشت کے ساتھ ترکاریاں  
 وغیرہ نباتی غذائیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اسی طرح صرف گوشت کھانے والے جانور  
 بھی بہ نسبت صرف پھل کھانے والے جانوروں کے بہت کم بچے دیتے ہیں ان مشاہدات  
 کی رو سے اطباء نے صرف گوشت خوری کو اسباب عسر حمل میں شمار کیا ہے۔

علاج۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ عسر حمل کا سبب صرف گوشت خوری کے سوا اور  
 کوئی نہیں ہے تو ایسی غذاؤں کے استعمال کو رفتہ رفتہ ترک کرنے کی ہدایت کرنی چاہیے۔  
 اور گوشت کے ساتھ ترکاریاں اور نباتی غذائیں کھانے کی عادت کرنی لازم ہے۔

اٹھائیسویں فصل۔ کثرت استقاط حمل را بارشش ایہ اس مرض کا نام ہے  
 جس میں حاملہ عورتوں کا حمل ضائع ہو جاتا ہے اور وقت سے پہلے جنین رحم سے خارج  
 ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ استقاط حمل ابتدائی تین مہینوں اور آخری تین مہینوں میں اکثر  
 واقع ہوتا ہے۔ شیخ بوعلی بن سینا کا قول ہے کہ رحم کے ساتھ بچہ کا تعلق ایسا ہوتا ہے  
 جیسا کہ میوہ کا تعلق درخت کی شاخ کے ساتھ اور جس طرح کہ میوہ کے گرنے کا خوف  
 ابتداء میں اور بچتگی کے قریب زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح استقاط جنین کا خوف بھی حمل کے  
 ابتدائی زمانہ اور آخری زمانہ میں بہ نسبت درمیانی زمانہ کے زیادہ ہوتا ہے۔

اگرچہ ان دونوں زمانوں میں اکثر ادنی سبب سے استقاط حمل ہو جاتا ہے لیکن مریض کو

اس سے کسی سخت خطرہ کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے جیسا کہ مدت حمل کے درمیانی تین یا چار مہینوں میں ہوتا ہے۔ کیونکہ حمل کے ابتدائی دو یا تین مہینے تک جنین کا جسم بہت چھوٹا اور اس کا تعلق رحم کے ساتھ ضعیف ہوتا ہے اس لئے وہ مع اپنے تمام متعلقات کے پورے طور پر آسانی رحم سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے خارج ہوتے وقت مریضہ کو درد وغیرہ کی بھی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے اور جریان خون کا بھی بہت کم اندیشہ ہوتا ہے۔

اسی طرح مدت حمل کے آخری حصہ میں اگرچہ جنین کا جسم بڑا اور اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے لیکن اسقاط حمل کے وقت مریضہ کو وضع حمل سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے اور نہ جریان خون بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس مدت میں بھی جنین کا تعلق رحم سے زیادہ قوی نہیں ہوتا۔

اور تیسرے مہینے کے آخر سے ساتویں مہینے تک جنین اور اس کے متعلقات کا تعلق رحم کے ساتھ نہایت قوی ہوتا ہے اور بچہ کی مقدار جسامت بھی کچھ بہت کم نہیں ہوتی ہے۔

اس لئے اگرچہ اس درمیانی مدت میں اسقاط حمل بہت کم ہوتا ہے اور وہ بھی بلا سبب قوی کے نہیں ہوتا۔ لیکن اسقاط کے وقت مریضہ کو درد وغیرہ کی نہایت سخت تکلیف

ہوتی ہے جو وضع حمل طبعی سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور خروج جنین کے بعد اکثر آئول رحم کے سطح سے چٹا رہ جاتا ہے جو کچھ وقفہ کے بعد نہایت دشواری اور تکلیف کے ساتھ خارج

ہوتا ہے اور چونکہ رحم کو بچے کے نکالنے میں زور سے پھیل کر پھر سکڑنا پڑتا ہے۔ اس لئے عورت کے رحم سے بکثرت جریان خون ہوتا ہے جس سے مریضہ بہت ضعیف ہو جاتی

ہے اور کبھی ان شدائد کے سبب سے ہلاک بھی ہو جاتی ہے۔

اگرچہ کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اسقاط حمل کے بعد آئول آٹھ دس دن تک

رحم میں بدستور چپا رہتا ہے اور برابر اپنی غذا رحم سے لیتا رہنے کے باعث متعفن نہیں ہوتا۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر دو یا تین دن تک وہ رحم سے خارج نہ ہو سکے تو رحم کے

اند متعفن ہو جاتا ہے اس وقت جو رطوبات اور خون رحم سے بہتے ہیں ان میں سخت بدبو آنے لگتی ہے اور کبھی آئول کے متعفن ٹکڑے یا چھپچھڑے خون وغیرہ کے ساتھ

خارج ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں متعفن مادہ کا زہر بذریعہ خون کے تمام بدن میں سرایت

آئول کا رحم میں چپا رہنا



کر جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے اور اس سے عوارض فساد خون یا سرخ بادہ پیدا ہونیکے علاوہ کسی خاص قسم کی سمیت سے تپ شدید اور سرسام تک فوبت پہنچتی ہے اور مریضہ کے ہلاک ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ حالات مذکورہ بالا کو مد نظر رکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسقاط حمل ایک بچاری نامراد اور مصیبت زدہ عورت کے لئے نہ صرف ایک حسرت اور افسوس ہی کا باعث ہوتا ہے بلکہ طرح طرح کی شدائد و تکالیف کے سبب سے اس بچاری کی زندگی کو سخت خطرہ میں ڈالنے والی ایک بلا و ناگہانی ہے۔ اسی لئے عموماً کہا جاتا ہے کہ اسقاط حمل کے شدائد سے مریضہ کا نجات پانا گویا مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی حاصل کرنا ہے۔ اسباب اسقاط حمل کے اسباب استقدر کثیر التعداد ہیں کہ اگر ان سب کو بلا ترتیب ایک جگہ مفصل بیان کیا جائے تو ان کا یاد رہنا طالب علم کو سخت دشوار ہوگا۔ اس لئے ہم انہیں حسب ذیل چار جماعتوں میں تقسیم کر کے بیان کرتے ہیں (۱) امور خارجی (۲) عوارض جسمی (۳) امراض رحم (۴) فساد حال جنین۔

جماعت اول امور خارجی۔ اس جماعت میں وہ تمام امور داخل ہیں جو اتفاقاً حاملہ کو پیش آتے اور اکثر اسقاط حمل کے باعث ہوتے ہیں جیسے (۱) حرکت و ریاضت قوی (۲) ضرب یا سقط (۳) کثرت جماع (۴) مدرات قویہ کا استعمال (۵) مسہلات قویہ کا استعمال۔ (۶) بدن سے خون کا بکثرت نکلنا (۷) متواتر فاقہ کشی (۸) مرغوب طبیعت اشیاء کا وقت پر دستیاب نہ ہونا (۹) کثرت غم و غصہ وغیرہ (۱۰) یکایک خوف اور گھبراہٹ (۱۱) آب و ہوا کی موسمی یا مقامی خرابی۔

جماعت دوم عوارضات جسمی۔ اس جماعت میں حاملہ کے عوارضات جسمی کے علاوہ بعض امراض بدنی بھی شامل ہیں جن سے اکثر اسقاط حمل ہو جاتا ہے جیسے صفرسی (۲) مزاجی خرابی (۳) ضعف اعضاء اور لاغری مفطر (۴) فربہی مفطر اور کسل اعضاء (۵) کلانی شکم و کثرت ریاح (۶) تپ لرزہ اور اس کے شدائد (۷) قے مفطر اور اس کی تکالیف (۸) اسہال کثیر اور ان سے کمزوری (۹) ہیضہ اور اس کی سمیت (۱۰) پچش اور اسکا درد (۱۱) کرم شکم یعنی دیدان امعاء (۱۲) عورت کا سوزاک اور اس کی تکالیف (۱۳)

مرض آتشک اور اس کا فساد۔

جماعۃ سوم امراض رحم۔ اس جماعۃ میں تمام وہ امراض داخل ہیں جنکی موجودگی میں اکثر تواستقرار حمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ امراض خفیف ہوں جن سے رحم کے فعل میں زیادہ خرابی نہ ہو سکنے کے باعث کبھی استقرار حمل بھی ہو جاتا ہے لیکن ایسی حالت میں ادنی سبب اسقاط حمل کا قوی اندیشہ رہتا ہے۔ یا اگر استقرار حمل کے بعد حاملہ کو وہ امراض لاحق ہو جائیں تو اسقاط حمل کے موجب ہوتے ہیں۔ اس لئے ان امراض کو اسقاط حمل کے اسباب میں شمار کیا جاسکتا ہے جیسے (۱) صغیر رحم (۲) رحم کچرنی (۳) ہونا (۴) میلان رحم (۵) نفخہ رحم (۶) احتناق رحم (۷) رحم کی ساخت میں رطوبت کی زیادتی۔ (۸) رحم کے اندولی معمولی رطوبات میں شوربت اور نیزابی خاصیت (۹) میلان رحم (۱۰) کثرت حیض اور اس سے کمزوری (۱۱) قلت حیض اور اس سے دیگر فسادات (۱۲) رحم کی ساخت میں رسولی (۱۳) رحم کا تشنج کسی دوا کے سبب سے جیسا کہ ارگٹ کے بے موقع استعمال سے ہوتا ہے (۱۴) خبیثہ الرحم کی رسولی۔

جماعۃ چہارم جنین اور اس کے متعلقات کی خرابیاں۔ اس جماعۃ میں تمام امراض اور خرابیاں شامل ہیں جو ص جنین رنی نش یا اغشیۃ الجنین (فی ظل میمرئیس) یعنی جنین کی جھلیوں سے یا مضغہ مشیمہ رہا سنٹا یعنی آنول۔ اور حبس السرقا رامبلائیکل کاڑ یعنی ناس سے تصق رکھتے ہیں۔ اور وہ تہ نف و اسقاط حمل کا باعث ہوتے ہیں جیسے رامشیمہ کا تعلق رحم سے کمزور ہونا۔ رطوبت جنین کی زیادتی اور جھلیوں کا تنور (۱) رطوبت مذکورہ کا سیدان (۲) آنول کچرنی و رتو ج نہ لال کا زیادہ لمبا ہونا اور اس میں تیج یا گرہ لگ جانا (۳) جنین کا زیادہ قوی ہونا۔ جنین کی کمزوری اور لاغری۔ (۴) جنین کا مبتلا مرض ہونا۔ (۵) جنین کی موت۔

اسقاط حمل کی علامات و اسقاط حمل کے اسباب میں سے کسی ایک سبب کا پیا ج نہ یک سے زیادہ اسباب کا جمع ہونا کہ اسقاط حمل کا منجہ ہوتا ہے۔  
 (۱) اسباب اسقاط حمل کے واقع ہونے سے کچھ دیر کے بعد حاملہ کو اپنی پشت۔

خاصہ۔ (چڈے کے مقام) اور بیڑوں میں گرانی محسوس ہوتی ہے پھر ان مقامات میں درد شروع ہوتا ہے۔ (۳) رحم میں تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد انقباض دسکڑنے کی ایسی حرکت محسوس ہوتی ہے شدت سے درد ہونے لگتا ہے۔

(۴) رحم سے سیلان خون شروع ہو جاتا ہے خصوصاً جبکہ حمل کے دوسرے یا تیسرے مہینہ کے بعد اسقاط حمل واقع ہو۔

(۵) پستان کی سختی زائل ہو جاتی ہے اور ان کی جسامت دفعۃً گھٹ جاتی ہے۔

(۶) اندام نہانی میں فراخی اور ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے اور رحم اپنے مقام سے نیچے کو مائل ہو جاتا ہے۔

(۷) رحم کا منہ اس قدر کھل جاتا ہے کہ قابلہ کی انگلی اس کے اندر بخوبی جا سکتی ہے۔

(۸) اگر قابلہ انگلی سے امتحان کرے تو جنین فم رحم کے حلقہ میں یا اس سے کسی قدر باہر کی طرف آیا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس حالت میں جنین کے متعلقات کا اکثر حصہ جسم کی ساخت سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔

(۹) جب اسقاط حمل کا وقت بالکل ہی قریب ہوتا ہے تو اکثر حاملہ کے سر میں غیر معمولی گرانی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی گہرائی میں درد اور بدن میں لرزہ پیدا ہوتا ہے خصوصاً جبکہ مدت حمل کے درمیانی زمانہ میں اسقاط حمل کا اتفاق پیش اسقاط حمل کا علاج۔ اسقاط حمل کا سبب واقع ہوتے ہی اور علامات اسقاط کے

شروع ہونے سے پہلے اس کی مفرت سے محفوظ رہنے کی بتدبیر کی جائیں انہیں اطباء کی اصطلاح میں تقدم بالحفظ کہتے ہیں اور علامات اسقاط کے شروع ہونے کے بعد جب تک جنین اپنے اصلی موقع پر قائم ہو۔ اور حسن تدبیر سے اس کے قائم رہنے کی امید ہو سکے۔ تو اس وقت حفظ جنین اور منع اسقاط کی تدابیر کی جاتی ہیں لیکن جب جنین اپنی جگہ سے علیحدہ ہو جائے اور حمل کے قائم رہنے کی امید نہ ہو سکے تو جنین کا نکالنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ اب ہم ان تینوں قسم کی تدابیر کو ذیل میں درج کرتے ہیں۔

(۱) تقدم بالحفظ۔ حاملہ کو اسباب اسقاط سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر عوارضات جسمی یا

امراض رحم اسقاط حمل کا باعث سمجھے جائیں تو استقرار حمل سے پہلے ان کی تدبیر کرنی مناسب ہے اور استقرار حمل کے بعد ان کی مصرت سے غافل نہیں رہنا چاہئے۔ اگر جنین کی خرابی ثابت ہو تو اس کی طرف بھی توجہ کرنی لازم ہے لیکن اس قسم کی تمام تدابیر اسقاط حمل کے آثار شروع ہونے سے پہلے کارگر ہوتی ہیں اور اسقاط حمل کے آثار شروع ہو جانے کے بعد علامات اسقاط کو اچھی طرح سے دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہئے کہ حمل قائم رہ سکتا ہے یا نہیں۔

۲) حفظ جنین اور منع اسقاط۔ اگر حاملہ کے پیڑ و کمر رانوں وغیرہ میں درد کم ہو اور سیلان خون بہت زیادہ نہ ہو۔ فم رحم کھلا نہ ہو۔ جنین اپنے موقع پر قائم ہو تو اسقاط حمل سے محفوظ رہنے کی توقع کی جاسکتی ہے۔ ایسی حالت میں وہ تدابیر عمل میں لائی جائیں جن سے خون رک جائے درد موقوف ہو جائے اور جنین اسقاط سے محفوظ رہے۔

اگرچہ حمل کے ابتدائی ایک دو ماہ تک تو اسباب اسقاط کے واقع ہوتے ہی اس قدر جلد اسقاط حمل ہو جاتا ہے کہ اس تھوڑی سی مدت میں حاملہ یا قابلہ کو حفظ جنین کی تدبیر کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ اور نہ حاملہ کو بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے نہ کچھ زیادہ سیلان خون ہوتا ہے۔ بلکہ اکثر منجمد خون کے لوتھڑوں میں جنین ایسا مخلوط ہو کر خارج ہو جاتا ہے کہ اس کی خبر تک نہیں ہوتی اور ایسے موقع پر جس خون یا حفظ جنین کی جو تدبیریں کی جاتی ہیں ان سے عورت کو سخت نقصان پہنچتا ہے اس لئے ایسے موقع پر اس منجمد خون کا امتحان کرنا ضروری ہے۔

خون کے امتحان سے اگر ثابت ہو جائے کہ صرف خون ہے اور اس میں جنین کا کوئی خروشاہل نہیں ہے تو اس تدبیر سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے (اپنیے کا نسخہ۔ زہر مہرہ بنسلوچن۔ گیرو۔ سنگجراحت چاروں ایک ایک ماشہ باریک پیسکر آلہ مربی ایک عدد میں ملائیں اور چاندی کے ایک ورق میں پیٹ کر کھلائیں۔ اس کے اوپر فوراً یہ نسخہ پلائیں۔ شیرہ سیخ انجبار ۴ ماشہ۔ شیرہ حب الاس ۳ ماشہ۔ شیرہ تخم خرفہ سیاہ ۳ ماشہ۔ سب کو عرق گاؤ زبان میں شیرہ نکال کر اور شربت اناشیریں ۲ تولہ ملا کر پلائیں

۲) لیپ کا نسخہ۔ گل سرخ۔ بلوط۔ جفت بلوط۔ افاقیا قشاکر کند۔ مازوسبر۔ مائین۔

پوست انارترش - عدس مسلم - ہر ایک ۶ ماشہ لیکر پانی میں پیس لیں اور مرضیہ کے پیڑ و اورشیت پر لپیپ کریں (۳) آبدست کا نسخہ - کوکنار - گلنار - بلوط - جفت - بلوط - پوست انارترش ہر ایک ایک تولہ لیکر نیم کوفتہ کریں اور ۴ سیر پانی میں خوب جوش دے کر رکھ چھوڑیں اس پانی کو چھان کر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس سے آبدست کرائیں۔

(۴) سفوف کا نسخہ - اکثر اس نسخہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور میرزا خاندانی مجرب ہے سنگمراحت ۹ ماشہ - نسلوچن ۶ ماشہ - دانہ الائچی خورد ۳ ماشہ ۳ ماشہ - سب کو باریک پسیر اس کے برابر شکر سفید ملا لیں - اور اس کی تین خوراکیں کر لیں - ان میں سے ایک ایک خوراک تین تین گھنٹہ کے بعد گائے کے دودھ کی لسی کے ساتھ مرضیہ کو کھلائیں (۵) ملتانی مٹی ۱۰ تولہ کوٹ کر مٹی کے کورے برتن میں ڈال کر اس میں تازہ پانی بھر دیں جب مرضیہ کو پیاس معلوم ہو یہ صاف اور ٹھنڈا پانی ایک ایک گھونٹ پلاتے رہیں - اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔

(۶) مرضیہ کو غذا نہایت ہلکی دینی چاہئے - اکثر ساگودانہ رقیق اور کم شیریں پلایا جاتا ہے یا خشک ملائم - دودھ اور نہایت کم شیرینی کے ساتھ دیا جاتا ہے۔

(۷) سب سے زیادہ ضروری اور بہتر یہ ہے کہ مرضیہ کو اچھی ہو اور صاف مکان میں رکھیں لباس صاف - ستھرا - اور بستر نرم ہو - اور حتی الامکان مرضیہ کو آرام سے لیٹا رہنے دیں - ڈاکٹروں نے اس کی بہت تعریف کی ہے کہ مرضیہ کو ہر تین چار گھنٹے کے بعد پنچر اوپیم ۲۰ قطرہ یا کلورل ہائیڈریٹ ۵ گرین - یا کلور وڈین ۲۰ نم - یا لائیکر اوپائی سیڈ ٹیوس دیں - ان ادویات میں سے جو دوا دی جائے اس کی تین خوراک سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ان سے درد کو آرام ہوتا ہے - سیلان خون بند ہو جاتا اور حمل قائم رہتا ہے لیکن یہ تدبیر تین مہینہ کے حمل کو اچھی طرح روک سکتی ہے اگر سیلان خون زیادہ ہو تو پلپائی ایسیٹاس ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک تازہ پانی کے ساتھ یا قدرے افیون کو پانی میں حل کر کے اس کے ساتھ دیتے ہیں یا سلفیورک ایسڈ اور کیا لک ایسڈ افیون کے ساتھ دیا جاتا ہے - لیکن خیال رکھنا چاہئے کہ افیون سے اکثر قبض ہو جاتا ہے

جو اسقاط کا معاون ہوتا ہے۔ اس لئے اگر ضرورت سمجھی جائے تو اس کے ساتھ تھوڑی مقدار میں کاسٹر آئل یا کوئی دوسرا نرم ملین دیں تاکہ قبض نہ ہونے پائے۔

(۳) جنین کو نکالنا۔ اگر علامات کے مشاہدہ سے اس بات کا یقین ہو جائے کہ حمل کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے۔ حمل تین مہینے یا اس سے زیادہ کا ہے۔ درد شدید اور جریان خون زیادہ ہے رحم کا منہ کھل گیا اور بچہ اپنے مقام سے علیحدہ ہو گیا ہے تو ایسی حالت میں تدابیر مذکورہ بالا سے کوئی فائدہ ہونے کی امید نہیں کی جاسکتی ہے اسوقت اسقاط جنین پر اعانت کرنے والی ادویات دینی چاہئیں تاکہ حاملہ کو اسقاط حمل کی تکالیف اور شدت درد یا کثرت سیلان خون وغیرہ عوارض سے جلد نجات مل جائے۔

(۱) پینے کا نسخہ۔ مشکطرا مشیع۔ تخم ترب۔ گل خطمی۔ پرسیا و شال۔ خار خشک۔ تخم کرفس۔ دو قو۔ عنب الثعلب خشک۔ پوست المٹاس۔ تخم خرپڑہ۔ پوست خرپڑہ زیرہ سیاہ شربت بزوری۔ ان ادویات میں جو دوائیں اور حسب قدر مناسب ہوں۔ پانی میں جو شش دیکر دلائی جائیں تاکہ جنین خارج ہو جائے۔

(۲) آب زن کا نسخہ۔ اگر ضرورت ہو تو ان ادویات کو بہت سے پانی میں پکا کر کسی بڑے برتن میں بھر دیں اور مریضہ کو اس میں بٹھائیں۔ ترمس تلخ۔ برنجاسف۔ بابونہ حاشا۔ قردمانا۔ فراسیون۔ پودینہ کوہی عطینا۔ کماذریوس۔ برگ تلخی۔ ہر ایک ایک تولہ اس ترکیب سے بہت جلد اسقاط ہو جاتا ہے۔

(۳) ضماد کا نسخہ۔ بچھکنی۔ برنجاسف باریک پسیر شہد میں ملا کر عانہ اور پشت پر لپکریں (۴) فرزجہ کا نسخہ۔ ایلوہ۔ سہاگہ بریاں۔ لونگ۔ نوسادر۔ جھوہ کی گٹھلی۔ بسکچیرہ کی جڑ۔ ہر ایک سنات ماشہ لے کر باریک پس لیں اور بسکچیرہ سب کے عرق میں ملا کر فرزجہ رکھیں۔ (۵) ایضاً۔ مرکبی۔ جاوشیر۔ کٹکی سفید ہر ایک تین ماشہ باریک پسیر گائے کے پتے میں ملائیں اور باریک کپڑے میں آلودہ کر کے استعمال کریں۔

(۶) ایضاً۔ ماذریون۔ جاوشیر۔ سکنج۔ زراوند مدحرج۔ اشنان۔ تخم حنظل۔ موزیرج۔ کٹکی سیاہ۔ نوشادر ہر ایک بقدر مناسب لے کر باریک پس لیں اور روغن بیدانجیر اور

گائے کے پتے میں ملا رکھیں پھر اس میں سے قدرے لیکر اس میں باریک کپڑا آلودہ کر کے  
فرزجہ کے طور پر استعمال کریں (۷) مرکی - بہر وزہ خشک - جاؤ نشیر - برابر لیکر سیفوف کریں -  
اس میں سے بقدرے ماشہ لیکر ہمراہ جو شاندرہ تخم کرفس اور سونف کے پھینکائیں -  
(۸) برگ سداب خشک ۱۰ ماشہ مرکی ۳۰ ماشہ ہینگ پونے دو ماشہ سب کو باریک  
کوٹ چھان کر دو حصے کریں ان میں سے ایک حصہ صبح کو اور ایک حصہ شام کو جو شاندرہ اہل  
کے ساتھ پھینکائیں (۹) جنطیانا رومی جب الغار - مرکی - قسط بھری - تاج - مجیٹھ گوگل عصارہ  
افستین - قرومانا - مشکطرا - مشع - زراوند طویل - ایک ایک تولہ کوٹ چھان کر شہد خالص  
۳۵ تولہ میں ملا کر رکھیں - مقدار خوراک ایک ایک تولہ سے دیرھ تولہ تک ہے -

فصل انتیسویں - (رجایا حمل کا ذب را سپیورس پر کنین سی) یعنی جھوٹا حمل - اس  
مرض میں یا تو رحم کے اندر خراب فضلات جمع ہو جاتے ہیں - یا اس کی تمام ساخت میں یا  
اس کے کسی خاص حصے میں سختی پیدا ہو جاتی ہے یا رحم کے جوف میں فضلات روہ سے  
ریاح پیدا ہو کر وہیں بند رہتی ہیں - یا ایک گوشت کا لوتھڑا سا پیدا ہو کر بڑھتا رہتا ہے  
اس لئے مریضہ کا شکم حاملہ عورت کے شکم کی طرح سے روز بروز بڑھتا جاتا ہے اور ابتدا میں  
تین چار مہینے تک مریضہ کو عمل کا دھوکا رہتا ہے -

کیونکہ اس مرض میں سچے حمل کی طرح سے رحم کا منہ بند رہتا ہے اور حیض اکثر بالکل  
ہی بند رہتا ہے اور بعض حالتوں میں کبھی کبھی بے قاعدہ طور پر نھوڑا آکر رہتا ہے چونکہ مریضہ کو  
اس سے کچھ زیادہ تکلیف یا اپنی خیالی امید کے زائل ہونے کا خوف نہیں ہوتا اس لئے وہ  
اس حیض کے آنے کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی ہے بلکہ وہ حتی المقدور کسی پر اس کی اظہار بھی  
نہیں کرتی اور ہر وقت اپنی خیالی امید کی دھن میں لگی رہتی ہے اس حیض کی بے موقع  
رکاوٹ یا بے قاعدگی سے مریضہ کے تمام بدن کی رنگت میں خصوصاً اس کے چہرے کے  
رنگ میں قدرے تیرگی اور بے رونقی پیدا ہو جاتی ہے اس کے پستان میں سختی اور تپناؤ  
سا معلوم ہونے لگتا ہے - سر پستان کا رنگ سیاہی مائل اس کے گرد کا حلقہ  
قدرے اودا ہو جاتا ہے -

ان تمام علامتوں کے علاوہ اگرچہ مریضہ کی طبیعت نسبت سچے حمل کے کسی قدر زیادہ بد مزہ اور کسلمند رہتی ہے۔ اعضا شکنی اور بدن کے مختلف مقامات کا ورد اسے اکثر ستاتا ہے شکم میں نفخ و اترقہ کی کثرت اور ضعف ہضم وغیرہ کی شکایت سے اکثر وہ بے چین رہتی ہے لیکن وہ ان سب تکلیفوں کو اپنی وہی امید کے بھروسہ پر گوارا کر لیتی ہے۔ اسی حالت میں جب مریضہ کو تین مہینے گزر چکے ہیں اور چوتھا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے شکم میں یارحم میں کبھی کبھی ریا ح کی حرکت محسوس ہونے لگتی ہے جس سے اس کا خیال اور بھی زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کرنے لگا ہے۔

لیکن اس کے بعد حسب قدر زمانہ گزرتا ہے مریضہ کے بدن میں مرض کی سبب تکالیف ظاہر ہونے لگتی ہیں اکثر اس کے چہرے پر تہنج اور پاؤں پر ورم و خورائے ڈی ما اچھی طرح سے معلوم ہونے لگتا ہے اور بخلاف حاملہ عورتوں کی حالت کے مریضہ متفکر اور پریشان رہتی ہے اس کی تمام حرکات میں سستی اور کاہلی و سست ہمتی پائی جاتی ہے۔ پھر بھی وہ بچہ پاری بچہ کی مان بننے کی امید میں تمام تکلیفوں کو بدستور جھیلی رہتی ہے۔ البتہ مدت حمل کے آخری زمانہ میں خصوصاً نو مہینے گزر جانے کے بعد حسب قدر وضع حمل میں تاخیر ہوتی ہے اسی قدر مریضہ اور اس کے رشتہ داروں کو فکر بڑھتا جاتا ہے اور مجبوراً طبیب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور طبیب اس مرض کے اسباب و علامات میں غور کر کے علاج شروع کرتا ہے

**اسباب**۔ یونانی اطباء اس مرض کے دو سبب قرار دیتے ہیں ایک تو یہ کہ پیدائش جنین کا صرف نسائی مادہ (راوم) رحم کے اندر پہنچ کر کسی وجہ سے وہاں ٹکرا جائے اور چونکہ ایسے مادے میں پیدائش جنین کی پوری قابلیت موجود نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے صرف سی سے طبعی طور پر مستقر حمل ممکن نہیں ہے اس وجہ سے مادہ رحم کے اندر خون حیض سے مدیا کر ایک گوشت کے ٹوٹھڑے کی صورت اختیار کرنا اور تدریج بڑھتا رہتا ہے۔

دوسرے یہ کہ رحم کے مزاج میں کسی وجہ سے گرمی زیادہ پیدا ہو جائے اور فضلات رو بہ اس میں جمع ہو کر وہیں رُکے رہ جائیں۔ پھر چاہے ان ہی فضلات کی مقدار جو رحم میں روز بروز بڑھتی رہے یا ان سے ریح پیدا ہو کر جمع ہوتی۔ یہی یا ان سے رحم کی

نسبہ امراض

نسبہ امراض



ساخت کے کسی حصہ میں یا تمام رحم میں ورم صلب پیدا ہو کر بدستور ترقی کرتا رہے بہر صورت مریضہ کی حالت حاملہ کے مشابہ ہو جاتی ہے اسی طرح سے بعض اطباء کا یہ بھی خیال ہے کہ اکثر اس مرض کا ابتدائی سبب مرض قب المرحم بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رحم کی گردن میں ورم صلب ہو جانے سے فم رحم بھی سخت ہو کر نہایت شدت سے بند ہو جاتا ہے اور اس کی ابتدا اکثر اس طرح سے ہوتی ہے کہ اول کسی سبب سے رحم کی گردن یا اس کی اندرونی جھلی میں التهاب (انفلامیشن) اور پھر ورم فلخنونی یعنی دموی پیدا ہو جاتا ہے۔ رحم کی اندرونی جھلی کے غد دلعا یہ دمویو کس کلینڈر متورم ہو جاتے ہیں۔ شروع شروع میں نومریضہ کی شرمگاہ سے رقیق و سفید رطوبت بکثرت بہا کرتی ہے پھر وہ موقوف ہو جاتی ہے اور اگر کسی سبب سے رحم کے اندرونی سطح پر خفیف سی رگڑ ہو نیچے یا کوئی خراش دار تیز مادہ وہاں پہنچے تو رحم سے بکثرت خون بہنے لگتا ہے رحم کی اس حالت کو ڈاکٹری اصطلاح میں (سروائیکل انڈومٹرائٹس) کہتے ہیں۔ پھر جب ایک مدت کے بعد مادہ ورم کے لطیف اجزاء تحلیل ہو کر اس کے کثیف اجزاء باقی رہ جاتے ہیں تو وہ ورم سخت ہو جاتا ہے اور اسی سختی کے سبب سے فم رحم بند ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو یونانی اطباء قب الرحم کہتے ہیں اگر اس حالت میں اندام نہانی کے اندر انگلی داخل کر کے ٹٹولا جائے تو رحم کے دونوں لب نہایت سخت اور اس کا منہ شدت کے ساتھ بند محسوس ہو کر تا ہے۔ اس لئے ایسی حالت میں عورت کو استقرار حمل کسی طرح ممکن نہیں کیونکہ ایک تو فم رحم کے بند ہونے سے مرد کا مادہ منویہ رحم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ زخم کا مزاج نادرست ہونے کے سبب سے جنین کی پیدائش کا مادہ فاسد ہو کر استقرار حمل کے لائق نہیں رہ سکتا ہے۔ اور پھر بھی اگر اس حالت میں مریضہ کو حمل کی سی علامتیں ظاہر ہونے لگیں تو اکثر وہ سچا حمل نہیں ہوتا بلکہ اسے حمل کا ذب سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ فم رحم کے بند ہونے کی حالت میں حیض کا خون اور دیگر فضلات ردیہ رحم کے اندر سے نکل نہیں سکتے اور اگر عورت کا مادہ منویہ (اووم) رحم کے اندر آئے تو وہ بھی وہیں بند رہتا ہے اس لئے رحم میں ان مادوں کے جمع رہنے سے یا تو ایک گوشت کا لوتھڑا سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یا

ان سے ریح پیدا ہو کر رحم میں بھری رہتی ہیں۔ یا وہ فضلات اپنی موجودہ صورت میں ہی رحم کے اندر بھرے ہوئے اور بتدریج زیادہ ہوتے رہتے ہیں اور ان فضلات کی زیادتی کے سبب سے مریضہ کا پیٹ حاملہ کے پیٹ کی طرح سے روز بروز بڑھتا جاتا ہے یہ حالت ایک مدت تک بدستور قائم رہتی ہے اسی کو حمل کا ذب یا مرض رجا کہتے ہیں۔

ڈاکٹروں کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ دا زیادہ عمر ہو جانے کے سبب سے جن عورتوں کا حیض بند ہونے کو ہوتا ہے اکثر وہ عورتیں اس مرض میں مبتلا دیکھی گئی ہیں ۲۱ یا ان جوان عورتوں کو جنہیں اولاد کی زیادہ اتمو ہوتی ہے اور ہر مرتبہ اپنے آپ کو حاملہ خیال کرتی ہیں ۲۳ خصوصاً ان مستورات کو یہ مرض اکثر ہوتا ہے جو اختناق الرحم میں مبتلا ہوں ۲۴ یا ان عورتوں کو جو قدرتی طور پر وہمی طبیعت کی ہوں یا کسی قسم کے فساد تخمیل میں مبتلا ہوں۔ غرض یہ ہے کہ اس مرض کے اسباب دریافت کرنے میں جہاں تک چھان بین کی گئی تو یہی معلوم ہوا کہ قوت متخیلہ سے اس مرض کا بڑا گہرا تعلق ہے۔

تشخیصی علامات۔ اس حالت میں چار یا پانچ مہینے گذر جانے سے پہلے ایک تو خود طبیب کو ہی مرض مذکور اور حمل میں شبہ رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مریضہ اور اس کے رشتہ داروں کے دلوں میں سے ان کے جھے ہوئے خیالات کا دور کرنا اور حمل نہ ہونیکا یقین دلانا سخت دشوار ہوتا ہے اس لئے پانچ مہینے سے پہلے مرض کے موجود ہونے کا قطعی فیصلہ نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد اگر مریضہ کے حالات کی پوری تفتیش کی جائے اور علامات ذیل کو نہایت احتیاط اور غور و فکر کے ساتھ مختلف اوقات میں چند مرتبہ تلاش کیا جائے تو امید ہے کہ تشخیص مرض میں کافی امداد حاصل ہو سکے گی۔

۱) مریضہ کا شکم حاملہ کی بہ نسبت عموماً زیادہ سخت ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے رحم میں کسی قسم کی فضلی رطوبات بھری ہوئی ہیں تو اس کے پیٹ پر دونوں طرف ہاتھ رکھ کر ایک ہاتھ کے دبانے سے اس رطوبت کی حرکت پانی کی لہروں کی طرح سے دوسرے ہاتھ کو محسوس ہوا کرتی ہے۔ اور اگر رحم میں ریح جمع ہوں تو ہاتھ کی ضرب اندرونی ہوا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دیکھو تصویر نمبر ۶۹

(تصویر نمبر ۶۹)



(۲) مریضہ کو اپنے پیٹ میں بچے کی سی حرکت محسوس نہیں ہوتی ہے اور اس میں غیر معمولی بوجھ سا معلوم ہوا کرتا ہے اور اگر ہاتھ سے کسی طرف کو حرکت دی جائے تو عارضی طور پر قدر حرکت ہو جاتی ہے اگر مریضہ کے پیٹ پر مختلف جگہ آگے سمع الصوت (اسٹٹھسکوپ) لگا کر بچے کے دل کی حرکت سننی چاہیں تو ان کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ (دیکھو تصویر نمبر ۷۰)

(تصویر نمبر ۷۰)



(۳) مریضہ کی طبیعت بہ نسبت حمل کے سست بدفرہ متفکر اور مغموم رہتی ہے اسکے بدن اور چہرے پر حاملہ کی سی رونق نہیں پائی جاتی ہے اس کے ہاتھ پاؤں میں سستی ڈھیلا پن

اور کسل وغیرہ پائے جاتے ہیں بلکہ بعض موقع پر تو اس کے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر کسی قدر تہج راسے ڈی ما بھی ہو جاتا ہے۔

۴۴) کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کلوروفارم سنگھا کر مریضہ کو بیہوش کریں تو عضلات شکم کے ڈھیلے ہوجانے سے پیٹ کی اونچائی غائب ہو جاتی ہے اور پھر جب اس دوا کا اثر زائل ہو جاتا ہے تو شکم بدستور ابھر آتا ہے اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دیگر اسباب کے علاوہ کبھی مریضہ کے صرف خیالات اور اس کے اعصاب کی خاص شش سے بھی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے (۵) اگر مریضہ کے رحم یا خصینۃ الرحم کی رسولی یا ان کے ورم سے اس کا شکم بڑھ کر حمل یا مرض رجا کی سی حالت ہوگئی ہو تو ان امراض کی خاص علامتوں سے اس کی تشخیص ہو سکتی ہے اور مریضہ کے شکم ابھر اس ورم یا رسولی کی طرف سے شروع ہوتا ہے۔ بخلاف حاملہ کے کیونکہ اس کے شکم کا ابھار پیڑوں کے ٹھیک بیچ میں سے شروع ہو کر ہر طرف بڑھتا رہتا ہے۔ علاج۔ اگر مریضہ کے رحم میں یا عنق الرحم میں ورم سوداوی صلب یعنی مرض قُب المرحم (سروائکل انڈوسٹرائٹس) موجود ہو تو (۱) اس کے متعلق تمام تدابیر وہی ہیں جو ورم صلب رحم کی بحث میں بیان کی گئی ہیں

(۲) ان تدابیر کے علاوہ یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر مریضہ قوی اور اس کے بدن میں خون کا غلبہ ہو اور نبض خون سے بھری ہوئی اور قوی معلوم ہو تو قصد باسلیق یا قصد صافن سے بقدر مناسب خون نکالا جائے۔

(۳) اور یہ نسخہ پلانا چاہئے صفتہ۔ گل نبشتہ۔ گل سرخ۔ بادیان۔ مکوہ خشک ہر ایک ۷ ماشہ موثر منفی ۹ دانہ۔ گاؤزبان۔ گل خطی ہر ایک ۳ ماشہ رات کو پانی میں ترکیب صبح کو جوش دے کر مل چھان لیں اور خمیرہ نبشتہ یا گلقدیم تولہ حل کر کے پلائیں۔ اگر مریضہ کو گرمی اور پیاس وغیرہ کی شکایت ہو تو اسی نسخہ میں سپستان ۱۵ دانہ اور تخم خیابین ۳ ماشہ اضافہ کریں (۴) اگر اس کے بعد ترقیہ کی ضرورت سمجھی جائے تو اسی نسخہ میں سناء کی ریشہ خطی ہر ایک ۷ ماشہ۔ مغر فلوس۔ خیاشنبہ ۴ تولہ ترنجبین ۴ تولہ شیرہ مغر بادام شیریں مقشر ۷ عدد اضافہ کر کے مسہل دیں۔ اس دن بجائے پانی کے سونف اور کوہ کا عرق

یا ان کا جو شانہ پلائیں۔ شام کو مونگ کی نرم کچڑی کھلائیں۔ دوسرے دن صبح کو معمولی تبرید کا نسخہ پلایا جائے (۵) اسی طرح کم سے کم تین سہل دینے کے بعد پیڑ اور شکم پر یہ ضماد لگانا چاہئے صفقتہ مغز فلوس ایک تولہ۔ گل بابونہ۔ اکلیل الملک۔ مرزنجوش۔ تخم میٹھی۔ تخم خطمی۔ مغز تخم ارند ہی ہر ایک چھ ماشہ سب کو باریک پیس کر زردی بیضہ مرغ ایک عدد۔ روغن گل ایک تولہ اس میں ملا کر نیم گرم ضماد کریں (۶) اور یہ فرز جہ صلابت رحم کے لئے نہایت مفید ہے صفقتہ۔ تخم خنکاش سفید۔ کنجد منقشر ہر ایک ۲ تولہ کوٹ کر گائے کے دودھ میں پکائیں اور خوب باریک پیس لیں پھر زعفران۔ کیترا۔ ایک ایک ماشہ۔ گوند لیکر۔ گل خطمی ہر ایک دو ماشہ باریک پیس کر اور انڈے کی زردی ۲ عدد۔ روغن گل۔ روغن خنایک ایک تولہ اس میں ملا کر نگاہ رکھیں۔ اس میں سے بقدر ضرورت لیکر باریک کپڑے کے ساتھ استعمال کریں (۷) ان تدابیر کے ساتھ ہی مریضہ کو آئرن میں بٹھانا اور تکمید کرنا بھی مفید ہوتا ہے صفقتہ۔ گل خطمی۔ گل بابونہ ہر ایک ۲ تولہ اکلیل الملک مکھو خشک مرزنجوش۔ بادیان۔ تخم میٹھی۔ تخم اسی۔ برگ کرتب ہر ایک ایک تولہ سب کو چار سیر پانی میں جوش دیکر صاف کریں اور چالیس سیر پانی گرم میں ملا کر کسی بڑے ٹب میں ڈالیں اور مریضہ کو اس میں بٹھاویں ۱۰ تکمید کا نسخہ یہ ہے صفقتہ۔ تخم سویہ۔ تخم کرنس۔ اجوائن دیسی۔ زیرہ سیاہ۔ با بڑنگ۔ آنہ ہلدی۔ مغز خستہ شفتالو ہر ایک ۴ ماشہ۔ کنجد سیاہ ۲ تولہ۔ نایل کہنہ ایک تولہ۔ سب کو نیم کوفہ کر کے دو پوٹلیاں بنائیں اور لوہے کے توبے پر گرم کر کے بقدر بر داشت سینکیں (۹) غذاؤں میں سے چوزہ مرغ یا حلوان کا گوشت اور لطیف چیزیں بقدر ہضم کھلائیں اور تیز نک مرچ یا خشک چنیروں سے پرہیز کریں۔

ان تمام تدابیر سے رحم کی سختی رفع ہو کر وہ اپنی اصلی حالت پر آجاتا ہے اور غنی الحیم درست و نرم ہو کر نرم رحم کا سوراخ اپنے معمول کے موافق کھل جاتا ہے۔ اس لئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض بجا کی حالت میں صرف اسی علاج سے پوری کامیابی حاصل ہوتی ہے اور کسی دوسری تدبیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے رحم کے اندر جو کچھ ہوتا ہے خواہ وہ طوبت متعفنہ ہو یا ریح یا گوشت کا لوتھڑا اسے طبیعت یا تو خود بخود یا تھوڑی تحریک سے دفع کر دیتی ہے۔

شمار محل دوم

نسوان

تخم میٹھی

اور اگر ان تدبیروں سے نفع نہ ہو تو اس حالت میں وہ دوائیں استعمال کرنی چاہئیں جو رکے ہوئے حیض کو جاری کرنے یا جنین مردہ کو نکالنے کے لئے بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ یہ نسخے بھی اس غرض کے لئے بہت مفید ہیں (۱) جوشاندہ جو ریضہ کو پلایا جاتا ہے صفتہ مشکطرا مشیع - بادیان - پرسیا و شال - میچٹہ - اشتر غار ہر ایک ہم تخم خرزہ - خار خشک - تخم کاسنی ہر ایک ۵ ماشہ شہد خالص اتولہ - یا شربت زروری سم تولہ سب کو آدھ سیر پانی میں جوش دیں جب ایک تہائی پانی باقی رہ جائے اس وقت چھان کر پلائیں (۲) اور یہ جوشاندہ بھی فائدہ کرتا ہے صفتہ - بادیان - تخم کاسنی - ہر ایک ۵ ماشہ انیسون - ترمس - مشکطرا مشیع اہل - ہر ایک ۵ ماشہ - گلقد ۲ تولہ (۳) یہ ضاد و ریضہ کے پیڑ و اور تخم پر کیا جائے - صفتہ - زیرہ سیاہ - صغتر گل - بابونہ - فردمانا - تخم کرفس ہر ایک ۶ ماشہ - جاوشیر - سکنج ہر ایک ۵ ماشہ - برگ کرفس سبز کے عرق میں یا پانی میں پیسکر ضاد کریں (۴) یہ شیاف اسقاط جنین کے لئے مجرب ہے صفتہ - مرکی - جاوشیر - ککلی - ہینگ - گندہ بہرزدہ خشک - ہر ایک ۳ ماشہ باریک پیسکر گائے کے پتے میں ملائیں اور باریک بتیاں بنا کر ان میں سے ایک بتی فم رحم کے اندر رکھیں -

(۵) یہ آئرن جنین مردہ کو نکالنے اور صفائی رحم کے لئے بہت مفید ہے صفتہ تخم میچی سداب تخم السی - تخم فنجنگشت - تخم گذر - مکوہ خشک - میچٹہ - ہر ایک ۲ تولہ شب کو پانی میں جوش دیکر صاف کریں - اور ریضہ کو بدستور اس پانی میں بٹھائیں -

اس طریقہ پر علاج کرنے سے رحم کی بخوبی صفائی ہو جاتی ہے - اس کے اندر چاہے گوشت کا تو نظر ہو یا کسی قسم کی متعفن رطوبت ہو سب کچھ نکل جاتا ہے - اور اگر ضرورت سمجھی جائے تو فرزجہ کے ان نخوں میں سے جو مناسب ہو استعمال کریں - ان سے بھی رحم کے اندر کی سڑی ہوئی رطوبت بہکر خارج ہو جاتی ہے -

(۱) فرزجہ - منقی رحم اجمود - باؤ بڑنگ - بہرزدہ خشک ہر ایک ۴ ماشہ تخم سویدہ نمک ہووری ہر ایک ۲ ماشہ سب کو باریک پیسکر شہد خالص گرم کئے ہوئے میں ملائیں اور پرانی روٹی کیسا تھ

لے دیکھو بیان اقتباس حقیقہ صفحہ ۱۸ سے ۱۹ تک اور جس قسم کا احتیاس ہو اسی کے موافق علاج کرو ۱۲ مولف

جوشاندہ منقی رحم

جوشاندہ

ضاد

شیاف

آئرن

فرزجہ منقی رحم

لگائے گئے پتے میں ملا رکھیں پھر اس میں سے قدرے لیکر اس میں باریک کپڑا آلودہ کر کے فرزجہ کے طور پر استعمال کریں (۷) مرکی - بہر وزہ خشک - جاؤ شیر - برابر لیکر سفوف کریں - اس میں سے بقدرے ماشہ لیکر ہمراہ جو شاندرہ تخم کرفس اور سونف کے پھنکائیں - (۸) برگ سداب خشک ۱۰ ماشہ مرلی ۳ ماشہ ہینگ پونے دو ماشہ سب کو باریک کوٹ چھان کر دو حصے کریں ان میں سے ایک حصہ صبح کو اور ایک حصہ شام کو جو شاندرہ اہل کے ساتھ پھنکائیں (۹) جنطیانا رومی حب الغار - مرکی - قسط بحری - سنج - مجیہ گوگل عصاہ (فسنتین) - فردمانا مشکطرا مشیع - زراوند طویل - ایک ایک تولہ کوٹ چھان کر شہد خالص ۳۵ تولہ میں ملا کر رکھیں - مقدار خوراک ایک ایک تولہ سے ڈیڑھ تولہ تک ہے -

فصل انتیسویں - (رجایا حمل کا ذب راسپیوریس پر کنین سی) یعنی جھوٹا حمل - اس مرض میں یا تو رحم کے اندر خراب فضلات جمع ہو جاتے ہیں - یا اس کی تمام ساخت میں یا اس کے کسی خاص حصے میں سختی پیدا ہو جاتی ہے یا رحم کے جوف میں فضلات روپیہ ریا ح پیدا ہو کر وہیں بند رہتی ہیں - یا ایک گوشت کا لوتھڑا سا پیدا ہو کر بڑھتا رہتا ہے اس لئے مریضہ کا شکم حاملہ عورت کے شکم کی طرح سے روز بروز بڑھتا جاتا ہے اور ابتدا میں تین چار مہینے تک مریضہ کو حمل کا دھوکا رہتا ہے -

کیونکہ اس مرض میں سچے حمل کی طرح سے رحم کا منہ بند رہتا ہے اور حیض اکثر بالکل ہی بند رہتا ہے اور بعض حالتوں میں کبھی کبھی بے قاعدہ طور پر بخوڑا آکر تا ہے چونکہ مریضہ کو اس سے کچھ زیادہ تکلیف یا اپنی خیالی امید کے زائل ہونے کا خوف نہیں ہوتا اس لئے وہ اس حیض کے آنے کی زیادہ پروا نہیں کرتی ہے بلکہ وہ حتی المقدور کسی پر اس کی اظہار بھی نہیں کرتی اور ہر وقت اپنی خیالی امید کی دھن میں لگی رہتی ہے اس حیض کی بے موقع رکاوٹ یا بے قاعدگی سے مریضہ کے تمام بدن کی رنگت میں خصوصاً اس کے چہرے کے رنگ میں قدرے تیرگی اور بے رونقی پیدا ہو جاتی ہے اس کے پستان میں سختی اور تناؤ سا معلوم ہونے لگتا ہے - سر پستان کا رنگ سیاہی مائل اس کے گرد کا حلقہ قدرے اودا ہو جاتا ہے -

ان تمام علامتوں کے علاوہ اگرچہ مریضہ کی طبیعت نسبت سچے حمل کے کسی قدر زیادہ بضرہ اور کسلمندہ رہتی ہے۔ اعضا شکنی اور بدن کے مختلف مقامات کا درد اسے اکثر ستاتا ہے شکم میں نفخ و اقراق کی کثرت اور ضعف ہضم وغیرہ کی شکایت سے اکثر وہ بے چین رہتی ہے لیکن وہ ان سب تکلیفوں کو اپنی وہمی امید کے بھروسہ پر گوارا کر لیتی ہے۔ اسی حالت میں جب مریضہ کو تین چھ گزر چکے ہیں اور چوتھا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے شکم میں یا رحم میں کبھی کبھی ریاح کی حرکت محسوس ہونے لگتی ہے جس سے اس کا خیال اور بھی زیادہ بچختہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کرنے لگا ہے۔

لیکن اس کے بعد جب قدر زمانہ گزرتا ہے مریضہ کے بدن میں مرض کی سی تکالیف ظاہر ہونے لگتی ہیں اکثر اس کے چہرے پر ہنچ اور پاؤں پر درم (خو) داے ڈی (ما) اچھی طرح سے معلوم ہونے لگتا ہے اور بخلاف حاملہ عورتوں کی حالت کے مریضہ متفکر اور پریشان رہتی ہے اس کی تمام حرکات میں سستی اور کاہلی و سست ہمتی پائی جاتی ہے۔ پھر بھی وہ بچہ پاری بچہ کی مان بننے کی امید میں تمام تکلیفوں کو بدستور جھیلی رہتی ہے۔ البتہ مدت حمل کے آخری زمانہ میں خصوصاً نو مہینے گزرنے کے بعد جب قدر وضع حمل میں تاخیر ہوتی ہے اسی قدر مریضہ اور اس کے رشتہ داروں کو فکر بڑھتا جاتا ہے اور مجبوراً طبیب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور طبیب اس مرض کے اسباب و علامات میں غور کر کے علاج شروع کرتا ہے

**اسباب۔** یونانی اطباء اس مرض کے دو سبب قرار دیتے ہیں ایک تو یہ کہ پیدائش جنین کا صرف نسائی مادہ (اووم) رحم کے اندر پہنچ کر کسی وجہ سے وہاں رکا رہ جائے اور چونکہ اکیلے مادے میں پیدائش جنین کی پوری قابلیت موجود نہیں ہوتی ہے۔ اسلئے صرف اسی سے طبعی طور پر مستقر حمل ممکن نہیں ہے اس وجہ سے مادہ رحم کے اندر خون حیض سے مدد پا کر ایک گوشت کے تو تھڑے کی صورت اختیار کرتا اور بتدریج بڑھتا رہتا ہے۔

دوسرے یہ کہ رحم کے مزاج میں کسی وجہ سے گرمی زیادہ پیدا ہو جائے اور فضلات رو بہ اس میں جمع ہو کر وہیں رکے رہ جائیں۔ پھر چاہئے ان ہی فضلات کی مقدار جو رحم میں روز بروز بڑھتی رہے یا ان سے ریاح پیدا ہو کر جمع ہوتی رہیں یا ان سے رحم کی

سند امراض نسوان

سند امراض نسوان



ساخت کے کسی حصہ میں یا تمام رحم میں ورم صلب پیدا ہو کر بدستور ترقی کرتا رہے بہر صورت مریضہ کی حالت حاملہ کے مشابہ ہو جاتی ہے اسی طرح سے بعض اطباء کا یہ بھی خیال ہے کہ اکثر اس مرض کا ابتدائی سبب مرض قلب الم رحم بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رحم کی گردن میں ورم صلب ہو جانے سے فم رحم بھی سخت ہو کر نہایت شدت سے بند ہو جاتا ہے اور اس کی ابتدا اکثر اس طرح سے ہوتی ہے کہ اول کسی سبب سے رحم کی گردن یا اس کی اندرونی جھلی میں التهاب (انفلامیشن) اور پھر ورم فلغمونی یعنی دموی پیدا ہو جاتا ہے۔ رحم کی اندرونی جھلی کے غدولعا پیدہ دیو کس گلیٹنڈر متورم ہو جاتے ہیں شروع شروع میں تو مریضہ کی شرمگاہ سے رفیق و سفید رطوبت بکثرت بہا کرتی ہے پھر وہ متوقف ہو جاتی ہے اور اگر کسی سبب سے رحم کے اندرونی سطح پر خفیف سی رگڑ ہو نیچے یا کوئی خراش دار تیز مادہ وہاں پہونچے تو رحم سے بکثرت خون بہنے لگتا ہے رحم کی اس حالت کو ڈاکٹری اصطلاح میں (سروائیبل انڈومٹرائٹس) کہتے ہیں۔ پھر جب ایک مدت کے بعد مادہ ورم کے لطیف اجزاء تحلیل ہو کر اس کے کشیف اجزاء باقی رہ جاتے ہیں تو وہ ورم سخت ہو جاتا ہے اور اسی سختی کے سبب سے فم رحم بند ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو یونانی اطباء قلب الرحم کہتے ہیں اگر اس حالت میں اندام نہانی کے اندر انگلی داخل کر کے ٹٹولا جائے تو رحم کے دونوں لب نہایت سخت اور اس کا منہ شدت کے ساتھ بند محسوس ہوا کرتا ہے۔ اس لئے ایسی حالت میں عورت کو استقرار حمل کسی طرح ممکن نہیں کیونکہ ایک تو فم رحم کے بند ہونے سے مرد کا مادہ منویہ رحم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ زخم کا مزاج نادرست ہونے کے سبب سے جنین کی پیدائش کا مادہ فاسد ہو کر استقرار حمل کے لائق نہیں رہ سکتا ہے۔ اور پھر بھی اگر اس حالت میں مریضہ کو حمل کی سی علامتیں ظاہر ہونے لگیں تو اکثر وہ سچا حمل نہیں ہوتا بلکہ اسے حمل کا ڈب سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ فم رحم کے بشدت بند ہونے کی حالت میں حیض کا خون اور دیگر فضلات ردیہ رحم کے اندر سے نکل نہیں سکتے اور اگر عورت کا مادہ منویہ (اووم) رحم کے اندر آئے تو وہ بھی وہیں بند رہتا ہے اس لئے رحم میں ان مادوں کے جمع رہنے سے یا تو ایک گوشت کا ٹوٹھڑا سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یا

ان سے ریا ح پیدا ہو کر رحم میں بھری رہتی ہیں۔ یا وہ فضلات اپنی موجودہ صورت میں ہی رحم کے اندر بھرے ہوئے اور بتدریج زیادہ ہوتے رہتے ہیں اور ان فضلات کی زیادتی کے سبب سے مریضہ کا پیٹ حاملہ کے پیٹ کی طرح سے روز بروز بڑھتا جاتا ہے یہ حالت ایک مدت تک بدستور قائم رہتی ہے اسی کو حمل کا ذب یا مرض رجائت کہتے ہیں۔

ڈاکٹروں کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ۱۰ زیادہ عمر ہو جانے کے سبب سے جن عورتوں کا حیض بند ہونے کو ہوتا ہے اکثر وہ عورتیں اس مرض میں مبتلا دیکھی گئی ہیں (۲) یا ان جوان عورتوں کو جنہیں اولاد کی زیادہ ارمو ہوتی ہے اور ہر مرتبہ اپنے آپ کو حاملہ خیال کرتی ہیں (۳) خصوصاً ان مستورات کو یہ مرض اکثر ہوتا ہے جو اختناق الرحم میں مبتلا ہوں (۴) یا ان عورتوں کو جو قدرتی طور پر وہمی طبیعت کی ہوں یا کسی قسم کے فساد تخیل میں مبتلا ہوں۔ غرض یہ ہے کہ اس مرض کے اسباب دریافت کرنے میں جہاں تک چھان بین کی گئی تو یہی معلوم ہوا کہ قوت متخیلہ ہی اس مرض کا بڑا گہرا تعلق ہے۔

تشخیصی علامات۔ اس حالت میں چار یا پانچ مہینے گزر جانے سے پہلے ایک تو خود طبیب کو ہی مرض مذکور اور حمل میں شبہ رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مریضہ اور اس کے رشتہ داروں کے دلوں میں بے ان کے جھے ہوئے خیالات کا دور کرنا اور حمل نہ ہونیکا یقین دلانا سخت دشوار ہوتا ہے اس لئے پانچ مہینے سے پہلے مرض کے موجود ہونے کا قطعی فیصلہ نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد اگر مریضہ کے حالات کی پوری تفتیش کی جائے اور علامات ذیل کو نہایت احتیاط اور غور و فکر کے ساتھ مختلف اوقات میں چند مرتبہ تلاش کیا جائے تو امید ہے کہ تشخیص مرض میں کافی امداد حاصل ہو سکے گی۔

(۱) مریضہ کا شکم حاملہ کی بہ نسبت عموماً زیادہ سخت ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے رحم میں کسی قسم کی فضلی رطوبات بھری ہوئی ہیں تو اس کے پیٹ پر دونوں طرف ہاتھ رکھ کر ایک ہاتھ کے دبانے سے اس رطوبت کی حرکت پانی کی لہروں کی طرح سے دوسرے ہاتھ کو محسوس ہوا کرتی ہے۔ اور اگر رحم میں ریا ح جمع ہوں تو ہاتھ کی ضرب اندرونی ہوا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دیکھو تصویر نمبر ۶۹

(تصویر نمبر ۶۹)



خیمہ کے تحت امتحان کر رہی ہے


(۲) مریضہ کو اپنے پیٹ میں بچے کی سی حرکت محسوس نہیں ہوتی ہے اور اس میں غیر معمولی بوجھ سا معلوم ہوا کرتا ہے اور اگر ہاتھ سے کسی طرف کو حرکت دی جائے تو عارضی طور پر قدر حرکت ہو جاتی ہے اگر مریضہ کے پیٹ پر مختلف جگہ آدھ صماعت الصوت (اسے ٹھس کوپ) لگا کر بچے کے دل کی حرکات سننی چاہیں تو ان کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ (دیکھو تصویر نمبر ۷۰)

(تصویر نمبر ۷۰)



یہ آدھ صماعت صوت ہے جس سے مریضہ کی دل کی حرکات سنائی دیتی ہیں۔

یہ آدھ صماعت صوت ہے جس سے مریضہ کی دل کی حرکات سنائی دیتی ہیں۔



مریضہ کو منیر پر لٹا ہے۔

Kamil 19/34

(۳) مریضہ کی طبیعت بہ نسبت حمل کے سست بدضرہ متفکر اور مغموم رہتی ہے اسکے بدن اور چہرے پر حاملہ کی سی رونق نہیں پائی جاتی ہے اس کے ہاتھ پاؤں میں سستی ڈھیلپان

اور کسل وغیرہ پائے جاتے ہیں بلکہ بعض موقع پر تو اس کے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر کسی قدر تہج راسے ڈی ما بھی ہو جاتا ہے۔

۴۴) کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کلوروفارم سنگھا کر مرضیہ کو بیہوش کریں تو عضلات شکم کے ڈھیلے ہونے سے پیٹ کی اونچائی غائب ہو جاتی ہے اور پھر جب اس دوا کا اثر زائل ہو جاتا ہے تو شکم بدستور ابھر آتا ہے اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دیگر اسباب کے علاوہ کبھی مرضیہ کے صرف خیالات اور اس کے اعصاب کی خاص شش سے بھی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے (۵) اگر مرضیہ کے رحم یا خصیتہ الرحم کی رسولی یا ان کے ورم سے اس کا شکم بڑھ کر حل یا مرض رجا کی سی حالت ہوگی، تو تو ان امراض کی خاص علامتوں سے اس کی تشخیص ہو سکتی ہے اور مرضیہ کے شکم ابھر اس ورم یا رسولی کی طرف سے شروع ہوتا ہے۔ بخلاف حاملہ کے کیونکہ اس کے شکم کا ابھار پیڑوں کے ٹھیک بیچ میں سے شروع ہو کر ہر طرف کو بڑھا کر تباہی علاج۔ اگر مرضیہ کے رحم میں یا عنق الرحم میں ورم سوداوی صلب یعنی مرض قبا المرحم (سروائکل انڈومتریٹس) موجود ہو تو (۱) اس کے متعلق تمام ہدایہ رو ہی ہیں جو ورم صلب رحم کی بحث میں بیان کی گئی ہیں

(۲) ان تدابیر کے علاوہ یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر مرضیہ قوی اور اس کے بدن میں خون کا غلبہ ہو اور نفخ خون سے بھری ہوئی اور قوی معلوم ہو تو قصد باسلیق یا قصد صافن سے بقدر مناسب خون نکالا جائے۔

۴۵) اور یہ نسخہ پلانا چاہئے صفتہ گل بنفشہ گل سرخ۔ بادیان۔ مکوہ خشک ہر ایک ۷ ماشہ مویز منقی ۹ دانہ۔ گاؤزبان۔ گل خطمی ہر ایک ۳ ماشہ رات کو پانی میں تر کریں صبح کو جوش دے کر مل چھان لیں اور نیمہ بنفشہ یا گلقدہم تولہ حل کر کے پلائیں۔ اگر مرضیہ کو گرمی اور پیاس وغیرہ کی شکایت ہو تو اسی نسخہ میں سپستان ۱۵ دانہ اور تخم خیاریں ۳ ماشہ اضافہ کریں (۴) اگر اس کے بعد ترقیہ کی ضرورت سمجھی جائے تو اسی نسخہ میں سنابلی ریشہ خطمی ہر ایک ۷ ماشہ۔ مغر فلوس۔ خیارشنبہ ۹ تولہ ترنجبین ۴ تولہ شیرہ مغر بادام شیریں متقشر ۷ عدد اضافہ کر کے مسہل دیں۔ اس دن بجائے پانی کے سونف اور کوہ کا عرق

یا ان کا جوشاندہ پلائیں۔ شام کو مونگ کی نرم کچڑی کھلائیں۔ دوسرے دن صبح کو معمولی تبرید کا نسخہ پلایا جائے (۵) اسی طرح کم سے کم تین مہل دینے کے بعد پٹر واور شکم پر یہ ضماو لگانا چاہئے صفقتہ مغز فلوس ایک تولہ۔ گل بابونہ۔ اکلبل الملک مرزنجوش۔ تخم میٹھی تخم خلمی مغز تخم ارند ہی ہر ایک چھ ماشہ سب کو باریک پیس کر زردی بیضہ مرغ ایک عدد۔ روغن گل ایک تولہ اس میں ملا کر نیم گرم ضماو کریں (۶) اور یہ فرز جہ صلابت رحم کے لئے نہایت مفید ہے صفقتہ۔ تخم خنشاں سفید۔ کنجد مقشر ہر ایک ۲ تولہ کوٹ کر گائے کے دودھ میں پکائیں اور خوب باریک پیس لیں پھر زعفران۔ کیترا۔ ایک ایک ماشہ۔ گوند لیکر۔ گل خلمی ہر ایک دو ماشہ باریک پیس کر اور انڈے کی زردی ۲ عدد۔ روغن گل۔ روغن خنا ایک ایک تولہ اس میں ملا کر نگاہ رکھیں۔ اس میں سے بقدر ضرورت لیکر باریک کپڑے کے ساتھ استعمال کریں (۷) ان تدابیر کے ساتھ ہی مریضہ کو آئرن میں بٹھانا اور تکمید کرنا بھی مفید ہوتا ہے صفقتہ۔ گل خلمی۔ گل بابونہ ہر ایک ۲ تولہ اکلبل الملک مکو خشک مرزنجوش۔ بادبان۔ تخم میٹھی۔ تخم السی۔ برگ کرتب ہر ایک ایک تولہ سب کو چا سیر پانی میں جوش دیکر صاف کریں اور چالیس سیر پانی گرم میں ملا کر کسی بڑے ٹب میں ڈالیں اور مریضہ کو اس میں بٹھاویں (۸) تکمید کا نسخہ یہ ہے صفقتہ۔ تخم سویہ۔ تخم کرفس۔ اجوائن دیسی۔ زیرہ سیاہ۔ با بڑنگ۔ آنہ ہلدی مغز خستہ شفتالو ہر ایک ۶ ماشہ۔ کنجد سیاہ ۲ تولہ۔ ناریل کہنہ ایک تولہ۔ سب کو نیم کوفتہ کر کے دو پوٹلیاں بنائیں اور لوہے کے توے پر گرم کر کے بقدر بر داشت سینکیں (۹) غذاؤں میں سے چوزہ مرغ یا حلوان کا گوشت اولطف چیز ہی بقدر مضحم کھلائیں اور تیز نک مرچ یا خشک چیزوں سے پرہیز کریں۔

ان تمام تدابیر سے رحم کی سختی رفع ہو کر وہ اپنی اصلی حالت پر آجاتا ہے اور غرق الرحم درست و نرم ہو کر فم رحم کا سوراخ اپنے معمول کے موافق کھل جاتا ہے۔ اس لئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرض بجائی حالت میں صرف اسی علاج سے پوری کامیابی حاصل ہوتی ہے اور کسی دوسری تدبیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے رحم کے اندر جو کچھ ہوتا ہے رخواہ وہ رطوبت متعفنہ ہو یا ریح یا گوشت کا لوتھڑا، اسے طبیعت یا تو خود بخود یا تھوڑی تحریک سے دفع کر دیتی ہے۔

ضماو مغل

نسوان

پیشہ

اور اگر ان تدبیروں سے نفع نہ ہو تو اس حالت میں وہ دوائیں استعمال کرنی چاہئیں جو رکے ہوئے حیض کو جاری کرنے یا جنین مردہ کو نکالنے کے لئے بیان کی گئی ہیں

ان کے علاوہ یہ نسخے بھی اس غرض کے لئے بہت مفید ہیں (۱) جو شانہ جو ریفہ کو پلایا جاتا ہے صفتہ - مشکطرا مشبع - بادیان - پرسیا و شال - مجیٹھ - اشتر غار ہر ایک ہر ایک ہر ایک تخم خرزہ - خار خشک - تخم کاسنی ہر ایک ۵ ماشہ شہد خالص ۱ تولہ - یا شربت بزوری ۴ تولہ سب کو آدھ سیر پانی میں جوش دیں جب ایک تہائی پانی باقی رہ جائے اسوقت چھان کر پلائیں - (۲) اور یہ جو شانہ بھی فائدہ کرتا ہے صفتہ - بادیان - تخم کاسنی - ہر ایک ۵ ماشہ انیسون - ترمس - مشکطرا مشبع اہل - ہر ایک ۵ ماشہ - گلقد ۲ تولہ (۳) یہ ضاد مریفہ کے پیڑ اور شکم پر کیا جائے - صفتہ - زیرہ سیاہ - صغتر - گل بابونہ - قردمانا - تخم کرفس ہر ایک ۵ ماشہ - جاوشیر - بلیکچ ہر ایک ۵ ماشہ - برگ کرفس سبز کے عرق میں یا پانی میں پیسکر ضاد کریں (۴) یہ شیاف اسقاط جنین کے لئے مجرب ہے صفتہ - مرکی - جاوشیر - کلکی - ہینگ - گندہ بہروزہ خشک - ہر ایک ۳ ماشہ باریک پیسکر گائے کے پتے میں ملائیں اور باریک بتیاں بنا کر ان میں سے ایک بتی فم رحم کے اندر رکھیں -

(۵) یہ آیزن جنین مردہ کو نکالنے اور صفائی رحم کے لئے بہت مفید ہے صفتہ - تخم میٹھی سداب - تخم السی - تخم فنجنگشت - تخم گذر - مکوہ خشک - مجیٹھ - ہر ایک ۲ تولہ شب کو پانی میں جوش دیکر صاف کریں - اور مریفہ کو بدستور اس پانی میں بٹھائیں -

اس طریقہ پر علاج کرنے سے رحم کی بخوبی صفائی ہو جاتی ہے - اس کے اندر چاہے گوشت کا ٹھٹھا ہو یا کسی قسم کی متعفن رطوبت ہو سب کچھ نکل جاتا ہے - اور اگر ضرورت سمجھی جائے تو فرزجہ کے ان نسخوں میں سے جو مناسب ہو استعمال کریں - ان سے بھی رحم کے اندر کی سڑی ہوئی رطوبت بہکے خارج ہو جاتی ہے -

(۱) فرزجہ - منقی رحم - اجود - باؤ بڑنگ - بہروزہ خشک ہر ایک ۴ ماشہ تخم سوینہ مکمل ہوئی ہر ایک ۲ ماشہ - سب کو باریک پیسکر شہد خالص گرم کئے ہوئے میں ملائیں اور پانی روئی کیساتھ

ملہ دیکھو بیان احتیاج حضی کا صفحہ ۱۸ سے ۱۹ تک اور جس قسم کا احتیاج ہو اسی کے موافق علاج کرو ۱۲ مؤلف

جو شانہ منقی رحم  
جو شانہ ضاد  
شیاف  
آیزن

فرزجہ منقی رحم

اندام نہانی میں فم رحم کے سامنے رکھیں (۲) ایضاً مجرب - فرکچور بہرہ خشک -  
لوگ ٹوپی دار - باؤڑنگ - نمک ٹاموری ہر ایک ایک ماشہ باریک پیسکرتل کے تیل  
میں ملائیں اور پرانی روئی اس میں آلودہ کر کے استعمال کریں (۳) ایضاً مرکبی - لوگ  
ایک ایک ماشہ باریک پیسکرتل پوٹلیاں بنائیں ان میں سے ایک پوٹلی فم رحم کو سامنے  
اور دو پوٹلیاں اس کے دونوں طرف رکھیں -

اگر دستوں کے ذریعہ سے رطوبت کا نکالنا منظور ہو تو مریض کو پہلے منضج کا نسخہ پلا کر  
اس کے بعد قوی مہل دینا چاہئے - اور ایسے موقع پر مہل کی یہ گولیاں بھی مفید ہوتی ہیں -  
نسخہ منضج - گل بنفشہ - بادیان - بیج کاسنی پر سیاوشاں - مکوہ خشک - تخم خسہ پڑہ  
ہر ایک ۵ ماشہ - مونیر منقی ۹ دانہ - عنب ۵ دانہ - گاؤربان ۵ ماشہ - خمیرہ بنفشہ ۵ تولہ -  
جوب مہل - جن سے رطوبت قیق دستوں میں نکلتی ہے اور مرض استسقا میں  
بھی فائدہ ہوتا ہے - قنطاریون - ماہی زہر ج - عصارہ افسنتین ہر ایک ایک ماشہ -  
غارلقون ایاچ فیکرا - ہر ایک ۲ ماشہ - تربد سفید ۳۰ ماشہ - تخم خنظل سفوفو نیا انگریزی -  
ہر ایک ۱۰ ماشہ - سب کو باریک پیس کر پانی میں ملائیں اور چمکے برابر گولیاں بنائیں -  
ان میں سے ایک گولی رات کو سوتے وقت مزق بادیان ۵ تولہ کے ساتھ کھلا دینی چاہئے  
ان سے ہر روز ایک دو مرتبہ اجابت کھل کر ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ پورے طور پر تنقبہ  
ہو جاتا ہے - اگر رحم میں ریاچ بھرے ہوئے ہوں تو انہیں تحلیل کرنا اور ان کے مادہ کا  
نکالنا ضروری ہوتا ہے - اس لئے ایسی حالت میں یہ نسخے بہت مفید اور مجرب ثابت  
ہوئے ہیں - (۱) جو شاندر محلل ریاچ رحم - تخم کرفس - انیسون - بادیان - تخم سداب  
قرمانا - فطر سالیون اجوائن دیسی ہر ایک ۳ ماشہ - گلقد ۲ تولہ (۲) ایضاً - بادیان -  
مکوہ خشک - مجیٹہ ہر ایک ۴ ماشہ - بیج بادیان - گوکھرو - تخم خرپڑہ ہر ایک ۶ ماشہ -  
گلقد ۲ تولہ - بقدر مناسب پانی میں جوش دیکر حسب دستور پلائیں (۳) آئرن -  
وضاد و محلل ریاچ - برگ سداب - پودینہ خشک - برنجاسف - مرزنجوش قنطاریون -  
تخ قلمی - زیرہ سیاہ انیسون - تخم سنہالو - تخم کرفس اجوائن دیسی ہر ایک ۶ ماشہ -

فرکچور

جوب مہل

جو شاندر محلل ریاچ رحم آئرن وضاد

سب کو پانی میں جوش دیکر صاف کریں اور اس پانی میں مریضہ کو بٹھائیں۔ ان دواؤ کا نقل باریک پیسکر نیم گرم لپ کریں۔

۴۴ نسخہ حمل - برگ سداب - پودینہ خشک - ابہل - نرچور - ہر ایک ۳ ماشہ باریک پیس کر مل کے نہایت باریک کپڑے میں چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنائیں اور ہر مرتبہ تین پوٹلیاں رکھیں ۱۵ حقنہ رحم گل بابونہ - اکیلل الملک - بادیان - انیسون - تخم سداب - تخم سویہ - تخم کرفس - تخم حرمل - اجوائن دیسی - زیرہ سیاہ - مرزنجوش - برنجاسف - افسنتین - درمنہ ترکی ہر ایک ماشہ سب کو آدھ سیر پانی میں نرم آنچ سے خوب پکائیں جب ایک تہائی پانی باقی رہ جائے صاف کر کے اس میں روغن قسط - روغن جنپلی - روغن نار دین ایک ایک تولہ ملا کر بذریعہ پیمکاری کے رحم میں حقنہ کریں۔

انجام مرض کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ باوجود ہر قسم کی عمدہ تدبیریں کرنے اور ہر طرح سے علاج میں پوری کوشش کرنے کے بھی مریضہ کی حالت زیادہ دنوں تک بدستور باقی رہتی ہے۔ سکم کا بڑھا و رفتہ بڑھتا جاتا ہے جس سے مریضہ کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے مریضہ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ کبھی مرض استسقا تک نوبت پہنچتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخر کار خود بخود یا علاج کے اثر سے مریضہ کو دردِ ذرد کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اور رحم کے اندر جو کچھ ہوتا ہے خدا کے فضل سے خارج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے موقعوں پر مختلف شکل کے بچوں کا پیدا ہونا سنا گیا ہے۔ مثلاً گچھوے کی صورت یا بندیر یا مرغ یا کتے یا بائٹھی یا سانپ کی صورت ہوتی ہے۔ یا صرف ایک گوشت کا سادہ تو کھڑا ہوتا ہے یا اس میں چھوٹی چھوٹی بہت سی انسانی صورتیں موجود ہوتی ہیں یا محض بطبقتضہ یا بکثرت ریاخ خارج ہوتی ہیں۔ ایسی صورت واقع ہونے کے بعد تمام وہ تدبیریں عمل میں لانی چاہئیں جو زچہ کے لئے کی جاتی ہیں لیکن مریضہ کی قوت کا خیال ہر طرح سے رکھنا چاہئے اور کوشش کرنی چاہئے کہ جہاں تک ممکن ہو رحم بہت جلد اپنے اندر کی آلائشوں سے اچھی طرح پاک اور صاف ہو جائے۔

ان تدبیروں کے بعد جب پورے طور سے اطمینان ہو جائے کہ رحم بالکل پاک



اور صاف ہو گیا ہے تو مقوی رحم دواؤں کا استعمال کرنا چاہئے تاکہ پھر اس میں کبھی شکم کا خراب مادہ جمع نہ ہونے پائے۔ اس فائدہ کے لئے یہ نسخہ بہت اچھا اور بار بار کامیاب ہے۔  
 صفحہ - جاوتری - لونگ - ناگ موتھ - ہر ایک ایک ماشہ - باجھر - وارچنی - انیسون ٹین خورد ہلدی - کندر چھالیہ کہنہ گوگل - مرا حور - مومیائی کافی - نبات سفید مغر خستہ زرد آلو -  
 مغر خستہ شفتالو مغر تولہ - مغر فندق - مغر بادام شیریں - مغر لپتہ - مغر اخروٹ  
 مغر نار جیل کہنہ ہر ایک ۲ ماشہ - گل سرخ مصطکی - ہر ایک چار ماشہ موم سفید ۲ ماشہ  
 روغن جینیلی ۴ ماشہ - چربی مرغ ۴ ماشہ - زردی بیضہ مرغ ایک عدد - آب گندنا تازہ -  
 ایک تولہ - پیسے کے لائق دواؤں کو باریک پس کر موم و چربی وغیرہ بچھلا کر اس میں  
 ملائیں - پھر اندے کی زردی وغیرہ ملا کر مثل مرہم کے بنائیں اور اس میں سے قدرے  
 لے کر باریک کپڑے کے ساتھ استعمال کریں۔

فصل تیسویں

فصل تیسویں - سَلَحَةُ الرَّحِمِ (یوٹرائن ٹیومر) یعنی رحم کی ساخت میں رسولی کا پیدا ہونا - اولاد زیادہ پیدا ہونے کے سبب سے یا کسی دوسری وجہ سے جن عورتوں کے رحم کی ساخت کمزور ہو جاتی ہے - اور ان کے خون میں رطوبات غلیظہ کی کثرت یا غلبہ سوداؤ کے سبب سے گاڑھا پن یا کسی دوسری قسم کا فساد موجود ہوتا ہے تو اس حالت میں تیس سال کی عمر سے پچاس سال کی عمر تک ان کے رحم میں کبھی رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ رسولیاں رحم کی ساخت کے عضلاتی پرت میں اکثر پائی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ جس قدر ان کی جسامت بڑھتی جاتی ہے اسی قدر ان میں سختی اور مریضہ کے شکم میں کلانی ظاہر ہو جاتی ہے شروع شروع میں ان کا پتہ چلنا بہت دشوار ہوتا ہے لیکن جب ان کے پڑھنے سے مریضہ کے پیڑوں میں اچھا پیدا ہوتا اور اس کا شکم بڑھنے لگتا ہے تو چند روز تک اسے حمل کا شبہ رہتا ہے۔

پھر جب اسے اپنے پیڑوں کے اندر غیر معمولی گرمی اور تناؤ کا درد محسوس ہوتا ہے۔

۱۔ بعض قسم کی رسولیوں کی جسامت کمبوتر کے اندے کے برابر اور بعض کی اغروٹ کی برابر ہوتی ہے اور بعض اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ ان کا وزن دس سینک بکتیس سینک ہو جاتا ہے اس حالت میں مرض مستعفا کا شبہ ہونے لگتا ہے ۱۲۔ سولف

اور اس کے بعد نہایت درد سے حیض کا خون بکثرت جاری ہو جاتا ہے تو وہ اسقاط حمل کا خیال کر کے اسے روکنے کی تدبیر کرتی ہے۔ اگر وہ ایسا کر سکی اور خون کا اخراج بند ہو گیا تو اس کے شکم کی کٹانی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر جریان حیض میں بندش نہ ہوئی تو چار پانچ دن میں وہ خود بخود کم ہو کر آخر کو بالکل رک جاتا ہے۔ اس کے بعد مریضہ کو چند روز کے لئے پیڑو کے اندر والی گرمی اور تناؤ کے درد کی تکلیف میں بہت کمی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد خلاف عادت کسی قدر خون آ جاتا ہے اور اسی طرح سے حیض کی بتقاعدگی بدستور شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب دوسرے مہینے میں بھی اسے پہلی طرح تکلیف ہوتی ہے اور اس کا شکم رفتہ رفتہ بڑھ کر حیض کے آنے سے اس کی تکلیف میں کسی قدر کمی ہو جاتی ہے تو اسے مرض کا خیال ہوتا ہے اور طبیب کی طرف رجوع کر کے اپنی سرگذشت سناتی ہے

## رسولیوں کی ساخت

اکثر یہ رسولی ریشہ دار عضلی ساخت کی ہوتی ہے اسے سلعہ لیفیہ (فائبر انڈیوم) کہتے ہیں اور کبھی اس کے اندر ایک قسم کا دانہ دار مادہ چربی کا سا مع قدرے ریشہ دار ساخت کے بھرا رہتا ہے۔ اسے سلعہ لیفیہ مرکبہ (مائی اوسارکوما) کہتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض دیگر اقسام کی رسولیاں بھی ہوتی ہیں جن میں چونے کی طرح کا سخت مادہ یا نہایت گاڑھی رطوبت بھری رہتی ہے اور کبھی سرطانی رسولیاں بھی ہوتی ہیں۔ کبھی ان کی افزائش مستند رست ہوتی ہے

کہ مدت تک بدستور رہتی اور بہت زیادہ


تکلیف کی موجب نہیں ہوتی ہیں اور

کبھی بہت جلد بڑھ کر تکلیف

دینے لگتی ہیں۔

دیکھو تصویر نمبر ۱ رحم کی رسولیاں صفحہ آئندہ پر

## تصویر نمبر ۱۷ رحم کی رسولیاں



رسولیوں کے مقامات۔ کبھی یہ رسولیاں رحم کی گردن کے قریب اور کبھی اسکے جسم والے حصہ میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کبھی صرف ایک رسولی کسی ایک جانب میں ہوتی ہے اور کبھی ایک سے زیادہ رسولیاں رحم کے اگلے حصہ میں اور پیچھے اور اوپر کی طرف کوئی ہیں۔ بعض مرتبہ رسولی رحم کے عضلی پرت میں اس کے اندر کی طرف طبقہ مخاطیہ (میوس کوٹا) کے نیچے ہوتی ہے اس لئے اس کو سلعہ تحت الغشائیدہ (سب میوس ٹیومر) کہتے ہیں۔ اس قسم کی رسولی رحم کے جوف کی طرف بڑھ کر اسے گھیر لیتی ہے۔ اور کبھی اس کے اندر کو لٹکنے سے اور اس کے بوجھ کی دائمی کشش سے رحم کی ساخت اندر کو پلٹ کر مرنس انقلاب الرحم (انورس آف یوٹرس) ہو جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ رسولیاں رحم کے عضلی پرت میں باہر کی طرف طبقہ مصلیہ (سیرس کوٹا) کے نیچے ہوتی ہیں اس لئے ان کو سلعہ تحت الصفاقیدہ (سب پے ری ٹونی آل ٹیومر) کہتے ہیں اس قسم کی رسولیاں رحم سے باہر کی طرف بڑھ کر اس کی ساخت پر اپنا دباؤ ڈالتی ہیں اس لئے اکثر اس تحول کی تنگ یا بچھک یا نکل بند ہو جاتی ہے۔ یہ رسولیاں کبھی تو رحم کو دھکیل کر اسے

دوسری طرف کو جھکا دیتی اور مرض میلان الرحم (دس پلیمس منٹ آف یوٹرسس) پیدا کرتی ہیں۔ اور کبھی ان کے دباؤ سے رحم کی ساخت اندر کو ٹٹک کر اس کے جوف میں پلٹ آتی ہے جس سے مرض انقلاب الرحم ہو جاتا ہے۔

اسباب (۱) مریضہ کے خون میں غلبہ بلغم سے گاڑباپن یا کوئی دوسرا فساد اور رسولیوں کے پیدا کرنے کی خاصیت موجود ہونا (۲) عورت کے کثیر الا ولاد ہونے یا کسی دوسرے سبب سے رحم کی ساخت کا نہایت کمزور ہو جانا (۳) مقتضائ سن یا کسی دوسری وجہ سے رحم کی طرف دوران خون کسی قدر زیادہ ہونا (۴) رحم کی کمزوری کے سبب سے اس میں دفع فضلات کی پوری قابلیت نہ ہونا (۵) یا رحم کی عروق پر کسی قسم کا دباؤ پڑنے سے اکثر اس کی ساخت میں اجتماع خون رہنا۔

علامات (۱) مریضہ کا شکم حاملہ عورت کی طرح سے رفتہ رفتہ بڑھنے لگتا ہے (۲) رسولی کے دباؤ سے مرض انقلاب الرحم یا میلان الرحم ہو جاتا ہے (۳) رحم کی ساخت میں اجتماع خون کے زیادہ ہو جانے سے اور رسولیوں کے دباؤ اور تناؤ سے مریضہ کو اپنے پیڑوں میں غیر معمولی گرمی اور تناؤ کا سادہ محسوس ہوا کرتا ہے (۴) مریضہ کو حیض نہایت درد کے ساتھ بکثرت آتا ہے لیکن اس کے وقت کا انتظام درست نہیں رہتا۔ (۵) اول تو اس حالت میں استقرار حمل ہی بہت دشوار ہوتا ہے اور اگر اتفاقاً مریضہ حاملہ ہو جائے تو کچھ دنوں کے بعد حمل گر جاتا ہے (۶) اگر رسولی رحم کی ساخت کے پچھلے حصہ میں ہوتی ہے تو معاً مستقیم پر دباؤ پڑنے سے مریضہ کو اکثر قبض کی شکایت رہا کرتی ہے۔ یا پیش کی طرح سے بار بار اجابت کا تقاضا ہوا کرتا ہے (۷) اسی طرح اگر رسولی رحم کی ساخت کے سامنے والے حصہ میں ہوتی ہے تو متناہ پر دباؤ پڑنے سے مریضہ کو بار بار پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے اور پیڑوں میں گرمی ہونے کے سبب سے پیشاب گرم سرخ اور جلن سے آیا کرتا ہے اور کبھی احتباس بول بھی ہو جاتا ہے (۸) اگر اندام نہانی یا مقعد میں انگلی داخل کر کے امتحان کیا جائے تو رحم کے باؤف حصہ میں سختی بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ اور قم رحم رسولی پر پھسلتا ہوا محسوس ہوا کرتا ہے (۹) مریضہ کو باوجود ان تکالیف کے بخار نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ یکایک زیادہ لاغر ہو جاتی ہے۔

علاج - مریضہ کو چند روز تک نیم تختہ منضج کا پلا کر مہل مناسب سے تنقیہ کامل کرایا جائے تاکہ رسولیوں کی افزائش موقوف ہو جائے اور مقامی دواؤں کے استعمال سے رسولیاں بتدریج تحلیل ہونے لگیں تنقیہ کے بعد مریضہ کو ہر روز آبن میں بٹھائیں یا اسکے شکم پر نطول کریں مادے کو تحلیل کرنے والے روغنوں کی مالش کریں اور اسی قسم کے ضما د لگائیں۔ ان کے علاوہ فرزجہ کے طریقہ پر بھی مناسب دواؤں کا استعمال کریں (۱) تختہ منضج - گل بنفشہ - بادیان - شاہترہ - منڈی - گل سرخ - مکو خشک - ہر ایک، ماشہ - تخم خرپرہ - پرسیاوشاں - گاؤزباں - تخم کثوث (پوٹلی باندھ کر) ہر ایک ۵ ماشہ سب کو پانی میں جوش دے کر گلفند ۳ تولہ حل کر کے اور چھان کر پلائیں (۲) اس کے بعد جب اریاج سے یا مبطوخ اقیتمون سے حسب قاعدہ تنقیہ کرائیں۔ لیکن ہر حالت میں مریضہ کی قوت کا پورے طور پر لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

(۳) نطول - گل بابونہ - اکیلل الملک - مرزنجوش - بیج سوسن - زوفا خشک - تخم سوہ - تخم قرطم - تخم خطمی - اسی ہر ایک ۲ تولہ - سب کو میں سیر پانی میں خوب لپکائیں - پھر چھانکر دواؤں کا نفل رہنے دیں اور صاف پانی کو لوٹے کی ٹوٹی کی باریک دھار سے مریضہ کے شکم پر ڈالیں اور ان ہی دواؤں کے پانی میں مریضہ کو بطور آبن کے بٹھانا بھی مفید ہوتا ہے (۴) آبن یا نطول کے بعد مریضہ کے شکم پر روغن بابونہ - روغن نرگس روغن سوہ روغن قسط وغیرہ کی مقدار مناسب مالش کرنی چاہئے (۵) ایلوہ - رسوت - مکوہ سبز کے پانی میں گھول کر اوزر رد کوڑیوں کی راکھ پرانی چربی میں ملا کر سب کو خوب مخلوط کریں - جب وہ سب یک ذات ہو جائیں تو مریضہ کے شکم پر لپیٹ کر کے اس کے اوپر سیسہ کا پلہ ایک ورق رکھ کر بانڈ دیا کریں - اس سے بھی رسولیاں تحلیل ہوجاتی ہیں۔

(۶) جناب حکیم اکمل خان صاحب مرحوم نے ایک نہایت عمدہ ضما و خنازیری مادے کو تحلیل کرنے کے لئے تجویز کیا ہے جو رسولیوں کو بھی تحلیل کرتا ہے - صفحتہ - تخم شقی ۳ ماشہ ایلوہ - مرکبی - اجوائن دیسی - تخم المی - ایرساہر ایک ۴ ماشہ - زراوند - مدر حرج - مرچ سیاہ پیلا مول - چرائے - گوگل - اشق راہیج قسط تلخ - فریون - ہینگ ہر ایک ایک تولہ - سب کو

باریک پسکر پانی کے ساتھ قرص بنا رکھیں۔ ان میں سے بقدر مناسب لیکر مکوہ سسبر اور کشنیر سسبر کے پانی میں گھسکر ضماد کریں۔

(۷) مرہم ریشل اور مرہم باسیلقون یا مرہم داخلیون کا مرکب کا استعمال بطور فرجہ کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ صفتہ۔ تخم السی۔ تخم میٹھی۔ اسپنول سلم۔ ہر ایک ایک ایک تولہ رات کو پانی میں بھگو کر ان کا لعاب نکال لیں۔ مردار سنگ ۳ تولہ۔ روغن زیتون ۱۰ تولہ۔ زرد آدھ میر میں پکائیں۔ جب تیل سیاہ ہو جائے تو دواؤں کا لعاب اس میں ڈال کر نرم آج سے پکائیں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو اس میں زفت رومی ۹ ماشہ۔ خاکستر شاخ انگور ۱ تولہ۔ ترس ایک تولہ باریک پس کر ملائیں۔ سب مل کر ریشل مرہم کے ہو جائے گا۔

(۸) مرہم زعفران مرکب بھی رحم کی رسیوں اور سختی کو تحلیل کرتا ہے۔ صفتہ۔ زعفران۔ ایلوہ گوگل۔ ایرسا ہر ایک ۴ ماشہ۔ جذبد ستر ۳ ماشہ۔ سب کو باریک پس لیں اور روغن بابونہ۔ روغن ارندی۔ روغن خا۔ روغن سوسن۔ ہر ایک ایک تولہ۔ موم زرد ۲ تولہ بگھلا کر پسی ہوئی دوائیں اس میں ملائیں اور بقدر مناسب لیکر گرم کر کے مریضہ کے شکم پر ضماد کریں۔ اسی میں تھوڑا سا لیکر بطور فرجہ کے بھی استعمال کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔

(۹) مریضہ کو آرام سے رکھنا اور ہلکی زود ہضم غذائیں کھلانا چاہئے۔ بادی اور نفاس چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

رسولیوں کے تغیرات اور مرض کا انجام۔ کبھی یہ رسولیاں خود بخود یا علاج کرنے سے تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی ان کا بڑھا موقوف ہو جاتا ہے۔ اور برسوں تک بدستور باقی رہتی ہیں اور مریضہ کو ان سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ان میں خون کم ہو کر چربی سی بن جاتی ہے اور کبھی چونہ کا سامادہ پیدا ہو کر اس جگہ رحم کی ساخت میں سختی ہو جود رہتی ہے کبھی رسولیوں کی جڑ پتی ہو کر اور ان کی جسامت بڑھ کر جوف رحم سے اندام نہانی تک آ جاتی ہیں۔ کبھی ان کی جڑ ٹوٹ کر اندام نہانی سے خارج ہو جاتی ہیں اور کبھی ان میں ورم ہو کر پک جاتا اور رحم میں زخم ہو جاتا ہے کبھی اس زخم سے بکثرت مواد اوپر چھپڑے نکلتا آرام ہو جاتا ہے

لہ مرہم اور دیگر مرکب دوائیں ہندوستانی دواخانہ دہلی سے نہایت عمدہ اور معتبر مل سکتی ہیں ۱۲ مؤلف۔

مرہم داخلیون

مرہم زعفران مرکب

اور کبھی سرطانی صورت اختیار کرتا ہے اور اس سے متعفن رطوبت زرد رنگ کی ہوتی رہتی ہے کبھی زخم سے رحم کی ساخت بالکل مر رہا ہو کر اس میں سوراخ ہو جاتا ہے اور غرض ورم الصفاق پر پری ٹونائیٹس ایک نوبت پہنچتی ہے۔ یا زخم اور پیپ کی سمیت خون میں سرایت کر جانے سے مرض ریٹے سی سی آ ہو کر مریضہ ہو جاتی ہے۔

**فصل التیسویں التهاب الصفاق الرحمی (پرری مٹرائیٹس) یعنی رحم کے طبقہ مصلیہ (سیرس کوٹ) کی سوزش۔** رحم کا یہ پرت صفاق البطن کا ایک حصہ ہے جو رحم کے بیرونی سطح پر امتز کرتا ہے۔ یہ مرض عورتوں میں بڑی کثرت سے ہوتا ہے شروع میں مریضہ کو اپنے پیڑ کے اندر گرمی اور جلن کے ساتھ سوئیوں کے چبھنے کا سادہ درد ہوتا ہے۔ شدت کے وقت لرزہ کے ساتھ بخار چڑھتا ہے رتلی اور تھے بہت ستاتی ہے۔ منہ کا مزہ کڑوا بھوک بہت کم اور پیاس زیادہ ہو جاتی ہے۔ مریضہ ہر وقت اپنے پاؤں شکم کی طرف سیکیٹ پڑی رہتی ہے پاؤں پھیلانے یا پیڑ پر دبانے سے درد زیادہ ہوتا ہے اور اگر مرض خفیف ہو تو یہ عوارض بھی کسی قدر کم ہوتے ہیں اس کے بعد اس مرض کی تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہو جاتی ہے (۱) مقام ماؤف کے سطح سے بہت سا آب غلیظ (سیرم) رسکر جوف عانہ میں جمع ہونے لگتا ہے جس سے مریضہ کا پیڑ واؤنچا ہو جاتا ہے (۲) مقام ماؤف سے رسکر جمع ہونے والی رطوبت پیپ بن جاتی ہے اور آب خون یا پیپ جوف عانہ میں سیروں جمع ہو سکتی ہے (۳) کبھی رحم کا ماؤف سطح اپنے قرب وجوار کے دوسرے اعضا کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔

**اسباب (۱) وضع حمل یا اسقاط عل کے صدمہ سے یا کسی دوسری وجہ سے** رحم کی ساخت کا ضعیف ہو جانا (۲) حیض کے دنوں میں رحم پر خارجی سردی کا اثر پہنچنے سے یا کسی دوسری بے اعتدالی سے احتیاس حیض ہو کر رحم کی ساخت میں بہت سا خون جمع ہو جانا (۳) مریضہ کے بدن میں سوزاکی نہ رہنا یا تشنہ فساد کا موجود ہونا اور تمام خون میں اس کا سرایت کر جانا (۴) خاص رحم یا شرمگاہ کے گہرے حصوں میں کوئی عمل جراحی کرنا۔ (۵) رحم کے اندر کوئی آلہ داخل کرنے میں بے احتیاطی واقع ہونا (۶) خیمیت الرحم میں

رسولیاں یا سرطان زہر کا موجود ہونا، خصیتہ الرحم یا قاذف نالیوں میں ورم ہونا۔  
 علامات (۱) اگر مرض شدید قسم کا ہوتا ہے تو مریضہ کو لرزہ کے ساتھ بخارا ہوتا ہے۔  
 (۲) متلی اور تے بکثرت ہوتی ہے (۳) مریضہ کے پیرو میں درد اسقدر شدید ہوتا ہے کہ  
 اس کے پیرو پر تھوڑا بڑا ڈالنے سے یا اس کو بدانے جانے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔  
 (۴) ریاخ کا اخراج نہ ہونے سے مریضہ کے شکم میں نفخ کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔  
 (۵) اگر مقام ماؤف سے رطوبت رسر جوف عانہ میں جمع ہو جاتی ہے تو مریضہ کا پیڑ و الجھیر  
 آتا ہے (۶) اندام نہانی میں انگلی داخل کرنے سے جوف عانہ میں آب خون دسیرم یا  
 پیپ کا اجتماع اور اس کی لہریں محسوس ہو سکتی ہیں۔

(۷) اگر رحم اپنے قرب وجوار کے اعضا سے چپٹ گیا ہو تو وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں  
 کر سکتا ہے اور اگر انگلی سے پایا جائے تو مریضہ کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔

یا در کھو۔ کہ یہ مرض اور رحم کی رسولیاں اور رحم کے قرب وجوار والے

اعضاء کا التهاب اور جوف عانہ میں خونی رسولیاں۔ یہ سب ایسے

ملنے جلتے امراض ہیں کہ جن میں باہم اشتباہ ہو سکتا ہے

اس لئے ان کی تشخیصی علامات اور باہمی امتیازات

کو نقش ذیل سے اپنے ذہن میں خوب

جالینا چاہئے

(دیکھو نقشہ صفحہ آئندہ پر)



# امراض نذریہ ذیلی کے لئے تشخیصی علامات کا نقشہ

سلعہ ۱۲ الرحمہ	۱۱ انتہائی المعافۃ الرحمی	۱۰ انتہا عجبا ورات الرحم	سلعہ ۱۱ دموی عاصی
پوشیدہ اسباب فرت فرت انزاس ہوتی ہوتی ہے	اسباب مذکورہ بالا سے فعتہ قصر کی تکالیف ظاہر ہونے لگی ہیں۔	اگر کسی عمل جراحی یا استقلاط عمل یا وضع حل کے مدد سے ہوتا ہے۔	نذریہ نہانی کے علاوہ کسی قسم کی رکاوٹ سے یا کسی دوسرے سبب سے استسباب جین ہو یا پیڑ و کے تمام پرکونی سخت چوٹ لگے تو مرض از فعتہ شروع ہو جاتا ہے۔
بخار سے لرزہ مئی غیر ایڈیٹری ہد میں مائی الرحمہ جین کے فعلی میں ہد ادھیلا جین جین کی سکلیہ ہوتی ہے	بخار سے لرزہ کے متلی اور سے کثرت پیڑ میں درد شدید یا وضع شک ہوتا ہے	بخار اور لرزہ لازمی نہیں ہے	رحم وغیرہ کی رگوں میں کو فعتہ خون بہہ جوف عارض نہیں جمع ہو جانے سے مرینہ کوٹے کی ہوتی اور ضعف ہو کر کئی تک نوبت پہنچتی ہے۔
تختی ناسخ رحم کی سببیں ہوتی ہر الہا لہذا کحت ہوتا اند کے ساتھ حکمت ہوتا ہے۔	تختی رحم کے سائز یا پچھلے محسوس ہوا کرتی ہر ابھلا کر رحم کی پچھلے محسوس ہوا کرتا ہے	رحم کے دونوں طرف تختی محسوس ہوا کرتی ہر ابھلا سائز یا پچھلے محسوس ہوا کرتا ہے	رحم کی ساخت سالم ہوتی ہے۔
ابھلا رگوں اور جلد و دوتا ہے	ابھلا پھیلا ہوا ہوتا ہے	درد کا ابھلا زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہوتا۔	درد کا ابھلا زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہوتا۔
رحم پر طرف کو کت کرکٹا ہے۔	رحم اکثر اپنی جگہ پر جکڑا رہتا ہے۔	رحم ایک طرف کو جکڑ جاتا ہے۔	رحم مخالف جانب کو مائل ہو جاتا ہے۔
مرینہ کو اپنی اپنی سکلیہ سے تڑپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔	مرینہ اپنی دونوں رانیں سکلیہ سے پڑی رہتی ہے۔	ماؤں جانب کی رانیں سکلیہ سے ہوتی ہے	اس میں نہیں۔

**علاج۔** اس مرض کی ابتدا میں نہایت مستعدی اور ہوشیاری کے ساتھ ایسی تدبیریں کرنی چاہئیں جن سے التهاب میں فوراً کمی اور خون کی حدت میں بہت جلد تسکین ہو جائے۔ چنانچہ اگر مریضہ کا مزاج گرم اور اس کے بدن میں خون غالب ہو اور قوت بھی کافی ہو تو سب سے پہلے قصد باسلیق یا صافن کے ذریعہ سے بقدر مناسب خون نکلا دینا چاہئے (۲) اس کے بعد تریکا یہ نسخہ پلا یا جائے صفتہ۔ لعاب گل خطمی ۳ ماشہ شیر مکوہ خشک شیر بادام ہر ایک ۵ ماشہ۔ شیر غلاب ۵ دانہ۔ عرق مرکب مصفی خون یا عرق شاہترہ ۱۰ تولہ۔ شربت نیلوفر یا شربت بنفشہ ۲ تولہ۔ خاکسی ۳ ماشہ (۳) پھر صبح کو ہر روز یہ نسخہ منضج کا پلا جائے صفتہ۔ گل بنفشہ۔ گل نیلوفر۔ منڈی۔ شاہترہ۔ ہر ایک ۵ ماشہ۔ مکوہ خشک گل خطمی۔ تخم خیارین۔ ہر ایک ۵ ماشہ۔ غلاب ۵ دانہ۔ رات کو پانی میں نر کریں اور صبح کو محض کباب مکوہ سبز مرقق آب کاسنی سبز مرقق ہر ایک تین تولہ۔ خمیرہ بنفشہ ۴ تولہ ملا کر صبح (۴) ضمد۔ مکوہ خشک ایک تولہ۔ مغز الماس ۹ ماشہ۔ جو کا آٹا۔ گل خطمی صندل سرخ۔ صندل۔ گل سرخ پانی کی کائی ہر ایک ۶ ماشہ۔ سب کو باریک پسکر آب مکوہ سبز بقدر حاجت اور سرکہ خالص ۶ ماشہ روغن گل ایک تولہ میں ملائیں اور نیم گرم ضمد کریں۔

(۵) فرزجہ۔ مکوہ خشک۔ جو کا آٹا۔ رسوت۔ صندل سرخ۔ صندل سفید۔ گل ارمنی۔ حدود ار اصلی ہر ایک تین ماشہ۔ آب مکوہ سبز۔ آب کشیر سبز ہر ایک بقدر حاجت میں نہایت باریک پسکر باریک کپڑے یا روئی کے ساتھ بطور فرزجہ کے استعمال کریں۔

انتہائے مرض کے زمانہ میں اگر مہل کی ضرورت سمجھی جائے تو منضج کا نسخہ نمبر ۳ ملا کر اسی میں گل سرخ۔ سنارکلی۔ ریشہ خطمی ہر ایک ۵ ماشہ۔ مغز الماس ۶ تولہ اضافہ کر کے شیرہ مغز بادام شیریں ملا کر حسب دستور تین مہل دیے جائیں اور اگر مہل کی زیادہ ضرورت نہ سمجھی جائے تو مریضہ کو دوسرے یا تیسرے دن روغن ارمنی و گرم پانی حقنہ (اینی) کر دینا اکثر کافی ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ضمد کے نسخہ میں گل بابونہ۔ تخم خطمی۔ اکلیل الملک اضافہ کریں اور بجائے مذکورہ با فرزجہ کے یہ مرہم استعمال کرنا چاہئے صفتہ۔ گل خطمی۔ گل بابونہ۔ مکوہ خشک۔

تخم خطمی ہر ایک ۹ ماشہ پانی میں نرم آئنج سے خوب پکائیں جب یہ تمام دوا میں خوب گل جائیں تو پانی کو چھان کر اس میں روغن گل - روغن بنفشہ ہر ایک ۲ تولہ ڈال کر نیم آئنج سے پھر پکائیں جب پانی خشک ہو کر صرف تیل باقی رہ جائے تو اسے صاف کر کے اس میں موم سفید ۶ ماشہ - چربی بکری کے گردہ کی ایک تولہ اضافہ کر کے اس میں معطلی - کسندر - صندل سفید ہر ایک ۳ ماشہ - زعفران ایک ماشہ نہایت باریک پسکر ملائیں اور ضرورت کے وقت اس میں سے قدرے لیکر اندے کی زردی ایک عدد آب مکوہ سبز بقدر حاجت ملا کر استعمال کریں۔

ان تمام تدابیر کے علاوہ آئرن کا یہ نسخہ بھی بہت مفید ہے صفحہ - گل خطمی - گل نیلوفر - گل بابونہ - اکلیل الملک - تخم خطمی - تخم خربزہ - تخم اسی ہر ایک ایک تولہ جو منقشر سبوس گندم - گل سرخ ہر ایک ۲ تولہ برگ خطمی سبز - برگ کرب سبز - برگ کاستی سبز ہر ایک ۵ تولہ شلغم تازہ چھند زنا زہ مع برگ ہر ایک دس تولہ - سب کو چالیس سیر پانی میں اسقدر پکائیں کہ خوب گل جائیں اور پانی کو صاف کر کے مریضہ کو اس میں ایک گھنٹہ تک بٹھائیں اور اگر اسی پانی سے نطول بھی کرایا جائے تو مفید ہوگا۔ نطول یا آئرن کے بعد مریضہ کے پیرو پر روغن حسا یا روغن مثبت کی مالش کر کے گرم روئی باندھ دینی چاہئے۔ باقی تمام تدابیر وہی ہیں جو دم رحم گرم کے علاج میں بتائی گئی ہیں۔

لیکن اگر مریضہ کے بدن میں خشکی زہر یا سوزا کی مادہ موجود ہو تو اسکے خاص علاج سے غافل نہیں رہنا چاہئے اور نرم بستر پر آرام سے لیٹی رہنے دیں اور ایسی غذا کھلائیں جس سے خون میں حدہ پیدا نہ ہو۔ اور اجابت نرم ہوتی رہے۔ اور مکان کی صفائی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

انجام مرض - اگر تمام تدابیر عمدہ طور پر میسر ہوں تو اکثر دو یا تین ہفتہ میں مریضہ کو آرام ہو جاتا ہے اور اگر یہ مرض بڑھ جائے تو اس سے وہم الصفاق (ریری ٹونائیٹس) ہو جائیگا اندیشہ ہوتا ہے یا کوئی خوفناک پھوٹا بن کر خاص حم کے اندر گویا اندام نہانی کی طرف یا شانہ یا مہا مستقیم کی طرف پھوٹ سکتا ہے اور اگر مادہ مرض کا فساد یا اسکی عفونت خون میں سرایت کر جائے یا زخم کی پیسپ خون میں جذب ہو جائے تو اسے مرض فذازۃ الدم (سپٹیمیآ) پیدا ہو کر مریضہ ہلاک ہو جاتی ہے۔

**باب دوم میں رحم کے جملہ امراض تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں۔ لیکن دو تین مرض ایسے ہیں جن کا ذکر مستقل طور پر نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ دوسرے مرض کے اسباب میں ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایسے امراض کا بھی الگ الگ بیان کر دیا جائے۔ اس میں طلبات و ناظرین کو سہولت ہوگی۔ وہ امراض یہ ہیں ۱۔ سور مزاج۔ ۲۔ ضعف رحم۔ ۳۔ عظم الرحم۔**

**سور مزاج رحم۔** بدن انسان کے ہر عضو کا مزاج خاص ہے اور ہر عضو کی ساخت جداگانہ ہے تمام امراض مزاج یا ساخت کے متغیر ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔

**سور مزاج کی دو قسم ہیں۔ سازج۔ مادی۔ سور مزاج مادی۔** اور ساخت کے تغیرات کے امراض اپنی موٹی موٹی اور ظاہری علامات و عوارضات سے بخوبی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن سور مزاج سازج جبکہ اس کے ساتھ مادی عوارضات اور ساخت کی خرابیاں واقع نہیں ہوتی ہیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا نہ اس کی طرف معالج کا ذہن منتقل ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض مستورات کے رحم کا مزاج اصلی متغیر ہو جاتا ہے اور ساخت میں کوئی خرابی نہیں ہوتی جیسے بعض اقسام اختناق الرحم اور بعض اقسام عقر محض سور مزاج سازج حار یا بارد ہوتی ہیں۔ آلات و دیگر ذرائع سے ڈاکٹر نیاں و داکیاں رحم کی جسمانی ساخت میں کوئی تغیر نہ پا کر تشخیص میں حیران ہوتی ہیں اور ان کے بیان کے مطابق معالج طبیب یا ڈاکٹر بھی تشخیصات و عصبی خرابی کہہ دیتے ہیں اور اصلی سبب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ایلوپتھیک میں مزاج سے بحث ہی نہیں کی جاتی اس لئے وہ تو اس بات پر بھنبھنبیں کہ اختناق الرحم کی جس مریضہ میں مواد اور ساخت کی خرابیاں موجود نہیں ہوتیں اسے عصبی بیماری کہہ دیتے ہیں اور اصلی سبب جس سے اعصاب میں یہ خرابی ہوئی ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ سبب نامعلوم۔ لیکن طبیب و طبیبہ مزاجی اصول کے مطابق غور و خوض کر کے صحیح نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایسے مشاہدات پیش آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں کہ بعض مستورات کی تمام جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے۔ رحم میں کوئی مادی یا ساخت کی خرابی نہیں ہوتی۔ ماہواری حیض ٹھیک آتا ہے اور اختناق الرحم کے دورے ہوتے ہیں یا حمل قرار نہیں پاتا۔ ایسے حالات میں منع حمل کے

اور اشتقاق کے دیگر اسباب نہیں پائے جاتے صرف حرارت یا برو دت۔ رحم اعصاب میں بڑھ جاتی ہے اس اصول کے مطابق مبردات و مخنثات سے علاج کیا جاتا ہے تو اکثر فائدہ ہو جاتا ہے۔ سو مزاج رحم کے اقسام۔ اسباب۔ علامات۔ علاج کی تفصیل عقر کے ضمن میں ہو چکی ہے۔

ضعف رحم۔ اس کی دو قسم ہیں۔ ایک یہ کہ قوت ماسکہ۔ جاذبہ۔ دافعہ۔ ہاضمہ (غاذیہ) ہو، مزاج کی وجہ سے کمزور ہو جائیں۔ دوسری یہ کہ ان قوتوں کی خرابی کے بعد رحم کی ساخت کمزور ہو جائے سو مزاج سے اولاً رحم کی قوتوں کے افعال خراب ہوتے ہیں پھر اسکی ساخت میں مختلف قسم کی خرابیاں ہو کر دیگر امراض پیدا ہوتے ہیں اور ان اسباب امراض سے رحم کی قوت پرورش ناقص و کمزور ہو کر اسکی ساخت تلی پڑ جاتی ہے۔ یہ دونوں قسم کا ضعف اکثر ہوتا ہے۔ اور بعض مستورات میں پیدائشی طور پر رحم کمزور ہوتا ہے۔ ضعف رحم کی تفصیل کثرت حیض کے ضمن میں گذر چکی ہے عظم الرحم۔ یعنی رحم کا بڑھ جانا۔ اس حالت میں رحم کی پوری ساخت موٹی اور دبیز ہو جاتی ہے دور بڑا ہو کر جو فراع مزاج ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے پیدا ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وضع حمل کے بعد رحم پورے طور پر سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر نہ جاسکے اور اسی حالت پر قائم ہو جائے۔ پھر اسکی تمام جسمانی ساخت دبیز اور موٹی ہونے لگتی ہے۔

اسباب۔ وضع حمل کے بعد جلدی چلنے پھرنے یا کام کرنے لگ جانا۔ متواتر حمل ہونا۔ بچگی میں عمدہ اور مقوی رحم غذاؤں کا نہ ملنا ان سب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رحم کے ریشیوں اور لیفات کی انقباضی رسکیٹر، قوت کمزور ہو جاتی ہے۔

تشخیص۔ انگشت داخل کرنے سے درد ہوتا ہے اور فم رحم موٹا اور کشادہ معلوم ہوتا ہے عنق رحم بڑی اور سخت معلوم ہوتی ہے۔ ساونڈ ڈھائی انچ سے زیادہ اندر چلا جاتا ہے پٹرو میں ابھار ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اسقدر بڑھ جاتا ہے کہ حمل یا رسولی کا شبہ ہوتا ہے۔ حمل اور رسولیوں کی دیگر علامات سے فرق کیا جاسکتا ہے جن کا بیان اپنی اپنی جگہ ہو چکا ہے۔

عظم الرحم کی پوری کیفیت معلوم ہونے کے بعد یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مرض بھی حمل قرار نہ پانے کا ایک قوی سبب ہے۔

علاج۔ صلابت رحم کے اصول سے علاج کریں۔ غذائیں لطیف و زود ہضم کھلائیں بعض دفعہ

اس مرض میں فم رحم پر زخم ہو جاتا ہے اور لب کشادہ ہو جاتے ہیں ایسی حالت میں فم کا علاج کریں۔ جب یہ مرض خفیف حالت میں ہوتا ہے تو مغوی اور لطیف غذاؤں کے دینے اور مریض کو آرام سے رکھنے ہی سے آرام ہو جاتا ہے۔

واضح رہے کہ جملہ امراض میں کثیر الوقوع ورم رحم اور سیلان رحم ہے۔ اکثر امراض رحم ان دونوں مرضوں سے ہوتے ہیں بلکہ مستورات کی دیگر بیماریاں بھی اکثر رحم کی خرابیوں سے پیدا ہوتی ہیں اسلئے طبیب اور طبیبہ کو لازم ہے کہ رحمی امراض میں ورم رحم کی طرف زیادہ توجہ کریں اور مستورات کی دوسری بیماریوں میں بھی رحم کے امراض و حالات کی طرف زیادہ خیال کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریضہ کو بخار ہے مسہل کی ضرورت پڑی ماسوائی حیض کا کچھ خیال نہیں کیا انہیں ایام میں مسہل دیدیا حیض رک گیا بخار شدید ہو کر سرسامی حالت ہو گئی۔ بعض مرتبہ ایسی بے احتیاطیوں سے مریضہ کو اختناق کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ علاج معالجہ کرنے والے حضرات کو ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ بڑھی عورت بیمار ہے اسکے بوڑھے ہوئی وجہ سے رحمی حالات کی طرف خیال نہیں ہوا اور اسکے مرض کا سبب ورم رحم ہے۔ مختلف قسم کے علاج ہوئے آرام نہیں ہوا جب اس طرف خیال کر کے علاج کیا تو صحت ہو گئی۔

النفص رحمی امراض میں عموماً ورم رحم کی ابتدا نکلتی ہے۔ اور مستورات کی دوسری بیماریوں میں بھی رحمی امراض کی شرکت یا معیت ہو کرتی ہے اور ورم رحم اتنا کثیر الوقوع مرض ہے کہ فیصدی نوے عورتیں اس میں مبتلا دیکھی جاتی ہیں جب ورم رحم عرصہ تک رہتا ہے تو دیگر حشرات کے افعال خراب ہو کر دوسری بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ دق بھی ہو جاتی ہے اور بعض مرتبہ اسکے عوارضات دق کے مشابہ ہونے سے معالج کو دھوکہ ہوتا ہے اور وہ دق کا علاج شروع کر دیتا ہے اور ورم رحم کے علاج سے غافل رہتا ہے۔ اس سے بجائے نفع نقصان ہوتا ہے۔ چونکہ ایسی مریضہ لاغر اور بہت کمزور ہوتی ہے۔ دق کا خیال ایسا قوی اور غالب ہو جاتا ہے کہ اصلی سبب کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا صحیح تشخیص ہی مشکل ہوتی ہے۔

طبیب اور طبیبہ کو ان سب امور کی طرف متوجہ ہو کر علاج کرنا چاہئے۔ یہ چند مشاہدات اور واقعات علاج کی عام واقفیت حاصل ہونے اور غلطیوں سے محفوظ رکھنے کی غرض سے لکھ دی گئی ہیں۔

# باب سوم

## امراض ملحقات رحم

اس باب میں خصیۃ الرحم اذقافون نالیوں اور رحم کے رباطات وغیرہ دوسرے ملحقات رحم کے امراض کا بیان ہے۔ یہ باب چند فصلوں پر مشتمل ہے اور ہر ایک فصل میں ایک لیک مرض کے اسباب و علامات مع مجرب علاج کے درج کئے گئے ہیں۔

**فصل پہلی۔** وجع خصیۃ الرحم (پین آف دی اوویری) یعنی خصیۃ الرحم میں درد ہونا۔ اس مرض میں عورت کو اپنے پیڑوں میں خصیۃ الرحم کے مقام پر گہرا درد محسوس ہوا کرتا ہے جو اکثر تو خصیۃ الرحم کے ورم یا زخم وغیرہ سے یا بعض امراض رحم کی شرکت سے ادھی اعضاء (سفسری نروز) کے تکلیف پاتے سے ہوتا ہے جسے ان امراض کی علامت سمجھنا چاہئے مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ ظاہر خصیۃ الرحم کا مقام اوپر سے کسی قدر اعلیٰ ہو بھی معلوم ہو جس سے خیال کیا جاسکے کہ یہ درد اندرونی ورم وغیرہ کے سبب ہے۔ لیکن اسباب مرض میں کامل غور کرنے سے بخوبی ثابت ہو جاتا ہے کہ درحقیقت خصیۃ الرحم یا رحم میں کوئی ظاہری مرض موجود نہیں ہے۔ ایسے ڈاکٹر لوگ اسے عصبی درد (نیورالجیا) کی اقسام میں شامل کرتے ہیں۔ اور یونانی اطباء کے نزدیک اس درد یا تو اعصاب اور دماغ کی کمزوری سے یا ان کی حس تیز ہو جانے سے۔ یا کسی عضو کے مزاج میں خرابی (سور مزاج گرم یا سرد) پیدا ہو جانے سے عارض ہوتا ہے

اکثر نازک مزاج عورتیں اس درد میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اور کبھی اختناق الرحم کی مریضہ کو بھی اس قسم کے درد کی شکایت ہوتی ہے۔ یہ درد اکثر نوبت سے ہوتا ہے۔ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی خود بخود کم یا بالکل موقوف ہو جاتا ہے۔ اور بائیں خصیۃ الرحم میں بہ نسبت دایہ کے زیادہ واقع ہوتا ہے۔ چلنے پھرنے سے اور حصین کے دنوں میں یا مباحثت کے وقت یا کو کھ پر ہاتھ وغیرہ کا دباؤ ڈالنے سے اکثر اس درد کی شدت ہو جاتی ہے۔ کبھی تو صرف خصیۃ الرحم میں ہی ہوتا ہے۔

اور کبھی تمام جوف عاز میں پھیل جاتا ہے۔ اس وقت مریضہ کو پیشاب درد اور عین سے مھوڑا مھوڑا بار بار آتا ہے۔ اسی طرح اجابت کے وقت بھی اسے تکلیف ہوتی ہے۔

**اسباب**۔ ڈاکٹروں کے نزدیک تو اس قسم کے درد کا سبب صرف عصبی خرابی ہے لیکن یونانی اطباء کے مسلک پر اس مدعا کی شرح اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر دماغ یا حسی اعصاب میں کسی قدر کمزوری پیدا ہو جائے یا کسی عضو کی عصبی حس اپنے معمول سے زیادہ ہو جائے۔ تو پرورش عضوی کے متعلق اندرونی تغیرات (جو حسب معمول ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں ان) سے بھی اذیت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی عضو کے مزاج میں گرمی یا سردی وغیرہ دفعتاً اپنے معمول سے کسی قدر زیادہ ہو جائیں تو اس حالت میں بھی حسی اعصاب اس ناگوار تغیر کا احساس کرتے ہیں۔ اور اسی کا نام درد ہے۔ اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ عصبی درد یا تو ضعف دماغ و اعصاب سے یا اُن کی حس تیز ہو جانے سے ہوتا ہے۔ اور یا کسی عضو کے مزاج میں خرابی پیدا ہونے سے۔

**علاج (۱)** اگر ضعف دماغ و اعصاب اس مرض کا سبب ہو تو پہلے کمزوری کے اسباب دریافت کر کے انہیں رفع کرنا چاہئے۔ اور پھر دماغ و اعصاب میں قوت پیدا کرنے والی چیزیں استعمال کرنی چاہئیں۔ جیسے حریرہ بادام وغیرہ کا یا خمیرہ گاؤزباں۔ اور مقوی غذائیں کھلائی جائیں۔ (۲) اور اگر عصبی حس تیز ہو گئی ہو تو اسے کسی قدر سُست کرنے کے لئے ایسی چیزوں کا استعمال کریں جن سے ادراج دماغی میں غفلت پیدا ہو اور اخلاط بدنہ کا رُطبہ پیدا ہوں جیسے حریرہ خشک اور معجون برشغشا وغیرہ اور بکری کی سری یا اس کے اشتاء لطینہ کا شوربا یا حلیم وغیرہ (۳) اگر خصیۃ الرحم کے مزاج میں گرمی یا سردی کا غلبہ ہو جائے تو اس کی درستی اور تعدیل کرنی چاہئے۔ چنانچہ سو مزاج گرم کی حالت میں مریضہ کو ٹھنڈی دوائیں پلائیں۔ جیسے شیرہ تخم خرفہ اور شیرہ تخم کاسنی۔ شربت نیلوفر وغیرہ۔ اسی طرح صندل سفید کشتیز خشک۔ گل سرخ کدو سفید کے چھلکے۔ گل ارمنی۔ پوست خشتخاش۔ پانی کی کافی۔ سب کو پانی میں پیس کر قدرے سرکہ خالص اور گلاب اضافہ کر کے پیڑ درضاد کریں۔ اور صرف اس پھول مسلم گلاب میں جھگو کر ضاد کرنا

لے جیسے عسماؤن کی رگوں میں غذا لٹی مادہ کا انتہام اور اعلیٰ معمولی تغیر وغیرہ ۱۲۔ محمد عبدالرزاق



بھی کافی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خشک شش سفید مکاری کے دودھ میں پس کر روئی کے ساتھ اندام سہانی میں رکھنے سے یا ٹھنڈے پانی میں کپڑا تر کر کے پیڑ و پیر رکھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

(۴) اگر پیڑ و پیر خارجی سردی لگنے سے یا سرد چیزیں زیادہ کھانے سے خفیۃ الرحم میں سردی پیدا ہو کر دھڑکنے لگے تو مرہضہ کے پیڑ و پیر گرم رہنموں کی مالش کرنی چاہئے۔ اس غرض کے لئے روغن بالونہ روغن قسط۔ روغن مہطلی وغیرہ عمدہ ہیں۔ اسی طرح گرم دواؤں سے تسکید کرنی بھی مفید ہوتی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو مرہضہ کو حلوا گھیکوار یا کوئی مناسب معجون کھلائیں۔

(۵) اگر درد کی نہایت شدت ہو تو ہر قسم کے درد میں ایسی دوائیں بھی استعمال میں لائی جاسکتی ہیں جن سے مرہضہ کو درد کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ جیسے کھلانے میں یا مقامی طور پر مخدرات (اینی سٹھیک) اشیاء کا استعمال کرنا چنانچہ اس غرض کے لئے معجون برشتشا بقدر مناسب کھلانا اور پوست خشک شش اور گل بالونہ پانی میں بکا کر اس سے تسکید کرنا بہت مفید ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحبان بھی ایسے موقعہ پر لے فی منٹ بلا ڈونا اور لے فی منٹ اکوناٹ ہڈرے کلور افارم کے ساتھ ملا کر مقام ماؤنٹ پر مالش کراتے اور پٹاسی برومائیڈ کھلاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاھن سائٹراس ایک گرین اور کونائن دو گرین ملا کر عرق گاؤزباں ۵ تولہ کے ساتھ کھلاتے ہیں۔ اور ہر روز ایسی تبن پڑیاں کھلانے سے درد کو نفع ہوتا ہے۔

ڈاکٹر رحیم خاں صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے لئے دو دوائیں بہت مفید ہیں جن پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ ایک کونائن ہے جو نیورالجیا کی دیگر صورتوں کے درد کی طرح اس درد میں بھی فائدہ کرتی ہے۔ اور دوسری دوا کانام "وے لی ری انٹ آف زنگ" ہے۔ مگر اس کے استعمال میں ایک تو یہ قیاحت ہے کہ اس کا ذائقہ عرصہ تک منہ میں رہتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے کھانے سے بُری ڈکاریں عرصہ تک آتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر اس کی گولی بنا کر چاندی کے ورق میں لپیپ کر کھلائی جائے تو اس کے یہ دونوں عیب رفع ہو جاتے ہیں۔

**فصل دوسری۔** التهاب خُصیۃ الرحم (انفلامیشن آف دی اوویری) یعنی عورتوں کے خفیۃ الرحم میں سوزش اور سرخی پیدا ہونا۔ یہ مرض نوجوان لڑکیوں کو اکثر خون جین کی خرابی اور بیقاعدگی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے زیادہ عمر والی عورتوں کو خفیۃ الرحم کی کمزوری سے یا کثرت

مباشرت سے یا پیڑ کے مقام پر چوٹ وغیرہ لگنے سے ہو جاتا ہے۔ خصوصاً جبکہ ان کے خون میں کسی وجہ سے زیادہ گرمی پائی جائے۔

**اسباب** (۱) خصیتہ الرحم کی ساخت میں کسی وجہ سے کمزوری موجود ہونا (۲) کسی سبب خون میں جدت پیدا ہونا (۳) کثرت مباشرت سے یا چوٹ وغیرہ سے خصیتہ الرحم کو اذیت پہنچنا (۴) کسی نفع سے کوئی تعزیر و فاسد رحم یا اندام نہانی میں رکھنا (۵) کسی سبب دفعتاً معمولی اخراج کا ٹوک جانا۔

**علامات** (۱) اسباب مذکورہ بالا کے واقع ہونے سے ایک یا دو روز کے بعد مریضہ کو اپنے پیڑ و لگن کو لکھ میں ایک طرف یا دونوں طرف گرمی اور جلن کے ساتھ قدرے درد محسوس ہونے لگتا ہے۔

(۲) پیشاب جلن سے آتا اور اکثر قیض شکم رہتا ہے (۳) پیاس بہت لگتی ہے اور بھوک بہت کم ہو جاتی ہے (۴) مریضہ کو اکثر سہار منہ متلی ہوتی ہے۔ اور ابکائیاں آتی ہیں۔ اور کسی دن صغیر اوی نئے

بھی ہو جاتی ہے (۵) مریضہ کا دل ہر وقت بے چین رہتا اور کسی قدر بخار بھی ہوتا ہے (۶) کپڑے ہونے کے وقت یا ایام معمولی کے موقع پر یا مباشرت کے وقت درد کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔

(۷) اس مرض کی حادثہ کے ساتھ بخار بہت تیز ہوتا ہے۔

**علاج** (۱) مریضہ کو چند روزیہ نسخہ صبح کے وقت پلائیں صفت مکہ خشک۔ تخم خلی۔ تخم خیارین شامترہ۔ مسندی ہر ایک ۵ ماشہ۔ گل نیلوفر۔ پرسیا و شاں ہر ایک ۵ ماشہ۔ رات کو پانی میں جھگو کر صبح کو صاف کریں اور گھنٹہ ۳ تولہ اس میں حل کر کے خاکسی ۵ ماشہ کے ساتھ پلائیں۔

(۲) شام کو قریب چار بجے کے عرق شامترہ سات تولہ۔ آب مکہ سبز ۳ تولہ۔ شربت سفید ۲ تولہ حل کر کے پلائیں۔ اگر مریضہ کا مزاج زیادہ گرم اور مرض حادثہ کا ہو تو لعاب بہدانہ ۳ ماشہ۔ شیرہ قنار ۵ دانہ۔ عرق مکہ۔ عرق شامترہ ہر ایک ۵ تولہ۔ شربت نیلوفر ۲ تولہ کے ساتھ پلائیں (۳) درد کی

تشکین اور مادہ مرض کو تحلیل کرنے کی غرض سے پوست خشناب ایک تولہ۔ گل سرخ۔ گل بابونہ ہر ایک ۲ ماشہ۔ دوسیر پانی میں پکا کر اسفنج کے ذریعہ سے مریضہ کے پیڑ پر تکیہ کریں۔

(۴) اگر ضرورت ہو تو مریضہ کے پیڑ و سر محلکات کا ضا د بھی کریں۔ یا نمبر ۳ کی دواؤں کا نفل باریک پسیر اس میں قدرے روغن گل ملا کر پیڑ پر نیم گرم باندھ دیں۔

(۵) مریضہ داخلین آب مکہ سبز اور سفیدی سفیدہ مرغ کے ساتھ بطور فرجہ کے استعمال کرنا بھی مفید ہے۔

(۶) اگر حصیہ کے بعد وقت بند ہو جائے سے مرض پیدا ہوا ہو تو اس کے اسباب تلاش کر کے ان کے سوا وقت علاج کرنا چاہئے۔

(۷) اندام تنہائی میں کسی تیز و اکافر زجر رکھنے سے مریضہ کو منع کریں۔ اور کثرت مباشرت سے بچائیں۔ رحم اور حصیۃ الرحم کو تقویت پہنچانے کی تدابیر عمل میں لادیں۔  
**انحجام مرض**۔ اگر ابتدائے مرض سے ہی مریضہ تنہا رہے مطب میں آئے تو مذکورہ بالا طریقہ پر علاج کرنے سے بہت جلد آرام ہو جانے کی قوی امید کی جاسکتی ہے۔ اور اگر ابتدا مرض کا زمانہ گزر جانے کے بعد خصوصاً شدت عوارض کے وقت علاج شروع کیا جائے تو علاج کسی قدر مشکل ہوتا ہے اور مریضہ کی حالت نازک ہوتی ہے۔ اس پر بھی اگر مرض قابو میں نہ آئے تو کبھی التهاب کے زیادہ ہو جانے سے ورم حصیۃ الرحم تک نوبت پہنچتی ہے۔ پھر اگر وہ ورم تحلیل نہ ہو سکے تو پیکر زخم ہو جاتا ہے۔ جسکی پیپ اندام تنہائی یا معامہ مستقیم کی طرف کو پھوٹ کر بہا کرتی ہے اور یا جوف عانہ کے اندر جمع ہو کر مریضہ کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ورم پکنا نہیں بلکہ سخت ہو کر ایک مدت تک بدستور قائم رہتا ہے اور اس جگہ پر ایک سخت گرہ سی باقی رہ جاتی ہے۔

اگر حصیۃ الرحم کا التهاب ابتدا سے ہی مزمن متم کا ہوتا ہے تو اس میں مریضہ کو دروغیہ کی زیادہ شکایت نہیں ہوتی۔ اسلئے وہ علاج کی بھی کچھ زیادہ پرواہ نہیں کرتی۔ اور خفیف سی نکالین کی برداشت کرتی رہتی ہے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ حصیۃ کی ساخت پر ایک پردہ کاذب رفتہ رفتہ التهابی مادہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا بیان پانچویں فصل میں آئے گا۔

**فصل تیسری ورم حصیۃ الرحم (اور برائی نش)** یعنی حصیۃ الرحم کا سوج جانا یہ ورم ایک وقت میں دونوں طرف کے حصیۃ الرحم میں بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ اور دواہنی طرف کی بہ نسبت بائیں طرف زیادہ پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا یہ سبب ہو کہ بائیں طرف کا حصیۃ الرحم چونکہ معامہ مستقیم کے سامنے اس کے قریب رہتا ہے۔ اس لئے معامہ مستقیم کے اندر والے فضلات ہمیشہ قریب رہنے سے اس طرف کے حصیۃ الرحم میں ادنیٰ سبب سے متورم ہو جانے کی قابلیت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور دواہنی طرف کے حصیۃ الرحم میں ایسی قابلیت کم ہوتی ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ تمام

مباشرت سے یا پیڑ کے مقام پر چوٹ وغیرہ لگنے سے ہو جاتا ہے خصوصاً جبکہ ان کے خون میں کسی وجہ سے زیادہ گرمی پائی جائے۔

**اسباب** (۱) خصیتہ الرحم کی ساخت میں کسی وجہ سے کمزوری موجود ہونا (۲) کسی سبب خون میں جدت پیدا ہونا (۳) کثرت مباشرت سے یا چوٹ وغیرہ سے خصیتہ الرحم کو اذیت پہنچنا (۴) کسی مرض سے کوئی عزیز دوام رحم یا اندام نہانی میں رکھنا (۵) کسی سبب دفعتاً معمولی اخراج کا روک جانا۔

**علامات** (۱) اسباب مذکورہ بالا کے واقع ہونے سے ایک یا دو روز کے بعد مریضہ کو اپنے پیڑ یا کوکھ میں ایک طرف یا دونوں طرف گرمی اور جلن کے ساتھ قندے درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ (۲) پیشاب جلن سے آتا اور اکثر قہقہہ شکم رہتا ہے (۳) پیاس بہت لگتی ہے اور بھوک بہت کم ہو جاتی ہے (۴) مریضہ کو اکثر نہار منہ متلی ہوتی ہے۔ ادا لکائیاں آتی ہیں۔ اور کسی دن صفر آدمی نے بھی ہو جاتی ہے (۵) مریضہ کا دل ہر وقت بے چین رہتا اور کسی قدر بخار بھی ہوتا ہے (۶) کپڑے ہونے کے وقت یا ایام معمولی کے موقع پر یا مباشرت کے وقت درد کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ (۷) اس مرض کی حادثہ کے ساتھ بخار بہت تیز ہوتا ہے۔

**علاج** (۱) مریضہ کو چند روزیہ نسخہ صبح کے وقت پلائیں صفت مکہ مکوہ خشک۔ تخم ظلی۔ تخم خیارین شاتہرہ۔ مسندی ہر ایک ۵ ماشہ۔ گل نیلوفر۔ پرسیا وشتاں ہر ایک ۵ ماشہ۔ رات کو پانی میں بھگو کر صبح کو صاف کریں اور گھنٹہ ۳ تولہ اس میں حل کر کے خاکسی ۵ ماشہ کے ساتھ پلائیں۔

(۲) شام کو قریب چار بجے کے عرق شاتہرہ سات تولہ۔ آب مکوہ سبز ۳ تولہ۔ مشربت بنفشہ ۲ تولہ حل کر کے پلائیں۔ اگر مریضہ کا مزاج زیادہ گرم اور مرض حادثہ کا ہو تو لعاب بہدانہ ۳ ماشہ۔ شترہ و عبا ۵ دانہ۔ عرق مکوہ۔ عرق شاتہرہ ہر ایک ۵ تولہ۔ مشربت نیلوفر ۲ تولہ کے ساتھ پلائیں (۳) درد کی تشکین اور مادہ مرض کو تحلیل کرنے کی غرض سے پوست خشخاش ایک تولہ۔ گل سرخ۔ گل بابونہ ہر ایک ۵ ماشہ۔ دوسیر پانی میں پکا کر اسفنج کے ذریعہ سے مریضہ کے پیڑ پر تکیہ کریں۔

(۴) اگر ضرورت ہو تو مریضہ کے پیڑ پر ٹھکرات کا خاد بھی کریں۔ یا نمبر ۳ کی دواؤں کا نقل باریک پسیر اس میں قدر سے روغن گل ملا کر پیڑ پر نیکرم باندھ دیں۔

(۵) مرہم داخلیون آب مکوہ سبز اور سفیدی سفید مرغ کے ساتھ بطور فرزجہ کے استعمال کرنا بھی مفید ہے۔

(۶) اگر حصین کے بے وقت بند ہو جاتے سے مرض پیدا ہوا ہو تو اس کے اسباب تکلاش کر کے ان کے موافق علاج کرنا چاہئے۔

(۷) اندام نہانی میں کسی تیز و اکافز جہ رکھنے سے مریضہ کو منع کریں۔ اور کثرت مباشرت سے بچائیں۔ رحم اور خصیۃ الرحم کو تقویت پہنچانے کی تدابیر عمل میں لادیں۔

انچام مرض۔ اگر ابتدائے مرض سے ہی مریضہ متہار سے مطب میں آئے تو مذکورہ بالا طریقہ پر علاج کرنے سے بہت جلد آبرم ہو جانے کی قوی امید کی جاسکتی ہے۔ اور اگر ابتداء مرض کا زمانہ گذر جانے کے بعد خصوصاً شدت عوارض کے وقت علاج شروع کیا جائے تو علاج کسی قدر مشکل ہو تا ہے اور مریضہ کی حالت نازک ہو شواطیب کی پوری توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ اس پر بھی اگر مرض قابو میں نہ آئے تو کبھی التهاب کے زیادہ ہو جانے سے درم خصیۃ الرحم تک نوبت پہنچتی ہے۔ سیر اگر وہ درم تحلیل نہ ہو سکے تو پیک کر زخم ہو جاتا ہے۔ جبکی پیپ اندام نہانی یا معا مستقیم کی طرف کو بھٹ کر بہا کرتی ہے اور یا چون عانہ کے اندر جمع ہو کر مریضہ کی ہلاکت کا سبب ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ درم پکتا نہیں بلکہ سخت ہو کر ایک مدت تک بدستور قائم رہتا ہے اور اس جگہ پر ایک سخت گرہ سی باقی رہ جاتی ہے۔

اگر خصیۃ الرحم کا التهاب ابتداء سے ہی مزمن قسم کا ہوتا ہے تو اس میں مریضہ کو در دو وغیرہ کی زیادہ شکایت نہیں ہوتی۔ اسلئے وہ علاج کی بھی کچھ زیادہ پرواہ نہیں کرتی۔ اور خفیف سی نکالین کی برداشت کرتی رہتی ہے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ خصیۃ کی ساخت پر ایک پردہ کا زبب رفتہ رفتہ التهابی مادہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا بیان یا نچیں فصل میں آئے گا۔

**فصل تیسری درم خصیۃ الرحم (اور ایرانی لٹ)** یعنی خصیۃ الرحم کا سوج جانا یہ درم ایک وقت میں دونوں طرف کے خصیۃ الرحم میں بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ اور دایہی طرف کی بہ نسبت بائیں طرف زیادہ پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا یہ سبب ہو کہ بائیں طرف کا خصیۃ الرحم چونکہ معا مستقیم کے سامنے اس کے قریب رہتا ہے۔ اس لئے معا مستقیم کے اندر والے فضلات ہمیشہ قریب رہنے سے اس طرف کے خصیۃ الرحم میں ادنیٰ سبب سے متورم ہو جانے کی قابلیت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور دایہی طرف کے خصیۃ الرحم میں ایسی قابلیت کم ہوتی ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ تمام

بدن میں داہنی طرف کے اعضاء بہ نسبت بائیں طرف کے قدرتی طور پر زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ اسلئے وہ اکثر امراض کے اثر سے نسبتاً کم متاثر ہوتے ہیں۔

یہ ورم دو قسم کا ہوتا ہے (۱) حاد و فرمن (سب اکیوٹ) اس قسم کے عوارض کسی قدر شدید ہوتے ہیں۔ اور مریضہ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ قسم بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ (۲) فرمن (کرائنگ) اس قسم میں عوارض بہت خفیف ہوتے ہیں۔ اور مرض اگرچہ زیادہ مدت تک رہتا ہے۔ لیکن مریضہ کو بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ قسم اکثر دیکھنے میں آتی ہے اور یا تو قسم حاد کے مادہ میں سر دی پیدا ہو کر اس کے کارٹھا ہو جانے سے ہوتی ہے۔ اور یا ابتدا سے ہی اس کا مادہ سرد و غلیظ ہوتا ہے۔

قسم حاد کے اسباب (۱) عورت کے پیرڈ پر کوئی چوٹ وغیرہ لگنا۔ اور خصیتہ الرحم پر کسی قسم کی اذیت پہنچنا (۲) سوزا کی مادہ کا خصیتہ الرحم تک سرایت کر جانا۔ یا خون میں آتشکی زہر موجود ہونا (۳) خصیتہ الرحم کی ساخت میں کمزوری ہونی۔ اور حصین کا دفعتاً کسی سبب سے رک جانا (۴) ان اسباب کے علاوہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خصیتہ الرحم کا غلاف بنانے والی جھلی یا اس کے قرب وجوار کی دیگر ساختوں کا ورم بڑھ کر خصیتہ الرحم کی ساخت کو مبتلا کر لیتا ہے۔

علامات (۱) ورم رحم کی طرح اس مرض میں بھی مریضہ کو تیز بخار مع درد ہوتا ہے۔ اور اکثر ہڈیاں (ڈٹے ری ام) تک ٹوٹ پھٹتی ہے (۲) مریضہ کے پیرڈ، جگاسہ اور کمر میں درد ہوتا ہے۔ (۳) کبھی درد کی تکلیف پنڈلیوں کے پھٹوں تک پہنچتی معلوم ہوا کرتی ہے۔ اور کھڑے ہونے سے پاؤں کانپتے اور درد زیادہ ہوتا ہے (۴) مریضہ کو پیشاب سرخ اور تھوڑا تھوڑا بار بار اور تکلیف سے آتا ہے۔ (۵) اکثر متبن کی شکایت رہتی ہے یا پیش اور مروڑ کی تکلیف ہوتی ہے (۶) کبھی قے اور ابکائیاں بھی آتی ہیں (۷) اندام نہانی میں یا معاً مستقیم میں انگلی داخل کر کے امتحان کرنے سے ورم کی سختی انگلی کو محسوس ہوتی ہے۔

یاور کھو کہ اگرچہ اس مرض کا علاج بالکل وہی ہے جو ورم رحم میں کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی مقام مرض کی تعیین اور اس مرض کی پوری تشخیص کرنے کے لئے چند تشخیصی علامات کا جاننا بہت ضروری ہے چنانچہ مندرجہ ذیل علامات کی رد سے ورم رحم اور اس مرض میں

تم بخوبی فرق کر سکتے ہو۔

(۱) اندام نہانی میں انگلی داخل کر کے رحم اور اس کے لبوں کو ٹوٹنے سے اگر لب سوجے ہوئے معلوم ہوں۔ اور مرینہ کو درد محسوس ہو تو ورم رحم ہے۔ اور اگر اندام نہانی کی چھپت میں دہنی یا بائیں طرف انگلی ہلانے سے درد محسوس ہو اور خصیۃ الرحم کا جرم بڑھا ہو معلوم ہو تو سمجھ لو کہ ورم خصیۃ الرحم میں ہے۔ (۲) اسی طرح خصیۃ الرحم کے ورم کا ابھار بھینویں ہوتا ہے اور اگر انگلی سے دھکیلیں تو وہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے۔ (۳) اگر خصیۃ الرحم کے ورم کو انگلی سے دبائیں تو مرینہ کو فوراً متلی ہونے لگتی ہے۔ اور یہ باتیں ورم رحم میں نہیں پائی جاتیں (۴) اگر مرینہ لاغر ہو تو اس کے پیڑ و پر ٹوٹنے سے خصیۃ الرحم کے ورم کا ابھار مقام رحم سے کسی طرف کو ہٹا ہوا محسوس ہو سکتا ہے (۵) اگر دہنے خصیۃ الرحم میں ورم ہوتا ہے تو متانہ پر اس کا دباؤ پڑنے سے مرینہ کو پیشاب بار بار آیا کرتا ہے۔ اور اگر بایاں خصیۃ الرحم مبتلائے مرض ہو، تو معائنہ مستقیم پر زیادہ دباؤ پڑنے سے پیشاب کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔

علاج (۱) اگر مرینہ کا مزاج گرم اور گرم جوان ہو تو اسے پینے کا یہ نسخہ پلا یا جائے صفحہ ۱۔ شاہترہ گل نیلوفر۔ گل سرخ۔ مکوہ خشک۔ تخم خطمی۔ تخم خیارین ہر ایک ۷ ماشہ۔ غلاب۔ آلو بخارا ہر ایک ۵ دانہ رات کو پانی میں ترک کر کے صبح کو چھان لیں اور مصری ۲ تولہ حل کر کے پلائیں۔

(۲) اگر پیشاب کی شکایت موجود ہو تو اس نسخہ میں سے غلاب۔ آلو بخارا۔ تخم خیارین موقوف کر کے ریشہ خطمی۔ تخم کنوچہ ہر ایک ۷ ماشہ بڑھائیں۔ اور اسچول مسلم کے ساتھ پلائیں۔

(۳) شام کے وقت لعاب ریشہ خطمی ۴ ماشہ۔ لعاب بہدانہ ۳ ماشہ۔ شیرہ تخم خیارین۔ شیرہ تخم حزنہ سیاہ۔ ہر ایک ۳ ماشہ۔ عرق شاہترہ ۷ تولہ۔ عرق مکوہ ۵ تولہ میں تیار کر کے شربت بنفشہ ۲ تولہ حل کریں۔ اور تخم کنوچہ ۵ ماشہ کے ساتھ پلائیں۔

(۴) تخم خطمی۔ تخم اسی۔ تخم سویہ۔ مکوہ خشک۔ گل سرخ۔ گل بالونہ۔ ہر ایک ۶ ماشہ۔ میزاملتک ۷ ماشہ۔ آب مکوہ سبز۔ آب کاسنی سبز میں پیکر روغن گل ایک تولہ ملائیں۔ اور مرینہ کے پیڑ پر نیم گرم صاف کریں۔ اگر درد کی زیادہ تکلیف ہو تو اسی لپ میں بزرابنج ۳ ماشہ۔ افیون۔ عرق ہر ایک ایک ماشہ۔ زردی حبیبہ مرغ ایک عدد اضافہ کریں یا لے فی منٹ بلا ڈونا۔ لے فی منٹ کوٹنا

ورم رحم و خصیۃ الرحم کی علامات فارغ

سمہ وزن سے کر قدرے کلورافارم اس میں ملا کر پیڑوپر مالش کریں۔

(۵) مرلیضہ کو ہر روز آدھے گھنٹے تک صرف گرم پانی میں یا ایسی دواؤں کے جوشا مذہ میں بٹھائیں جن سے ورم کا مادہ تحلیل ہو جائے۔ اور درد کو تسکین ہو سکے۔ جیسے گل بالونہ۔ تخم خطمی۔ گل سرخ۔ پوست خشتخاش و عنبرہ۔ اور اسی پانی سے بذریعہ اسفنج کے تمکید کرنا بھی مفید ہے۔

(۶) شدت درد کے وقت آب کاسنی سبز۔ آب مکوہ سبز۔ آب بارتنگ سبز۔ آب کشیر سبز۔ روغن صغیری بمینہ مرغ۔ روغن کی ماں کا دودھ۔ سب کو ملا کر اس میں روئی تر کریں۔ اور اندام بنانی اور مقعد کے راہ مقام ورم کے قریب پہنچائیں۔

(۷) اسی طرح افیون اور بلاڈونا کی بتی بنا کر رحم میں رکھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر تسکین کی زیادہ ضرورت ہو تو چار چار گول افیون سترتین یا چار گھنٹے کے بعد دے سکتے ہیں۔

(۸) ڈاکٹروں نے کونائٹ اور کافینی سائٹر اس کی بہت تعریف کی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ وی لے ری نٹ آف زنک بقدر دیگرین کی گولی بنا کر اور چاندی کا ورق اس پر لپیٹ کر کھلانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

(۹) اگر احتباس حین اس مرض کا سبب قرار پائے تو ضد صاف کرنے سے یا مرلیضہ کے پیڑوپر آٹھ دس جونکلیں لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمام وہ تدابیر کرنی چاہئیں جن سے حین ہمیشہ باقاعدہ آتا رہے۔

(۱۰) اگر مرلیضہ کے خون میں ہتشی فساد یا سوزا کی زہر موجود ہو تو اس کا باقاعدہ علاج کرنا چاہئے۔ (دیکھو آتشک اور سوزاک کا بیان کتاب ہذا میں)

(۱۱) مرلیضہ کو غذا نہایت ہلکی اور جلد ہضم ہو جانے والی دینی چاہئے۔ اور ایسی تدبیر کرنی چاہئے جس سے مرلیضہ کمزور نہ ہونے پائے۔ لیکن گوشت اور ہر ایک ایسی غذا سے پرہیز کرائیں جس سے خون رقیق اور زیادہ گرم پیدا ہوتا ہو۔ اس کے علاوہ مرلیضہ کو چلنے پھرنے سے منع کریں۔ اور بستر پر آرام سے لیٹے رہنے دیں۔

**انجام مرض**۔ اگر ہر طرح سے عمدہ تدابیر ٹیڑھوں تو فضل الہی سے چند روز میں مرلیضہ کو بالکل آرام



ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ورم پکنے والا ہوتا ہے تو کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ مریضہ کی تکلیف روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ اور ہر وقت ٹیس کا سادرد اور تیز بخار رہتا ہے۔ پھر ورم پھوٹ کر اندام نہانی یا مقعد کی راہ اس کی پیپ ایک مدت تک جاری رہتی ہے۔ ایسی حالت میں نہایت مستعدی کے ساتھ عمدہ علاج کرنے سے یا تو مریضہ کو شفا ہو جاتی ہے۔ ورنہ وہ رفتہ رفتہ کمزور ہو کر فوت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ورم جوف عانہ کی طرف پھوٹ کر اس کی پیپ اندر ہی جمع رہتی ہے تو ورم صفاق ہو کر بخار وغیرہ نگالین دفعتاً بڑھ جاتی ہیں۔ اور مریضہ جلد ہلاک ہو جاتی ہے۔

**قسم مرن کے اسباب:** (۱) مریضہ کا مزاج بلغمی یا سوداوی ہونا یا اس کے خون میں تشکی زیر موجود ہونا۔

- (۲) اندام نہانی یا رحم میں ورم بارود موجود ہونے کی حالت میں کثرت مباشرت کا اتفاق پڑنا۔
  - (۳) کثرت مقاربت کے ساتھ ایسی تدابیر کرنا جن سے انتقار حمل نہ ہو سکے۔
  - (۴) سردی وغیرہ کے اثر سے حیض دفعتاً رک جانا۔ اور خصیۃ الرحم کا کمزور ہونا
  - (۵) مشراب خوری یا مساحت کی عادت ہونا یا ادھورے جماع کا اتفاق پڑنا۔
- علامات** (۱) حیض دشواری اور درد کے ساتھ آتا ہے (۲) مریضہ کو مباشرت سے قدرے تکلیف ہوتی ہے (۳) خصیۃ الرحم کی جگہ پر خفیف سادرد ہر وقت رہتا ہے۔ جو بانے سے ہونے لگتا ہے۔ اور کبھی مریضہ کو درد کی بالکل شکایت نہیں ہوتی (۴) کبھی رحم سے رطوبت سفید جاری ہوتی ہے۔ اور پستان میں قدرے درد مع ورم کے ہوتا ہے (۵) مریضہ کو اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے رفع حاجت کے وقت پیروں درد زیادہ ہوتا ہے (۶) اندام نہانی میں انگلی داخل کرنے سے خصیۃ الرحم کا ورم بخوبی محسوس ہو سکتا ہے۔ اور اس ورم پر انگلی کا دباؤ پڑنے سے مریضہ کو درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی وقت ابکائیاں یا قے آنے لگتی ہے (۷) مریضہ چڑچڑی ہو جاتی ہے اور مانچو لیا والوں کی طرح اس کے خیالات اکثر فاسد رہتے ہیں۔ کبھی اس کے حواس میں خلل پڑتا ہے
- سلا** کیونکہ خصیۃ الرحم کی ساخت میں خون بھر کر انکی جسامت بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ اپنی جگہ سے نیچے کو ٹک کر مہتمم اور اندام نہانی کے درمیان والے طبعی خلل (یا ڈیج آف ڈگلاس) میں آٹھ پڑتا ہے۔ اسلئے یہ ورم دائرہ کی انگلی کو بخوبی محسوس ہو سکتا ہے۔ ۱۲ محمد عبدالرزاق عفی عنہ۔

اور وہ نہایت بے عقلی کی باتیں کرنے لگتی ہے۔

علاج۔ اگر مریض کے خون میں آتشکی زہ کا فساد موجود ہو تو بیش بہا خوری یا مساحت کی مادی سے یا احتساجن کے سبب سے یہ مرض پیدا ہو تو در حقیقتہ لرجہ کو تخمین کرنے کی عام تدبیر کے ساتھ یہاں سے پہلے یا بعد کو ایسا کہ مندرجہ سب حال ہو اس ناخبر ہوں گو دور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ایک قوم عن کا سبب موجود رہنے کی حالت میں زلالہ عن کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ کہ اگر عمدہ تدبیروں سے کسی قدر فائدہ ظاہر بھی ہوتا ہے۔ تو وہ مدت کم نہیں رہ سکتا۔ بلکہ دوران علاج میں ہی پھر مرض کی حالت بدستور ہو جاتی ہے کہ کوہ بالا خرابیوں کی اصلاح کے علاوہ تخمیل و دم کے لئے مندرجہ ذیل تدبیر میں رہنی چاہئیں۔

۱) کوہننگ - تخم خنکی - شہترہ - چراگتہ - گل سرخ - مریم - شہ - درنجویہ - جنسیہ - رومی - بزرگ  
۵) شہ رات - کوہلو - کرج - کوہجان - لیں - اور معمری - تو - س - حیر - حل - بکے - ی - ش -

(۲) معجون پنچیکھل داماشہ - سحر شیرہ دویان شیرہ کدو خشک - یک دہشتہ شیرہ مویز منقہ و دانہ عرق نانخود و قلعہ عرق برنج سفید - توہ میں تیار کر کے تھپتہ دیا - سو توہ حاصل کرے شو کہ توہ کچھ چلا

(۱) جو ان دیسی ایک شہ۔ مرجیہ دھرد۔ مگ سب و یک شہ۔ رت کوسوتے وقت لکھا کر  
اور سے عرق کو ایک دو گھنٹہ میں کیا کرتا ہے۔ مرعینہ کے یہ پودے حیدر آباد کے مشرق میں

ایسا ہو جائیو گے۔ اور بھیجیے کہ سخی خود در مساب روئے ہیں ہیں جس سے کہ سخیوں  
 کریں اور حکیم شفا مار لہ و لہ مدد کے کہ اس دین میں کسور یہ فہم ہیں بقدر سخیوں

بیس گزین سرور۔ تین درجہ دیہات مسکین و مہنت محبوب ہے۔ اور گردِ عشق کے خون سے شکر  
 زہرِ موجود بولویو بندیشِ تم محبوب غمخیز غنوتِ حیرت کے سپر دریا ہے۔

۲۷) مریض اگر کمزور ہوئی ہو تو مریض سے اسکی تقویت کے لئے دیکھنا ضروری ہے۔ اسکی حالت میں اسے مقوی غذا میں اور دوائیں دی جائیں۔ تقویت، علم کے لئے بھی ضروری ہے۔ چنانچہ

سین کے دوست کے مرگت سے مرغل پر سخت منہ ملیں۔ مرغل نے کوہ صفا کو میں رکھیں۔

اور ہر روز صفوطی دیر کے لئے پانکلی میں یا سیدیل ہواخوری کرائیں۔ اس کے علاوہ مریضہ کو گرم پانی میں بٹھانا اور سپرٹو پر تنکید کرنا بھی مفید ہے۔

انجام خصیتہ الرحم کا ورم مزمن کبھی مہینوں بلکہ برسوں تک رہتا ہے۔ اس حالت میں اگر خصیتہ الرحم کے فعل میں کچھ نہ کچھ فتور ضرور پڑ جاتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مریضہ کو درد وغیرہ کی شکایت بالکل نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ورم کے مقام سے پیازی رنگ کی رطوبت (لمف) برس کر خصیتہ الرحم کو اس کے قریبی اعضا میں سے کسی کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اور یہ ورم سخت ہو کر ایک گرہ سی ہیشہ کے لئے باقی رہ جاتی ہے خصیتہ الرحم کا سخت حصہ بالکل بے کار ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے اگر دونوں خصیتہ الرحم بے کار ہو جائیں تو عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔

**فصل چوتھی** ورم خصیتہ الرحم (اوویرین السرز) یعنی خصیتہ الرحم کے زخم جب کہ خصیتہ الرحم کا ورم کسی علاج سے تحلیل نہیں ہوتا اور پک کر اس میں ریم پیدا ہونے لگتی ہے تو اکثر خصیتہ الرحم کی متورم ساخت سے ایک رفیق سرجی مائل رطوبت (لمف) برس کر اسے قریبی اعضا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اسلئے جب یہ ورم پھوٹتا ہے تو اسکی ریم یا تو اندام نہانی کے راہ عرصہ تک بہا کرتی ہے اور یا معاً مستقیم کی طرف سے نکلتی رہتی ہے اور یا قاذف نالیوں کے ذریعہ سے رحم میں آکر وہاں سے نکلا کرتی ہے۔ اور اگر کسی طرف کو نہ نکل سکے تو جوف عانہ میں جمع ہونے لگتی ہے۔ اور مریضہ کی ہلاکت کا سبب ہوتی ہے۔ یہ مرض بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ اور اگرچہ اس کی تشخیص کرتے وقت ہلاکات کا مل تحقیق اور کامل غور کے یقینی طور سے یہ سمجھ لینا سخت دشوار ہے کہ مریضہ کے اندام نہانی یا معاً مستقیم سے بہنے والی پیپ خاص خصیتہ الرحم کے زخموں سے آئی ہے۔ یا قاذف نالیوں میں زخم ہیں۔ یا رحم کی ساخت زخمی ہو رہی ہے۔ لیکن علاج کرتے وقت کھانے پینے کے نسخوں یا مقامی ادویات کا استعمال کرنے کے لئے اس تحقیقات کی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ حسب طرح کھانے پینے کی ادویات ہر حالت میں یکساں ہیں اسی طرح مرہموں وغیرہ کا لگانا یا کھکاری کے ذریعہ سے زخموں کا دھونا بھی اسی مقام سے عمل میں آتا ہے جہاں سے پیپ بہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس لئے ایک تو اس قسم کی تشخیصی علامات بیان کرنے میں زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مقام ماؤف میں تکلیف کا محسوس ہونا اور پہلے سے ورم وغیرہ کے

عوارضات کا موجود ہونا مقام ماؤف کی لتین کے لئے کافی ہے۔

علاج۔ (۱) چونکہ تمام زخموں کے اندمال کے لئے خون کا بہتر حالت میں ہونا ضروری ہے۔ اس لئے معالج کا فرض ہے کہ اگر مریضہ کے خون میں کسی قسم کا فساد پائے تو کھانے یا پینے میں مٹھی خون ادویات کا استعمال ضروری سمجھے۔ اسلئے ایسے موقع پر نفوع شاہترہ یا لعاب بہدانہ۔ شیرہ عشا۔ شیرہ تخم خیارین۔ شیرہ مغز تخم کدو۔ عرق مرکب مصغی خون۔ شربت بزوری کے ساتھ۔ یا سجون عشبہ ہمراہ عرق عشبہ یا اطر لیل شاہترہ ہمراہ عرق مرکب شربت بزوری حل کر کے پلایا جائے۔

(۲) اگر ضرورت ہو تو مسہل مناسب سے تنقیہ بھی کرایا جائے۔

(۳) اس کے بعد جو ہر منفی بھی چند روز دیا جاسکتا ہے۔

(۴) اندمال قروح کے لئے یہ سفوف بھی نہایت مفید ہے۔ گیر و سنگراحت۔ دم الاخوین۔ مینبلوچن۔ شادنج عدسی۔ کہربا۔ کتھ سفید۔ دانہ الاچی سفید۔ ہر ایک مساوی لے کر سب کے برابر مہری ملائیں اور اس میں سے ۳ ماشہ ہر روز صبح کے وقت بکری یا گائے کے دودھ کی لسی کے ساتھ کھلائیں۔

(۵) برگ نیب۔ برگ شاہترہ۔ مکوہ خشک۔ نکل سرخ کبیلہ کے جو شاذہ کی پچکاری سے زخموں کو دھونا بھی بہتر ہے۔

(۶) روغن کبیلہ یا مرہم سفیدہ یا مرہم کافوری مفید ہے۔

(۷) پرہیز کے متعلق طبیب کا فرض ہے کہ مریضہ کو مناسب ہدایات کرے۔

**فصل یاخوین**۔ غشاء کا ذب خصیۃ الرحم (فالس ممبرین آف اویری) یعنی خصیۃ رحم کی بیرونی سطح پر ایک غیر معمولی سخت جھلی کا پیدا ہونا۔ یہ مرض اکثر خصیۃ الرحم کے التهاب مرض کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر مریضہ ایک مدت تک خفیف لٹا لیف کی برداشت کر کے علاج غافل رہے۔ تو خصیۃ الرحم کے التهاب کا غلیظ مادہ اس کی سطح پر جم کر رفتہ رفتہ ایک جھلی کے پردہ کاذب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر یا تو اس پردہ کے اندر ایک رقیق و شفاف رطوبت تھوڑی تھوڑی برس کر جمع ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی رطوبت کے زیادہ جمع ہو جانے سے مرض مستقلاً خصیۃ الرحم (اویری ان ڈراپسی) پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یا وہ پردہ موٹا اور سخت ہو کر خصیۃ الرحم کی ساخت اور

اس کی عروق پر اس قدر دباؤ ڈالتا ہے کہ جس سے خصیتہ الرحم کی پرورش موقوف ہو جاتی ہے پھر ایک تو خصیتہ الرحم کی پرورش نہ ہونے سے اور دوسرے اس کی سرحاقت پر ہر وقت اس پردہ کا دباؤ پڑنے سے اس کی حبا مت رفتہ رفتہ گھٹنے لگتی ہے۔ اس لئے ماؤن خصیتہ الرحم کچھ دنوں کے بعد چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پردہ نہ کو سخت ہو کر اس قدر سکر جاتا ہے کہ اس کے کچاؤ سے اس طرف کا رباطا عرضین بھی سکر جاتا ہے۔ اور خصیتہ الرحم یا توفان نامی کے ساتھ اور یا رحم کی ساخت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر جب خصیتہ الرحم سکر کر ہٹ چھوٹا اور نہایت سخت ہو جاتا ہے تو اس حالت میں اس کا قدرتی کام بھی موقوف ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں خصیتہ الرحم اس مرض میں مبتلا ہو کر بیکار ہو جاتے ہیں تو مرینہ کا حیض اپنے معمولی وقت سے پہلے بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اور وہ بیجاری بانجھ ہو جانے کے علاوہ اعتبار س طمت کے دیگر شدید عوارض میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہے۔ اور اگر ایک طرف کا خصیتہ الرحم مبتلا ہوتا ہے تو اس حالت میں بھی کس قدر تکلیف ضرور ہوتی ہے۔

علامات۔ مرینہ کے سابقہ حالات دریافت کرنے سے معلوم ہو سکے گا کہ وہ کچھ دنوں پہلے انتہا خصیتہ الرحم کی قسم مزمن میں مبتلا ہو چکی ہے (۲) اور جب ہی سے اس کو قلت طمت اور دوری نکات بڑھے بڑھتے بالکل اعتبار س طمت تک نوبت پہنچی ہے (۳) خصیتہ الرحم کے مقام پر ٹوٹنے سے دایہ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی مقدار حبا مت کم ہو گئی ہے۔ اور وہ ایک سخت گٹھلی کی طرح محسوس ہوتی ہے (۴) رباطا عرضین کے تناؤ کو بھی دایہ محسوس کر سکتی ہے۔ (۵) مرض پرانا ہو جانے پر مرینہ میں نسائی خواص رفتہ رفتہ کم ہونے لگتے ہیں۔

علاج۔ جو تدابیر صلابت رحم کے لئے بیان کی گئی ہیں۔ وہی اس مرض کے لئے بھی مفید ہوتی ہیں اگر مرض پرانا نہیں ہے تو فائدے کی امید رکھنی چاہئے۔ لیکن اگر خصیتہ الرحم سکر کر نہایت چھوٹے اور بیکار ہو گئے ہوں تو مرض کے لاعلاج ہونے میں کلام نہیں ہے۔

یہ رباطا رحم کے دونوں طرف ہوتا ہے جو اسے جوف عانہ کے ساتھ بانڈھے رکھتا ہے۔ دیکھو تعلیم القابلہ حصہ اول صفحہ ۱۷۰  
سے یہ کی بیدائش کا نسائی مادہ پیدا کرنا جو خصیتہ الرحم کی سطح پر ایک آبلہ نما جسم (گرائی ان ویسکیول) کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان دیکھو تعلیم القابلہ حصہ اول میں۔ ۱۲ محمد عبد الرزاق۔

بہر حال روغن حنایا روغن زعفران یا روغن سرخ یا روغن قسط مع مشک خالص یا عنبر بریا  
جذبیدستر کے پیڑ و پرمالش کرنے سے اور کھجیہ مہول مطب یا دوسری محلل ادویات کا عہدہ کرنے  
سے کامیابی کی قوی امید ہو سکتی ہے۔

**فصل چھٹی** صغیر خصیۃ الرحم (اٹرونی آف دی اوویری) یعنی خصیۃ الرحم کا چھوٹا ہونا۔  
کبھی تو ابتداء پیدائش میں خصیۃ الرحم کی ساخت اسقدر چھوٹی اور برائے نام ہوتی تھی کہ بدن کو  
بڑھانے والی قوت اور پرورش بدن کا غذائی مادہ (تمام بدن کی پرورش کے ساتھ) انکی جسامت  
کو واجب مقدار تک پہنچانے کے لئے کافی نہیں ہو سکتے اس لئے وہ مقدار واجب سے بہت چھوٹے  
رہ جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خصیۃ الرحم کے غلاف میں انتہا فرمن (کرانک اظلامے شن)  
ہو جانے سے اس پر ایک باریک جھلی کا پردہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں رطوبت لمفاویہ لطف یعنی  
آب خون رس کر اسے قاذف نالی یا رحم کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ یا وہ کاذب جھلی اسقدر موٹی ہوتی  
ہے کہ خصیۃ الرحم اس کے اندر جکڑ جاتا ہے۔ اس لئے اس کی پرورش پورے طور پر نہ ہو سکے کے  
سبب سے وہ رفتہ رفتہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ دی ہوتا ہے جو اس سے پہلی فصل میں بیان  
کیا گیا ہے۔

**اسباب** (۱) ابتداء پیدائش میں خصیۃ الرحم کا بہت چھوٹا پیدا ہونا (۲) خصیۃ الرحم کو بڑھانے  
والی قوت کا قصور یا غذائی مادہ کی خرابی (۳) حونی عروق کی خرابی سے غذائی مادہ کا دباؤ  
نہ پہنچنا (۴) خصیۃ الرحم پر کاذب جھلی پیدا ہو جانے سے اس کی پرورش میں نقصان ہونا۔  
(۵) کبھی کثرت مساحت سے بھی یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔

**علامات** (۱) اگر مرض پیدائشی ہو تو پہلے ہی سے حین بند ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بندش سے  
مریضہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے (۲) اگر خصیۃ الرحم بالکل چھوٹے اور غیر کافی ہوں تو عورت  
کو اپنے بیاہ اور اس کے لوازمات سے نفرت ہوتی ہے (۳) ایسی عورت بانچھ ہوتی ہے۔ اور  
اس کے عادات و اخلاق اور تمام جسمی حالات اور آواز وغیرہ مردوں کے ساتھ متشابه ہوتے ہیں  
(۴) اگر مرض سن بلوغ کے بعد شروع ہوا ہو تو حین کچھ دنوں تک آکر رفتہ رفتہ بند ہو جاتا ہے  
اور مریضہ کو اعتبار حین کے متعلق تکالیف گھیرے رہتی ہیں۔ اگر مرض کا سبب عادت مساحت

یا خصیۃ الرحم کا پردہ کاذب ہے تو حالات سابقہ کے دریافت کرنے سے اس کے اسباب کا تعقد معلوم ہو سکے گا

**علاج۔** اگر یہ مرض پیدا ہوتی ہو، یا خصیۃ الرحم کو غذا پہنچانے والی حونی عروق کے کٹ جانے سے یا ان میں کوئی (نہ زائل ہونے والی) رکاوٹ پیدا ہو جانے سے عارض ہو ہو تو لا علاج سمجھنا چاہئے۔ اور اگر خصیۃ الرحم کے گرد کاذب جھلی کا پیدا ہونا یا مذکورہ بالا خراب عادت اس مرض کا سبب ہو تو ابتداً مرض میں جب تک کہ حصن کے بالکل بند ہو جانے اور تفرج کے لوازمات پیدا ہونے تک نوبت نہ پہنچی ہو یا اس حالت کو زیادہ زمانہ گذر نہ گیا ہو تو اس وقت تک یہ مرض قابل علاج سمجھا جاسکتا ہے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ اس حالت میں بھی علاج کی کامیابی نہایت مشکل ہے۔ لیکن پھر بھی خدا کے فضل پر بھروسہ کر کے حتی المقدور مناسب تدابیر عمل میں لانا طبیب کا فرض ہے۔ اگر عضو ماؤف کی ساخت میں اصلی حالت پر آ جانے کی قابلیت باقی ہے اور علاج کی تمام ضروریات میر ہو جائیں تو نفع کی امید کی جاسکتی ہے۔ اسلئے تدابیر مندرجہ ذیل پر ایک مدت تک کاربند ہونا چاہئے۔

(۱) مرہضہ کو کسسرال میں رہنے اور مقوی غذائیں بقدر ہضم کھانے اور بے فکری کے ساتھ عیش و آرام سے بسر کرنے کی ہدایت کی جائے (۲) اعضا و تناسل میں قوت پیدا کرنے والی معجونیں اور گولیاں یا عرق وغیرہ کھلائے پلائے جائیں (۳) اگر کوئی خلط فاسد بدن میں موجود ہو تو اسکا باقاعدہ تفتیہ کرایا جائے (۴) اگر عشاء کاذب کی پیدائش اس مرض کا سبب ہو تو صلابت رحم کے علاج کے طور پر اٹکی تدابیر عمل میں لائی جائیں (۵) اگر عضو ماؤف کی طرف دوران خون میں خرابی ہو تو مطلقاً اس کا جذب خون اشیاء کا صناد اور اسی قسم کے روغنوں کی مالش اور مقوی فرزیہ وغیرہ کا استعمال مناسب جیسے روغن زعفران روغن سرخ وغیرہ میں مشک ملا کر پیڑ پور مالش کرنا اور عطر خاکیا تھ فرزیہ کرنا مفید ہے

**فصل ساتویں** خراج خصیۃ الرحم (اوویرین پیوسیس) یعنی خصیۃ الرحم کا اپنے مقام سے پھسل آنا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رحم یا اندام نہانی کی ساخت کے ڈھیلہ ہو جانے سے یا خصیۃ الرحم کی بندش کے ڈھیلہ ہونے کی حالت میں اس مقام پر کوئی جھجکا لگنے سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے اسی طرح کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مرض انزال یا الرحم یا انقلاب رحم یا سیلان الرحم کے ساتھ ایک

یادوں خفیۃ الرحم اپنی جگہ سے پھسل کر رحم کے سامنے یا پیچھے یا اس کے جانبی کناروں کے نیچے یا اٹھ ہوئے رحم کے خلو میں آجاتے ہیں یا رحم کے رباط مستدیر کے ساتھ مجرّے اربیہ (انگونی ٹل کینال) میں یا اس سے باہر جنگاسہ یا شرمگاہ کی نرم ساخت میں جلد کے نیچے جگہ لیتے ہیں۔ اس آخر الذکر حالت میں اس مرض کو متفق استحمائی (پیوڈنل ہرنیا) کی ایک قسم قرار دیا جاسکتا ہے۔

**اسباب (۱)** رحم یا اندام نہانی کی ساخت یا رباط الخفیۃ کے ڈھیلا ہونے کی حالت میں کوئی شدید جھٹکایا دباؤ پڑنا (۲) مرض انزلاق الرحم یا انقلاب الرحم میں رحم کے ساتھ خفیۃ الرحم کی شرکت۔ (۳) مرض میلان الرحم میں خفیۃ الرحم پر جھکے ہوئے رحم کا دباؤ پڑنا (۴) وضع حمل کے وقت یا اُس کے بعد رحم کا زیادہ زور سے سکڑنا اور خفیۃ الرحم کو دھکیلنا (۵) اتفاقاً زور سے کودنا یا کھانا یا کوٹھنا یا طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانا۔

**علامات (۱)** اگر مرض کسی حرکت شدید کے سبب سے دفعتاً لاحق ہوا ہے تو مرینہ کو اپنے پیڑوں میں درد نہایت شدید محسوس ہوتا ہے (۲) کبھی اس کے ساتھ البکانی اور متلی بھی سانی تہے (۳) اگر البکانی خفیۃ الرحم جنگاسہ یا شرمگاہ کی نرم ساخت میں آسپنچا ہو تو جلد کے اسکا بھجائی محسوس ہو سکتا ہے (۴) اگر مجرّے اربیہ میں ہو تو جنگاسہ میں ٹوٹنے سے معلوم ہو سکتا ہے (۵) اگر مرض میلان الرحم کے سبب خفیۃ الرحم دب کر رحم کے پیچھے اپنی جگہ سے نیچے کو لٹک گیا ہو تو مقدس انگلی داخل کرنے سے شناخت کی جاسکتی ہے۔ (۶) اگر جھکے ہوئے رحم کے سامنے یا اس کے جانبی میں یا اٹھے ہوئے رحم کے خلو میں لٹک آیا ہو تو اندام نہانی میں انگلی داخل کرنے سے دریافت ہو سکتا ہے (۷) ہر حالت میں خفیۃ الرحم پر انگلی کا دباؤ پڑنے سے مرینہ کو درد محسوس ہوتا اور البکانی آتی ہے۔

**علاج (۱)** اگر رباط الخفیۃ ڈھیلا ہو اور غلبہ رطوبت کی علامات موجود ہوں تو گل سرخ ہینڈل سفید۔ کنڈر مرکی مصطکی۔ بازو بنر پھلکری ہر ایک ۷ ماشہ نہایت باریک پس لیں اور صاف روئی کی روغن گل میں تر کر کے اسے پیسی ہوئی دواؤں سے آلودہ کریں۔ اور اندام نہانی میں اس طرح رکھیں کہ اس سے خفیۃ الرحم کو اپنے اصلی مقام تک پہنچنے کے لئے کافی سہارا مل سکے۔

(۲) اگر انقلاب الرحم یا انزلاق الرحم یا میلان الرحم اس مرض کا سبب ہو تو اس حالت میں ازالتہ سبب کی تدابیر عمل میں لانی چاہئیں۔ اور مذکورہ بالا فرزہ بھی مفید ہوگا۔



(۳) صندل سرخ، صندل سفید گل، ارمنی، بازوسنہ، مائیں گلنار، افاقا فیا جفت بلوط ہر ایک ۶ ماشہ نہایت باریک ہیں کہ جو شاذہ پوست انار میں ملا کر پیڑا کر کر پر لپیپ کرنا مفید ہے۔  
(۴) پیڑا اور شکم پر سینگیوں یا گلاس لگانا بھی مناسب ہے۔

(۵) لیکن اگر مریضہ زچہ ہو تو اس حال میں ان قابض دواؤں کے استعمال سے احتیاس تقاس اور شدت درد اور دیگر عوارض پیدا ہونے کا خوف ہے۔ اسلئے دایہ کو چاہئے کہ وہ رحم کی طرح خفیہ گرم کو بھی اٹھلی سے اسکی اہلی جگہ پہنچائے۔ اور شراب یا روغن گل میں روئی تر کر کے فرز جہ رکھے۔

(۶) ہر حالت میں مریضہ کو چند روز بستر پر آرام سے چت لیٹے رہنا اور کسی قسم کی حرکت نہ کرنا ضروری ہے۔  
(۷) ایسی تدبیر کرنی چاہئے کہ مریضہ کو اجابت نرم ہوئی رہے اور قبض شکم نہ ہونے پائے۔ اگر ضرورت پڑے تو ہر روز صابون اور نمک کے پانی سے عمل کر دینا چاہئے۔

**فصل آٹھویں** سلعہ خصیۃ الرحم (اوویرین ٹیومر) یعنی خستہ الرحم کی ساخت میں رسولی پیدا ہونا کبھی خستہ الرحم کی سطح پر بھی مثل دیگر اعضا کے رسولی پیدا ہو جاتی ہے جو نکتہ مختلف مریضات میں ان رسولیوں کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ اور ان کے اندر کامادہ بھی گاڑھے پن یا رقیق ہوتا ہے اور اپنی جنسیت میں مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض رسولیاں جلد بڑھنے والی اور بعض دیریں مند پانے والی ہوتی ہیں اور بعض رسولیاں زیادہ اذیت دینے والی اور بعض کم اذیت دہ ہوتی ہیں۔ اسلئے اطباء نے انکی متن متیں بیان کی ہیں (۱) وہ رسولیاں جنہیں رقیق رطوبت بھری رہتی ہے اور اسکی ایک خضیلی ہوتی ہے۔ انکی سطح ہموار محسوس ہوتی ہے اور اگر بڑھی ہوئی رسولی پر دونوں طرف ہاتھ رکھ کر ایک طرف سے حرکت دیں تو دوسرے ہاتھ کو بانی کی لہر دہنی حرکت (فلکوشن) صاف طور سے محسوس ہوتی ہے۔ اس قسم کی رسولیاں بتدریج بڑھتی ہیں اور اپنے قریب والی دیگر ساختوں سے اکثر علیحدہ رہتی ہیں اگر یہ رسولیاں زیادہ بڑھی جائیں تو ان سے مریضہ کو بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اسلئے وہ لپکا یا کینا یا دہ ناتوان اور لاغر نہیں ہو جاتی ہے اگر


سلعہ اکثر انکی مقدار نہ کم کے دانہ سے بڑھے رنگتے نمک ہوئی ہے۔ مگر بعض مرتبہ مقدار بڑی ہوتی ہیں کہ ایسی ایک سیر یا دوسرے رطوبت ہوتی ہیں۔  
سلعہ اکثر ان رسولیوں میں صاف شفاف قدرے برہنہ مائل آبیخون (سیرم) جمع ہوتا ہے جس میں بکثرت البومین موجود اور اس کا وزن مثلاً (۲۰-۱۰) ہوتا ہے۔ کبھی اس رطوبت میں قدرے خون یا میپ بھی ملی سکتی ہے۔ کبھی رسولیوں میں گاڑھی رطوبت بھری رہتی ہے اور کبھی چربی دار مادہ یا پاٹی اور بال بھی دیکھ جاتے ہیں۔ مولف۔

انکے اندر کا پانی بذریعہ آلہ طر و کار کے نکالا جائے تو یہ بالکل خالی ہو جاتی ہیں  
(۲) وہ رسولیاں جن میں رطوبت بھری ہوئی چنڈھیلیاں ہوتی ہیں ان ہتھیلیوں کے علاوہ علیحدہ محسوس  
ہونے کے سبب سے انکی سطح ناہموار محسوس ہو کر ٹی ہے۔ اور پانی کی حرکت بھی ہر ایک ہتھیلی میں علیحدہ علیحدہ محسوس  
ہو کر ٹی ہے۔ یہ رسولیاں اکثر جلد بڑھ جاتی ہیں۔ اور اپنے قریبی الی دیگر ساختوں سے اکثر جڑ جاتی ہیں۔ اور  
مریضہ ان میں بہ نسبت قسم اول کے ضعیف ہو جاتی ہے۔ اگر ان کا پانی نکالا جائے تو صرف وہی ہتھیلی  
خالی ہوتی ہے۔ جسے چھیدا گیا ہے۔ اور باقی حصہ بے ستور پانی سے بھر رہتا ہے۔

(۳) وہ رسولیاں جو سخت اور ناہموار ہوتی ہیں انہیں درد دیا دہ ہوتا ہے۔ اور جلد بڑھ جاتی ہیں ان میں  
دن کی بہ نسبت رات کو درد زیادہ ہوتا ہے۔ اور مریضہ بہت جلد کمرور ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی رسولیاں اکثر  
تیس یا چالیس برس کی عمر تک پیدا ہو کر ٹی ہیں۔ اگر انہیں نلکی چھیدی جائے تو رطوبت بالکل نہیں نکلتی ہے  
کیونکہ نلکے اندر کی رطوبت بہت گاڑھی ہوتی ہے۔ اور کبھی انہیں بال یا دانت کی سی ہڈیاں بھی پائی جاتی ہیں۔  
۱) جب تک یہ رسولیاں چھوٹی اور جوف عانہ میں رہتی ہیں اگر زیادہ بڑھی ہوئی ہوں  
تو مریضہ کسی زیادہ تکلیف کی شکایت نہیں کیا کرتی (۲) لیکن جب وہ کسی قدر بڑھ کر جوف عانہ میں  
پھنس جاتی ہیں۔ تو مشانہ پردہ اوپر اٹھنے سے احتباس یا تقطیر بول کی اور معاستقیم پردہ اوپر اٹھنے سے  
احتباس براز کی شکایت ہوتی ہے (۳) اعصاب عجزیہ قدامیہ (انٹی زری اسکیرل نرون) پردہ اوپر اٹھنے  
سے مریضہ کو اپنی رانوں اور کولہوں کے عضلات میں سستی اور جلد میں خدر کی سی کیفیت محسوس ہوا  
کرتی ہے (۴) چلنے میں پاؤں بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اور پیرو میں تناؤ یا چھین کا سادرو ہو کر رہتا ہے  
(۵) ممکن ہے کہ وید جرقہ باطن پر اور اس کے ساتھ علاقہ رکھے والی دیگر بڑی رگوں پر دباؤ پڑنے  
پاؤں میں اجتماع اور ہیج پیدا ہونے لگے (۶) رسولی کے دباؤ سے رحم کی گردن چھوٹی ہو کر سانے کو  
جھک جاتی ہے (۷) مریضہ کے چہرہ کی خاص حالت اور اس میں بے رونقی پیدا ہو جاتی ہے۔

امراض متشابهہ سے تشخیص۔ خضتہ الرحم کی رسولی جب بڑھ کر جوف عانہ میں پھنس جاتی ہے تو چھ  
تینوں قسموں میں سے کسی قسم کی ہو اسکو رحم کی رسولی سے یا حاملہ کے میلان رحم سے تشخیص کرنا مشکل  
ہوتا ہے۔ اسلئے یا در کھنا چاہئے کہ اگر کئی مہینہ سے ایام معمولی بند ہوں۔ اور اندام نہانی و پستان کے  
مستقل علامات حل موجود ہوں۔ اور رحم کی گردن نرم ہو مریضہ کی طبیعت زیادہ مضطرب نہ ہو اور میلان رحم کے

اسباب واقع ہوئے ہوں۔ تو حاملہ کا رحم پیچھے کو جھک جانے سے رحم یا خصیۃ الرحم کی رسولی کا شبہ ہو سکتا ہے لیکن اگر جریان حین میں بے قاعدگی اور کثرت پانی جاوے اور ایام مقررہ میں مریضہ درد شدید کی شکایت کرے۔ اندام نہانی میں انگلی داخل کر کے امتحان کرے تو رحم رسولی پر پھیلتا ہوا معلوم ہو تو اس کو رحم کی رسولی سمجھنا چاہئے۔ اگر علامات مذکورہ بالا میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے اور جوف عانہ کے اندر غیر معمولی ابھار موجود ہو تو خصیۃ الرحم کی رسولی سمجھی جائے۔ اور جب یہ رسولیاں بڑھ کر جوف شکم میں پہنچ جاتی ہیں۔ تو ابتداء میں آنتوں اور معدہ وغیرہ پر دباؤ پڑنے سے مریضہ پیچ رہتی ہے۔ اسکی طبیعت متفعل اور سست رہنے کے علاوہ ہضم کی خرابی رہتی ہے۔ وجہ قبول کھانا نہیں کھا سکتی۔ اور جو کچھ کھاتی ہے تے سے نکل جاتا ہے۔ اسلئے وہ رفتہ رفتہ ضعیف والا غریبہ جاتی ہے اسکا شکم بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت اس مرض کو استقار یا حمل یا شکم و رحم کی رسولیوں سے فرق کرنا ہوتا ہے اسلئے یاد رکھنا چاہئے۔ کہ حمل کی دیگر علامات (معلقہ اندام نہانی و پستان وغیرہ) کے علاوہ حمل کا ابھار پیڑوں کے ٹھیک بیچ سے اوپر کو اپنی خاص رفتار کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اور خصیۃ الرحم کی رسولی پیڑوں کی دہائی یا بائیں طرف سے شروع ہو کر اوپر کو اور دوسری طرف کو بڑھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور استقار میں شکم کا ابھار ناف کے قریب سے شروع ہوتا ہے۔ شکم کی جلد میں پانی چکھنے لگتا اور ناف ابھرتی ہے۔ مریضہ کو اس سے پہلے مرض جگر یا گردہ یا قلب کی شکایت ہوتی ہے۔ سیطیح شکم کی رسولی حمل کے اندر شروع ہو کر بڑھ کر کرتی ہے۔ اور رحم کی رسولی کی علامات اور جریان لگتی ہیں ان تمام علامات کو ذرا ملاحظہ کر کے تشخیص میں



تصویر نمبر ۲۰

خصیۃ الرحم  
کی رسولی

کافی امداد حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ چھینٹا رحم کی رسولی میں بال یا چربی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اگر خصیۃ الرحم میں کسی قدر التهاب موجود ہوتا ہے۔ اس وقت رحم کے

رباط عین کے التہاب سے فرق کرنے کے لئے علامات مندرجہ ذیل کا خیال رکھنا چاہئے۔ (۱) خفیۃ الرحم کی رسولی کو ادھر ادھر حرکت دیا جاسکتی ہے۔ اور اس سے مرصیہ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی اور التہاب رباط عین میں ابھار اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا اور وہاں صرف ہاتھ رکھنے سے مرصیہ ٹپ جاتی ہے (۲) اگر یہ رسولی جوف عانہ میں پھنس جانے کی وجہ سے حرکت نہ کر سکے تو اس میں اندام نہانی کی پھت اس قدر مٹی ہو کر سخت نہیں ہو جاتی ہے جس قدر کہ رباط عین اور اس کے قریبی خانہ و اساحت (سیلولر ٹش) کے التہاب میں ہوتی ہے خفیۃ الرحم کی رسولی خواہ جوف عانہ میں ہو یا جوف شکم میں تاہم اسکی شکل و عدد و ٹٹولنے سے بخوبی معلوم ہو سکتے ہیں۔ بخلاف ورم رباط عین وغیرہ کے (۴) یہ رسولی اکثر ایک طرف ہی ہوتی ہے اور رباط عین کا ورم اگر ایک طرف ہو تو بہت جلد دوسری طرف بھی ہو جاتا ہے (۵) رسولی ایک مدت تک رفتہ رفتہ بڑھتی رہتی ہے۔ اور بالآخر اس میں پانی وغیرہ کا وجود ثابت ہونے لگتا ہے۔ رباط عین کا ورم بہت جلد پکنے لگتا ہے۔ اور اس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔

علاج۔ اگر خفیۃ الرحم کی میں رقبہ پانی بھرا ہوا ہو تو اس کا علاج استسقاء خفیۃ الرحم کے موافق کرنا چاہئے۔ اور اگر رسولی میں گاڑھی رطوبت بھری ہوئی ثابت ہو تو تحلیل رطوبت کے لئے مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کرنی چاہئیں (۱) بھیکاسنی۔ بیج بادیان۔ اصل سوس مقشر مکوہ خشک۔ شاترہ گاؤد بابا ہر ایک ۵ ماشہ۔ تخم کوٹ (پوٹلی میں باندھ کر) ۳ ماشہ سب کو آدھ سیر پانی میں پکائیں جبا میکائی پانی باقی رہ جائے تو افتیمون ۳ ماشہ کی پوٹلی اس میں ڈال کر مثل چائے کے دم کریں۔ ایک گھنٹہ کے بعد چھانکر سفین غصلی یا بزوری ۲ تولہ یا مشرب دینارہم تولہ حل کر کے پلائیں (۲) نسخہ مذکورہ بالا تین روز تک پلانے کے بعد شام کے وقت یہ سفوف بھی ہمراہ جو شامہ اذخر کی ۲ ماشہ۔ تخم اسی ۲ ماشہ کے پلانے شروع کریں۔ نسخہ سفوف کا یہ ہے۔ ریوند حنی مجبیط ہر ایک ۹ ماشہ۔ داحینی ۳ ماشہ بکو کوٹ چھانکر سفوف بنائیں۔ حوزاک ۳۰ ماشہ ہے (۳) اکلیل الملک، بالچھر، برگ سداب۔ تخم میقہ۔ مرزنجوش۔ گل بابونہ۔ مکوہ خشک۔ مجبیط بگل سرخ ہر ایک ۲ تولہ لے کر پانی میں جو شامہ دیں اور صاف کر کے بڑے برتن میں ڈال کر مرصیہ کو اس میں بیٹھائیں (۴) بالچھر ۲ ماشہ۔ زعفران ۳ ماشہ۔ باریک پس کر مغر ساق کاؤ میں ملا کر آبن کے بعد مالش کریں (۵) بالچھر۔ برگ سداب۔ تخم میقہ صندل۔ اکلیل الملک ہر ایک ۲ ماشہ۔ انجیر خشک ۵ عدد کوٹ چھان کر رکھیں۔ اور اشق و گول ہر ایک ۵ ماشہ

سرکہ شرب میں حل کر کے چھان لیں اور کٹی ہوئی ڈوائیں اس میں ملا کر موم زردہ ماشہ۔ روغن گل ۲ تولہ  
میں گھلا کر اس میں ملائیں۔ پھر اس میں سے قدرے لیکر آب مکوہ سبز اور سرکہ خالص کے ساتھ  
نیم گرم لیمپ کریں (۶) اسی طرح یہ لیمپ بھی مفید ہے۔ عود خام۔ بالچڑ۔ یونڈ چنی۔ جبالہ۔ ہر ایک ماشہ  
گوگل۔ مصطکی ہر ایک ۲ ماشہ۔ مومیاٹی۔ زعفران ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ سب کو باریک پس کر آب مکوہ سبز  
بغذر حاجت روغن سوسن۔ یا روغن بکائن ایک تولہ میں ملا کر نیم گرم ضماد کریں (۷) زردہ ماشہ۔ طویل الملوہ  
ہر ایک ۶ ماشہ۔ فسنیقین۔ زعفران ہر ایک ۲ ماشہ باریک پس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ جب ہر نصفی  
حالت رو بہ اصلاح ہو تو ایام کی باقاعدگی کے لئے ۲ گولیاں رات کو سوتے وقت عرق بادیاں کیسٹیا  
کھلائی جائیں (۸) کثرت ریح و قراقر اور درد شکم کی تکلیف دور کرنے کیلئے یہ گولیاں مفید ہوتی ہیں ہونیک  
الموہ۔ زعفران۔ افیون ہر ایک ۳ ماشہ باریک پسکر دانہ ماش کے برابر گولیاں بنائیں ان میں سے ایک گولی  
عرق پودینہ یا عرق جوائن کے ساتھ کھلائیں (۹) مرکبات میں سے والاکرم اور قرص مقل اور معجون اناسیا  
صغیر بھی اس مرض میں تحلیل و طہیت اور ادرار کیلئے مفید ہوتی ہیں نسخہ دوم والاکرم۔ زعفران۔ بالچڑ۔ ہر ایک  
ایک تولہ۔ مرکی۔ وارچنی۔ فجاج۔ ذخیرہ قسط تلخ ہر ایک ۶ ماشہ۔ سب کو کوٹ چھان کر شہد خالص ۱۲ تولہ میں  
ملا کر اس میں سے ۳ ماشہ ہر روز کھلایا جائے۔ نسخہ قرص مقل مقل مصفی ۵ تولہ۔ گل سرخ ۱۰ ماشہ۔ بالچڑ۔ ہر ایک  
قسط تلخ۔ مغربا دام تلخ ہر ایک ۳ ماشہ۔ مرکی۔ مصطکی۔ زعفران ہر ایک ۲ ماشہ۔ سب کو پس چھان کر شہد خالص  
میں ملا کر قرص تیار کریں۔ مقدار خوراک ۱۰ ماشہ۔ تہ عرق پودینہ ۵ تولہ کے نسخہ ثانی اناسیا صغیر معیہ یا سبہ  
زعفران قسط تلخ۔ بالچڑ۔ مرکی۔ عود۔ ملباں۔ سیلخہ۔ افیون ہر ایک ۶ ماشہ۔ عصارہ خافث ایک تولہ۔  
املا سوسن مقشر ۱ تولہ۔ سب کو کوٹ چھان کر پاؤسیر شہد میں ملائیں۔ خوراک ۲ ماشہ ہے۔

**فصل نویں۔** استسقاء خصیۃ الرحم (ادویرین ڈرپسی) یعنی خصیۃ الرحم میں پانی بھر جانا۔  
یہ مرض نو عمر لڑکیوں اور بوڑھی عورتوں کو بہت کم ہوتا ہے۔ ۳ سال سے ۵۰ سال کی عمر تک زیادہ ہوتا ہے  
اکثر خاوند والی عورتیں بہ نسبت بے شوہر والیوں کے۔ اور بالچھ عورتیں بہ نسبت اولاد والیوں کے اور  
وہ عورتیں جن کو بے قاعدگی ٹمٹ یا دوسرے امراض رحم کی شکایت ہو۔ اس مرض میں زیادہ  
متلا دیکھی جاتی ہیں۔

یہ مرض اکثر اسقدر پوشیدہ طور پر شروع ہوتا ہے کہ ابتداء میں جب ہر نصفی اپنے پیڑ میں کھینچتا ہے

نہایت

نہایت

نہایت

اجبار دیکھتی ہے تو سمجھتی ہے کہ فربہ یا کثرت ریح کے سبب سے ہے۔ اور اگر وہ شوہر والی ہے اور کسی وجہ سے اتفاقاً اس کا حین بھی رک گیا ہو تو اپنے کو حاملہ سمجھتی ہے۔ اسلئے وہ علاج کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتی۔ البتہ جب تین یا چار مہینے گزر جانے کے بعد وہ اپنی کو کھ میں سخت اجبار سچہ کے سر کا سایا پاتی ہے اور بچہ کی حرکت اسے محسوس نہیں ہوتی۔ یا اس کا شکم امید سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اسے فکر ہوتا ہے اور اس اجبار کو رسولی یا دمل کا اجبار سمجھ کر طبیب کی طرف رجوع کرتی ہے۔

**حقیقت** اس مرض کی یہ ہے کہ خفیۃ الرحم کے خاص غلاف میں رقیق سفید یا قدرے سرخی مائل چمکاو دار پانی جمع ہو جاتا ہے اور خفیۃ الرحم کا غلاف ایک پانی سے بھری ہوئی پھٹی کی طرح ہو جاتا ہے ابتداء میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خفیۃ الرحم کی سطح پر گویا ایک چھوٹا سا آبلہ پیدا ہو گیا ہے جس میں رقیق رطوبت بھری ہوئی ہے۔ اس وقت تک اس مرض کو خفیۃ الرحم کی رسولیوں کے اقسام میں شمار کیا جاسکتا ہے لیکن جب کچھ دنوں میں وہ آبلہ رفتہ رفتہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ جوف عانہ سے اونچا ہو کر جوف شکم میں جگہ لیتا ہے۔ اس وقت مریضہ کا شکم حاملہ کی طرح یا استسقا والے کی طرح بڑھ جاتا ہے۔ اس حالت میں اس مرض کو استسقا و خفیۃ الرحم کہتے ہیں۔

**اسباب**۔ اس مرض کے اسباب پیدائش بیان کرنے میں اطباء کی مختلف رائیں ہیں (۱) اطباء قدیم کی رائے کے موافق کہا جاسکتا ہے کہ خفیۃ الرحم کی ساخت میں کمزوری پیدا ہونے کے سبب یا جن میں کوئی خرابی موجود نہ ہو نیکے سبب اس کا غذائی مادہ اسکی ساخت میں مقیم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لئے رطوبتی فضلات خفیۃ الرحم کے غلاف میں کثیر المقدار جمع ہو جائیں۔ تو اس مرض کا نام استسقا و خفیۃ الرحم رکھا جاتا ہے (۲) اطباء جدید میں سے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ خفیۃ الرحم کے خاص غلاف (ٹیوبی کا البوجی نیا) میں التهاب مزمن (کرائنگ انفلامیشن) پیدا ہو کر اس کے مسامات میں سے رقیق رطوبت رستے لگتی ہے۔ اور غلاف مذکور کے اوپر جو صفائی البطن کا استر ہوتا ہے اس کے نیچے رطوبت جمع ہوتی رہتی ہے (۳) اور اکثر اصحاب کا خیال ہے کہ خفیۃ الرحم میں ہمیشہ پیدا ہونے والا آبلہ مناجیم یعنی حوصلہ کرافیوس (گرافی ان ویسکیل) جو بجائے اپنے مقر وقت پر تیار ہو کر چھٹا کرتا ہے۔ اور بچہ کی پیدائش کا انسانی مادہ (اووم) اس کے اندر سے نکل کر قاذف نالیوں کے راہ جوف رحم میں پچھا کر رہتا ہے۔ اگر اس آبلہ مناجیم کی ساخت میں کسی سبب التهاب پیدا

پیدا ہو جائے تو اس سے ایک رفیقِ رطوبت برسرِ کمر اس کے اندر جمع ہونی ترسہنی ہے۔ چنانچہ اس تنازعہ کا غلاف کسی وجہ سے اس قدر سخت و مضبوط ہو جائے کہ اس رطوبت کے تناؤ سے نہ پھٹ سکے، تو غلاف مذکور میں رفتہ رفتہ کثیر المقدارِ رطوبت جمع ہو جاتی ہے اور مریضہ کا شکم استسقا والے مریض کی طرح بڑھ جاتا ہے شکم کی جلد تن جاتی ہے اور اس پر سفید خطوط نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن اس میں پانی کی چمک نہیں ہوتی ہے۔ علامات (۱) ابتداء میں کوکھ اور پیڑوں کے درمیان گول اُبھار محسوس ہوتا ہے (۲) لیکن آخر میں پانی سے بھرا ہوا خبیثہ الرحم رفتہ رفتہ تمام شکم کو گھیر لیتا ہے (۳) اگر مریضہ کے شکم پر دونوں طرف ہاتھ رکھ کر ایک طرف سے حرکت دیں تو دوسرے ہاتھ کو پانی کی لہریں محسوس ہوتی ہیں (۴) چونکہ اس مرض میں اکثر ایک خبیثہ مبتلا ہوتا اور دوسرا سالم ہوتا ہے۔ اسلئے مریضہ کو عموماً حصین کے متعلق کوئی زیادہ شکایت نہیں ہوتی ہے (۵) لیکن جب شدتِ مرض سے مریضہ بہت ضعیف ہو جاتی ہے تو قلتِ حصین یا احتباسِ حصین تک نوبت پہنچتی ہے (۶) اگر مریضہ زیادہ لاغر نہ ہو تو غلافِ خبیثہ الرحم کے تناؤ اور درد کی تکلیف سے ایامِ مقررہ پر رحم کی ساخت میں بکثرت اجتماعِ خون ہونے سے کثرتِ حصین کی شکایت بھی ہو سکتی ہے (۷) کبھی اس مرض کے ساتھ خبیثہ الرحم میں ورم بھی ہوتا ہے تو انکی علامات (بخار، پیڑوں میں درد، سرخی و گرمی وغیرہ) بھی پائی جاتی ہیں (۸) خبیثہ الرحم میں پانی کی زیادہ مقدار جمع ہو جانے سے مریضہ کے شکم اور حجابِ حاجز میں تناؤ پیدا ہونے کے باعث اس کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے (۹) کبھی آنتوں پر زیادہ دباؤ پڑنے سے مریضہ کو قہقہ شکم ہو جاتا ہے (۱۰) کبھی مثانہ کے بالائی حصہ پر دباؤ پڑنے سے حقوڑا حقوڑا پیشاب جلد جلد آیا کرتا ہے جسے وہ روک نہیں سکتی (۱۱) کبھی مثانہ کی گردن درجہ بے بولی پر دباؤ پڑنے سے اس کا پیشاب سیارکِ جانبہ کہ قاناطیر سے نکالنا پڑتا ہے (۱۲) کبھی گردوں پر دباؤ پڑنے سے بون کی پیدائش کم ہونے لگتی ہے۔ اور خون میں فاسد فضلات کی آمیزش ہونے سے بعض دیگر امراض پیدا ہو جاتے ہیں امراضِ متشابہ سے تشخیص۔ اس مرض میں بعض مرتبہ تو حمل کے ساتھ اور بعض مرتبہ امراضِ مندرجہ ذیل کے ساتھ اشتباہ ہو سکتا ہے۔ اسلئے تشخیصی علامات کا یاد رکھنا ضروری ہے۔

(۱) تندرست عورت کو استقرارِ حمل سے پہلے حصین باقاعدہ آتا ہے۔ اور حمل قرار پانے کے بعد اس کی بندش سے کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اور حمل کا اصبار اور سختی پیڑوں کے بیچ سے شروع ہو کر راہِ باہ ایک خاص رفتار سے بڑھتی ہے۔ رحم کی گردن نرم ہوتی ہے۔ پھر چوتھے مہینہ میں حاملہ کو بچہ کی حرکت

محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح بچہ کے دل کی حرکت آگے سینہ میں کے ذریعہ معلوم کی جاسکتی ہے۔ حالہ اگر کسی سبب سے ضعیف و لاغر ہو تو بھی اسکی طبیعت زیادہ مضحمل اور چہرہ بے رونق اور سمیت پست نہیں ہوتی ہے لیکن اس مرض میں حین کسی قدر بے قاعدہ اور تکلیف سے آتا ہے۔ ابھار پیڑ کے کسی جانب سے شروع ہو کر دوسری طرف کو بتدریج بڑھنے لگتا ہے چونکہ حمل نہیں ہے اسلئے نہ مرہضہ کو کسی وقت بچہ کی حرکت محسوس ہوتی ہے اور نہ امتحان کرنے والے کو بچہ کے دل کی حرکت کا پتہ لگتا ہے۔ اور اگرچہ اکثر مرہضہ کی قوت جلد زائل نہیں ہوتی۔ اور بظاہر اس کی عامہ صحت میں کچھ زیادہ خلل محسوس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کا چہرہ بے رونق اور سمیت پست اور طبیعت سست رہتی ہے۔

(۲) رحم سے باہر (جوف شکم کے اندر) حمل قرار پانے کی حالت میں حاملہ کے شکم میں درد و لمبڈت اور تواتر ہوا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اکثر خون حین جاری ہو کر ہمیں جھلی کے ٹکڑے خارج ہوا کرتے ہیں رحم کی گردن ملائم ہوتی اور مدت حمل کے آخر میں اگر شکم کو ٹٹولیں تو رحم بڑھا ہوا جوف شکم میں اونچا نہیں معلوم ہوتا بچہ کے اعضا کا ابھار اس (رحم) سے اوپر علیٰ معلوم ہوا کرتا ہے لیکن اس مرض (استقاخصیۃ الرحم) میں اگر کبھی مرہضہ کو درد شکم کی شکایت ہوتی ہے تو شکم میں سوئیاں سی جھتی ہوتی محسوس ہوا کرتی ہیں اور اگر خون حین آتا ہے تو اس میں جھلی کے ٹکڑے نہیں ہوتے۔ رحم کی سکونت جوف عانہ میں اور اس کی گردن اپنی معمولی حالت پر ہوتی ہے۔ اور مرہضہ کے شکم کو ٹٹونے سے بچہ کے اعضا کا ابھار محسوس نہیں ہوتا۔

(۳) استقا، ایشیہ (ڈیپسی آف دی ایمین) میں حاملہ کا رحم حسب معمول جوف عانہ سے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اور اندام نہانی میں انگلی داخل کریں تو رحم تک لمبڈل ہو پختی ہے۔ نیز یہ عارضہ مدت حمل سے زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن استقاخصیۃ الرحم میں رحم اکثر جوف عانہ سے کچھ زیادہ اونچا نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر پانی سے بھرا ہوا خصیۃ الرحم جوف شکم تک پہنچ جائے تو کلائی شکم زیادہ دنوں تک رہتی ہے۔

(۴) مرنس بجا (سپورس پرگنٹن سی) یعنی حمل کا ذب میں اکثر مرہضہ کے شکم کا ابھار جوف عانہ کے درمیان سے اوپر کو چڑھتا ہے اور اس میں بہ نسبت حمل کے سختی کسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن استقاخصیۃ الرحم کا ابھار پیڑ کے ایک جانب شروع ہو کر اوپر کو بڑھتا ہے اور ہاتھ کے ساتھ ٹٹونے سے اس میں پانی بھرا ہونے کے سبب نرم معلوم ہوتا ہے۔



(۵) رحم کے اندر اگر خون یا پیپ کا زیادہ اجتماع ہو تو اس حالت میں بھی پیڑ کا اچھا مرض استسقاء خضیہ رحم سے مشابہ ہوتا ہے۔ لیکن اسباب مقدمہ کے دریافت کرنے سے یہ اشتباہ بخوبی رفع ہو سکتا ہے۔

(۶) شکم کی رسولیاں جلد یا عضلات شکم میں پیدا ہو کر اگرچہ مقام ماؤف سے ہر طرف کو پھلتی ہیں لیکن پھر بھی ان کے پھیلاؤ کا میلان اکثر نیچے کو زیادہ ہوتا ہے۔ بخلاف اس مرض کے کہ اس کا پھیلاؤ ہمیشہ جوف عانہ کے کسی ایک طرف سے شروع ہو کر اوپر کو بڑھا کرتا ہے۔

(۷) استسقاء البطن (ایڈومی نل ڈراپسی) میں مریضہ کو پہلے سے کوئی مرض دل یا گردہ یا جگر کا ہوتا ہے اور پھر اسے شکم کا ابھار ناف کے قریب سے شروع ہو کر تمام شکم میں پھیلتا ہے۔ اور شکم کا درمیانی حصہ زیادہ اونچا نہیں ہوتا۔ اور شکم کی جلد شدت تناؤ سے پتلی ہو کر اور اس کے اندر پانی بھرا رہنے سے چکنے لگتی ہے اور شکم کی رگیں نیلی اور کسی قدر موٹی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس مرض میں شکم کی رگیں بہت موٹی اور کھال سخت اور بے رونق ہوتی ہے۔ اچھا جوف عانہ کے ایک طرف سے شروع ہو کر اوپر کو

(دیکھو تصویر نمبر ۳۷، استسقاء خضیہ الرحم کی)



مریضہ بیٹھی ہے۔ کوڑی کے مقام مردانہ پتھر رکھا رہی تھیں  
کا اظہار کرتی رہی ہے۔ پانی سے پھر اس کو خضیہ الرحم جوف  
شکم میں کوڑی تک پہنچ جانے سے اس کا پیٹ مستقیم  
کی طرح بڑھ گیا ہے۔ شکم کی جلد میں موٹی موٹی  
رگیں ابھرتی ہیں۔

بڑھتا ہے مریضہ کو دل یا گردہ یا جگر کے کسی مرض کی  
شکایت نہیں ہوتی۔ شکم کا درمیانی حصہ زیادہ ابھرا ہوا اور  
اچھال کے گرد کی حدود اچھی طرح محسوس ہوا کرتی ہیں  
علاج۔ ابتداء میں اس میں ایسی دوائیں مفید ہوتی  
ہیں جن سے بلغمی رطوبات کی پیدائش میں کمی ہو کر خون  
کا قوام درست ہو سکے۔ اور جگر میں قوت پیدا ہو کر  
اس کا فعل درست ہو جائے۔ ایام معمولی کی حالت  
سھٹیک ہو جائے۔ لیکن اگر مرض شدید ہو کر استسقاء  
سے مشابہ ہو جائے تو استسقاء کی طرح اس میں نڈیہ  
۲ (ٹروکار) پانی نکال کر ایسی دوائیں دی جائیں جن سے  
خضیہ الرحم میں پانی کی پیدائش نہ ہونے پائے اس  
غرض کیلئے مندرجہ ذیل تدابیر نہایت مفید ہوتی ہیں  
(۱) اساروں۔ بادیان۔ اجوائن دیسی۔ تخم کر فس۔

چھانڈنا کا نسخہ

نوشہ ریوند

جو شانہ کا نسخہ


نوشہ مازنیان

جوف علی

بالچھر۔ وج ترکی۔ انجان رومی۔ پودینہ خشک۔ تخم ملیون۔ کاکچ ہر ایک ۳ ماشہ سب کو آدھ سیر یاں  
میں جوش دیں جب ایک ثلث پانی باقی رہ جائے اس وقت صاف کر کے شربت اقیقون ۲ تولہ ملا کر  
صبح کے وقت پلائیں (۲) شام کو حب ریوند ہمراہ جوشانہ انیسوں ۳ ماشہ۔ بادیان ۵ ماشہ۔ اجوان  
دہی ۳ ماشہ۔ شربت کثوت ۲ تولہ کے ساتھ کھلائیں۔ نسخہ حب ریوند۔ تربد سفید ۱ تولہ۔ ریوند چنی۔  
گوگل مصفی ہر ایک ۵ ماشہ۔ زراوند مدحرج ۳ ماشہ۔ انیسوں ۱۰ ماشہ۔ سب کو باریک میکہ پانی میں گوند کر  
چنے کے برابر گویاں بنائیں (۳) دارچینی چرائے۔ برگ جھاؤ۔ زراوند مدحرج۔ گل بابوبہ۔ گل سرخ۔ حنظل  
سرخ۔ جدوار اصلی ہر ایک ۱ ماشہ باریک پس کر روغن سوسن یا روغن بکاسن میں ملا کر نیکم صناد  
کریں (۴) بالچھر۔ دارچینی۔ سلجہ۔ اجوان دہی۔ زراوند مدحرج ہر ایک ۱ ماشہ کھاری نکل بکتور سب کو نیم  
۲ تولہ سب کو نیم کوفتہ کر کے پوٹلیاں بنائیں اور گرم کر کے تکید کریں۔ (۵) قرص مازیون کا یہ نسخہ بھی  
اس مرض میں بہت مفید ہے نسخہ قرص مازیون۔ مازیوں ایک تولہ اسقدر سرکہ میں ترکیں کہ انکے  
اوپر آئے۔ دوشبانہ روز کے بعد اسے سایہ میں خشک کر لیں۔ پھر پوست ہلیہ زرد۔ آرد جو۔ نبات سفید ہر ایک  
ایک تولہ لیکر سب کو جدا جدا کوٹ کر چپان کر پانی میں گوندھ لیں اور قرص بنا کر سایہ میں خشک کریں۔ خوراک  
۳ ماشہ ہے۔ اس سے رقیق دست آتے ہیں اور احشا میں پانی کی پیدائش کم ہونے لگتی ہے (۶) پیرفون  
بھی بہت فائدہ دیتا ہے۔ لکھی سیاہ۔ کالی زیری۔ ہر ایک ۳ ماشہ کوٹ چھانڈ کر صوف بنائیں۔ اس میں سے  
۲ ماشہ لے کر رات کو سوتے وقت عرق بادیان۔ عرق مکوہ ہر ایک ۵ تولہ کے ساتھ کھلا دیا کریں۔ اس  
سے بھی پتلے دست آتے ہیں (۷) مرصیہ کو غذا میں سٹوربا کو تر کا یا بجونی ہوئی چڑیاں دینی چاہئیں  
اور اگر پانی کے بجائے صرف عرق برنج جھاؤ اور مکوہ قدر سے پینے پر صبر کر سکے تو بہتر ہے۔ ورنہ پانی میں  
لوہا بھجا کر پینا چاہئے۔

**فصل دسویں** سلعہ دموی عانہ (پلوک ہیماتوسیل) یعنی جوف عانہ میں اجتماع خون ہو کر  
رسولی کی شکل اختیار کرنا۔ اگر یہ اجتماع خون رحم کے پیچے خلاۃ الدیکلس (پاڈج آف وگلاس) میں ہوتا ہے  
تو اسکو سلعہ خلف الرحم (ریٹرو لیوٹرائن ہیماتوسیل) کہتے ہیں اور اگر رحم کے سامنے اور شانہ کے مابین  
خلویں ہوں تو اسکو سلعہ قدام الرحم (انٹی لیوٹرائن ہیماتوسیل) کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے  
کہ اس خون میں سے کچھ حصہ رحم کے سامنے یا پیچھے والی خانہ و اساحت میں جذب ہو کر اس میں درم یا

سلہ دموی پیدا کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ورم مذکور سے یہ مرض پیدا ہو جائے۔



لغویہ مہمے میں سلہ دمویہ عانہ کی  
دونوں قسٹیں قدیمی و خلقی دکھائی  
گئی ہیں۔


(۱) رحم کے سامنے اور پیچھے جتماع خون  
(۲) مثانہ خون کے دباؤ سے پک گیا ہے  
(۳) اندام نہانی  
(۴) رحم

**اسباب (۱)** یہ مرض اکثر سن شباب میں جوش خون یا حدت خون سے ہوتا ہے (۲) جوش خون کے  
سبب سے ہی کبھی شدید ٹائیفیس فیور میں یکا یک یہ مرض ہو جاتا ہے (۳) سنا ذونا در بڑھاپے میں بھی احتیاطاً  
لات یا گھونسا وغیرہ کی چوٹ لگنے سے یا بلجھ اٹھانے سے ہو سکتا ہے (۴) عام بدنی ضعف و لاغری اگر کسی  
خون یا بلغمیت خون کے سبب ہو اور ایسے موقع پر جوش خون کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ اور احتیاطاً جوف  
عانہ میں اجتماع خون ہو کر اسکو وہاں سے نکلنے کا موقع نہ مل سکے تو اس حالت میں بھی یہ مرض پیدا  
ہو سکتا ہے (۵) اسی طرح رحم یا حقیقۃ الرحم یا قاذف نالیوں یا اندام نہانی یا شرمگاہ کی ساخت میں  
دیگر وجوہات سے اجتماع خون ہونا (۶) ایام معمولی کے موقع پر احتیاطاً عانہ میں بیرونی نمردی کا اثر پہنچنے  
سے یا دفعۃ غم یا خوف وغیرہ دماغی صدمات کے واقع ہونے سے یکا یک احتیاطاً طہت ہو جانا (۷) حمل  
کے ابتدائی زمانہ میں اسقاط ہو جانا۔ یا رحم سے باہر منتقل حمل ہونا۔ یا رحم کا پھٹ جانا (۸) کسی وجہ سے  
حقیقۃ الرحم یا قاذف نالیوں کا پھٹ جانا۔ یا حقیقۃ الرحم کے مرن میں عمل جراحی کرنا (۹) التهاب  
الصفاق الرحمی (پیری مٹرائیٹس) اور التهاب مجاورات الرحم (پیرامیٹرائیٹس) یا بلیک  
سیلولائیٹس) بھی اس مرض کے اسباب میں سے ہیں۔

**علامات (۱)** اسباب مذکورہ بالا میں سے بعض کا تقدم اور بعض کا موجود ہونا اور اس کے بعد یکا یک  
مرض کا ظاہر ہونا (۲) مرض شروع ہونے سے پہلے بعض مرتبہ جریان طہت بکثرت ہوتا ہے۔ اور بعض

مرتبہ بلا جریان طمث کے مرض پیدا ہو جاتا ہے (۳) جو غانہ میں اجتماع خون کے سبب مریض کو قے اور متلی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ مقبن شکم یا احتباس بول کی شکایت ہوتی ہے (۴) مریضہ کو جو غانہ میں درد شدید اور بوجھ اور باد محسوس ہوتا ہے (۵) منجن سریل و ضعیف ہوتی ہے اور ابتدا مرض میں درجہ حرارت گھٹ جاتا ہے۔ لیکن شدت مرض کے وقت درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور منجن مختلف ہو جاتی ہے۔ کبھی جریان طمث بکثرت ہوتا ہے اور شدت ضعف کے سبب غشی تک لغویت پہنچتی ہے (۶) اندام نہانی میں انگلی داخل کر کے امتحان کرنے سے رحم کی ساخت سالم معلوم ہوتی ہے لیکن رحم کے آگے یا پیچھے اول ایک نرم ابھار مع گرمی کے محسوس ہوتا ہے جو چند روز کے بعد سخت

ہو جاتا ہے (۷) رحم مخالف جانب کو سامنے یا  
پچھے کو مائل ہو جاتا ہے اور مرض جب قدر زیادہ  
دنوں کا ہوتا ہے اس قدر رحم ایک جگہ جکڑ جاتا ہے



تقدیر غیرہ، جو غانہ میں اجتماع خون ہو کر سامنے چھوٹا ہو  
اور پیچھے معاصر مقیم کو دوبارہ ہے

(۸) جھکاسہ اور پیڑو کے درمیان ابھار پایا جاتا ہے  
یہ جس پر بھونکنے سے آواز مھوس آتی ہے  
(۹) علامات مندرجہ بالا کا بشدت پایا جانا  
یا انہیں کسی قدر کمی ہونی۔ جو غانہ میں جمع  
ہونے والے خون کی مقدار پر موقوف ہے  
علاج۔ مریضہ کو بستر پر آرام سے لیٹے

رہنے کی ہدایت کرنی چاہئے۔ اگر مریضہ جوان ہو اور اس کے خون میں حلت پانی جائے تو شدت  
مرض اور بخار کی حالت میں صبح کو یہ نسخہ پلایا جائے (۱) گل بنفشہ۔ شاہترہ۔ منڈی۔ مکوہ خنگ  
ہر ایک ۵ ماشہ۔ عناب۔ آلو بخارا۔ ہر ایک ۵ دانہ۔ تخم کاسنی۔ تخم خیاریں۔ گل ثلثہ فرنگی۔ گلاب  
ہر ایک ۵ ماشہ۔ رات کو پانی میں بھلو کر صبح کو صاف کر کے حمیرہ بنفشہ سے تولہ حل کر کے پلائیے۔  
اگر احتشاء و غانہ میں درم بھی موجود ہو تو اس نسخہ میں آسہا کاسنی سبز مردوق اور آب مکوہ بنفشہ  
اضافہ کیا جائے (۲) اگر مریضہ دوا کی زیادہ مقدار پسند نہ کرے اور ضعیف ہو تو بجائے اس نسخہ کے  
حمیرہ گلاب و زباں پر درق تھریہ لپیٹ کر اس کے ساتھ صرف مردقین میں حمیرہ بنفشہ حل کر کے پلانا


بھی کافی ہوتا ہے (۳) شام کے وقت حمیرہ مردارید سمراہ لعاب بہداندہ - بشیرہ عناب - عرق مرکب  
مصفی خون - شربت نیلوفر پلایا جائے (۴) عصہ ماؤف کی طرف مادہ کی آمد روکنے اور مادہ موجودہ  
کی تحلیل و تسکین درد کیلئے ابتدا مرض میں ریضا مفید ہوتا ہے گل سرخ - گل بالونہ - مکوہ خشک -  
مغز الملتاس - صندل سفید - رسوت خالص - آرد جو - طحلب - آب کاسنی سبز - آب مکوہ ہترہ - روغن گل  
سفیدی - صبیضہ مرغ سرکہ خالص بدستور تیار کر کے صناد کرے (۵) زیادتی جوش خون اور گرمی مزاج  
شدید سوزش کی حالت میں پیروپربرف رکھنا بھی مفید ہوتا ہے (۶) اگر مریض بہت ضعیف نہ ہو تو کبھی صند  
بالیق کھولنی پڑتی ہے (۷) غذا میں آتش جو یا دال مونگ کا پانی یا کدوے دراز یا خرقہ یا بالک کاساگ  
اور دوسری سرد غذا میں مناسب ہیں - اور میوہ جات میں سے انار یا انور دے سکتے ہیں۔

اگر مریض کا مزاج سرد ہو اور اس کے خون میں بلغمیت پائی جائے تو صبح کے وقت پینے کیلئے نسخہ دیا جائے  
(۱) شہترہ - مکوہ خشک - بادیان - بیجا دیان - تخم خرپرہ - ہر ایک ۷ ماشہ - پرسیاوشاں - جنبتین - فوہ  
ہر ایک ۵ ماشہ پانی میں جوش دیکر صاف کرے اور شربت دینا ۴ تولہ حل کر کے پلائی (۲) شام کا نسخہ یہ ہے  
دوا الملک صغیر یا کبیر ۵ ماشہ سمراہ شیر بادیان - بشیرہ تخم کثوث - بشیرہ مکوہ خشک ہر ایک ۵ ماشہ عرق برنج صاف  
۱۰ تولہ - شربت بنوری ۴ تولہ - صناد کا نسخہ یہ ہے - جدوار اہل - مکوہ خشک - مغز الملتاس - حاشا -  
مرکی - مصطکی - صندل سرخ - جاو شیر - سلکنج - آب مکوہ سبز میں پس کر روغن گل اضافہ کر کے نیگرم صناد  
کرے (۳) رات کے وقت روغن جنبتین کی مالش اور بھرتہ سہفت برگ معمولہ مطب کا بانڈھنا بھی مفید  
(۴) گل بالونہ - گل سرخ - مرزنجوش - صعفر فارسی - املیل الملک - پودینہ خشک - فوہ - گلی سفید ہر ایک  
بغیر مناسب لے کر پانی میں پکائیں اور صاف کر کے کسی بڑے برتن میں ڈالکر مریضہ کو اسپیں بٹھائیں  
(۵) تسکین درد کے لئے پوست خشخاش - مکوہ خشک - گل بالونہ - گل سرخ کے جوشانہ سے نمکید کرنا  
بھی مناسب ہے - (۶) غنا میں دال ارہر - گرم مصالحہ کے ساتھ اور شلغم اور حنظل یا بھتہ یا بھتی  
وسو یکا ساگ دیا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر ڈول نے اس مرض کیلئے ارگٹ کے دھلی وغار جی استعمال کی تعریف کی ہے۔ اور سرگرین سے  
گرین تک اس کی پیکاری کو لھے پر مفید بتائی ہے۔ تقویت کے لئے کومین اور ڈیجیٹس کے استعمال  
کا مشورہ دیا ہے۔ تسکین درد اور تحلیل مواد کے لئے بلاڈونا اور افیون کا شیاف رکھنا تجویز کیا ہے


ان تدابیر کے علاوہ آہ بڑوکارا، اکیسپورنگ ایسائی ریٹر کے ذریعہ سے ادھ جھتہ کو نکالنا بہتر سمجھا ہے

تصویر نمبر ۷۶ ٹروکار کی



تصویر نمبر ۷۷ آہ اکیسپورنگ ایسائی ریٹر کی

- (۱) اسپائیٹ کی پچکاری
- (۲) خول دار سوئی (۳) سوئی لگائی کی نلی
- (۴) ریٹر کی نلی جو کبھی نمبر ۲ و ۳ کے درمیان لگائی جاتی ہے۔



انجام۔ اگر مرض حاد و مزمع کا اور شدید ہو اور اول الذکر طریقہ علاج کی مندرجہ تمام تدابیر وقت پر میسر ہوں تو مریض کو اکثر شفا ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ باوجود ممدردہ تدابیر کے بھی شدید عوارض کی تکلیف سے مریضہ ضعیف ہو کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ اور اگر مرض مزمن و دیر پا ہوتا ہے تو آخر الذکر تدابیر سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ مرض دیر پا اور عسر علاج ضرور ہے لیکن بعض ڈاکٹروں نے اپنا تجربہ یہ لکھا ہے کہ ایسی مریضیات کا علاج نہایت استقلال اور احتیاط کے ساتھ تین سال تک کیا گیا تو بالآخر صحت حاصل ہوئی۔

**فصل گیارھویں۔** التهاب عجا و ذات الرحم (پلوک سلولائی سٹ) یعنی رحم کے گرد کی خانہ دار ساخت میں یا رحم کے گرد کی خانہ دار عرین کی دونوں ہتوں کے درمیان والی ساخت میں کوش پیدا ہونا۔ اگرچہ یہ مرض رحم کے گرد کی خانہ دار ساخت کے ہر حصہ میں ہو سکتا ہے لیکن اس حصہ میں اکثر لاحق ہوتا ہے جو رحم کے رباط عرین (براڈ لگامنٹ) کے دو پرتوں کے درمیان میں پایا جاتا ہے ڈاکٹروں کی جدید تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ مرض پہلے خبیثہ الرحم اور قاذف نالیوں کی ساخت سے شروع ہوتا ہے پھر رباط عرین اور اس کے اندر والی خانہ دار ساخت کو مبتلا کرتا ہے اس کے بعد صفاق البطن (پری ٹونی ام) کے اس حصہ میں بھی پھیل سکتا ہے جو تمام پیرٹ کے جوف میں ہوتا کرتا ہے اس وقت اسکو التهاب الصفاق العانی (پلوک پری ٹونیائی سٹ) کہتے ہیں۔

اس مرض کے مختلف حالات (۱) ابتداء مرض میں عمدہ تدابیر میرہ ہونے سے یا خود بخود حسن اتفاق سے کبھی ایک یا دو دن میں ہی الہابی مادہ تحلیل ہو کر یہ مرض بجائے شدت پکڑنے کے بالکل رفع ہو جاتا ہے (۲) لیکن اگر دو یا تین دن تک مرض رفع نہ ہو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مقام ماؤن سے بخوڑی، بخوڑی، رطوبت لمفاویہ (لمف) رسرخصیۃ الرحم اور قاذف نالیوں اور رباط علیین وغیرہ کو کچھ کیٹھا یا معاً ہضم (کیم) کیٹھا چٹا دی (۳) پھر رفتہ رفتہ ماؤن میں سو جن بیلہ ہو کر اسکے تمام عوارض ترقی کر لگتے ہیں (۴) اسکے بعد آٹھ علاج کئے جودہ دم بالکل تحلیل ہو جاتا ہے یا کیونچے دہ دم کا لطیف حصہ تحلیل ہو کر اسکے کثیف اجزاء باقی رہ جاتے ہیں۔ اور ایک سخت گرہ سی ہمیشہ کے لئے باقی رہ جاتی ہے۔ (۵) یا دہ دم پکے لگتا ہے اس حالت میں اسے وسیلہ عانیہ (پلوک ایب س) یعنی پیڑ کو کا بھوڑا لیتے ہیں جس کا سبب علاج کیا جائے گا اسباب (۱) اسقاط حمل یا وضع حمل کی حالت میں رحم یا اسکے قریب والے اعضاء خفیۃ الرحم وغیرہ کی ساخت پر کوئی غیر معمولی صدمہ پہنچنے سے اکثر یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے (۲) ایام حیض میں اگر عورت بیرونی سردی وغیرہ سے احتیاط نہ کرے اور اس وجہ سے حیض اپنے معمولی وقت سے پہلے دفعتاً رک جائے تو یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر مریضہ کے خون میں تیزی یا کسی قسم کا دوسرا فساد موجود ہو تو وہ بھی اس مرض کے پیدا کرنے میں بڑا مددگار ہوتا ہے۔

علامات (۱) اگر یہ مرض جلد ترقی کرنے والا اور شدید قسم کا ہوتا ہے تو وضع حمل یا احتباس حیض سے دو یا تین دن کے بعد ہی مریضہ کو سردی لگ کر تیز بخار ہو جاتا ہے۔ اور اسے اپنے پیڑ میں گرمی اور ظن کے ساتھ تناؤ کا سا درد محسوس ہونے لگتا ہے اور اگر مرض رفتہ رفتہ بڑھنے والا ہوتا ہے تو تمام علامتیں آہستہ آہستہ ظاہر ہوا کرتی ہیں۔

(۲) اگر مرض رباط علیین کے اندر والی ساخت میں ہوتا ہے تو پہلے مریضہ کو اپنی ماؤن کو کھ میں صرف بوجھ سا محسوس ہوا کرتا ہے۔ اور کوکھ کے مقام پر دبانے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہاں ٹھونکنے سے آواز ٹھوس آ یا کرتی ہے۔ پھر دو یا تین دن کے بعد دم ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اور ٹھونکنے سے قدرے سختی معلوم ہونے لگتی ہے۔ جو چند روز کے بعد نرم ہو جاتی ہے۔

(۳) یہ دم جسم کے آٹھ پن میں لمبا اور کسی قدر چڑا پھیلا ہوا لیکن دلدار زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک طرف رحم سے اور دوسری طرف جوف عانہ کی دیوار سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور جب قدر بڑھتا جاتا ہے اختیار

رحم کو اسکی جگہ سے دھکیلتا جاتا ہے۔

(۴) اگر یہ ورم رحم اور مثانہ کے درمیان کی خانہ دار ساخت میں ہوتا ہے تو جب تک زیادہ نہ بڑھ جائے اس وقت تک اس کا ابھار پیڑو کے مقام پر بہت ہی کم اور نہایت مشکل سے محسوس ہوا کرتا ہے لیکن اندام نہانی میں اٹھکی داخل کر کے امتحان کیا جائے تو اسکی سامنے والی دیوار اوجھٹ میں ورم کا ابھار مع گرمی اور سختی کے بخوبی محسوس ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مریضہ کو پیشاب زیادہ سرخ نہایت جلن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بار بار آیا کرتا ہے (۵) اگر یہ ورم اندام نہانی اور معار مستقیم کے درمیان والی ساخت میں ہوتا ہے تو اندام نہانی یا مقعد میں اٹھکی داخل کرنے سے سختی اور گرمی اندام نہانی کی اٹھکی دیوار کی طرف محسوس ہوا کرتی ہے۔ اسکے علاوہ مریضہ کو دروزہ کی طرح کا سخت درد تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تار بہتا ہے اور جب مریضہ بیٹھے یا کھڑی ہونے کی کوشش کرتی ہے تو درد نہایت شدت پکڑ جاتا ہے اور نہایت سکون کے ساتھ ماؤف جانب کی ران بکڑے ہوئے اپنے بہتر پر پڑے رہنے کی حالت میں در و کم ہوا کرتا ہے (۶) اس درد کی شدت دورہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی ایک یا دو گھنٹے کے لئے در و میں کمی ہو جاتی ہے اور کبھی ہر روز کسی وقت کچھ دیر تک درد کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ بخار اور در و کی تکلیف سے مریضہ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور ایسے عیش کی تکلیف رستی ہے۔ اسلئے وہ اور بھی زیادہ ناتوان ہو جاتی ہے (۷) جب ورم تحلیل ہونے لگتا ہے تو مریضہ کی تمام تکلیفوں میں رفتہ رفتہ کمی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اور جب وہ پکنے لگتا ہے تو اسکی تمام تکلیفیں بڑھنے لگتی ہیں۔ اور مریضہ کی کمزوری بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے علاج (۱) اگر مریضہ کا مزاج گرم اور عرجوان ہو تو ابتدائے مرض میں لعاب بہدانہ ۳ ماشہ۔ شیرہ غناب ۵ دانہ۔ عرق مصفی خون ۱۰ تولہ۔ شربت بزوری ۱۴ تولہ کے ساتھ پلا تا جاوے پھر یاقین دن کے بعد گل تفتہ۔ گل نیلوفر۔ شاہترہ۔ چائتہ۔ منڈی۔ مکوہ خشک۔ ہر ایک ۷ ماشہ۔ غناب ۵ دانہ پر سیا دشاں۔ تخم خیارین۔ گاؤ زباں ہر ایک ۵ ماشہ رات کو پانی میں تر کر کے صبح کو چھان کر شربت بزوری ۱۴ تولہ اس میں حل کر کے پلائیں۔ اور شام کو لعاب بہدانہ والا نسخہ دیتے رہیں (۲) اگر مزاج زیادہ گرم نہ ہو تو شاہترہ۔ چائتہ۔ منڈی۔ مکوہ خشک۔ ہر ایک ۷ ماشہ۔ غناب ۵ دانہ پر سیا دشاں۔ تخم خیزہ۔ گاؤ زباں۔ ہر ایک ۵ ماشہ۔ رات کو پانی میں تر کر کے اور صبح کو چھان کر شربت بزوری ۱۴ تولہ حل کر کے پلائیں۔ اور شام کو شیرہ بادیان۔ شیرہ غناب خشک۔ ہر ایک ۵ ماشہ۔ عرق



مرکب مصفی خون ۱۰ تولد بشر بت بزوری ۳ تولد دینا چاہئے (۳) اسی طرح مرہینہ کے پیر پر صناد حملات سے لگانے سے یا اسکی ماؤف کو کھ پرچہ چونکیں لگانے سے بھی بہت جلد آرام ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ چونکیں لگانے سے فائدہ نہ ہو، تو ہم ۳ گھنٹے کے بعد پھر چونکیں لگانی چاہئیں۔ اگر ضرورت ہو تو اذام سنائی کو بذریعہ آلہ مفتاح الفرج (اپسے کیو لم) کے کھول کر خاص غم رحم چونکیں لگانی جاتی ہیں۔ (۴) اگر چند روز تک یہ تدبیریں کرنے سے فائدہ نہ ہو اور ابتداء مرض کا زمانہ گزر جائے اور تنقیہ کی ضرورت سمجھی جائے تو نسیجہ جات مذکورہ بالا میں تلکین کی دوائیں بڑھا کر ملکی سی تلکین دینی چاہئے تاکہ کبھی بھی خون بید انجیر گلاب میں حل کر کے بذریعہ حقنہ کے آنتوں کو صاف رکھنا چاہئے۔ (۵) اسکے علاوہ مرہم اظلیون سفیدی صینیہ مرغ۔ آب کاسنی بنر۔ آب مکوہ بنر۔ روغن گل کے ساتھ ملا کر آگے اور پیچھے (بطور فزرجہ اور حمل کے) استعمال کرنا مناسب ہے۔ اور تلکین درد کے لئے پوست خشتی من مکوہ خشک۔ گل سرخ۔ گل بالونہ کے جوشانہ سے تکمید کرنا اور اسی سے آبن یا فطول کرنا بھی مفید ہے۔ (۶) اگر چونکیں وغیرہ لگانے کے بعد مرض کے مقام پر قدرے سخی باقی رہ جائے تو اکٹھر اکٹھ بلا ڈونا ۲ ڈرام۔ مرہم سیاب ۶ ڈرام۔ دونوں کو ملا کر سنٹ کے ذریعہ سے ورم کی جگہ پر لگانے سے بقیہ ورم بہت جلد تحلیل ہو جاتا اور درد کو تلکین ہوتی ہے (۷) تنقیہ کے بعد اگر مرکبات سہاب کا استعمال کیا جائے تو اس سے بھی انتہائی (انفلامیشن) کا مادہ بہت جلد رگوں میں جذب ہونے لگتا ہے اور مرض بڑھنے نہیں پاتا۔ جسے گے پوڈر اور ڈوڈرس پوڈر کو بموزن لیکر پانچ پانچ گرین کی گولیاں بنا لیں انہیں سے ایک گولی صبح کو اور ایک شام کو کھلائیں۔ آٹھ یا دس روز میں اس سے مرہینہ کا منہ آجاتا ہے اور مرض میں تخفیف ہونے لگتی ہے۔ اگر بیماری شدید ہو تو ہر چھ گھنٹے کے بعد ایک گولی کھلائی چاہئے۔ اور اگر رات کو درد کی شدت ہو تو تلکین درد کیلئے افیون میں قدرے کا فور ملا کر کھلانے سے فائدہ ہوتا ہے (۸) مرہینہ کو نہایت ملکی اور جلد مضہم ہونے والی غذا دی چاہئے جو باوجود مسوی ہونیکے خون میں حدت پیدا نہ کر سکے۔ جیسے آش جو یا خیارین کی کھیر یا دودھ کی فیئر یا مونگ کا

۱۱ صناد حملات کا نسخہ یہ ہے۔ مکوہ خشک ایک تولد۔ مغز امانس ۹ ماشہ۔ گل بالونہ۔ اکلیل النملک۔ بالہیجہ۔ آرد جو ریت خالص گلیجیر۔ مندل سرخ۔ جیوار اعلیٰ ہر ایک ۶ ماشہ۔ سب کو باریک کر کے مرکب کاسنی بنر۔ آب مکوہ بنر میں ملا کر درد کو صاف کرنے کے بعد روغن گل اصفادہ کر کے نیگم لپ کریں۔ محمد عبد الرزاق۔ علی غنہ

بہارِ نبی

پانی یا کوئی حریرہ وغیرہ اور جب تک مر لہینہ بالکل تندرست نہ ہو جائے اسے چلنا پھر ملکہ اپنے بستر پر سے اٹھنا بھیٹنا ہرگز نہیں چاہئے (۹) پورے طور پر تندرست ہو جانے کے بعد جب جن کا زمانہ آئے تو اسے نہایت سکون و آرام کے ساتھ رہنا چاہئے۔ اور اگر وہ اپنے پیڑ میں غیر معمولی درد یا کسی قسم کی بے چینی، غصہ، محسوس کرے تو فوراً پیڑ کے مقام پر چند جو کلیں لگائی جائیں اور پھر مذکورہ بالا تدابیر کے موافق علاج کرنا چاہئے۔ تاکہ مرض کے دوبارہ عود کر آنے کا اندیشہ باقی نہ رہے۔

**انجام مرض۔** اگر ابتداء مرض میں ہر طرح سے عمدہ تدابیر میسر ہوں تو اس مرض کے علاج میں بہت جلد کامیابی ہوتی ہے۔ اور اگر ورم بہت زیادہ ہوتا ہے تو اسے تحلیل ہو جانیکے بعد کسی قدر سختی اکثر باقی رہ جاتی ہے جو یا تو کچھ دنوں کے بعد رفتہ رفتہ خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے اور یا مقام دائمی پر قدرے سختی ہمیشہ کے لئے باقی رہ جاتی ہے جو کسی علاج سے نازل نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب ورم یک کر اس سے ریم ہونے لگتی ہے تو مہینوں تک علاج کرنے سے بجز تخفیف کے پورے طور پر صحت پانے کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ اکثر مر لہینہ عورتیں آحضر میں نہایت کمزور ہو کر فوت ہو جاتی ہیں۔

**فصل بارہویں** دیلیلہ عانیہ (پلوک ایپس) یعنی پیڑ کا پھوڑا جب رحم کے گرد کی گرد کی خانہ دار ساخت میں یا رحم کے باطن عارضین (براڈ لگمانٹ) کی دوہتوں کے درمیان الی خانہ دار ساخت میں ورم ہو کر پکے لگتا ہے۔ اور اس میں سپ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اسے دیلیلہ عانیہ کہتے ہیں اسباب۔ یہ تو آپکو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اس مرض کا مقدم سبب جو عفانہ کے اندر والی خانہ دار نرم ساختوں میں ورم پیدا ہونا اور اسے مادہ کا تحلیل نہ ہو سکا ہے۔ لیکن اس ورم کے پکے اور پھوڑا بنانے کے قریبی اسباب تقریباً دیے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ دیگر اعضا میں پھوڑے پیدا ہونے کے اسباب ہوتے ہیں۔

**علامات (۱)** جب ورم پکے لگتا ہے تو مر لہینہ کو تیز بخار ہر وقت رہتا ہے (۲) پیڑ کے متورم مقام میں سرخی اور گرمی اور صلب کے ساتھ میٹس کا سادہ مر لہینہ کو ہر وقت سوجھن رکھتا ہے۔ اگر ورم کا تناؤ اور اس کے مواد کا فنا و عضلہ حرقہ (ایلائنگیل) اور عضلہ صلب کیسیرہ (سواس میٹس) میں ہر اثر کہ جاتا ہے تو ان دونوں عضلوں کے سکڑنے سے مر لہینہ کی ران سکڑ جاتی ہے اور وہ اپنا باؤل



**علاج**۔ جب تم دیکھو کہ باوجود بہترین تدابیر کے ورم مذکور بڑھ رہا ہے۔ اور کسی طرح تحلیل ہونے میں نہیں آتا۔ اور مریضہ کا بخار شدت پر ہے۔ اور ٹیس کا درد شروع ہو گیا ہے۔ تو سمجھ لینا چاہئے کہ ورم کپنے لگا ہے۔ اس وقت بجائے صنماد محلات کے تخم اسی اور تخم کنوچہ کی پولٹس دن رات میں چند بار گرما گرم باندھنی چاہئے۔ اس سے ورم بہت جلد پک کر اس کی پیپ کسی طرف کو نکلنے لگتی ہے اس کے بعد شامیرہ۔ مکوہ خشک۔ گل سرخ۔ کیلہ ایک ایک تولہ۔ شہد خالص ۲ تولہ پانی میں جوش دیکر ادرچھان کر بذریعہ پکاری کے زخم کو دھوئیں۔ اگر درد کی شدت ہو تو اسکی ستکین اور زخم کو صاف کرنے کے لئے گرم دودھ اور شہد کی پکاری بھی مفید ہے۔ اسی طرح پوست خشخاش۔ گل بابونہ۔ گل سرخ کے جوشاندہ سے بذریعہ اسفنج کے تمکید کرنے سے بھی درد میں سکون ہو جاتا ہے۔ پھر زخم کا علاج مرہموں سے کرنا چاہئے۔ لیکن ورم پک جانے کے بعد اگر اسکے پھوٹنے میں دیر ہو۔ تو کسی ہوشیار اور مستند طبیب کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ جو اعمال جراحی میں نہایت مشاق اور تجربہ کار ہو۔ وہ اس پھوڑے کی پیپ کا ٹھیک موقع معلوم کر کے اسی جگہ پر نگاف دیکر پیپ نکالے گی جہاں سے بذریعہ پکاری کے زخم کو دھونا اور صاف کرنا آسان ہو۔ اور زخم کے اندر مرہم وغیرہ پہنانے میں سہولت ہو اور زخم آسانی کے ساتھ بہت جلد بھر سکے۔ ان سب تدابیر کے علاوہ مریضہ کو مصفی خون دوا کھلانا اور خون کی حدت کم کرنے والی دوائیں پلانا اور بدنی قوت کو قائم رکھنے والی مقوی اور عمدہ غذائیں کھلانی چاہئیں۔ اور گاہ گاہ ملیحات کا استعمال بھی مناسب ہے۔ تاکہ قبض نہ ہونے پائے۔ کیونکہ ایسی حالت میں قبض شکم سخت مضر ہوتا ہے۔

**فصل تیرھویں**۔ انسداد اذقازف (اٹریسیا آف دی فلیوپین ٹیوب) یعنی قاذف نالی کا مسدود ہو جانا۔ یہ مرض نہایت شاذ و نادر دیکھنے میں آتا ہے۔ اور بعض مستورات میں پیدا ہونے لگتا ہے اور بعض کو پیدائش کے بعد سن بلوغ سے پہلے۔ لیکن بعض کو سن بلوغ کے بعد لاحق ہوتا ہے اسلئے اسکو مندرجہ ذیل تین اقسام میں تقسیم کر کے بیان کرتے ہیں۔

**پہلی قسم**۔ پیدائشی۔ اس کا سبب (بھی تمام پیدائشی امراض کی طرح) یا تو قوت مصورہ کی خرابی ہوتی ہے۔ اور یا پیدائشی مادہ کا فساد اور اس کی علامات وہی ہیں جو مرض عقر (بانجھ پن) کے بیان میں درج ہیں۔ یہ مرض لا علاج ہے۔

دوسری قسم وہ ہے جو پیدائش کے بعد سن بلوغ سے پہلے کسی سبب سے پیدا ہوئی ہو۔ اسکی حالت بھی قسم اول کی سی ہے۔ یعنی لاعلاج ہے۔

تیسری قسم وہ ہے جو سن بلوغ کے بعد پیدا ہوئی ہو۔

**اسباب** (۱) عصبانی کچاؤ کے سبب قاذف نالی کی ساخت کا سکرطانا۔ اور اس کے مجری کا بند ہو جانا (۲) نالی میں کسی سدھ پیدا کرنے والے مادہ کا رک جانا (۳) ساخت مذکور میں ورم پیدا ہونے راستہ کا بند ہو جانا (۴) قاذف نالی کی ساخت پر قریبی اعضا کا دائمی دباؤ پڑنا۔ (۵) نالی مذکور کی اندر قنی غشاء مخاطی میں ورم ہونا اور اسکی سطح میں چپکاؤ دار رطوبت رسکر اس کے جوف کا اندرونی سطح میں چپٹ جانا (۶) آتشگی یا سوزاکی زخموں کا وہاں سرایت کر جانا اور اندام قرصہ کے وقت اس نالی کا بند ہو جانا (۷) قاذف نالی میں گوشت زائد یا مسہ کی طرح کا ابھار پیدا ہو جانا۔

**علامات** (۱) اسباب مرض کا موجود ہونا یا کچھ دنوں پہلے ان کا پایا جانا (۲) اسباب مرض کے لاحق ہونے سے پہلے سن بلوغ کے زمانہ لوازمات کا موجود ہونا اور اس کے بعد سبب میں کمی شروع ہو کر ان کا رفتہ رفتہ معدوم ہو جانا (۳) مریضہ کے دل میں اولاد سے مایوسی کے خیالات پیدا ہونا اور زمانہ جذبات کا معدوم ہو جانا **علاج**۔ اگر اس مرض کا سبب عصبانی تشنج ہو تو کھانے پینے کی دوائیں اور صنادیابالش کے اور آبدن کے طور پر ایسی دوائیں استعمال کرنی چاہئیں۔ جسے اعصاب کا تشنج رفع ہو جائے اگر قاذف نالی کی ساخت میں ورم ہو تو ہر طرح سے اسے تحلیل کرنے کی تدابیر کرنی چاہئیں۔ ان دونوں صورتوں میں اس قسم کے نئے مفید ہو سکتے ہیں۔ گل بنفشہ۔ مویرنقی۔ عناب۔ تخم خطمی۔ مکہ خشک۔ تخم کثوث۔ تخم خیارین۔ تخم خربزہ۔ بادیان۔ گاؤزبان۔ حمیرہ بنفشہ (۲) صنادجملات لگانا اور روغن نابونہ وغیرہ کی مالش کرنا۔ (۳) عصبانی تشنج دور کرنے کیلئے روغن موم یا چربیوں کی مالش کرنی بھی مفید ہوتی ہے (۴) مالش کا اٹا گائے کے دودھ میں گوندھل کر اسکی روٹی ایک طرف سے تو بے پرکھائیں اور دوسری طرف روغن گل سے چکنی کر کے گرم گرم باندھیں (۵) اعصاب میں تشنج اور خشکی پیدا کرنے والی اشیائے پرہیز کریں۔ اگر قاذف نالی پر قریبی اعضا کا دباؤ اس مرض کا سبب ہو اور اس زائد کرنا ممکن ہو تو

سہ جریان طمث اور بہتان کی بالیدگی داخل تناسلی کی طرف رغبت وغیرہ ۱۲ مؤلف

۱۳ اگر قاذف میں سدھ ہو تو سدھ کھولنے والی قوی دوا کا استعمال مناسب ہے۔ مؤلف

مناسب تدابیر کرنی چاہئیں۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس قسم کو بھی اول الذکر صورتوں کی طرح لا علاج سمجھو۔  
**فصل چودھویں۔** اشتقاق القاذف (ریچر آف دی فیلوپن ٹیوب) یعنی قاذف کا پھٹ جانا  
 پیڑ و کوئی سخت چوٹ مثلاً گھومنے یا لات وغیرہ لگنے سے یا نالی مذکور میں حمل قرار پا جانے اور وہاں اس کے  
 بڑھتے رہنے سے یہ مرض ہو سکتا ہے۔ اس وقت مقام ماؤف میں سخت درد ہوتا ہے۔ اور اگر  
 شکاف کے موقع پر کوئی موٹی رگ بھی ٹوٹ یا پھٹ جائے تو بکثرت جریان خون ہو کر جو ف عانہ  
 میں یا رابطہ علین (براڈ لگامنٹ) کی ساخت میں اجتماع خون ہو کر سلعہ دمویہ عانہ یا رابطہ مذکور  
 میں درم پیدا ہو سکتا ہے۔ اور ان مریضوں کے متعلق تمام وہ تکلیفیں مریضہ کو گھیر لیتی ہیں جیسا بیان  
 ان امراض کی بحث میں گذر چکا ہے۔

**اسباب (۱)** پیڑ و پر کوئی سخت چوٹ لگنا (۲) نالی مذکور میں حمل قرار پا کر وہیں اس کے  
 بڑھنے سے نالی کی ساخت میں شدید اور ناقابل برداشت تناؤ پیدا ہونا (۳) نالی مذکور کی سخت  
 کا پہلے ہی سے کمزور ہونا۔

**علامات (۱)** چوٹ وغیرہ کا شدید صدمہ پہنچتے ہی مریضہ کو مقام ماؤف میں سخت درد محسوس ہونا  
 (۲) اسکے بعد فوراً مریضہ کو غشی طاری ہونا (۳) مضن میں نہایت کمزوری اور سرعت بلکہ تفاوت اور  
 اختلاف پیدا ہونا (۴) پیڑ و میں اجتماع خون وغیرہ کے سبب غیر معمولی ابھار مع گرمی کے پیدا ہونا  
 (۵) سخت بخار لرزہ کے ساتھ ہونا۔

**علاج۔** اگر ابتدا مرض میں مریضہ آپ کے پاس آئے اور بدن ضعیف نہ ہو اور امتلاء خون یا  
 حدت خون کے آثار پائے جائیں تو (۱) سب تدابیر سے پہلے فصد باسلیق یا صفی اذام سے بمقدار  
 خون نکلوانا چاہئے (۲) پھٹکی خام ایک ماشہ بلدی ایک ماشہ نہایت باریک میکہ گائے یا بکری کے دوہ  
 کے ساتھ کھلانا سبب (۳) گلاب خالص آدھ سیر میں پوست خنشاں ایک تولہ اور پھٹکی ایک تولہ  
 جوش دیکر صاف کریں اور برف سے خوب سرد کر کے اسمیں کپڑا یا اسفنج تر کریں اور مقام ماؤف پر رکھیں  
 (۴) تقویت قلب کے لئے خمیرہ مروارید ۳ ماشہ ہمراہ لعاب بہدانہ ۳ ماشہ شیرہ عنب ۵ دانہ شیرہ قحط کا  
 مقشر ۳ ماشہ شیرہ بیخ انجیر ۳ ماشہ عرق گاؤں باریں عرق مکوہ عرق شاہرہ ہر ایک ۴ تولہ۔ شرب نیلوفر  
 ۲ تولہ حل کر کے اور تخم ریحاں یا تخم بارتنگ چھڑک کر پلائیں (۵) مریضہ کو نہایت سکون اور آرام سے سنا

پونیدھی لیٹی رہنے کی تاکید کریں (۶) اجابت کیلئے عمل کرنا اور قاناطیر سے پیشاب نکالنا ایسا ضروری ہے کہ معالج کو اس سے ہرگز غافل نہ رہنا چاہئے (۷) پیاس کے وقت عرق محلاب۔ عرق گاوڑیاں، عرق مکوہ۔ عرق کیوڑہ۔ ہر ایک بقدر مناسب ملا کر پھوٹا سھوڑا دینا اور انار کھانے کی اجازت دینا مناسب ہے۔ اگر ابتدائے مرض کا زمانہ گزرنے کے بعد مریضہ کچھ مطب میں آئے تو اس حالت میں تدریجاً کورہ بالا میں سے جو مناسب سمجھی جائیں مع ان تدابیر کے عمل میں لائیں جو سلحہ دمویہ عانہ یا دم مجاورات الحکم کے بیان میں گزر چکی ہیں۔

**انخبام**۔ اگر ابتداء مرض میں عمدہ تدابیر میسر ہو جائیں تو قاذف نالی کے شکاف سے زیادہ سیلان خون ہونے نہیں پاتا۔ مریضہ درم سے محفوظ رہتی اور شکاف درست ہو جاتا ہے۔ لیکن ممکن نہیں کہ اندمال شکاف کے موقع پر کوئی ایسی تدبیر کی جاسکے جس سے نالی مذکور زخمی ہونے یا بالکل بند ہو جانے سے یقیناً محفوظ رہ سکے۔ اگر شکاف کے موقع میں سے بکثرت سیلان خون ہو کر جوف عانہ میں اجتماع خون ہو جائے تو سلحہ دمویہ عانہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر مریضہ ضعیف ہو اور عمدہ تدابیر میسر نہ ہوں تو ضعف شدید اور غشی یا شدت درد اور بخار شدید وغیرہ تکالیف کی صعوبت سے جلد ہلاک ہو جاتی ہے۔ اور این مصیبتوں سے نجات پا کر جوف عانہ میں پھوڑا پیدا ہونے اور اس کے شائد میں مبتلا ہوتی ہے

**فصل سیدرھویں**۔ حرحہ قاذف (السریش آن دی فیلوپین ٹوب) یعنی قاذف نالی کا زخم۔ اس حالت میں مقام ماؤن سے پیپ یا زرد و متعفن اور تیزابی رطوبت سبک سہیہ جوف رحم کی طرف ہوتی ہوئی اندام ہنائی سے خارج ہوا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مریضہ اپنے پیڑواہر کمر میں ہلکی شکایت کرتی ہے۔ ایام معمولی کے موقع پر وہ سخت درد سے بے چین رہتی ہے۔ اور بعض مریضہ اتنے کثرت جریان طمث کی شاکاں ہوتی ہیں۔ اور بعض قلت و بیقا عدگی طمث کی مصیبت میں مبتلا ہوتی ہیں اگر علاج میں اصل مرض اور اس کے اسباب کا لحاظ نہ کیا جائے اور صرف عوارض موجودہ کے دفعیہ کی تدابیر عمل میں لائی جائیں تو باوجود پوری کوشش کے علاج میں ناکامی معالج کو حیران اور مریضہ کو شفا خاسنے سے مایوس کرتی ہے۔

**اسباب** (۱) یہ زخم کبھی تو آفتلکی یا سوزاکی مادہ سے ہوتا ہے (۲) اور کبھی صرف حدت و فساد خون کے سبب قاذف نالی کی اندرونی پھلی میں خراش پیدا ہونے سے ہوتا ہے (۳) کبھی نالی مذکور کی ساخت میں دم پیدا

ہو کر اس کے پک جانے سے ہوتا ہے (۴) کبھی نالی مذکور میں کیوجہ سے شنگاف ہو کر اس کے پک جانے سے ہوتا ہے  
**علامات** (۱) متھن اور تیزابی رطوبت کا سیلان (۲) مریضہ کو اپنے نلوں اور کمر میں درد محسوس ہونا  
 (۳) اگر تشکی یا سوزاکی زہر اس مرض کا سبب ہو تو اسکی علامات کا پایا جانا (۴) اگر حدت خون سبب ہو  
 تو اسکی علامات کا موجود ہونا (۵) اگر پہلے قاذف میں ورم یا شنگاف ہو کر اس کے پک جانے سے زخم پیدا  
 ہوئے ہوں تو مریضہ سے دریافت کرنے پر اس کا پتہ چل سکتا ہے۔

**علاج**۔ اگرچہ عام طور پر اس مرض میں مصفی خون دوائیں (جیسے نفقہ شامترہ) مدرات کے ساتھ  
 نہایت مفید ہوتی ہیں۔ لیکن اگر مریضہ کے خون میں حدت موجود ہو یا تشکی و سوزاکی زہر کا فنا پایا  
 جائے تو مصفیات خون کا پلانا بھی ضروری ہے۔ اور اس غرض کیلئے معجون عشبہ سمراہ عرق عشبہ و چوبینی  
 کے اور جوہر رسیکو و معمولہ مطب خاص مؤثر دوا ہے۔ اگر مزاج میں زیادہ گرمی اور خون میں حدت پائی  
 جائے تو لعاب بیدانہ، شیرہ عناب، شیرہ تخم کاسنی، عرق شامترہ، شربت نیلو فر شام کے وقت ضرور ملا نا چاہئے  
 اگر ورم موجود ہو تو زیر ناف ہنما، محملات لگانا چاہئے۔ اور ہر حالت میں رحم کے اندر چکاری کر نیکی کے لئے ریزہ  
 سفید ہوتا ہے صفقتہ۔ شامترہ، مکوہ خشک، گل بالونہ، گل سرخ، برگ نیب، کبیلہ ہر ایک بقدر مناسب لیکر  
 پانی میں پکائیں اور صاف کر کے رحم کے اندر چکاری کریں تاکہ دوا کا اثر مقام ماؤن تک پہنچ سکے۔  
 لیکن چکاری دینے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ پانی کی دھار مقام ماؤن سے آگے نہ بھاؤ نہ کرنے پائے بلکہ  
 موقعہ زخم تک زور سے نہ پہنچے۔ اور اس مرض میں یہ فرز جہت مفید ہے صفقتہ، کندر، انزروت، مرکی  
 جوز السرو، پوست انار، چنگر کی، دم الاخوین ہر ایک ۶ ماشہ نہایت باریک پیس چھانکر رکھیں اور اس میں سے  
 بقدر حاجت لیکر آب بارتنگ سبز کے ساتھ ملا کر استعمال کریں۔

**انجام**۔ اگر ہر طرح سے عمدہ تدابیر میر ہوں تو چند روز میں مریضہ کو آرام ہو جاتا ہے۔ ورنہ مہینوں  
 وہ بیجاری اس مصیبت میں مبتلا رہتی ہے۔ اور اگر دیگر عوارض پیدا ہو جائیں تو انکے شفا دے صفقتہ  
 فوت ہو جاتی ہے۔ بطریق اگر اند مال زخم کے موقعہ پر قاذف مسدود ہو جائے تو اس سے مریضہ باخجہ ہو سکتی ہے۔  
**فصل سولہویں**۔ تا کل قاذف (فال آن مبری آن فیلوین پیٹیب) یعنی قاذف کا گل جانا  
 کبھی قاذف نالی کے جھار وار سرے کے ریشے کسی تیز مادے کے ریشے گل کر چھڑ جاتے ہیں۔ اور کبھی

سے بیجوں اور جوہر رسیکو اور دیگر مرکب دوائیں ہندوستانی دواخانہ دہلی سے نہایت عمدہ و معتبر مل سکتی ہیں۔ ۲۲ مؤلف



یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ اس سرے کی رباطی ڈوری جو اسکو خفیۃ الرحم کے ساتھ جوڑتی ہے وہ بھی کھج جاتی ہے اس حالت میں قاذون نالی کا یہ سر خفیۃ الرحم کی سطح پر جو لپیٹہ کرافیوس (گرافین وی سائیکل) تک نہیں پہنچ سکتا ہے اور نہ اس پر اپنا دباؤ ڈال کر کچھ اندر والے مادہ کو بخوبی چوس کر اپنے اندر لے سکتا ہے اسلئے پیدائش انسانی کے نسائی مادہ کا (ادوم) خفیۃ الرحم سے جوف رحم میں پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے اور مریضہ عسر حمل کی مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں زن و شوہر کے دل میں اولاد کی تمنا کا جوش جب انہیں طبیع کے پاس پہنچ لاتا ہے۔ اور طبیب صاحب عسر حمل کے اسباب تلاش کرتے ہوئے جاسین کی قوت بدنی اور دیگر حالات متعلقہ مادہ تولید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی کا تصور نہ پا کر حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر اگر انھوں نے مستغیث سے اپنی حیرانی ظاہر کر دی تو اسے مایوسی ہوئی ہے اور اگر تن بہ تقدیر کچھ نہ کچھ علاج کرنا شروع کر دیا تو ناکامی سے خفت اٹھانی پڑتی ہے۔ اسلئے ہم اس مرض کے اسباب و علامات درج ذیل کرتے ہیں:-

**اسباب (۱)** خون میں آتشکی یا سوزاکی زہر کے اثر سے قاذون کے جھار دار سرے میں زخم ہو جانا  
(۲) اسی طرح سادہ گرمی اور عدت خون کے سبب نالی مذکور کے سرے میں زخم ہو جانا (۳) یہ بھی ممکن ہے کہ خفیۃ الرحم پر عمل جراحی کرتے وقت یا شکم میں شگاف دیکر بچہ رحم سے نکالتے وقت غلطی سے قاذون کے جھار دار سرے کے ریشے کٹ جائیں۔

**علامات (۱)** مرض لاحق ہونے سے پہلے خون میں آتشکی یا سوزاکی زہر کا موجود ہونا۔ خواہ اس کے بعد و خرابی موجود ہو یا زائل ہو گئی ہو (۲) حدوث مرض کے وقت فرسہ قاذون کی علامات موجود ہونا (۳) اس کے بعد مریضہ کو ربا وجود بظاہر تندہی کے عسر حمل کی شکایت ہونا۔

**علاج۔** اگر مریضہ کے بدن میں آتشکی یا سوزاکی زہر کا اثر موجود ہو، یا اس کے خون میں کسی دوسری قسم کا دندا پایا جائے تو پہلے اسے زائل کرنے کی تدابیر کرنی چاہئیں۔ اور اگر مریضہ کا خون صاف ہونے کے باوجود اور بلا کسی دوسرے سبب کے اسکو عسر حمل کی شکایت ہونے میں قاذون نالی کا قصور ثابت ہو جائے تو اسے لا علاج سمجھنا چاہئے کیونکہ نہ تو اس جھار دار سرے کی اصلی حالت پیدا ہونی

سکے کیونکہ اگر قاذون نالی کا یہ ربا و تعلق اتفاقاً جو لپیٹہ کرافیوس کے خشک ہو قہر پر چاہیئے اور نسائی مادہ کو باہر سے لپٹا لے لے کر جوف رحم میں پیچائے۔ اور طرف ثانی کا مادہ بھی ہر طرح سے درست ہو تو ایسی حالت میں ہتھوڑا حمل ہو سکتا ہے ورنہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔

مکن ہے۔ اور نہ اس جہار کا فائدہ کسی دوسری تدبیر سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

**فصل سترھویں** مسلحہ قاذف (ٹیومر آف دی فیلوپین ٹیوب) یعنی قاذف نالی کی رسولی  
ڈاکٹر جیم خاں صاحب مرحوم نے اپنی کتاب (امراض نسوان کے صفحہ ۲۵۰) میں لکھا ہے کہ خوارگرگیوں  
کی نقش کا امتحان کرنے ہونے سے بعض دفعہ قاذف نالیوں کے جہار دار سر کے قریب چھوٹی چھوٹی رسولی  
سر کے دانہ یا سر کی گھٹلی کے برابر پائی جاتی ہیں۔ ان میں ایک شفاف رقیق اور کسی قدر لمبیدار رطوبت  
بھری رہتی ہے اور ان کی ڈنڈی اکثر ایک انچ سے تین انچ تک لمبی ہوتی ہے۔ مگر کوئی رسولی بے ڈنڈی  
کی بھی ہوتی ہے۔ ان ڈنڈیوں کو اگر بغور دیکھا جائے تو ان میں ایک سوراخ ہوتا ہے جو بعض دفعہ  
کسی رسولی میں جا کھلتا ہے۔ کبھی ان ڈنڈیوں کے خود بخود ٹوٹ جانے سے یہ رسولیاں جھڑ کر گر پڑتی  
ہیں، اور یا پھٹ کر بالکل نابود ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی اپنی جگہ رفتہ رفتہ بڑھتی ہیں۔ لیکن یہ رسولیاں صفینہ رخ  
یا سیب یا رنگترہ سے زیادہ بڑی کبھی نہیں ہوتی ہیں۔

**اسباب علامات**۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اگرچہ ان رسولیوں کے اسباب و علامات و غیر  
بیان نہیں کئے ہیں۔ اور خصیۃ الرحم کی رسولیوں کے بیان میں ضمنی طور سے انکا ذکر کیا ہے۔ لیکن بخور افغان  
کرنے سے آپکو بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان رسولیوں کا سبب بھی وہی غیر طبعی اور گائرسی رطوبت ہوتی ہے  
جس سے دیگر اعضا میں رسولیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس طرح انکی علامات کی نسبت بھی کہا جاسکتا ہے  
کہ اگر ان کی مقدار کی قدر بڑی ہو تو مرصیہ کے پیڑ و اور جگہ گارہ کے درمیان (قرائنا صرہ میں) ایک  
غیر معمولی ابھار پایا جائے گا۔ لیکن رسولیوں کے متعلق دیگر علامات میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ مرصیہ  
کے صفر سن کی وجہ سے ان کا وجود پایا نہیں جاسکتا ہے۔ اور بعض ایسی ہیں کہ بچوں میں ان کے بیان  
کرنیکی قابلیت نہیں ہوتی ہے۔ اسلئے موضع ماؤت میں ایک غیر معمولی ابھار دیکھ کر قاذف نالی کی رسولی  
کی رسولی کا یقین کر لینا ایک سمجھدار معالج کے لئے سخت دشوار ہے۔

**علاج** جب کسی معقول وجہ سے کوئی طبیب کسی مرض کی تشخیص کامل میں عاجز و ناکام رہتا ہے۔ تو اسے  
موقعہ پر اے مشترک اور عام النفع طریقہ علاج اختیار کرنے کی اجازت دینی ہے۔ اسلئے میں کہہ سکتا  
ہوں کہ یہاں بھی طبیب کو ضاد محملات اور اسی قسم کی دوائیں کھلانے یا پلانے کی تجویز کرنی مناسب ہیں  
مقام ماؤت کا درم یا رسولی تحلیل ہو کے اور تیز و قوی الاثر دواؤں کے اہتمام سے احتراز واجب ہے۔

# باب چہارم

## بعض امراض مثانہ و معار مستقیم و متعذر

اگرچہ مثانہ اور معار مستقیم نہ تو اعضا تناسل کی جماعت میں شریک ہیں اور نہ ان کے ملحقات میں شمار کئے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم اس موقع پر ان دونوں اعضاء کے بعض ان امراض کو بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں جن کا طریقہ علاج یکمناطبییات کے لئے ضروری ہے تاکہ وہ مستورات کے ان امراض کا علاج بخوبی کر سکیں جن کی حالت صاف طور پر مردوں سے بیان کرنا دشوار ہوتا ہے۔ اور ان امراض کی تشخیص میں یا اسباب مرض کی تعیین میں اطباء کو اول تو سخت دشواریاں پیش آتی ہیں اور اس کے بعد استعمال ادویہ یا عملی خدمات بذات خود انجام نہ دے سکنے کے باعث بعض ضروری تدابیر سے قاصر رہتے ہیں۔ مگر ہماری تعلیم یافتہ طبیبات دیگر امراض مختصہ نسوان کی طرح ان امراض کے علاج میں بھی مہارت پیدا کریں گی تو امید کرنا ہوں کہ ایسی مریضات کو اپنے علاج کے لئے مرد اطباء کی طرف رجوع کرنے کی استد ضرورت باقی نہیں رہے گی۔

اس باب میں چند فصلیں ہیں اور ہر ایک فصل میں ایک مرض کے اسباب و علامات مع مجرب و مفید علاج کے درج کئے گئے ہیں۔

**فصل پہلی ورم مثانہ (سسٹائیٹس)** یہ مرض تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ورم گرم حاد دوسرا سرد مزمن۔ اور تیسرا سرطانی۔

**قسم اول۔ ورم گرم حاد۔** (اکیوٹ سسسٹائیٹس) یہ ورم اکثر گرم مزاج والی اور جوان مستورات کو پیڑ پر چوٹ لگنے سے یا مثانہ کی پتھری کے خراش سے یا وضع حمل کے وقت مثانہ کو اذیت پہنچنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور دایہ کی بے احتیاطی اور صفائی کا خیال نہ کرنے سے یا سوزاکی مادہ کے برائیت کرنے سے بھی ہو سکتا ہے۔

**علامات (۱) پیڑ میں درد شدید معہ ٹیس کے ہوتا ہے۔ اور کھڑے ہونے سے مریضہ کو سخت تکلیف ہوتی**

ہے (۲) شدید بخار ہوتا اور ہاتھ پاؤں سرد رہتے ہیں۔ کبھی ہڈیاں تک بھی ٹوٹ پھینچتی ہے (۳) پیشاب گارٹھا سرخ۔ متعفن اور قطرہ قطرہ نہایت جلن سے آتا ہے۔ اور اس وقت کبھی شدت تکلیف سے تشنج تک ٹوٹ پھینچتی ہے۔ اگر ورم زیادہ ہو تو پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے (۴) مریض کو پیش کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر ورم زیادہ ہو تو احتباس براز بھی ہو جاتا ہے۔

علاج (۱) اگر حوض کا غلبہ ہو ابتداء مرض کے زمانہ میں سب سے پہلے فصد باسلیق کرائیں (۲) اس کے بعد شیرہ بادیاں شیرہ مکوہ خشک۔ عرق شامہترہ۔ شربت نیلوفر پلائی (۳) ہر روز صبح کو یہ نفوع پلانا چاہئے صفقہ گل نبفشہ۔ عنب تھم خطمی۔ تخم خازی۔ مکوہ خشک۔ شامہترہ۔ تخم کاسنی۔ گادڑباں۔ شربت نبفشہ (۴) مکوہ خشک۔ مغز فلوس۔ آرد جو۔ گل بابونہ۔ کچھ مقشر۔ آب مکوہ سبز میں میکس روغن اضافہ کر کے فریج کریں (۵) گل نبفشہ۔ تخم خطمی۔ مکوہ خشک۔ شامہترہ۔ گل سرخ۔ گل بابونہ کے جوتا مذہ کا نطول کریں یا اسی سے آبن کریں۔ (۶) سنت درد کے وقت پوست خشمخاش کو گلاب میں جوش دیکر اس سے تکسید کریں (۷) آتش جویں شیرہ تخم خشمخاش سفید اور شربت نبفشہ ملا کر بطور غذا کے دیں (۸) ابتداء مرض اور ترید کا زمانہ گزر جائے بعد جملہ تدابیر مذکورہ بالا میں حسب موقع تنذیلی کرنا معالج کی رائے پر ہے۔

انجام۔ اگر عمدہ تدابیر میر ہوں تو چند روز میں ورم تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور وقت پر اگر عمدہ علاج نہ ہو سکے تو ورم کچلے لگتا ہے۔ اور اس میں پیپ پیدا ہو جانے کے بعد پھوٹ جاتی ہے اور یا ورم میں صلابت پیدا ہو کر قسم قسم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مرض نہایت شدید اور مریض لاغر و ضعیف ہو تو شدید عوارض کی تکلیف سے ہلاک ہو جاتی ہے

قسم دوسری۔ ورم بارڈلغنی۔ (کراٹک سٹائیٹس) یہ ورم اکثر سرد مزاج والی مریضات کو پیرٹو سردی لگنے سے یا سنگ مثانہ کی خراش سے یا پیشاب میں مرض نفرس کا مادہ موجود ہونے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں مثانہ کی اندرونی جھلی اکثر سھول کر مونی ہو جاتی ہے۔ اور مریضہ ہمیں مدت تک مبتلا رہتی ہے۔

علامات۔ (۱) مریضہ کو اپنے پیڑ میں بوجھ محسوس ہوتا ہے اور کھڑے ہونے سے پاؤں کانپتے ہیں۔ پیڑ میں درد اور بخار نہیں ہوتا۔ اور نہ طث کے متعلق کوئی شکایت ہوتی ہے (۲) پیشاب پھوٹا ہوا اور تکلیف سے آتا ہے اور پیشاب کرنے سے پہلے یہ تکلیف شروع ہوتی ہے (۳) پیشاب گارٹھا لیسا ہوتا ہے

نہ کیونکہ اندام نہانی میں رکھی ہوئی دوا کا اثر مثانہ کے پچھلے حصہ تک پہنچ سکتا ہے ۱۲ مولف

اور اس میں مسوب مغاطی (میوکس) بکثرت پایا جاتا ہے (۵) جس برتن میں پیشاب رکھا جائے اس میں بچے لگاڑھے اور لمبیدار اجزاء کے ساتھ کثیف رچوڑنے کے سے اجزاء بھی جھے ہوئے پائے جاتے ہیں (۶) جب قدر مرض ترقی کرتا جاتا ہے پیشاب میں ان اجزاء کی مقدار اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور پیشاب کا رنگ بھورا خاکستری ہوتا جاتا ہے (۷) اگر پیشاب کو جوش دیا جائے تو انڈسے کی سفیدی کی طرح کے اجزاء البیض اس میں نشین ہو جاتے ہیں۔ (۸) کبھی یہ گاڑھی رطوبت (میوکس) تحلیل میں چپٹ کر احتباس بول پیدا کرتی ہے۔ اگر قانایر داخل کیا جائے تو اس کے سوراخ میں میوکس چپٹ کر پیشاب کو نکلنے سے روکتا ہے (۹) کبھی پیشاب میں کثیف اجزاء خون کے شامل ہوتے ہیں اور اس میں نوشاؤ (میونیا) کی سی متعفن بو آتی ہے۔

علاج (۱) بادبان عذاب۔ شامبرہ۔ مکوہ خشک تخم خضلی تخم حنظلہ۔ گاؤزباب کا جو شانڈہ۔ مشربت بنفشہ یا مشربت بزوری کے ساتھ صبح کے وقت پلائیں۔ (۲) شام کے وقت یہ سفوف بقدر ساڑھے چار ماشہ ہمراہ آب تازہ اور سکجین ۲ تولہ کے کھلائیں۔ نصف صفتہ منفر تخم حنظلہ ایک تولہ تخم کرفس ۱۰ ماشہ۔ رب بس مش نبات سفید ۲ تولہ باریک میکسوف بنائیں (۳) بابونہ۔ مرزنجوش۔ تخم حلبہ تخم خضلی۔ تخم اسی۔ مکوہ خشک برنجاسف۔ شامبرہ۔ برگ نیب کے جو شانڈہ سے آبرن کریں (۴) روغن کسید بقدر مناسبت کاپری کے ذریعہ سے مثانہ میں داخل کریں (۵) اگر پیشاب نہایت بدبودار آتا ہو اور اندیشہ ہو کہ اسے فساد سے مثانہ کی جھلی گلے لگیگی تو مثانہ کے اندر اس جو شانڈہ کی بچکاری کرنی چاہئے نصف۔ برگ نیب۔ برگ حنا۔ مکوہ خشک۔ گل بابونہ۔ گل سرخ۔ شامبرہ۔ کلیلہ۔ پوست خنخاش پانی میں جوش دے کر صاف کریں اور اس بذریعہ بچکاری کے مثانہ کو دھو ڈالیں۔ (۶) جو ارش زرعونی اس مرض کے لئے بہت مفید ہے۔

صفتہ تخم کور تخم کرفس تخم سبب۔ ناخواہ۔ سفوف منفر تخم حنظلہ۔ منفر تخم حنارین۔ پوست بیج کرفس ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ لونگ۔ پیلا مول۔ کباب جینی ہر ایک ۲۰ ماشہ۔ عود دغام۔ زعفران۔ مصطلی۔ ہر ایک ۲۰ ماشہ۔ سب کو کوٹ چھان کر پاؤں سر شہد خالص میں ملا رکھیں۔ حوزاکہ ۱۰ ماشہ۔ (۷) غذائیں گوشت بز اور پالک۔ گوشتا سہایت کم تنگ و مرج ہمراہ چپاتی کے دیں۔ اگر دودھ یا حنارین کی کھیر دی جائے تو چنچاں۔ مثانہ ہیچ انجام۔ مثانہ میں رطوبت لمبیدار اور چونہ کی طرح کثیف رطوبتی اجزاء جمع رہنے سے پتھری پیدا ہونے لگتی ہے۔ یا مادہ مرض کے فساد سے مثانہ کی اندرونی جھلی گلے لگتی ہے۔ اور بالآخر آئیں زخم ہو جاتے ہیں۔ کبھی ان زخموں کے مثانہ میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ مرض مثانہ سے اوپر کو بڑھ کر

سنفوت و آبرن کل دم

تخم حنارین زرعونی

برنجین (یورٹین) کے ذریعہ سے گردوں تک پہنچتا ہے۔ اشدّت تک اس قسم کی تکالیف برداشت کرنے سے مرہینہ لانغ وضعیف ہو کر فوت ہو جاتی ہے۔

قسم تیسری۔ درم باردی سوداوی سرطانی (کینسر آف بلیڈر) یہ درم اکثر درم حار کے بعد (علاج میں کسی خرابی سے) پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مرہینہ کے مزاج میں سوداویت غالب ہو تو ابتداً بھی ہو سکتا ہے۔ علامات (۱) پیڑ میں نقل اور درد محسوس ہوتا ہے (۲) پیشاب تکلیف اور جلن کے ساتھ آتے ہیں (۳) قارورہ گاڑھا

علاج (۱) گل نبشہ عذاب۔ شامبرہ مکوہ خشک۔ پرسیاوشاں تخم حیارین۔ گاؤزباں کا جوش مذہبہ روز تک شربت بزوری کے ساتھ صبح کے وقت پلائیں (۲) نفخ کے بعد اسی نسخہ میں مغز فلوس اضافہ کر کے مہل دیں (۳) مکوہ خشک۔ گل بالونہ۔ کلیل الملک۔ تخم اسی۔ تخم میحی۔ تخم خطمی۔ پرسیاوشاں۔ مغز تخم قرط۔ خا خشک۔ پوست خنشاں۔ پانی میں جوش دیکر آبزین کریں (۴) مکوہ خشک۔ مغز فلوس۔ آرد جو گل بالونہ۔ تخم خطمی۔ رسوت۔ صندل سرخ۔ تخم اسی۔ تخم کنوبہ۔ کنجد سفید۔ اشق۔ گوگل۔ مکوہ سبز کے پانی میں پیس کر مغز ساق گاؤ۔ ردغن قسطا اضافہ کر کے نیم گرم صناد کریں (۵) شامبرہ۔ مکوہ خشک۔ برگ نیب۔ گل سرخ۔ گل بالونہ۔ کلیلہ۔ پانی میں جوش دے کر مثانہ میں اس کی پچکاری کریں۔ (۶) شدت درد کے موقعہ پر صناد اور پچکاری کی دوا میں افیون قدرے زعفران کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں۔ (۷) غذا میں آتش جو یا دال مونگ یا کدو دراز نہایت کم مرچ نمک کے ساتھ پکا کر چپانی کے ہمراہ دے سکتے ہیں۔

**فصل دوسری** قروح مثانہ و مجرائے بول (السرشن آف بلاڈ اینڈ یوریتھرا) یعنی مثانہ و مجرائے بول میں زخم ہو جانا۔

اسباب (۱) کوئی خلط گرم تیزابی خاصیت کا مثانہ میں گرے اور اپنی تیزی سے اندرونی سطح کو چھیل کر زخم پیدا کرے۔ جیسا کہ اکثر نوجوانوں کو سوزش بول کے بعد ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے حکو ایک مدت تک پیشاب جلن اور گرمی کے ساتھ آتا رہے۔ اسے قروح مثانہ یا مجرائے بول سے بخوبی پہچان رہنا چاہئے۔ (۲) مثانہ میں غار دار پتھری پیدا ہو جائے اور وہ مثانہ کی سطح میں خراش پیدا کر کے زخم ڈال دے (۳) بعض مرتبہ مثانہ میں درم پیدا ہو کر اسکے پک جانے اور پھوٹنے سے بھی زخم ہو جاتا ہے۔

علامات (۱) پیشاب جلن سے آنا (۲) پیشاب میں ریگ موجود ہونا (۳) پیشاب میں بدبودار پیپ موجود ہونا (۴) پیشاب میں بھوس کی طرح کے سفید جھپکے اور مثانہ کی اندرونی جھلی کے گلے ہوئے ٹکڑے موجود ہونے (۵) مثانہ میں ہر وقت جلن کی تکلیف محسوس ہوتی۔

علاج بہت پہلے مرہضہ کو ایسی دوائیں پلائی جائیں جن سے پیشاب کھل کر بکثرت آئے اور مثانہ پیپ اور میل وغیرہ سے پاک ہو جائے۔ جیسا کہ مارسل یا بکری کے دودھ کی لسی۔ یا پوست بیخ فالسہ کے نفیعہ کباب دلال شربت بزوری کیساتھ بھر جب مثانہ صاف ہو جائے اور زخم کو سپدا کر نیوالا متعفن مادہ بالکل نکل جائے تو اس وقت ایسی دوائیں کھلائی جائیں جن سے زخم رفتہ رفتہ مندمل ہونے لگیں جیسے قرص کانچ یا قرص کبریا وغیرہ۔ اور اگر گل ارنی شادنج عدسی منقول۔ کنڈر۔ انزروت۔ نشاستہ بامٹھا سوختہ سفیدہ حب۔ ہر ایک بقدر مناسب لیکر بکری کے دودھ میں گھول کر پچکار سی سے مثانہ میں سپنچائیں تو اس سے بہت جلد زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ اور اگر مثانہ یا اعلیل میں درد شدت محسوس ہو تو شیا ف ایفین افیونی کو عورت کے دودھ میں حل کر کے اعلیل میں ٹپکانا اور شربت خشخاش عرق شاتہرو یا عرق کاسنی میں ملا کر پلانا مفید ہوتا ہے۔

نسخہ قرص کانچ مخم کانچ۔ مخم تخم خیارین۔ مغز بادام شیریں مقشر۔ رب السوس۔ نشاستہ۔ صمغ عربی۔ دم الامخوین۔ کثیرا۔ کنڈجیم کرس۔ ہر ایک۔ اماشہ۔ افیون خالص ایک ماشہ کوٹ چھانکر صاف پانی میں قرص نمائیں خوراک ۳ ماشہ ہے۔

نسخہ قرص کبریا۔ کبریا شمی۔ کثیرا۔ نشاستہ۔ صمغ عربی۔ مخم تخم خیارین۔ ہر ایک۔ اماشہ۔ گلزار فارسی ۳ ماشہ۔ افاق ۳ ماشہ۔ کوٹ چھانکر آب بارتنگ میں قرص تیار کریں۔ خوراک ۷ ماشہ ہمراہ آب ساق۔  
نسخہ شیا ف ایفین۔ نشاستہ ایک ماشہ۔ سفید کاشغری معنول۔ اماشہ۔ کثیرا۔ صمغ عربی ہر ایک ۳ ماشہ۔ افیون خالص۔ اماشہ نہایت باریک پسکر سفیدی سفیدہ مرغ میں ملا کر شیا ف تیار کریں۔ یہ شیا ف کثرت خیم کے لئے بھی مفید ہیں۔ جو درد شدید کے موقع پر بعد تحقیق کے مستقل ہیں۔

فصل تیسری۔ احتباس البول (ریٹنشن آف یورن) یعنی پیشاب بند ہو جانا۔ یہ زخم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ پیشاب مثانہ میں بھرا رہے اور نکل نہ سکے۔ دوسرے یہ کہ گردوں میں پیشاب کی موقوف ہو جائے۔ اسلئے مرہض کا پیشاب رک جائے۔ ان دونوں قسم کے احتباس کا آخری نتیجہ

یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تکلیف زیادہ قائم رہے تو پیشاب میں دفع ہونے والے فضلات کی سمیت تمام بدن میں سرایت کرنے سے اور اعضاء رملیہ پر اس کا مفسد اثر ہونے سے مرلین ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس پر ان دو نوزن مستوں کو معہ اسباب و علامات و علاج کے درج ذیل کرتے ہیں۔

قسم اول۔ وہ احتباس جس میں مثانہ پیشاب سے اس قدر بھر جاتا ہے کہ مرلین کا پیڑ پھول جاتا ہے۔ اور مثانہ کے تناؤ کی سخت اذیت سے مرلین بے چین رہتا ہے۔ کبھی خفقان یا سیہوشی یا ہڈیاں تک کبھی نوبت پہنچتی ہے۔

اسباب (۱) اگر مثانہ میں پھری ہو تو اس کا مجرلے بول میں پھنس جانا (۲) اگر مثانہ میں زخم ہوں تو ان کی پیپ سے مجرلے بول کا بند ہو جانا۔ یا زخم کی جگہ سے کوئی کچھڑا علیحدہ ہو کر مجرلے بول میں پھنس جانا (۳) اگر مثانہ میں زخم ہو تو پیشاب کرنے میں تکلیف ہونے کے خوف سے بیمار کو پیشاب کی ہمت نہ ہونا (۴) اندام زخم کے موقعہ پر مجرلے بول میں گوشت زائد پیدا ہو جانا (۵) شرمگاہ کے بیرونی حصہ یا اندام نہانی یا معاء مستقیم وغیرہ میں ورم شدید ہو تو اس کے دباؤ سے مجرلے بول کا بند ہو جانا (۶) عام عصبی تشنج سے مجرلے بول کا بند ہو جانا۔ جیسا کہ بعض شدید قسم کے امراض دماغی میں ہوتا ہے (۷) یا خاص عضلہ ماسکے البول کے تشنج سے مجرلے بول کا بند ہو جانا۔ جیسا کہ مثانہ یا مجرلے بول میں ورم یا زخم ہونے کی حالت میں یا حرقت البول کی تکلیف سے ہوتا ہے (۸) مثانہ کی گردن اور عضلہ ماسکے البول کے علاوہ اسکی تمام ساخت کا ڈھیلا ہو جانا اور اسکی قوت دفعہ میں کمزوری پیدا ہونا اور جس معدوم ہو جانا۔ جیسا کہ مثانہ کی ساخت میں رطوبت مادی جذب ہو جانے سے ہوتا ہے (۹) اتفاقاً کسی کام میں مشغول ہونے کی حالت میں اگر کچھ دیر تک پیشاب روکا جائے تو شدت تناؤ کے سبب سے اسکی ساخت کے عضلی ریشے ٹھک کر اس قدر مست ہو جاتے ہیں کہ پیشاب کو دفع کرنے کے لئے انہیں سکرٹنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ اسلئے پیشاب خارج نہیں ہو سکتا۔

علامات (۱) مرلین کے پیشاب میں ریگ کا پایا جانا سنگ مثانہ کی علامتوں میں سے ہے۔ اور اندام نہانی میں انگلی داخل کر کے ٹٹونے سے بھی پھری معلوم ہو سکتی ہے (۲) پیشاب میں پیپ ہونا مثانہ کا مجرلے بول کے زخموں کی کھلی علامت ہے۔ باقی علامات ان امراض کے موقعہ پر درج کیا گئی۔ (۳) مجرلے بول میں گوشت زائد پیدا ہونے سے اگر احتباس بول ہو تو پہلے زخموں کا ہونا اور جب مال زخم



شروع ہو تو رفتہ رفتہ پیشاب کی دھار باریک ہو کر احتباس بول تک پہنچا اسکی علامت ہے۔ اسکے علاوہ اگر اچیل میں سلائی داخل کرنے سے اس میں رکاوٹ اور درد ہو اور سلائی خون آلودہ نکلے تو اس سے گوشت زائد کی تصدیق ہو سکتی ہے (۴) اگر شرمگاہ یا اندام نہانی وغیرہ کے درم سے یا عام عصبی تشنج سے احتباس بول ہو تو ان امراض کا وجود اسکی علامت ہے (۵) اگر مثانہ یا مجرئ بول کے گہرے حصہ میں درم ہونے سے احتباس بول ہو تو بخار اور مقامی درد کی تکلیف اسکی علامت ہے (۶) اگر مثانہ کی ساخت کے ڈھیلے ہونے اور ضعف قوت دفعہ سے پیشاب رک گیا ہو تو غلبہ بغیریت کی علامتیں موجود ہوں گی۔ اور پیڑو میں ثقل محسوس ہونا اور کثرت بلغم کے سبب کا مقدم ہونا اسکی علامت ہے (۷) اگر کسی کام میں مشغول ہونے اور پیشاب کے روکے رکھنے سے احتباس بول ہو تو دریافت کرنے سے ثابت ہو سکتا ہے۔

علاج۔ اگر مثانہ میں پیشاب کی زیادہ مقدار جمع ہو جانے سے مریض بے چین ہو یا دیگر شدید عوارض پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو سب تدابیر سے پہلے قاتا طیر داخل کر کے پیشاب نکال دینا چاہئے۔

لیکن یاد رکھو کہ اگر مجرئ بول یا مثانہ میں درم شدید ہو تو حتی المقدور قاتا طیر کا استعمال نہ کرنا چاہئے اسی طرح اگر شرمگاہ یا اندام نہانی میں درم ہو یا عضلہ ماسکے ابول میں سخت تشنج ہو تو اس حالت میں بھی صحت کے شدید ضرورت پیش نہ آئے۔ سو وقت تک قاتا طیر کا استعمال نہ کرنا بہتر ہے۔

(۵) اسکے بعد اگر مثانہ کی پتھری سبب ہو تو اس کے نکلانے کی تدابیر کرنی لازم ہیں جبکہ بیان آئندہ آئیگا (۶) اگر مثانہ یا مجرئ بول میں زخم ثابت ہوں تو انکا علاج بھی اسی قاعدہ سے کرنا چاہئے جو اس بحث میں مذکور ہے۔

(۷) اگر مجرئ بول میں گوشت زائد ہو تو دواؤں سے اسکا علاج سخت دشوار ہے۔ خصوصاً جبکہ مجرئ بول کے گہرے حصہ میں ہو۔ اسلئے قاتا طیر سے پیشاب نکالنا چاہئے۔ اور باروت ایک تولہ باریک پیس کر وعن زیتون تولہ میں ملا کر اسکے چند قطرے اچیل میں پٹکائیں۔ یا شیشے کی پکپکاری سے مجرئ بول میں سپاندیں۔ دو یا تین ہفتہ تک عمل کرنے سے گوشت زائد کے تحلیل ہونے کی امید ہے (۸) اگر عصبی تشنج یا درم کے سبب مجرئ بول بند ہو گیا ہو تو اسکے لئے یہ وزن معینہ صفتہ تخم حطی پر سیا دشاں۔ مکوہ خشک۔ مالونہ۔ تخم کتان۔ مرزنجوش۔ برگ سداب۔ یونیو۔ خشک۔ برنجاسف۔ تخم میقہ۔ گل سرخ۔ اکلیل الملک۔ سنبل الطیب۔ مغر تخم قرطم۔ تخم سویہ۔ براق ایک ایک تولہ لیکر پانی میں پکائیں اور صاف کر کے آبن کر لیں۔ باقی تدابیر درم کی بحث میں مذکور ہیں (۹) اگر مثانہ کی ساخت کے ڈھیلے ہونے (۱۰)

قوت دافعہ کے ضعف سے احتباس بول ہو تو قانا طیر سے پیشاب نکالنا اور ایسی دواؤں کے جو شانہ میں مرہضہ کو بچھانا معین ہوتا ہے۔ گلنار گل سرخ ساز و سبز مائیں۔ پوست انار جو زلسر و برگ گاس۔ بدستور پانی میں پکا کر کام میں لائیں (۱) اگر مثانہ کے عضلی ایشوں میں سکنے کی طاقت باقی نہ رہی تو انکی تحریک کے لئے زعفران کی پٹھڑی اچیل میں رکھنی اور پیڑ پر ستورہ کا لیپ کرنا اور کھینک کے کان کا میل ناف پر لگانا بہ طرح ناف میں جوں چھوڑ دینا مجرب ہے۔ قسم دوسری وہ احتباس بول جس میں پیشاب مثانہ کے اندر موجود نہ ہو بلکہ گردوں میں پیشاب کی موقوف ہو جانے کے سبب پیشاب بند ہو گیا ہو۔

**اسباب (۱)** ہیضہ دہانی کے تیرے درجہ میں جبکہ تیلے دست بکثرت کہنے بدنی رطوبت بہت کم باقی رہ جاتی ہیں صنف حرارت غریزیہ کے سبب بدن سرد اور بطن ساقط ہو جاتی ہے۔ اور خون کا قوام کاڑھا ہو کر رکاوٹوں سے ہو جاتا ہے۔ تو اس حالت میں تمام اعضا کی طرح گرتے بھی تنک کر اپنے کام (تولید بول) سے عاجز ہو جاتا ہیں (۲) بہ طرح بعض شدید تم کے بخاروں اور دیگر امراض میں بھی رطوبات بدنی کے تحلیل ہونے سے اس طبیعت کے دفع مرض کی تدابیر میں مشغول ہو کر اپنے معمولی فرائض سے عاجز رہنے کے باعث پیشاب کی پیدائش کم ہونے لگتی ہے (۳) بعض دماغی امراض میں پیشاب کی پیدائش کم ہونے یا بالکل موقوف ہونے کی علت (علاوہ مذکورہ بالا وجوہات) ایک یہ بھی ہے کہ دماغ کے مبتلا و مرض شدید ہونے کی حالت میں نظام عصبی کچھ ایسا دہم بہم ہو جاتا ہے کہ دماغ اعصاب ہشتر کہیہ (سب سے تھکے نروز) کے ذریعہ سے وہ احکام صادر نہیں کر سکتا جسکی رو سے خون کی گردش دوران خون کا انتظام قائم رکھ سکیں اور خون کو مہ فضلات بول کے حسب معمول گردوں تک پہنچاتی رہیں۔

**علامات (۱)** امراض مذکورہ بالا اور انکے شدید عوارض کا موجود ہونا کافی ہے۔

(۲) مثانہ میں پیشاب کا موجود نہ ہونا جو قانا طیر داخل کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔

(۳) پیشاب بند ہونے کے بعد مرہض کے پیڑوں میں اُبھار معلوم ہونا اور مثانہ کے تناؤ کی تکلیف اور جھیننی کا ہونا۔

(۴) غفلت اور بیہوشی ہونا یا ہڈیاں تک نوبت پہنچنا۔ (۵) بطن مخفض دقیق ضعیف خالی اور مختلف ہونی۔

**علاج**۔ ہیضہ دہانی میں پیشاب کی بندش رفع کرنے کے لئے یہ نسخہ مفید ہے صفحہ ۲۰۰ شورہ قلمی۔ جو اکھد

کباب جینی ہر ایک ۴ سرخ باریک پیکر سفوف بنائیں اور اسکے ہمراہ شیرہ تم کاسنی شیرہ تم خیارین شیرہ تم

خرفہ سیاہ ہر ایک ۳ ماشہ عرق گدڑے تو کہ عرق بید مشک ۵ تولہ میں تیار کر کے کھجین بنوری ۴ تولہ ملا کر

بھوڑا بھوڑا پلا میں۔ اور سبوس گندم و نمک کی پوٹلی سے گردوں کے مقام پر تھمکد کریں۔

بند ہونا

شدید ختم کے بخاروں میں اس غرض کیلئے یہ تدبیر اچھی ہے کہ مفرج بارد کے ساتھ شیر و غلاب شیر و مغز کرد و شیریں عرق کا زباں عرق گذر بہت بہت نیلوفر یا شربت بزودی دیا جائے۔ اور انیسویں۔ تھم صویہ۔ زیر سینہ قدرے جواکھاں اور ستون ملا کر پیڑا اور کمر پر گردوں کی جگہ لپ کریں۔ اور قدرے رائی یا فی میں جو شکر اس سے تکید کرنا بھی مفید ہے۔

اگر دماغی شدید امراض سے اعتبار بول ہو تو خاص ان امراض کی تدابیر کے علاوہ آہن کا نیچہ بہت مفید ہوتا ہے۔ صفحہ۔ تخم گزر۔ پر سیاوشاں۔ خار خشک۔ منتر تخم قرطم۔ بخود سیاہ۔ پودینہ خشک۔ تخم خطمی۔ سبوس گندم۔ بقدر مناسب لیکن ان کے جو شانہ سے آہن کرین۔ اور زعفران روغن بالونہ میں ملا کر پیڑا اور کمر پر لاش کریں۔

آہن در بول

**فصل چوتھی** حرقۃ البول (آری ٹیل بلیدز) یعنی پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہونا۔  
**اسباب (۱)** جوانی میں گرم چیزوں (تیز نمک مرعہ وغیرہ) کے زیادہ کھانے یا گرمی میں زیادہ رہنے سے جگر یا گردوں میں زیادہ گرمی پیدا ہونا۔ اور پیشاب میں صغرا کا زیادہ خارج ہونا  
**(۲)** مثانہ یا مجرئے بول میں ورم یا کسی قسم کی صحنیاں یا جب پیدا ہونا جزیب یا کسی سبب سے زخم ہو جانا۔  
**(۳)** جگر یا گردوں کی خرابی سے پیشاب میں کسی قسم کا تیزابی مادہ (ترسی یا کھاری پن) زیادہ ہو جانا۔  
**(۴)** گردوں یا مثانہ میں ریگ پیدا ہو کر پیشاب میں شامل ہونا اور مثانہ یا مجرئے بول میں خراش پیدا کرنا۔  
**(۵)** پیشاب زیادہ لانے والی چیزوں کے بکثرت استعمال سے مثانہ یا مجرئے بول کی محافظہ لیسدار رطوبت کا فنا ہو جانا۔

**علامات**۔ ہر ایک سبب کی تشخیص اسکی معلقہ علامتوں سے بخوبی ہو سکتی ہے۔ مثلاً (۱) گرم چیزوں کا پہلے کھانا اور گرمی میں رہنا۔ اور پیاس کی شدت بھوک کی کمی۔ پیشاب کی درد یا سرخی۔ سرد چیزوں کے استعمال سے فائدہ ہونا۔ حرارت جگر و گردہ کی علامات ہیں۔ (۲) مثانہ یا مجرئے بول میں ورم وغیرہ پیدا کرنے والے اسباب کا مقدم ہونا اور بخار یا درد وغیرہ علامات ورم کا موجود ہونا ورم مذکور کا گواہ ہے۔ اس طرح پیشاب میں رسوب خنثی کے وجود سے ورم کا ہونا اور پپ کے مخلوط ہونے سے زخم کا موجود ہونا ثابت ہو سکتا ہے (۳) پیشاب کی ترسی یا کھاری پن اسکی بوسے اور کیمیائی طریقہ پر امتحان کرنے سے دریافت ہو سکتی ہے (۴) پیشاب میں ریگ ہونا بھی قارور کے معمولی معائنہ سے معلوم ہو سکتا

اور کیمیائی امتحان سے اسکی پوری تصدیق ہو سکتی ہے۔

(۵) مدرات کے بکثرت استعمال کرنے کے بعد حرقتہ البول کی شکایت پیدا ہونا مجملے بول کی اندر زنی رطوبت کے فنا ہو جانے کی علامت ہے۔

علاج۔ اگر جگر یا گردوں میں حرارت ہو تو شیرہ تخم کاسنی، شیرہ تخم خیارین، شیرہ تخم خرفہ سیاہ، شربت نیلوفر یا بنوری کے ساتھ پائیں۔ جگر یا گردوں کی جگہ پر سرد چیزوں کا لپ گھائیں اور سرد غذائیں کھلائیں (۲) اگر مثانہ یا مجملے بول میں درم ہو تو اس کا علاج کریں۔ اور اگر جرب وغیرہ ہو تو لعاب بہدانہ، غیرہ مخمر تخم خیارین، عرق شامہرہ، شربت نیلوفر یا شربت خشتا شش پلائیں۔ اور یہ سفوف بھی مفید ہے۔ رب السوس ۳ ماشہ۔ نشاستہ۔ صمغ عربی۔ کثیر۔ تخم خشتا شش سفید، بزر البلیغ سفید ہر ایک ۷ ماشہ۔ مخمر تخم کھیرہ، مخمر تخم حنظلہ ہر ایک ۱۰ تولہ۔ تخم خرفہ ۳ تولہ۔ سب کو کوٹ چھانک اسپیول مسلم ۳ تولہ ملائیں۔ ہر روز اس میں ۹ ماشہ لے کر جو شامہ برگ شامہرہ ۷ ماشہ شربت عناب ۳ تولہ کے شامہرہ کھالیا کریں۔ اگر مثانہ یا مجملے بول میں زخم ہوں تو انکا علاج علیحدہ بیان کیا گیا ہے (۳) اگر مثیاب میں ترش تیزابی مادہ موجود ہو تو ربودہ صنی کباب صنی جاکھا شتر قلمی ہر ایک نصف ماشہ کا سفوف ہمراہ شیرہ کانج، شیرہ دوق، شیرہ تخم کرفس ہر ایک ۳ ماشہ شربت بنوری ۳ تولہ داخل کر کے پلائیں۔ اور پوست حنظلہ کا ٹک بھی اسکے لئے مفید ہے۔ جو پوست حنظلہ کی راکھ کو پانی میں گھول کر اسکے معطر پانی کے پکانے سے حاصل ہوتا ہے (۴) اور اگر مثیاب میں کھاری پن ہو تو اس کے لئے شیرہ تخم خرفہ ۳ ماشہ، سلجین بنوری کے ساتھ مفید ہے۔

(۵) ریگ گردہ و مثانہ کے لئے یہ سفوف بہت اچھا ہے۔ مخمر تخم خیارین ایک تولہ، مخمر تخم حنظلہ تخم جازی۔ بادیان۔ تخم کرفس ہر ایک ۶ ماشہ، مخمر بادام شیریں مقشر حب لبلاں، مخمر تخم بکائن۔ بیج کانج۔ دوق۔ فحاح اذخر۔ ناخواہ۔ برگ سداب۔ مرچ سیاہ۔ گل سرخ۔ ناگر موختہ۔ ہر ایک ۲ ماشہ کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔ جو راک ۷ ماشہ ہمراہ آب تازہ اور شربت آلو بالو کے کھلائیں۔ شربت آلو بالو پاؤسیر رات کو ایک سیر پانی میں بھگو کر صبح کو اسقدر پکائیں کہ نصف رہ جائے پھر صاف کر کے ایک سیر شکر سفید اضافہ کریں۔ اور شربت تیار کریں جو راک ۲ تولہ ہے (۶) کثرت استعمال مثانہ کی حالت میں سفوف رب السوس والہ گائے کے دودھ کی لسی کے ساتھ مفید ہوتا ہے۔ اور یہ پکا دی

نہایت مجرب ہے صفتہ منقرتہ کہ دشیریں منقرتہ تر بوز ہر ایک ۲ ماشہ پانی میں میکہ لوب اسپنول مسلم ۱ ماشہ لڑکی کی لہاں کا دودھ ایک تولہ اضافہ کر کے مجرے بول میں پچکاری سے داخل کریں۔ غذا مرعین کو ٹھنڈی غذائیں کھانا اور گرم چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے ۴ شش جو اور سبز ترکاریاں مثل کہود راز و کلڑی اور ساگ خرفہ و پالک وغیرہ سفید ہیں۔

**فصل پانچویں** سلسلہ البول (ان کا ہی ٹینس آف یورن) یعنی پٹیاب ہر وقت بلا ارادہ کے جاری رہتا ہے۔ یہ مرض اگرچہ بلغمی المریض بچوں اور ضعیف بوڑھوں کو ہوتا ہے اور بعض اچھے عرصے مرعین بھی (جو کہ مرطوب آب و ہوا کے مقامات میں سکونت رکھتے ہوں) اس مرض میں مبتلا دیکھے جاتے ہیں اسلئے میرے نزدیک اس مرض کا بڑا سبب مثانہ میں سردی پہنچنا اور غلبہ رطوبت کا ہونا ہے۔ لیکن اگر اس کے اسباب کو گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ یہ مرض پانچ اسباب سے پیدا ہو سکتا ہے جنکو ہم جدا گانہ مع علامات اور علاج کے درج ذیل کرتے ہیں۔

**اسباب (۱)** خاص مثانہ کی ساخت کے عصبی ریشے اور وہ عضلہ جو مثانہ کی گردن پر محیط ہو کر اسے بند رکھتا ہے۔ غلبہ بلغم سے مسترخ (ڈھیلا) ہو کر اپنا کام پورے طور پر نہ کر سکیں۔

**علامات (۱)** پٹیاب کا رنگ سفید ہونا (۲) سرد چیزوں کے کھانے سے مرض میں زیادتی ہونی (۳) گرم اور خشک چیزوں سے فائدہ ہونا (۴) دیگر اسباب کے متعلق کسی علامت کا موجود نہ ہونا۔

**علاج گرم اور قلعن و معوی مثانہ دوائیں کھلائیں جیسے معجون ماسک البول۔ معجون کندر جوارش مصطلکی۔ اور یہ سفوف بھی اس مرض میں بہت سفید ہے صفتہ کندر مصطلکی۔ گل سرخ۔ ناگزوتہ**

**حوالہ** حفت بلوط۔ گلزار۔ ہر ایک ساوی کوٹ چھان کر اس میں سے بھرے ماشہ رات کو سوتے وقت ہمراہ عرق بادیان عرق الاچی عرق پودینہ کے کھلایا جائے اور تل مقشر ایک تولہ خشک شمش

**سفید ماشہ منقر بادام شیریں مقشر ۷ عدد۔ ہر ایک میکہ سب کے برابر مصری ملا کر کھانا بھی سفید ہے۔ نسخہ معجون ماسک البول۔ حب الاس۔ شہد انج۔ ہر ایک ۱۰ تولہ۔ بلبلہ سیاہ۔ پوست بلبلہ کالی۔**

**دونوں گائے کے گھی میں بھوئی ہوئی۔ کچھ سفید ہر ایک ۹ ماشہ۔ کبر بادامی ۷۔ ماشہ تلہ مصری ۱۰۔ ماشہ حفت بلوط۔ قنار کندر ہر ایک ۲ ماشہ۔ سب کو کوٹ چھان کر نگاہ رکھیں اور مزید نفی کلاں ۱۰ عدد کلاں**

**۵ اتولہ میں پس کر اور چھان کر یکساں جب قوام کاڑھا ہو جائے تو کٹی ہوئی دوائیں سمیں ملا کر معجون**

سفوف ماسک البول

معجون ماسک البول

تیار کریں۔ خوراک ۵ ماشہ ہے نسخہ معجون کندر۔ کندر۔ قسط شیریں۔ بلوط سعد کوفی۔ وافر لکڑی۔  
۱۰ ماشہ سونٹھ ۶ ماشہ مرچ سیاہ ۴ ماشہ۔ کوٹ چھا لکڑی خالص ۵ اتولہ میں ملا کر معجون تیار کریں مقدار خوراک  
(۲) کثرت مدرات بول جن چیزوں سے بکثرت پیشاب آتا ہے ان کے کھانے میں مبالغہ کرنا اور  
ایک مدت تک بکثرت کھانا بھی گردہ اور مثانہ کو ضعیف کر کے اس مرض کا موجب ہو سکتا ہے جیسے شرابخوری کی  
عادت یا خرپڑہ اور ترلوز وغیرہ بکثرت کھانا۔ دودھ چھا چھ لکڑی یا کسی قسم کا شربت وغیرہ بکثرت پینا۔  
علامات (۱) اشیاء مذکورہ پہلے سے کھانا انکے سبب ہونے کا گواہ ہے جو مرینہ کے حالات سابقہ دریا  
کر غیہ بخوبی ثابت ہو سکتا ہے (۲) اس قسم کی اشیاء کا استعمال ترک کر نیسے یا انکی اصلاح کرنے سے مرض  
کو فائدہ پہنچا (۳) مرینہ کے اعصاب اور اعصاب عصبانہ کا اصل پیدائش میں کمزور ہونا بھی اسکا ایک قریب  
علاج۔ اس قسم کی اشیاء کے استعمال سے بالکل پرہیز کرنا اور مقویات مثانہ کا استعمال کرنا سفید  
ہوتا ہے چنانچہ اس عرض کے لئے روغن مصطکی۔ روغن بکائن۔ روغن سرخ کی مالش مثانہ پر کرتا  
اور اطر لعل کبیر یا جوارش مصطکی کھلانا مناسب ہے۔

(۳) سوء مزاج گرم مثانہ کبھی مثانہ کا سوء مزاج گرم بھی اس مرض کا سبب ہوتا ہے۔ خصوصاً  
جبکہ گرمی سے مثانہ کی ساخت کے ریشے ٹھیلے ہو جائیں علامات (۱) پیشاب کی سرخی اور طین  
(۲) مرینہ کے مزاج میں غلبہ گرمی کی علامات کا پایا جانا (۳) گرم اشیاء کے استعمال سے مرض کی زایدتی  
علاج۔ سرد اور قابض دوائیں کھلائیں۔ جیسے قرص طباشیر قابض جوارش آملہ۔ اطر لعل صغیر  
اور یسغوف بھی مفید ہے صفحہ بگنا۔ رگل سرخ۔ مانوسبز۔ کرتازج۔ کثیر خشک۔ آملہ خشک۔ صندل  
سفید۔ طباشیر سفید۔ ہر ایک ۶ ماشہ۔ نبات سفید سم تولہ۔ سب کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔ اور  
اس میں سے ۷ ماشہ لیکر بکری کے دودھ کے ساتھ کھلائیں۔

(۴) موضع عجز پر چوٹ لگنا۔ کبھی عجز کے مہروں پر پیچے سے چوٹ لگنے سے مثانہ کو صدمہ  
ہیچک رہا مثانہ کے پٹے ٹوٹ کر یا مثانہ کے قریب والے اعضا کا دباؤ مثانہ پر پڑنے سے یہ مرض ہو جاتا ہے  
علامت۔ اس جگہ چوٹ لگنے کے بعد اس مرض کا لاحق ہونا اسکی علامت ہے علاج۔ اگر عجز  
کے فقرات یا جوف عانہ کے اندر کا کوئی عضو اپنے موقع سے ہٹ کر مثانہ پر دباؤ ڈال رہا ہو تو اسکی  
کے ذریعہ سے ان اعضا کو انکے موقع کی طرف کھینچا جائے۔ اور اگر چوٹ لگنے سے مثانہ کی ساخت میں

کمزوری پیدا ہوگئی ہو تو مقوی مثانہ ضادات کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی سچھا ٹوٹ گیا ہو تو مرض لا علاج ہے۔ یہ صنماد چوٹ لگنے کے موقعہ پر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہلدی میدہ لکڑی سبجی۔ تل سفید۔ گل ارمنی۔ ایلوہ۔ تخم بنواڑ ہر ایک ۶ ماشہ پانی میں باریک پس کر نیم گرم لپ کرے۔ اس سے درد کو تسکین ہوتی اور درم تحلیل ہو جاتا ہے۔

(۵) ورم مجاورات مثانہ۔ اگر مثانہ کے قریب والے اعضا میں سے کسی میں ورم ہو جائے تو اس کے دباؤ سے بھی ہر وقت پیشاب جاری رہ سکتا ہے۔ جیسے ورم رحم مزمن یا ورم معا و مستقیم وغیرہ۔

علامات (۱) ان اعضا میں ورم ہونا اور درم کی علامات موجود ہونا (۲) دیگر اس کے متعلق علامات کا موجود نہ ہونا علاج۔ جس عضو میں ورم کا وجود ثابت ہوا اس کا علاج حسب قاعدہ کرنا چاہئے۔

**فصل چھٹی۔** البول فی الفرائض (الکٹوان کانظمی تنیس آف یورن) یعنی رات کو سوتے میں

پیشاب نکل جانا یہ مرض اکثر بلغمی یا خازیری مزاج کے ضعیف بچوں کو اور کبھی بوڑھوں کو بھی ہو جاتا ہے اس مرض میں اکثر عضلہ ماسکے البول (اسفکٹر ویسی سی) کسی قدر ضعیف ہو جاتا ہے چونکہ چلنے کی

حالت میں یہ عضلہ اس وقت تک کام دے سکتا ہے جب تک کہ مثانہ پیشاب سے خوب بھر نہ جائے اسلئے مریض حتی المقدور پیشاب روکنے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن سونے کی حالت میں جب مثانہ پیشاب

سے بھر اہو تو اسے روک رکھنا اکی طاقت سے باہر ہوتا ہے۔ اسلئے پیشاب نکل پڑتا ہے۔ یہ طرح اگر معا و مستقیم میں دیدان (چنچے) ہوں یا خازیری مزاج والے بچے کے پیشاب میں خراش وارتیزابی مادہ

(یورک لیٹ) ہو تو ان دونوں چیزوں کی خراش سے بھی اُغصی مشارکت کیوجہ سے اس عضلہ کے فعل میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اسلئے مریض رات کو سونے کی حالت میں پیشاب کو روکنے سے عاجز ہوتا ہے۔

**اسباب** (۱) مزاج بلغمی یا خازیری ہونا (۲) عام عصبی کمزوری اور خاص عضلہ ماسکے البول کا کمزور ہونا (۳) معا و مستقیم میں چنچے ہونا (۴) پیشاب میں ترخی یا کوئی تیزابی جو ہر ہونا۔

(۵) پیشاب کی سیدائش زیادہ ہونا۔

علامات (۱) بلغمی مزاج کے بچوں کا بدن مزید پھلچلا اور حواس گند حرکات سست۔ نصن عریض اور بلی ہونے کے ساتھ ہی انہیں نیند کا غلبہ اور بلغم کی دیگر علامات موجود ہوتی ہیں (۲) خازیری مزاج کے

سلہ یہ عضلہ مثانہ کی گردن کے گرد حلقہ بناتا اور اپنے سرکھٹنے سے مثانہ کے دہانہ کو بند رکھتا ہے۔ اسلئے

بچے اکثر خفیف زرد رنگ اور دیلے ہوتے ہیں (۱) اگر معائنہ مستقیم کے چیتھے مرض کا سبب ہوں تو کبھی کبھی براز میں کٹھن اور متعدد میں تکلیف ہونے سے تشخیص کئے جاسکتے ہیں (۲) پیشاب کی ترشی اور تیزابی قحطیت اسکے امتحان سے دریافت کی جاسکتی ہے (۳) زیادہ پیشاب پیدا کرنے والی چیزوں کا کھانا، دریافت کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔

**علاج (۱)** بلغمی مزاج کے مریضوں کو جوارش مصطکی یا معجون کندر مفید ہوتی ہے (۲) لوٹھے مریضوں اور خنازیری مزاج کے بچوں کیلئے معجون نہایت مجرب ہے صفحہ ۲۰۲ ناگرموٹھ ۲۰۲ تولہ۔ کندر مصطکی قططیریں بلوط۔ ہر ایک ۱۰ تولہ۔ سوٹھ ۹ ماشہ۔ مرج سایہ ۶ ماشہ۔ سب کو باریک کوٹ چھان کر شہد خاص ۲۵ تولہ میں ملا لیں۔ پوری خوراک ۵ ماشہ ہے۔ رات کو سوتے وقت عرق بادیان ۵ تولہ کیساتھ کھلائی جائے (۳) لوہے کے مرکبات جیسے کثہ خث الحدید یا فولاد کھلانا بھی مجرب ہے (۴) تل سفید نکال کر کھلانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور مصطکی ایک ماشہ پیکر گلقد ایک تولہ میں ملا کر رات کو کھلانا مفید ہے (۵) اگر چیخوں کے سبب ہو تو انکا علاج کرنا چاہئے۔ اور باؤ بڑنگ ۲ دانہ مویر متقی ۳ عدد میں رکھ کر ہر روز کھلانے سے دوسرے میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ (۶) اگر پیشاب میں ترشی یا تیزابی اجزاء پائے جائیں تو زیرہ یاہ کندر شہد اجوائن دیسی مرج سایہ نمک سیاہ جو اکھار ہر ایک ۳ ماشہ۔ سب کو سفوف بنا کر اس میں سے ایک ماشہ تازہ پانی کے ساتھ کھلانا چاہئے (۷) ڈاکٹروں کے لکھا ہے کہ چربا ڈو دوس قطرہ سے میں قطرہ تک دینا میں دفعہ پلاناس مرض میں پلاناسیت مفید ہے (۸) پوست خشتاش بریاں۔ پوست ہلیہ کالبی بریاں۔ گل سرخ جفت بلوط۔ گلار کندر جب اس طباشیر ہر ایک میں ماشہ۔ کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور اس میں سے ۳ ماشہ ہر روز تازہ پانی کے کھلائیں (۹) پیشاب زیادہ پیدا کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہئے اور سونے سے پہلے پیشاب کرنا اور رات کو ایک دو مرتبہ جگا کر پیشاب کرنا مناسب ہے۔ اگرچہ لیٹنے کی عادت ہو تو کروٹ سے لیٹنے کی ہدایت کرنی چاہئے۔

### فصل ساتویں۔ حصۃ المثانہ اور الکلیہ (کال کیولا ویسیائی سی۔ آر سٹون آف کڈنی)

اسے بڑا پلو تشریح سے معلوم ہے کہ مثانہ کے زیریں اور پچھلے حصہ میں عنق مثانہ سے اوپر اور جالبین کے جانے اختتام کے درمیان مثانہ کی ساخت کا وہ حصہ ہے جسکو مثلث متانی کہتے ہیں۔ اس موقع پر تین ذہیں قوت جس زیادہ ہے اور جو کہ جت لیٹنے کی حالت میں مثاب کا دباؤ بھگد زیادہ ہوتا ہے اسے اگر مریض کو روٹ سے لیٹا تو اس کے مثانہ میں پیشاب زیادہ رسکاتا ہے

معجون مریض

بلغمی مزاج



یعنی مثانہ یا گردہ میں پتھری پیدا ہوتا۔ چونکہ اس فصل میں دو جگہ پتھری پیدا ہونے کا بیان ہے پہلے ہم اس کو دو قسموں میں جداگانہ درج کرتے ہیں۔

**قسم اول۔ حصۃ الکلیہ۔** (سٹون آف کڈنی) یعنی گردہ میں پتھری پیدا ہوتا۔ اس مرض کا سبب یہ ہے کہ خون میں کثیف اجزاء پائے جائیں یا گردوں میں گاڑھا اور چپکاؤ دار مادہ جمع ہو جائے اور گردوں میں حرارت موجود ہو جو کہ ان کثیف یا گاڑھے اجزاء کو سخت کر کے پتھری بنائے۔ یہ مرض بعض غائبانہ میں ہو روتی ہوتا ہے اور برعکس میں ہو سکتا ہے۔ لیکن اکثر جوانی کے بعد یا بڑھاپے میں فزیا شخاص کو زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اسکی پیدائش کا مادہ اور دیگر اسباب سے عمر میں نسبتاً زیادہ پائے جاتے ہیں، اس میں عورتیں بہ نسبت مردوں کے زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان کے حال بدن (لیوریٹرن) پرچم اور اسکے مقلات کا اور جربی وغیرہ کا دباؤ رکھ کر اس راستے کو اس قدر سبک رکھتا ہے کہ پتھری پیدا کر دینا کثیف مادہ پیشاب کے ساتھ مثانہ میں باسانی نہیں ہو سکتا۔ اسلئے وہ مادہ ایسے اشخاص کے گردوں میں جمع رہ کر پتھری پیدا کرتا ہے۔ گردہ کی پتھری اکثر گردہ کے جوف (پلوس آف دی کڈنی) میں ڈھیلی پڑی رہتی ہے۔ لیکن کبھی وہاں سے نیچے کو اگر حالب (لیوریٹرن) میں کسی جگہ پھنس جاتی ہے۔ اس وقت مریض نہایت شدید درد کی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔

**پتھری کا رنگ اور مقدار۔** گردہ کی پتھری اکثر میلی سرخی یا زردی مائل ہوتی ہے۔ اور اسکی مقدار اکثر گھیوں یا جو کے دانے سے متریفہ کے بچ کے برابر تک ہوتی ہے۔ لیکن کبھی چھوڑا یا بیر کی گٹھلی کے برابر بھی دیکھی گئی ہے۔ گردہ کی پتھری کا وزن اکثر چند رتی سے ۶ یا ۷ ماشہ تک ہوتا ہے شکل اور تعداد۔ گردہ کی پتھری اکثر لمبوتری گول نوکدار اور چکنی یا قدرے کھردری ہوتی ہے لیکن کبھی غار وار بھی دیکھی جاتی ہے۔ اور تعداد میں فی گردہ ایک سے تیرہ تک ہوا کرتی ہے لیکن مریضوں کے گردہ میں پتھری کی پیدائش کا سلسلہ ایسا قائم ہو جاتا ہے کہ ہر مہینہ یا سال میں دورہ کے طور پر اسکی پیدائش ہوا کرتی ہے۔

**علامات۔** (۱) پہلے پیشاب سرخ یا زرد گاڑھا اور گدلا ہوتا ہے۔ اور جب پتھری پیدا ہوتی شروع ہوتی ہے تو پیشاب صاف لیکن سرخ موجود ہوتا ہے (۲) مریض کو اپنی کمر میں گردوں کی جگہ بوجھ اور آؤاؤ کے ساتھ کسی چیز کے ٹکڑے کا سادہ محسوس ہوتا ہے خصوصاً جبکہ مریض کھڑا ہو یا منہ کے بل لیٹے۔

(۳) جب آنتوں میں ثقل یا ریاح موجود ہوں تو درد کی شدت ہوتی ہے (۴) کبھی درد کی لہر ماؤف جانب کی جگہ سے تک پہنچتی ہوئی معلوم ہوتی ہے (۵) کبھی ماؤف جانب کے پاؤں تک درد محسوس ہوتا ہے۔ اور پاؤں کی جلد میں معلوم ہونے لگتی ہے۔

علاج (۱) تفتیہ بدن کے لئے سب سے پہلے چند روز تک یہ جو شانہ بلا کر قے کر ایسی صفتہ تخم موی تخم خربزہ۔ پوست خربزہ ہر ایک ۶ ماشہ۔ نمک طعام ایک تولہ ۳ سیر پانی میں بکا کر صاف کریں اور بخین علی ۳ تولہ آئیں حل کر کے پلائیں اور چند قدم چلا کر بھوڑی دیر کے بعد قے کر لیں (۲) انکے بعد گل صفتہ تخم خلی بھجکاسنی۔ بھجیا دیان ہر ایک ۷ ماشہ۔ تخم خربزہ پرسیا و شاں سکاؤزباں۔ تخم قرطم۔ تخم کثوت ہر ایک ۵ ماشہ۔ میوین متقی ۹ دانہ۔ پانی میں جوش دیکر حمیرہ صفتہ ۳ تولہ حل کر کے صاف کریں اور چند روز تک بلا کر مہل دیں (۳) اگر مریضہ کے بدن میں خون غالب ہو تو مریضہ باقی سے بھی تفتیہ ہو سکتا ہے (۴) اگر مریضہ شکایت ہو تو خارجہ خشک۔ تخم قرطم۔ قطور یوں ہر ایک ۵ ماشہ۔ خلی بادیاں ہر ایک ۷ ماشہ۔ میوین متقی ۹ دانہ۔ انجیر زرد ۳ عدد پانی میں جوش دیکر دھن پیدا بخیر ۲ تولہ شامل کر کے حقہ کریں (۵) اگر بھیری کے سبب گردہ یا حالب میں درد ہو تو مریضہ کو آبزین کے بعد روغن با لونہ مناسب ہوگا صفتہ۔ بالونہ خارجہ خشک۔ تخم خلی۔ تخم سویہ۔ پرسیا و شاں۔ تخم کرفس۔ تخم قرطم۔ تخم مٹی۔ بیج کرفس۔ بیج کبر۔ برگ کبجہ۔ برگ اسپنول۔ برگ خرفہ۔ برگ صفتہ۔ آمین سے جو دستیاب ہو سکے بعد مناسب دیگر پانی میں بکھائیں اور برٹے برتن میں ڈال کر بیا کر آئیں بھجائیں (۶) آبزین کے بعد روغن با لونہ۔ روغن سویہ۔ روغن صفتہ ملا کر گردوں کی جگہ پر ملیں۔ اور اگر آبزین کی دواؤں کا ثقل باریک پیکر گرما گرم پانی ۱۰ تولہ میں تیار کر کے شربت بزوری حل کریں اور صبح و شام پلائیں تو اس سے بھی نفع ہوتا ہے (۷) لطیف غذائیں کھانا جیسا کہ گوشت چوزہ مرغ اور لوہ اوکڑے کے بچہ کا۔ اور سبز ترکاریوں میں سے کدو یا یا لکڑی وغیرہ مفید ہیں (۸) دیر بھم اور غلیظ یا لزج غذاؤں سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ گوشت گاؤں بھینس وغیرہ کا۔ اور سری پائے اور میدہ کی روٹی یا حلوہ اور سیب یا امرود اور سی اور شقنا لوہا لچہ وغیرہ۔ قسم دوسری حصۃ المتانہ (کال کیولا دیسیائی سی) یعنی مشانہ میں پتھری پیدا ہونے پر پتھری اکثر بچوں اور جوانوں اور لاغراشخاص کے مشانہ میں پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ اسکو پیدا کرنے والا مادہ انکے

بدن میں زیادہ پایا جاتا ہے اور اس مرض میں عورتیں بہ نسبت مردوں کے بہت کم مبتلا ہوتی ہیں۔ کیونکہ عورتوں کا تجربہ بول (بور) محقرا بہ نسبت مردوں کے فراخ اور کم ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اسلئے پتھری کا پیدا کرنے والا مادہ ان کے مثانہ میں بہت کم ٹھہرتا ہے۔ بلکہ مثیاب کے ساتھ رنگ کی صورت میں دفع ہو جاتا ہے۔ مثانہ کی پتھری اکثر حوث مثانہ میں ڈھیلی پڑی رہتی ہے۔ لیکن کبھی مثانہ کی اندرونی سطح سے چسپی ہوتی یا اس کی اندرونی چھلی کی حنیٹوں میں پھنسی رہتی ہے۔ اور کبھی تجربہ بول کے دھانہ میں یا اس کے درمیانی حصہ میں پھنس جاتی ہے تو مرین کا مثیاب رک جاتا ہے اور درد کی تکلیف ہوتی ہے۔ رنگ اور مقدار مثانہ کی پتھری اکثر بھوری یا سفید ہوتی ہے۔ اور اس کی مقدار اکثر حوار کے دانہ سے مرعی کے اندسے کی برابر تک یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کا وزن چند رتی سے چند تولہ تک ہوتا ہے۔ لیکن اکثر ایک تولہ سے ڈھائی تولہ تک ہوتی۔ اور کبھی اتفاقاً ایک سیر تک بھی دیکھی گئی ہے۔

**شکل اور تعداد۔** مثانہ کی پتھری اکثر سفید یا گول یا قدرے نوکدار ہوتی ہے لیکن بعض پتھریاں مربع اور چوٹی بھی دیکھے میں آئی ہیں۔ انکی سطح اکثر کھداری یا چکنی ہوتی ہے۔ لیکن بعض خاں دار بھی دیکھی گئی ہیں۔ اگر پتھری بڑی ہو تو اکثر ایک ہی ہوا کرتی ہے۔ اور اگر چھوٹی ہوں تو ایک مرتبہ میں چند بھی پیدا ہو سکتی ہیں اس حالت میں لٹکے انصالی رخ چکنے ہوتے ہیں لیکن کبھی ایک بڑی پتھری خود بخود یا کسی سبب سے ٹوٹ کر بہت سی چھوٹی چھوٹی پتھریوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ٹکڑے بتدریج بڑھتے رہتے ہیں۔

**اسباب (۱)** اگر کسی وجہ سے مثانہ میں کثیف گاڑھا اور چپکا و دار مادہ جمع ہو جائے اور اس مثانہ یا اس کے قرب وجوار میں حرارت قویہ موجود ہو تو اس مادہ کے لطیف اجزاء کو تحلیل کر کے باقی کو بچھڑاتی اور پتھری بنادیتی ہے (۲) کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثانہ میں پیپ یا خون منجمد ہو کر ایک رت تک ٹھہرے اور کوئی دوسرا فساد پیدا نہ کرے تو اس سے پتھری پیدا ہو جاتی ہے (۳) کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تجربہ بول کے راہ کوئی سخت اور چھوٹی ٹی چیز باہر سے مثانہ کے اندر پھنک دیا جائے پڑی رہے۔ اور مثیاب کے کثیف اجزاء رفتہ رفتہ اس پر چسپ کر جتے رہیں تو ایک مدت میں ان سے پتھری بن جاتی ہے۔

**بعض ڈاکٹروں کا بیان ہے کہ یہ مرض پنجاب میں کثرت ہوتا ہے اور بنگالہ میں بہت کم دیکھے میں آتا ہے۔** ابتداء اسکی گردوں سے ہوتی ہے جہاں پتھری کا مادہ جمع ہو کر چھوٹی چھوٹی پتھریوں کی صورت

اختیار کرتا ہے۔ اور وہاں سے پیشاب کی تالی (لیوریٹر) کے راد مثانہ میں آتا ہے۔ پھر یہاں ایندروادہ جمع ہو کر بڑی پتھری بنا دیتا ہے۔ لیکن کبھی پتھری کا مادہ خاص مثانہ میں ہی پیدا ہو کر وہاں پتھری کی پیدائش کا سبب ہوتا ہے۔ خصوصاً اگر غیر جنس مثانہ کے اندر داخل ہو جائے تو فاسفٹک قسم کی پتھری بن جاتی ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر اس بات کے مقرر ہیں کہ عام سبب اس مرض کا تاہنوز انھیں معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن ان کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سرد ملکوں میں یہ نسبت گرم ملکوں کے یہ عارضہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ سمندر کے کنارے پر رہتے ہیں ان کو چاول زیادہ کھاتے ہیں وہ اس مرض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔

علامات (۱) پیشاب بار بار دروسے آتا ہے۔ اور اس میں رنگ سفید یا زرد موجود ہوتا ہے (۲) بعض اوقات پیشاب کی دھار لکھا لکھ رک جاتی ہے۔ جبکہ پتھری مجھڑے بول کے دہانہ پر آجائے پھر صفوطی دیر کے بعد اگر پتھری وہاں سے سہٹ جائے تو پیشاب کی دھار بدلتو رجاری ہو جاتی ہے (۳) پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد جب مثانہ خالی ہو جاتا ہے تو پتھری کا بوجھ اور اس کی رگڑ مثانہ کی ساخت پر پڑنے سے درد شدید ہونے لگتا ہے۔ لیکن جب پتھری مثانہ کے ساتھ جمی ہوئی ہوتی ہے تو بجائے درد شدید کے مثانہ میں صرف بوجھ محسوس ہوتا ہے (۴) مثانہ کی پتھری کا درد نہ صرف مثانہ میں محسوس ہوتا ہے بلکہ اس کی لہریں سیون جگہ سول اور رانوں تک پہنچا کرتی ہیں۔ اور یہ درد کو دینے دوڑنے یا گھوڑے پر سوار ہونے کی حالت میں زیادہ ہوتا ہے (۵) حشفہ میں جلن اور خارش یا چھین کی سی تکلیف ہر وقت رہتی ہے۔ اسلئے اگر مرلین بچہ ہو تو وہ اپنے قلفہ (پری پیوس) کو ملتا رہتا ہے (۶) جب پتھری بڑھ جاتی ہے تو اس کے دباؤ سے خروج المقعدہ کا عارضہ بھی ہو سکتا ہے (۷) اگر پتھری سخت اور رجاری یا خاردار ہوتی ہے تو اس کے بڑی ہو جانے کے بعد رفتہ رفتہ مثانہ میں المیہاب (الفلائی شن) ہو کر اول پیشاب میں لعابی رطوبت اور پھر خون آنے لگتا ہے اور جب زخم تک نوبت پہنچتی ہے تو مواد نکلتے لگتا ہے (۸) مثانہ کے اندر قانا طیر یا آلہ حداسہ (سائڈل) داخل کر کے ٹوٹنے سے اگر اس کا سرا پتھری سے ٹکر کھائے تو اس کے کھٹکے کی آواز سے پتھری کا یقین ہو سکتا ہے

۱۔ عام تجربہ اسکے ظلات ہے۔ یہ مشہور ہے کہ چاول کی کثرت سے پتھری پیدا ہو جاتی ہے ۱۷ مولف

۲۔ قانا طیر داخل کر کے طریقہ اور اس کے متعلق ضروری ہدایات دیکھو تعلیم اطفال حصہ اول کا صفحہ ۴۰ تا ۴۱ مولف

کیونکہ اگر بجائے پھتری کے مٹانہ میں کسی قسم کی رسولی ہوئی ہے تو آلہ داخل کرنے سے پھتری کی سی آواز سنیں سنائی دیتی ہے (۹) اگر آلہ مذکور کے ذریعہ سے پھتری کی آواز ایک مرتبہ سنائی دے اور دوسری مرتبہ نہ سنائی دے تو سمجھنا چاہئے کہ یا تو پھتری مٹانہ کی ساخت میں کسی طرف کو جھکی ہوئی ہے یا وہ جھلی کی عقلی میں چھپی ہوئی ہے۔ یا اس قدر چھپی ہے کہ کبھی تو آلہ کے ساتھ ٹکراتی ہے اور کبھی اس کے مقابل سے ہٹ جاتی ہے (۱۰) اگر پھتری کی مقدار معلوم کرنی ہو، تو آلہ کا سرۃ الحصاة (لیٹھو ٹرائٹ) کے ذریعہ سے معلوم ہو سکتی ہے (۱۱) علامات مذکورہ بالا کے علاوہ بچوں میں مقعدہ کے اندر اور مستورات میں اندام نہانی کے اندر انگلی داخل کر کے رسلنے کی طرف ٹوٹنے سے پھتری کی تشخیص بخوبی ہو سکتی ہے۔

علاج۔ ابتداء مرض میں ایسی دواؤں کا استعمال مفید ہوتا ہے جسے پھتری کا مادہ مٹانے کے ساتھ بکھیر اور پھتری ٹوٹ کر نکل جائے لیکن اگر پھتری بڑی ہو اور کھلانے کی دواؤں سے نہ کھلے تو مجبوراً دستکاری سے نکالی جاتی ہے۔ اسلئے پہلے ہم اس مرض کے مجرب نسخے لکھنے کے بعد طریقہ دستکاری کا بیان کریں گے۔

مجرب نسخہ (۱) حجر الیہود۔ سنگ سربابی۔ ہر ایک ایک ماشہ باریک پس کر معجون عقرب۔ اماشہ میں ملا کر اور اس کے بعد شیرہ تخم کرش۔ شیرہ تخم اسیول۔ شیرہ تخم ہلیون ہر ایک ۳ ماشہ عرق بادیان۔ ۱۰ تولہ میں تیار کر کے شربت بزوری ۴ تولہ ملا کر پلائی (۲) یہ جو شانہ بھی مفید ہے صفتہ۔ پودینہ خشک۔ بادیان۔ تخم خیارین۔ خار خشک ہر ایک ۵ ماشہ۔ برگ سداب۔ پرسیاوشاں۔ کانچ۔ تخم ہلیون۔ تخم کرش ہر ایک ۳ ماشہ سکوبانی میں جوش دیکر شربت بزوری ۴ تولہ حل کر کے پلائی (۳) تخم خطمی۔ تخم سیحقی۔ تخم مولی۔ تخم کرش۔ پودینہ۔ پرسیاوشاں۔ بالونہ۔ برگ سداب۔ برنجاسف۔ ہر ایک ایک تولہ سکوبانی میں جوش دیکر صاف کر کے اور ایک برٹے برتن میں ڈال کر پیار کو اسمیں بھجائیں (۴) آبرن کے بعد روغن بادیانہ روغن عترت کے ساتھ ملا کر پیار کے پیرو پر ملنا اور دو تین قطرے ایل میں ٹپکا کرنا مفید ہے (۵) مرکب دواؤں میں سے معجون حجر الیہود۔ معجون عترت۔ روغن عقرب اور معجون مفتت الحصاة اور کشتہ حجر الیہود بھی اس مرض کے لئے اطباء قدیم کے مجربات میں سے ہے۔

نسخہ معجون حجر الیہود۔ منغر تخم خیارین۔ منغر تخم حریرہ۔ منغر تخم کدو شیری۔ تخم کانچ ہر ایک ۳ ماشہ حجر الیہود اصلی ۵ تولہ سکوکوٹ چھانکرا پائوئیر شد خالص میں ملائی مقدار حذر اک ۵ ماشہ سے ۷ ماشہ تک ہے۔

لشخہ معجون عقرب۔ خاکستر عقرب ۱ تولہ۔ جذبیہ ستر تولہ۔ کاکچ ۱۰ تولہ۔ مرج سیاہ۔ پیل  
ہر ایک ایک تولہ۔ جنطیانا ۹ ماشہ۔ سونٹھ ۶ ماشہ۔ سب کو کوٹ چھان کر شہد خالص ۲۸ تولہ  
میں ملائیں۔ مقدار خوراک ایک ماشہ سے ۱۰ ماشہ تک ہے۔

ترکیب خاکستر عقرب۔ سیاہ بھجور کو آتشیشی میں ڈال کر کل حکمت کریں اور شیشی رات کو  
گرم تنور میں رکھ کر صبح کو نکالیں۔ اور شیشی میں سے راکھ نکال کر کم کام میں لائیں۔ بجائے  
شیشی کے لوہے کا ظرف بھی کام میں آسکتا ہے۔ لیکن اگر مٹی کے سکورہ میں بھجور کو جلایا جائے تو  
خاکستر کا اثر ضعیف ہو جاتا ہے۔

ترکیب روغن عقرب جنطیانا۔ زراوند حرج۔ پوست پنج کبر ہر ایک ایک تولہ کوٹ چھان کر  
شیشہ میں بھریں اور بادام تلخ کاتیل یا تلوں کاتیل یا و سیر ہمس ڈال کر موسم گرمیاں تو ایک ہفتہ تک  
لیکن موسم سرما میں دو ہفتہ تک دھوپ میں رکھیں۔ اسکے بعد تیل کو جھانکر شیشہ میں بھریں اور ۵ تولہ  
بھجور سیاہ زندہ اسی شیشی میں ڈال کر اس کا منہ ڈاٹ سے بند کر کے دو ہفتے تک دھوپ میں رکھیں۔  
لشخہ معجون مفت الحصاة۔ جب لباں تخم کلہی۔ کاکچ کی جڑ۔ حجر الاسفنج خاکستر عقرب ہر ایک  
ایک تولہ سب کو کوٹ چھان کر خار خشک سبز کے پانی میں ترکیں۔ اور سایہ میں خشک کر کے پھر بدستور  
ترکیں۔ اسی طرح سات مرتبہ تر اور خشک کر کے پس لیں اور ۵ تولہ شہد میں ملا لیں۔ مقدار خوراک  
ایک ماشہ سے ۳ ماشہ تک ہے۔ اگر خار خشک سبز میرہ نہ ہو تو لشخہ کا اثر ضعیف ہو جاتا ہے۔

ترکیب کشتہ حجر الیہود۔ جو حکیم فضل احمد صاحب بدایونی کی تحریر ہے۔ سند قلمی ۱۰ تولہ لیکر اس میں سے  
۵ تولہ ایک سکورہ میں ڈال کر اسے حجر الیہود ۵ تولہ رکھیں اور باقی سکورہ (۵ تولہ) اس کے اوپر رکھیں  
پھر مولی کا پتھر اس کو ابانی آدھ سیر سکورہ میں ڈال کر کل حکمت کر کے پانچ سیر ایلوں کی آچ دیں اس طرح جب  
چار مرتبہ اور آچ دیں گے تو چھ آنچوں میں کشتہ حجر الیہود تیار ہو جائیگا۔ اسے پسید شیشی میں رکھیں  
اس میں سے بقدر چار چاول اور جو اکھا را ایک رتی اور مولی کا نمک ایک رتی۔ مرتبہ بزوری ۴ تولہ  
میں مد کر سیاہ کو چٹا دیا کریں۔ اس دوا سے پتھری گھل کر مثیاب میں رنگ کی طرح ایک  
ہفتہ میں گھل جاتی ہے۔ اور جب وہ پتھری گھل کر اس قدر چھوٹی ٹرہ جاتی ہے کہ مثیاب کے سوراخ  
سے نکل کے تو مثیاب کے ساتھ نکل جاتی ہے۔

و دستکاری کے طریقے۔ مستورات کے مشانہ سے پتھری نکالنے کے تین طریقے ہیں  
 (۱) اعلیل کو پھیلا کر سالم پتھری نکالنا۔ اس عمل کو اخراج الحصاة بتوسیع المجری (لی ٹھک ٹھی) کہتے ہیں (۲) مشانہ میں آکر داخل کر کے پتھری کا چور کرنا اور پھر خاص طریقہ سے اس کو باہر نکالنا۔ اس عمل کو اخراج الحصاة بالکسر (لیٹھا ٹریٹ یا لٹھا لوٹکسی) کہتے ہیں۔ (۳) سنگاف دیکر پتھری نکالنا۔ صکبو اخراج الحصاة بالشق (لٹھا ٹومی پرنش) کہتے ہیں۔ اب ہم ان تینوں طریقوں کو تفصیل کے ساتھ درج ذیل کرتے ہیں۔

(۱) اخراج الحصاة بتوسیع المجری (لی ٹھک ٹھی) یعنی مجرے بول کو پھیلا کر سالم پتھری نکالنا اگر مشانہ کی پتھری بہت بڑی نہ ہو تو اس حالت میں یہ دستکاری کی جاتی ہے۔ اسکا طریقہ یہ ہے کہ دستکاری سے چند گھنٹے پہلے سفنج کی بتی مجرای بول میں رکھیں تاکہ وہ کسی قدر کشادہ ہو جائے۔ اور اگر بیمار کو دوا بیہوشی (کلوروفارم) سنگھا کر عمل کرنا مقصود ہو تو پہلے ان ہدایات پر نظر کریں جو اس دوا کے استعمال کے لئے ماہرین اصحاب نے مقرر کی ہیں اور جب ان ہدایات کی رو سے اس کا سنگھانا جائز قرار پائے اور دستکاری کے لئے مریضہ کو میز پر چت لٹائیں تو اسکے سر میں نیچے تکیہ رکھیں اور ایک ہوشیار مددگار کو حکم دیں کہ مریضہ کے سر کی طرف کھڑی ہو کر آلہ مشمتہ کی بوتل پر سینہ بند میں لٹکائے اور اسکا گلوپ مریضہ کی ناک پر رکھ کر اپنے بائیں ہاتھ سے آلہ مذکورہ کے ربط پاپ (سہوائی خزانہ) کی ہوا دینی رہے۔ اور مریضہ کے تنفس پر اپنی پوری توجہ رکھے نیز تین چار منٹ کے بعد اپنے دایہ ہاتھ سے مریضہ کی سفین دیکھ لیا کرے جب مریضہ بیہوش ہوئے لگے تو اسکے پاؤں سکیر کر اسکے ہاتھوں کو پتھروں سے ملایا جائے اور اس کی کلامیوں کو ٹخنے کے اوپر مضبوط باندھ کر دونوں گھٹنوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھیں تاکہ عجان کا موقعہ ظاہر ہو جائے پھر جب مریضہ اچھی سے بیہوش ہو جائے تو دستکار مریضہ کے سامنے دایہ طرف کو کھڑی ہو کر آلہ موسعہ الاجلیل (ایور ہیکل ڈائی لیٹر) (جسے تین پھل ہوں یا کسی دوسری قسم کا) مجرے بول میں داخل کر کے اسکے ذریعہ سے پیشاب کے راستہ کو بتدریج کشادہ کرے۔ اور بعض دستکار اسکے بعد جھپوٹی انگلی اجلیل میں داخل کر کے اسے خوب پھیلاتے ہیں۔ پھر آلہ مخرج الحصاة (اسٹون فارسیس) کے ذریعہ سے پتھری کو سالم نکالتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ اگر پتھری کسی قدر بڑی ہونے کے سبب جو بالکل

کو زیادہ پھیلا نا پڑتا ہے تو اس عمل کے بعد مرہض کو سلسل انبول کی شکایت ہوتی ہے۔  
(دیکھو تصویر ۹۷ معمول اور غالی کی معہ دو گاروں اور آلات کے)



۱۔ وہ دایات یہ ہیں کہ (۱) کلو و فارم پر پانا ہو کہ اسکا اثر ضعیف ہو جاتا ہے اور موت کا اندیشہ ہوتا ہے (۲) پہلے لطیفان حاصل کرنا چاہیے کہ مرہض کے بھیجے اور دل کی لڑائی تھکے ہوئی کوئی مرض نہیں کہ کوئی نکلان اعضا کے امراض میں اور بجا نشی اس دوا کا استعمال بالکل منع ہے۔  
۲۔ اس طرح مرگن اطمینان اور اس جزاء دماغ کی حالت میں تا وقتیکہ اسد مزورت پیش نہ آئے اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے دوسرے کو توں پہلے سے غذائے دین تاکہ اسکا مدد و غالی رہے اور زہن کے ذریعہ سے آستوں کو عاف کریں (۳) مرہض کو حجت لگا کر دوا سنگھائیں بھیجنا چاہیے کی حالت میں دوا سنگھانے سے غشی ہو کر موت کا اندیشہ ہے (۴) دوا سنگھانے وقت مرہض کے بازو کو کھٹار کر بند مینہ بند وغیرہ ڈھکے کر دیں (۵) دوا سنگھانیکے لئے ایک لائٹ اور تجربہ کار مددگار کا انتخاب کریں جو اپنی خدمت ادا کرتے وقت مرہض کی نفس اور نفس کو پورے توجہ اور غور سے دیکھتی رہے۔ اور جب نفس بخوبی نہ ہو یا بند ہو جائے تو فوراً دوا سنگھانا موقوف کر کے مرہض کو موادینا یا مصنوعی تنفس کرانا چاہیے (۶) جب مرہض کے نفس میں جڑے کی آواز آنے لگے۔ اور قرنیہ پر انگلی رکھنے سے مرہض آٹکھ بند نہ کرے اور اسکا ہاتھ ادا پر کوٹھا کر چھوڑ دینے سے نیچے کو گر پڑے تو سمجھنا چاہیے کہ دوا کا اثر پورے طور پر ہو گیا ہے اب زیادہ نہ سنگھائیں ۱۲ موٹ




(۲) اخراج الحصاء بالکسر (لیتھائٹریٹ یا لیتھالوپکسی) یعنی مشانہ میں آلہ داخل کر کے پتھری کو چورا کرنے کے بعد خاص طریقہ سے اسکو نکالنا یہ عمل ایسے موقع پر کیا جاتا ہے جبکہ شکات دیکر پتھری کا نکالنا مؤثر نہ ہو۔ اس عمر اور اسکے بدنی حالات کے لحاظ سے مناسب نہ سمجھا جائے اور ششگان دینے میں خطرات کا قوی اندیشہ ہو۔ اس دستکاری میں مریضہ کو دو یا بیہوشی نگھانی پڑنی ہے۔ اور اسکے متعلق مذکورہ بالا تمام ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں خصوصیت کے ساتھ مندرجہ ذیل آلات کا آمد ہوتے ہیں،

(۱) آلہ حداسہ (ٹامنسٹروائڈ) اسکے ذریعہ سے مشانہ میں پتھری ٹٹول کر اسکی مقدار وغیرہ معلوم کی جاتی ہے۔

(۲) آلہ المسار (یوریتھریل بوجی یا۔ ڈائی کیٹر) اس کے ذریعہ سے مجرے بول کو اس قدر پھیلا یا جاتا ہے کہ اس میں دیگر ضروری آلات آسانی سے داخل ہو سکیں (۳) کاسرۃ الحصاء (لیتھوٹرائٹ) یعنی پتھری کو توڑ کر چور کرنے کا آلہ۔ اس کے چند نمونہ ہوتے ہیں جو یکے بعد دیگرے کام میں لائے جاتے ہیں

(دیکھو تصویر نمبر ۸۰۔ شکلیں ان آلات کی)



(۴) آگ عسالہ امثانہ (نامستزالیہ کیواسٹر) یعنی مثانہ کو دھولے کا آلہ جس میں پانی یا کوئی مناسب قی  
بھری کر اس کے ذریعہ سے پتھری کا چور امثانہ سے نکالا جاتا ہے (۵) قانا طیر عسالہ (الیہ کیونیک سے قی  
یعنی وہ قانا طیر جو مثانہ میں داخل کر کے عسالہ امثانہ میں جوڑا جاتا ہے


دستکاری کیلئے تیاری سب سے پہلے بیمار کی جسمانی حالت ملاحظہ کریں۔ اگر ضرورت ہو  
تو مہل دیں اور پھر قوت ہاضمہ کو قوی کریں۔ فارورہ کا امتحان احتیاط سے کریں اور گردوں کی  
حالت معلوم کریں۔ پھر جب دستکاری کرنی ہو تو اس سے دو گھنٹے پہلے حقہ کر کے آنسو کو صاف  
کریں تاکہ دستکاری کے وقت مرہضہ کا براز نکل پڑنے کی طرف سے اطمینان حاصل ہو۔

طریقہ دستکاری۔ اول مرہضہ کو میز پر چت لٹا کر سیوشی کی دوا لگھائیں اور اسکے بالوں اور  
دھڑ کو گرم کپڑے سے ڈھکا رکھیں۔ اور جب وہ بیہوش ہونے لگے تو اسکے اعضا کو مذکورہ بالا وضع پر  
قائم کریں۔ پھر جب مرہضہ اچھی طرح سے بیہوش ہو جائے تو اسکی معقدہ کو گرم پانی کی ایک انڈیز لوشن  
کی پچکاری سے دھو ڈالیں اور قانا طیر سے پیشاب نکال کر بجائے اسکے آب محلول سہاگہ  
(بورنی سک لوشن) نیگیٹم بذریعہ پچکاری کے مثانہ میں داخل کریں۔ اس پانی کی مقدار اکثر ایسا  
کافی ہوتی ہے۔ لیکن پیشاب کی مقدار دیکھ کر اسکا ٹھیک اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس پانی کے داخل کرنے پر  
فائدہ ہوتا ہے کہ اسکی موجودگی میں مثانہ کی اندرونی جھلی پتھری کے ٹکڑوں اور آلہ کا سرة الحصاة کی  
رگڑ سے محفوظ رہتی ہے۔ اسکے بعد مرہضہ کے سرین کے نیچے تکیہ رکھ کر اسکے عانہ کو اونچا کریں تاکہ پتھری  
مثانہ کے پچھلے حصہ پر جا پھڑے۔ پھر آلہ حداسہ (ساونڈ) کے ذریعہ سے پتھری کا امتحان کر کے اسکی  
مقدار معلوم کریں۔ اور اگر مجرلے بول کو پھیلانے کی ضرورت ہو تو آلہ المسمار (یوریتیرل ٹی لٹریٹ)  
سے اس کو بقدر ضرورت وسیع کر لیں ماب یہاں سے خاص پتھری پر دستکاری کا عمل شروع  
ہوتا ہے۔ اور اس کے چار درجے ہیں۔


درجہ اول۔ آلہ کا سرة الحصاة (لیتیوٹرائٹ) کا داخل کرنا۔ عامل کو چاہئے کہ وہ بیمار کے منہ  
اور قدرے داہنی طرف کو کھڑی ہو کر اور آلہ مذکور کو روغن بابونہ و کسیلہ میں یا کاربولک آئیل میں  
تر کر کے اپنے داہنے ہاتھ سے نرمی کے ساتھ مجرلے بول میں داخل کرے چونکہ یہ آلہ بہ نسبت قانا طیر کے  
سیدھا اور صرف نوک کے پاس سے حمیدہ ہوتا ہے۔ اسلئے اسکے داخل کرنے میں تحریرہ امشق کی ضرورت داخل



دستہ کو بائیں ہاتھ سے مضبوط پکڑ کر اسکارخ پتھری سے بچائیں اور اسکی چرخی کو داہنے ہاتھ سے آہستہ آہستہ اسطرح گھمائیں کہ اس کا سامنے والا حصہ باہر کو کھینچ کر دونوں کے درمیان استقر فاصلہ ہو جائے کہ سامنے والا پھل مثانہ کی سامنے والی دیوار سے آگے بچھ اسکارخ پتھری کی طرف کو پھیر کر داہنے ہاتھ سے چرخی کو آہستہ آہستہ دوسری طرف گھمائیں۔ تاکہ پتھری دونوں پھلوں کے درمیان خوب گرفت میں آجائے۔




اگر اس طرح سے پتھری گرفت میں نہ آئے تو آہلہ کے پھلوں کا رخ ہر طرف کو بدل بدلے کھولتے اور بند کرتے رہیں۔ اور بند آہلہ سے پتھری کو مثانہ میں ٹوٹل کر اسے احتیاط سے کھولیں اور آہلہ کے پھلوں کو پتھری کے مقابلہ میں لا کر باہر کی بند کریں۔ اس طریقہ سے چھوٹی پتھری بھی گرفت میں آسکتی ہے۔ اس درجہ میں اس بات کی احتیاط رکھنی چاہئے کہ آہلہ کا استعمال نہایت نرمی کے ساتھ کیا




جائے۔ بائیں ہاتھ سے آلہ کے پچھلے حصہ کو مضبوط پکڑے رہیں کہ حرکت نہ کر سکے۔ اور داہنے ہاتھ سے آلہ کی چرخی گھما گھما کر اسے کھولتے اور بند کرتے رہیں۔

تیسرا درجہ۔ پتھری کو توڑنا اور اس کا چورا کرنا جب پتھری آلہ کی گرفت میں آجائے تو اسکو جوف مثانہ کے بیچ میں لائیں۔ اگر اس حرکت میں کچھ رکاوٹ محسوس ہو تو سمجھنا چاہئے کہ یا تو مثانہ کی اندرونی جھلی پتھری کے ساتھ آلہ کی گرفت میں آگئی ہے اور یا پتھری مثانہ کی ساخت سے چمٹی ہوئی ہے اس حالت میں آلہ کی گرفت کو قدرے کھول کر ذرا حرکت دیں اور پھر اسے بند کر کے وہاں سے ہٹائیں۔ جب آلہ مع پتھری کے جوف مثانہ کے بیچ میں آسانی سے آجائے تو سمجھنا چاہئے کہ پتھری مثانہ کی ساخت سے چمٹی ہوئی نہیں ہے اب آلہ کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اسکی چرخی کو باہر ہٹا دینے سے اس طرح گھمائیں کہ اس کے پھلوں کا دباؤ پتھری کو توڑ سکے۔ پھر آلہ کو اسی طرح بار بار کھولنے اور بند کرنے سے پتھری کے ٹکڑوں کو پکڑتے اور چورا کرتے رہیں پتھری کے ٹکڑوں کا پتہ بھی اسی آلہ سے ملیگا اور اسکے ٹکڑے جقدر باریک ہوتے جائیں گے۔ آلہ کے بیچ کا دباؤ اسی قدر کم ہوتا جائیگا۔ اگر پتھری کے ٹکڑے چھوٹے ہو کر بڑے آلہ کے قابو میں نہ آئیں تو اسے نکال کر چھوٹے نمبر کا آلہ داخل کرنا چاہئے اور جب تک پتھری خوب لپک باریک نہ ہو جائے۔ اسوقت تک آلہ کو نکالنا نہیں چاہئے۔ اور جب آلہ کو نکالنا چاہیں تو اسے دستہ کو نیچے دبا کر اسکے پھلوں کو پتھری کے ٹکڑوں سے علیحدہ کر کے خوب بند کر لینا چاہئے اور یہ اس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ آلہ کی چرخی کے بیچ ٹھیک اپنی جگہ پر آجائے ہیں جبکہ کچھل چھل چھل سے بند ہو جائیں تو آہستگی سے نکالنا چاہئے



جو تھا درجہ۔ پتھری کے چورے کو مثانہ سے نکالنا۔ آلہ کا سرۃ الحصاة کو کھانے کے بعد قانا طیر غسائیہ داخل کر کے مثانہ کو موجودہ عرق سے خالی کریں۔ پھر آلہ غسالۃ المثانہ (الیوے کیوایٹر) میں سوہاگہ کا پانی بوریک لوشن بھر کر اس کی ٹلی کو قانا طیر کے ساتھ جوڑ دیں۔ پھر اسکی ربر کی کچی کو دابنے ہاتھ سے دبا کر اس میں کا پانی مثانہ میں پہنچائیں۔ بعدہ باد کے ہٹانے سے وہ پانی مع پتھری کے چورے کے کھچکر آلہ کے درمیان حصہ میں آئے گا۔ اور یہاں آکر پتھری کا چورا (اوزنی ہونے کے سبب سے) شیشے کے اس ظرف (گلاس رسیور) میں جمع ہوتا رہے گا جو اس آلہ میں نیچے کو لگا رہتا ہے۔ لیکن پانی کچی کے جوف کو بھرنے کے لئے اس میں چلا جائے گا۔ اسی طرح چند مرتبہ کرنے سے ہر بار پانی مثانہ میں جائیگا۔ اور پتھری کے چورے کو وہاں سے اپنے ساتھ لائیگا۔

### تصویر نمبر ۸۵ آلہ غسالۃ المثانہ کے استعمال کی



اس عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پتھری کا تمام چورا جو قانا طیر غسائیہ کے سوراخ میں گزرنیکے لائق ہوتا ہے وہ مثانہ میں سے نکل آتا ہے اور مثانہ دھل کر بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر آلہ کا سرۃ الحصاة سے پتھری کو ٹوڑتے وقت اسکے بعض ٹکڑے باریک ہوئے سے رہ گئے ہوں جو قانا طیر غسائیہ کے راہ سے گذرنے

کے لائق نہوں تو وہ مثانہ میں رہ جائیں گے۔ اسلئے عامل کو چاہئے کہ جب مثانہ میں سے واپس آنی ہو پانی کے ساتھ پتھری کے ٹکڑے کھٹے موقوف ہو جائیں تو آلہ مثانہ کو علیحدہ کر کے اور قنات طیر غسالہ کو نکال کر آلہ حداسہ (ساؤنڈ) کے ذریعہ سے معلوم کرے کہ پتھری کا کوئی بڑا ٹکڑا مثانہ میں باقی رہ گیا ہے یا نہیں۔ اگر باقی رہ گیا ہو تو پھر اسے بھی آلہ کاسرۃ المحصاة (لیتھوٹرائسٹ) کے ذریعہ سے نیک کر کے بدستور سابق آلہ غسالہ المثانہ سے نکالیں اور جب اطمینان ہو جائے کہ اب مثانہ میں پتھری باقی نہیں رہی ہے تو دستکاری کو ختم کرنا چاہئے۔ دستکاری کے بعد بیمار کو ہدایت کریں کہ دو یا تین روز تک اپنے بستر پر آرام سے لیٹی رہے۔ پیشاب کے لئے بھی نہ اسٹھے۔ پیشاب لیٹے ہوئے کرے۔ پانچ ماہ کی حاجت روکنے اور دردی تسکین کے لئے ۲۰ چاول مارفیا کاشیاف (سپازیٹری) مقعر میں رکھیں غذا میں دودھ اور آمیش جو دینا چاہئے۔

اگر یہ دستکاری مستعدی اور ہوشیاری کے ساتھ کی جائے تو اس میں ایک یا دو ٹھوگھٹھ صرف ہوتا ہے۔ اور اگر بیمار بہت ضعیف نہ ہو تو اتنی دیر تک بیہوش رہنے سے اور دستکاری کی اذیت سے اگرچہ کسی خطرہ کا اندیشہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی عامل کو جقدر ممکن ہو اپنا کام چابک دستی سے کرنا اور اس کے مددگاروں کو اپنی معوضہ خدمات پوری مستعدی سے انجام دینی چاہئیں۔ خصوصاً بیہوشی کی دوا لگھانے والے مددگار کی خدمت بڑی ذمہ داری کی خدمت ہے جس کی قابلیت کا صحیح اندازہ کرنا عامل کی ہوشیاری پر موقوف ہے۔ اگر عامل ماہر فن اور تجربہ کار ہوگا تو وہ تمام پیش آنے والے عوارض اور خطرات کا تذکرہ کرنے کیلئے اہم ضروریات کو پہلے ہی سے مہیا رکھے گا اور پرا مددگاروں کو مناسب وقت ہدایات کرتا رہے گا۔

**عوارض (کم پلی کے ضمن) عامل کو دستکاری کے وقت اور اس سے پہلے امور مندرجہ ذیل کی طرف توجہ کرنی چاہئے (۱) اگر بیمار ورم مثانہ میں مبتلا ہو اور یہ ورم پتھری کی تکلیف ہے تو پہلے ورم کا علاج کیا جائے اور اس سے نجات حاصل ہونیکے بعد پتھری نکالنے کی دستکاری کرنی چاہئے (۲) اگر پتھری چھوٹی ہو تو مجرئے بول کو پھیلا کر یا اسمیں نرگاف دیکر پتھری نکالنا عمل کسر المحصاة سے بہتر ہے (۳) اگر پتھری بہت**

سہ اس لئے عامل کو چاہئے کہ پتھری کو توڑنے وقت جب تک اس کے خوب لیجائے کا یقین نہ ہو جائے۔ ہر وقت تک

آلہ کاسرۃ المحصاة کے نکالنے میں غلطی نہ کرے ۱۲ مولف

بڑی ہو تو پیڑ کی ٹہنی سے اور پرنگات دیکر پھری کٹا لیا جائے کیونکہ بہت بڑی پھری کو توڑ کر لگانے میں زیادہ دیر لگتی ہے (۴) اگر مجرے بول کی وجہ سے کٹا ہوا یا زیادہ تنگ ہو تو پہلے سے کشادہ کر لینا چاہئے (۵) بعض اوقات دستکاری کے وقت بیمار کے اعصاب میں عارضی تشنج ہو کر مجرے بول تنگ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جہاں تک ممکن ہو زیادہ موٹے آلات استعمال نہیں کرنا چاہئے۔

**خطرات اور انکی اصلاح (۱)** دستکاری کرتے وقت اگر آلہ کا سرۃ الحصاة مثانہ کے اندر لوٹ چکا ہو تو عامل کو گھبرانا نہیں چاہئے بلکہ نہایت استقلال کیساتھ مجرے بول میں یا اندام نہانی میں یا اندام نہانی میں باپیڑ اور پرنگات دیکر آلہ اور پھری کو فوراً کٹا کر لیا جائے (۲) اگرچہ اس دستکاری میں اکثر جریان خون بہت کم ہوتا ہے لیکن اگر اتفاقاً کسی وجہ سے مثانہ میں خون کے لوٹھڑے جمع ہو جائیں پتیاں رک جائیں تو انکو قاناطر سے یا آلہ فارسیس کے ذریعہ سے کٹا کر لیا جائے (۳) اگر مثانہ میں کوئی ٹکڑا پھری کا رہ گیا ہو اور وہ مجرے بول میں اٹک جائے تو اسے بھی آلہ مخرج الحصاة (فارسیس) سے کھینچ کر یا آلہ کا سرۃ الحصاة سے توڑ کر نکالیں (۴) اگر مثانہ کا اندونی پرت (میکوس ممبرین) زخمی ہو گیا ہو تو وہ علاج کریں جو فقرہ مثانہ کے بیان میں درج ہے ..... (۵) اگر دستکاری کے بعد مثانہ میں ورم پیدا ہو جائے تو اسکا علاج حسب قاعدہ کریں۔

**(۳) اخراج حصاة بالشفق** (لیٹھا ٹومی اپریشن) یعنی چیر کر پھری کٹا کر مسورات میں اس غرض کیلئے تین مقامات میں سے کہیں نہ کہیں شکاف دیا جاتا ہے ایک مجرے بول میں۔ دوسرے اندام نہانی میں تیسرے پیڑ کی ٹہنی سے اور پریٹیل اگرچہ زیادہ خطرناک ہے اور اسکی صوبتوں و خطرات کے خیال سے ہی قدیم یونانی اطباء نے اسکی مذمت کی ہے۔ صاحب اقسرانی نے لکھا ہے کہ مثانہ کی پھری کٹانے کیلئے شکاف دینے میں بڑا خطرہ اور یہ کام بے عقل لوگوں کا ہے۔ لیکن پھر بھی ایسے موقع پر جائز ہے جہاں پھری بہت سخت ہو اور اس کے توڑنے میں کامیابی کی توقع نہ ہو سکے۔ چنانچہ نفیس بن عوض طبیب لکھا ہے کہ پھری چیر کر کٹانے کا عمل قریب ستر سال کی عمر والے تندرست اور قوی بچوں میں مناسب ہے۔ کیونکہ اس عمر میں دستکاری کی تکلیف برداشت کرنے کی قابلیت موجود ہوتی ہے۔ اور پرنگات کا اندام جلد ہو جاتا ہے لیکن اس سے کم عمر کے بچے (ضعف قوت کے سبب) دستکاری کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ اسلئے کم عمر کے بچوں میں اس عمل سے تعداد اموات کا اوسط زیادہ رہتا ہے۔ بہطرح جوانوں میں بھی یہ عمل خطرناک ہے کیونکہ شکاف کے بعد اکثر ورم گرم شدید پیدا ہو کر موجب ہلاکت ہوتا ہے۔



اور فوٹڑھوں کے بدن میں رطوبت غریبہ فضلیہ کی کثرت اور رطوبات اہلیہ کی کمی کے سبب اندمالِ نجم  
مشکل سے ہوتا ہے۔ البتہ ادھیڑ عمر کے مریض کبھی اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ انکو دم گرم مہلک پیدا  
ہنیں ہوتا ہے۔ اور ان کے بدنوں میں سردی و خشکی اس قدر غالب نہیں ہوتی ہے کہ جس کے  
اندمالِ نجم نہ ہو سکے۔“

بہر حال جب تک کہ (۱) پتھری کو توڑ کر نکالنے والی دواؤں کے کھلانے پلانے سے مطلب حاصل ہو۔  
(۲) اور یا پتھری اس قدر چھوٹی ہو کہ اس سے بیمار کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور دواؤں سے کامیابی کی  
امید ہو (۳) یا بیمار کی عمر اور دیگر بدنی حالات لحاظ سے یہ دستکاری مناسب سمجھی جائے (۴) یا جب تک کہ بیمار  
اور اس سرپرست اس دستکاری کی صعوبتوں اور خطرات کو پیش رکھنے کے بعد اس عمل پر راضی ہوں بہت  
تک علاج کو دستکاری کی جرأت نہ کرنی چاہئے لیکن جب دستکاری کے تمام شرائط پائے جاویں  
تو اسے درگزر اور عذر کرنا بھی نہیں چاہئے۔

یا دیکھو کہ یہ دستکاری ایسے بچوں میں جائز ہے جو کسی مرض شدید میں مبتلا ہوں وضعیف نہ  
لاغر بھی ہوں اور ان کے مجرائے بول کو اس قدر پھیلا ناممکن نہ ہو کہ اسکی راہ سے پتھری نکالی جاسکے یا  
پتھری توڑ کر نکالنے کیلئے ان کے حلیل میں آلہ کاسرۃ الحصاة اور قناطر عسالیہ داخل کیا جاسکے  
اور ایسے مریضوں میں ہرگز جائز نہیں ہے جو بوڑھے اندالوں ہوں کہ شکاف کی تکلیف بڑاشت نہ کر سکیں  
اور اندمالِ نجم مشکل ہو۔ یا جو اشتیاق کی مرض سوزشی یا فساد خون میں مبتلا ہوں یا جوان گرم مزاج  
ہوں کہ شکاف کے بعد درم شدید پیدا ہونے کا احتمال ہو۔


اب ہم ان تینوں مقامات مذکورہ بالا میں دستکاری کرنے کے طریقے جداگانہ درج ذیل کرتے ہیں  
(الف) شقِ الحلیل (یوریتھریل تھاپومی) اگر پتھری اس قدر بڑی ہو کہ مجرائے بول کو پھیلا کر  
اسکا نکالنا ممکن نہ ہو تو حلیل میں شکاف دیکر نکالنی پڑتی ہے۔ اسوقت بیمار کو مزہ پر اس طریقہ سے ڈالیں  
جو کہ پتھری نکالنے کے لئے پہلے بتایا گیا ہے۔ پھر حلیل کے راہِ ٹیڑھی نامی دارسلانی (کڑوڈاشٹ) ہتھ  
میں داخل کریں اور اسکے ذریعہ سے باریک لوکدار شتر (شارپ ہائینڈ لیسٹری) داخل کر کے حلیل  
میں پیشاب کے سوراخ سے نیچے کی طرف بقدر ڈیڑھ انچ لمبا شکاف دیں اور شکاف میں آلہ  
مخرج الحصاة (ہٹون فارسیس) داخل کر کے پتھری کو نکالیں۔

(تصویر نمبر ۸۶ ان آلات کی)




پھر مثانہ کو پچکاری سے دھوئیں تاکہ وہ خون وغیرہ سے صاف ہو جائے۔ اس کے بعد شکاف میں دیا  
تین ٹانگے لگا کر حلی میں پورے منبر کا نرم قانا طیر (برٹکے محٹی ٹر) رکھ دیں تاکہ پیشاب س کے ذریعہ سے  
خارج ہو کرے۔ اور جب تک زخم اچھی طرح سے بھرنے آئے (ایڈمال کے لئے مناسب تدابیر کرتے رہیں۔  
(ب) شق المہبل (ویجائنل لیٹھا ٹوی) اگر پتھری اسقدر بڑی ہو کہ مجرے بول میں شکاف دیکر  
اسکا نکالنا ممکن نہ ہو تو اندام نہانی کی طرف سے مجرے بول اور مثانہ میں شکاف دیکر نکالی جاتی ہے  
اس دشکاری کے لئے مریض کو مذکورہ بالا وضع پر لٹا کر سیدی نالی دار سلائی (اسٹریٹ اسٹاف) حلی  
کے راہ مثانہ کے جوف میں داخل کریں۔ اور بائیں ہاتھ سے اسکو مضبوط پکڑ کر انگشت سبب کا سہارا دیکر  
اندام نہانی کے سامنے والی دیوار کو اس سلائی سے دبائیں۔ پھر چاقو کی طرح کے نشتر (اسکا پیل) اسے اندام  
نہانی کی سامنے والی دیوار اور پشت مثانہ کی ساخت میں اندر دلی سلائی کے نشان پر اندر کو ڈیرے لگائے  
شکاف دیں۔ اور آگے خرچ الحصاء (اسٹون فار سپس) شکاف میں داخل کر کے اس سے پتھری کو نکالیں پھر  
مثانہ کو مہاگہ کے پانی سے بذریعہ پچکاری کے دھو کر زخم میں ٹانگے لگائیں اور اندام نہانی کے لئے مناسب تدابیر سے غافل نہ رہیں

(تصویر نمبر ۸۷ ان آلات کی)



(رج) الشق فرق العائد (سو پراپیو یک اپرٹین) یعنی پٹو کے اوپر دستکاری۔ اگر پٹری سفید بڑی ہو کہ اندام نہانی یا اعلیل میں شکاف دیکر اسکا نکالنا ممکن نہ ہو۔ اور یا پٹری زیادہ سخت قسم کی ہو جو کہ توڑ کر نکالی نہ جاسکے تو مجبوراً ایسی حالتوں میں یہ عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ دستکاری نہایت خطرناک ہے۔ اس لئے جراح پر واجب ہے کہ دستکاری سے پہلے بیمار کو تمام ان خطرات سے آگاہ کر دے۔ جن کا اس دستکاری میں احتمال ہے۔ پھر بھی اگر مریض اور اس کے متعلقین درخواست کریں تو جراح کو منظور کر لینا چاہئے۔

طریقہ دستکاری بیمار کو میز پر چیت لٹائی۔ کندھوں کے نیچے تکیہ اونچا کریں بمقام عائد کے بالمشا کر کے اسکو پہلے صابون اور گرم پانی سے اور پھر پلچھہ کے کاربولک لوشن سے یا ایسے حصہ کے مرکری لوشن سے دھویں۔ پھر نرم قانا طیر مثانہ میں داخل کر کے اسکے ساتھ ربر کی نلی لگائیں جس کے سر پر شیشہ کا قیف ہو اس قیف کے ذریعہ سے مثانہ میں عرق سہاگہ (اور سبک لوشن) خیر گرم داخل کریں۔ پھر اس نلی کو نیچا کر کے عرق مذکور مثانہ میں نکلنے دیں۔ اور جب مثانہ خالی ہو جائے تو پھر تیز باقی ابھیں یہی عرق بھر کر نکالیں جب دو تین مرتبہ اسی طرح عمل کرینے خوب دھل جائے تو پھر میں نلی کو دو یا تین فیٹ اونچی کر کے قریب ۲ یا ۳ تولہ عرق اسمیں داخل کریں اور قناحہ کو نکال کر اسلیم کرک یا اسفنج کی باریک بتی داخل کر دیں تاکہ عرق مثانہ سے نکلنے نہ پائے اور کیمیا (رنگل سیگ) جو کہ بڑی باریک سیناوی پھٹی ہوئی ہے اور جسکی چوٹی پر لمبی نلی لگی ہوتی ہے اس پر تیل لگا کر ساق مستقیم میں داخل کریں اور نلی کے ذریعہ سے



ابھیں پانی بھر کر نلی کے منہ کو اسکی ڈاٹ کے پیچ سے بند کر دیں تاکہ پانی نہ نکل سکے پانی کی مقدار جوالوں میں ۲۵ تولہ ہے اور کچھ نہیں۔ (تولہ سے زیادہ ہونی چاہئے پھر مریض کے سر میں کے نیچے تکیہ رکھ کر عائد کو اونچی کرنا کہ اسکا شکم نیچا ہو جائے اور اسنٹیں شکم کے گڑھے میں چلی جائیں اب مریض کو بیہوشی کی دوا کھور دفارم سو نکھا کر دستکاری اس طرح شروع کہ دستکار مریض کے ہاں

طرف کھڑی ہو کر اسکی ناک سے نیچے شکم کے درمیانی خط پر جلد میں دو سے چار انچ تک لمبا شکاف دے

جو کہ پیڑ کی ہڈی (آس پیولس) کے بالائی کنارہ سے نصف انچ نیچے تک پہنچے۔ پھر اسی شکاف کے موقع پر عضلات شکم کے درمیانی وتر کو اس کے درمیانی خط (لینا ایلیا) کے برابر احتیاطاً اسے بذریعہ کٹر کے تقسیم کریں اور یہ شکاف نیچے سے اوپر کو ہونا چاہئے۔ اس کے بعد عضلات شکم کی آرٹری جسمانی (برائٹور سلیس فیشیا) نظر آئے گی جو کہ اسی احتیاط کیساتھ تقسیم کی جائیگی تاکہ صفاف البطن شکاف سے محفوظ رہے۔ پھر زخم کو بذریعہ آلہ ریٹریکٹر کے پھیلائیں۔ اور چربی وغیرہ کو بذریعہ فاسیس کے ہٹائیں تو اوپر کی طرف صفاف البطن کی دھری چنٹ جس کو ٹرب گریٹ اوٹنٹم کہتے ہیں۔ اور نیچے کی طرف مثانہ کی ساخت نظر آئے گی اور شکاف کے مقام کی خانہ دار ساخت (سیلورٹشو) میں ہوا داخل ہو کر ٹرب کو نیچے دبائیگی۔ اب اگر مثانہ بہت نیچا ہو تو قاشا طیر داخل کر کے اسکو قدرے اٹھانا چاہئے۔ اور مثانہ کی داہنی اور بائیں طرف اس کے عضلاتی پرت میں سوئی داخل کر کے ریشم کا تار اس میں باندھ کر دونوں طرف کے تار دو دو دگاروں کو بچھڑانے چاہئیں۔ تاکہ مثانہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ اور اگر مثانہ کی ساخت کے پرت پٹے ہوں تو اس کے اندرونی مخاطی پرت کو بھی اس بندس میں شامل کر لینا چاہئے۔ لیکن بعض دستکار مثانہ کو ٹھکوں کے ذریعے سے اس کی جگہ پر قائم کرتے ہیں۔ (تصویر نمبر ۸۹ ان آلات کی)



اس کے بعد مثانہ کو اس جگہ پر جہاں اس پر صفاف البطن (پیری ٹونی ام) کا پرت نہیں ہے چھری

کے ذریعہ سے نیچے کو اس قدر چیریں کہ شکاف میں دو انگلیاں بخوبی داخل ہو سکیں۔ اور پتھری آسانی کیسے نکالی جائے پھر مثانہ کے شکاف میں دو انگلیاں داخل کر کے پتھری کو معلوم کریں۔ اگر چھبوتی ہو تو انگلیوں سے بکڑ کر نکالیں۔ اور اگر کسی سبب سے پتھری انگلیوں کے قابو میں نہ آئے تو آلہ خرّاج الحصاة (سلّون فارسیں) کے ذریعہ سے نکالیں۔

یاد رکھو کہ یہ دستکاری کرتے وقت شہ ہو کہ پہلے مثانہ اندر سے اچھی طرح صاف نہیں ہوا ہے تو مثانہ میں شکاف دینے سے پہلے زخم کو دور ترقی فی اونس کی طاقت کے کلورائیڈ آف زنک واش سے دھویں اور پھر دینی شکاف پر آلودہ و فارم لگا کر مثانہ میں شکاف دیں اور پتھری نکالنے کے بعد مثانہ کی اندرونی سطح کو اسفنج سے صاف کریں۔ اب اگر مثانہ میں کسی قسم کی متغفن رطوبت موجود ہو اور اس کی ساحت میں التهاب یا ورم ہو تو مثانہ کے زخم کو ولایتی دوڑے (کاربولائیٹ و دیگر) سے بند کریں اور یا مفضلہ ذیل طریقہ پر آسین ٹانکے لگائیں۔ یعنی اول سوئی کو زخم کے اوپر والے حصہ میں ایک طرف کے عضلاتی تہ سے دوسری طرف کے عضلاتی تہ پر تک چھید کر ریشم کے تانے سے ٹانکا لگائیں اور اسی طرح مختلف ٹانکے لگائے۔ انھیں کے فاصلہ پر نیچے تک لگاتے آئیں تو آخر کار ٹانکا مثانہ کے شکاف کے نیچے حصہ میں لگیگا۔ اور اس طرح مثانہ کو سینے کے بعد پیشاب مثانہ سے باہر نہ نکلے گا۔ لیکن اگر مثانہ میں شکاف کے مقام پر ستورٹا سا سوراخ بھی باقی رہ گیا ہو تو اسی کی راہ پانی نکلے گا۔

اور اگر مثانہ کی دیوار کمزور ہو یا اس میں التهاب موجود ہو تو اس حالت میں مثانہ کے شکاف کو ٹانگوں بالکل بند نہیں کرنا چاہئے اور زخم کی پیپ وغیرہ نکلنے کے لئے ربڑ کی ٹی آسین رکھ دینی چاہئے۔ بہ طرح اگر اتفاقاً کسی وجہ سے مثانہ کے زخم کا کوئی ٹانکا لوٹ جائے تو پیشاب س نلی کے ذریعہ سے نکلا رہیگا اس کے بعد بیرونی شکاف میں بھی نہایت احتیاط کے ساتھ قریب قریب ٹانکے لگا کر ربڑ کی ٹی کے باس ختم کریں اور اند مال زخم کے لئے دو مانع عفونت لگا کر گدسی اور پیٹ سے باندھیں اور مرینہ کی مستقیم میں ربڑ کی پٹی رکھ کر پانی سے بھری گئی تھی۔ دستکاری سے فارغ ہونے کے بعد اسے فوراً نکال کر مرینہ کو اس کے بستر پر آرام سے لٹائیں۔ اور زخم کی نگہ رانی و دیگر تدابیر حسب قاعدہ احتیاط کے ساتھ کرتے رہیں۔ مرینہ کا پیشاب قاناطہ کے ذریعہ نکالتے رہیں۔ تین یا چار روز کے بعد جب زخم بالکل بھر کے قریب آئے تو ربڑ کی رفته رفته نکالیں۔

**خطرات** (۱) دستکاری کے وقت یا اس کے بعد کثرت جریان خون (۲) ورم الصفاق (بربیٹائیٹس) یعنی شکم کے اندرونی پردہ میں ورم ہو جانا (۳) ناصور فوق العانہ (سوپراپیوبیک فنجیولا) یعنی پیڑ وکا ناصور (۴) صعت و تقاہت شدید (۵) تشراب بول (اکسٹراورسے شن آف یورن) یعنی زخم کے قریب کی ساخت میں پیشاب کا سرایت کر جانا۔

**فصل آٹھویں۔ ورم المعاء المستقیم (رکٹائیٹس)** یعنی معاء مستقیم کی ساخت میں ورم ہونا یہ ورم اکثر گرم مادہ (خون یا خون صفراوی) سے گرم مزاج والے جوان مرعیوں کو ہوتا ہے لیکن شافو ناد کبھی سرد مادہ (بلغم فاسدہ یا سودا یا خون سوداوی) سے بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض دفعہ سنگی لعین اس مرض میں مبتلا دیکھے جاتے ہیں۔ اس مرض میں بیمار کو ہر وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسکی آخری آنت میں ثقل موجود ہے جس کے تناؤ اور ثقل کی وجہ سے اسکو بے اختیار دفع براز کے لئے بار بار قہقہ پر بیٹھنا اور کونٹھنا پڑتا ہے لیکن پیش کے ساتھ قدرے لیسار اور سیاہی مائل رطوبت خارج ہوتی ہے اگر ورم کا دباؤ مثانہ تک پہنچے یا مثانہ میں خراش پیدا ہو جائے تو پیشاب دشواری کے ساتھ بار بار آتا ہے اسباب گرم ورم کے اسباب یہ ہیں (۱) مرعین کو پیٹے سے نفق شکم کی شکایت ہونا (۲) آخری آنت میں کرموں کے کاٹنے سے یا کسی تیز مادہ سے خراش پیدا ہونا (۳) آنت کی ساخت میں بوہیری گرم خون کا جمع ہونا (۴) مرعین کا مزاج گرم ہونا (۵) بدن میں خون فاسد یا خون صفراوی کا غالب ہونا **علامات** (۱) آخری آنت میں نہایت گرمی و درد شدید جسکی بیش پشت تک پھیلی ہے (۲) مقام ماؤف میں بوجھ اور تناؤ کے سبب پیش کی تکلیف ہوتی ہے (۳) مقعد کا عضلہ شدت سے سکڑا ہوا اور وہاں معرخی نمودار ہوگی (۴) پیشاب دشواری سے بار بار آنا۔ (بہتر شدت ورم کے بیمار موجود ہونا۔

**علاج۔** اگر ورم گرم ہو اور بیمار فریہ قوی اور اس کے بدن میں خون فاسد غالب ہو تو زمانہ ابتدا میں (۱) سب سے پہلے فصد باسلیق سے بہتر مناسب خون نکالیں اور مرعین کو اپنے بہتر پر آرام سے لیٹے رہنے کی ہدایت کریں (۲) لعاب بہدانہ ۳ ماشہ شیرہ عذاب ۵ دانہ عرق ششہترہ ۱۰ تولہ شربت نیلوفر ۲ تولہ اسپنول مسلم ۵ ماشہ چمڑک کر پلائیں (۳) گل منقشہ مکوہ خشک تخم خطمی۔ ریشہ خطمی ششہترہ گل سرخ ہر ایک ۷ ماشہ عذاب ۵ دانہ۔ رات کو پانی میں بھگو کر صاف کر لیں اور شربت نیلوفر ۲ تولہ حل کر کے اسپنول مسلم ۷ ماشہ چمڑک کر پلائیں (۴) تسکین حرارت اور دریکلے رسوت خالص صندل سفید

داخلی و خارجی اسفالت کے خوب لٹینے

عذیل سرخ۔ گل سرخ۔ پوست خشناس۔ کافور۔ بقدر مناسب لیکر آب کا سی سبز آب کو ہنری میں پکھناد کر س۔  
 (۵) اور زردی بھینہ مرغ۔ روغن گل۔ قدر سے مردار سنگ ملا کر شاذ کر س (۶) اگر ضرورت ہو تو مغشہ۔ بالونہ  
 کو خشک تخم خلی۔ تخم خبازی۔ تخم اسی تخم کدوچہ۔ برگ کرب پانی میں پکا کر ہر چار یا پچھنٹہ کے بعد ازین  
 کر س (۷) اگر ورم اندر کو زیادہ ہو تو ان ہی دواؤں کے جو شائدہ سے حقہ کر۔ اور اگر بجائے اسکے لیکوئیٹ  
 اسکرٹ آف اوپیم۔ ۲ بوند سے ایک ڈرام تک سگچہ ملا ڈونا ۱۵ بوند سے۔ ۲ بوند تک۔ کا بجی ۲ اونس سیکو ملا کر  
 پچھاری کر س تو بھی مفید ہے (۸) ابتداء کا زمانہ گزر جانے کے بعد مذکورہ بالا نسخوں میں بقدر مناسب تبدیلیاں  
 کر س جو کہ عام ورموں کے علاج میں مختلف زمانوں کے لحاظ سے کیجاتی ہیں (۹) اور اگر کسی تدبیر سے فائدہ نہ ہوا  
 ورم نکلے لگے تو برگ کرب اور پیاز کو بھول میں دبا کر کپائیں اور تھپی۔ اسی تخم کدوچہ۔ کھیل الملک۔ گل۔ بالونہ۔ ایک  
 ۶ ماشہ کوٹ کر حجام کر ۳ ماشہ گوگل ملائیں اور اس میں روغن گل اضافہ کر کے شیاف بنا کر استعمال  
 کر س۔ تاکہ جلد نیک کر بھوٹ جائے۔

**فصل نویں** خراج المعاء الولدی (اسکی اور کل ایسیس) یعنی مہار مستقیم اور عظم الولک کے  
 درمیان کا بھوڑا سیہ بہت تکلیف دینے والا بھوڑا ہوتا ہے۔ جو کہ معاء مستقیم یا مقعدہ کا یا حوض عانہ  
 کی نرم ساختوں کا ورم بڑھ کر پکنے سے ہو جاتا ہے۔


**اسباب** (۱) اعضا مذکورہ بالا میں سے کسی کا ورم بڑھ کر حوضہ در کیہ مستقیم (اسکی اور کل فارسی)  
 کی نرم ساختوں تک پہنچ جائے (۲) ڈبلے اور ضعیف شخصوں کو سردی میں زیادہ بیٹھنے سے ہجکے کی  
 نرم ساختوں میں اجتماع خون ہو کر گہرا ورم پیدا ہو جائے اور وہ پک کر بھوڑا بن جائے (۳) ہنشی ہنا  
 یا کسی دوسری قسم کا فساد خون میں پایا جائے۔

**علامات** (۱) اسباب مذکورہ بالا کا موجود ہونا یا پہلے پایا جانا (۲) مقام ماؤف میں جو پٹے ہوتے ہیں۔  
 ان پر اس پھوڑے کا دباؤ پڑنے سے مرلیہ کو شرمگاہ اور سرین اور جگاسوں میں درد کی میس کا ہونا۔  
 (۳) مقام ماؤف میں جلن اور سخت درد ہونا جس سے مرلیہ کو بیٹھنا دشوار ہو جائے (۴) بخار شدید ہر وقت  
 موجود رہنا (۵) قبح شکم ہونا اور اجابت کے وقت مرلیہ کو سخت تکلیف ہونی (۶) مقعدہ کے اندر انکی  
 داخل کر کے دہی یا بایں طرف کو ٹھونسنے سے ورم بڑھنے نہ پائے۔ اور اس غرض کے لئے یہ نہاد نہایت مفید ہے  
 علاج (۱) ابتداء میں اسی تدبیر کریں جس سے ورم بڑھنے نہ پائے۔ اور اس غرض کے لئے یہ نہاد نہایت مفید ہے

مذہب دار

صفحتہ رسوت۔ حنڈل سرخ۔ گل سرخ۔ جدوار گل ارمنی۔ سچ۔ اسپنول کو قہ۔ مکوہ خشک۔ آرد جو۔ سکو  
مکوہ بزرگ عرق میں باریک پس کر و عن گل اندٹے کی سفیدی ملا کر ضماد کریں (۲) اگر ورم کا بڑھنا مسو  
نہ ہو تو بجائے اس کے ضماد محلات کام میں لائیں اور یہ پوٹس بھی نہایت مفید ہے صفحتہ۔ تخم کنوچہ۔  
تخم السی۔ تخم خشنش سفید۔ تخم خلی۔ جالغل۔ رلیونہ چینی۔ سب کو بکری کے دودھ میں پس کر یکا کر اور  
اندٹے کی زردی ملا کر ایلوہ باریک پس کر اس پر چھڑک کر باندھیں (۳) درد کی تکلیف رفع کرنے کی عن  
گل سرخ۔ مکوہ خشک۔ گل ایلوہ۔ پوست خشنش پانی میں جوش دیکر اسیں کپڑا یا اسفنج تر کر کے تکمید کریں (۴) اگر  
خون کی زیادتی سے ورم میں تناؤ کی تکلیف زیادہ ہو تو جو نکلیں لگائیں (۵) اگر چھوڑے میں پیپ  
بنگنی ہو تو اس کے خود چھوٹنے سے پہلے شکاف دیں تاکہ معقد یا اندام نہانی کی طرف نہ چھوٹے۔ لیکن  
شکاف میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس جگہ کی رگیں اور پیٹھے گٹھے سے بچائے جائیں۔ اس کے بعد  
زخم کا معمولی علاج ہو شیار سے کریں تاکہ ناسور نہ ہو جائے۔

مذہب دار



(التصویر نمبر ۹۰۔ شستروں کی)

فصل دسویں۔ قرحة المعاء المستقیم (السر آف رکٹم یعنی معار مستقیم کی ساخت میں زخم پیدا  
ہو جانا۔ اکثر سیرمن ورم کے پک جانے یا کسی تیز خلط کے خراش کا نتیجہ ہوتا ہے۔

اسباب (۱) معار مستقیم میں ورم ہو کر اس کا پک جانا (۲) کسی تیز خلط (صفو وغیرہ) سے یا سخت فضلہ  
کے سدہ سے آنت کا پھل جانا (۳) آنت کے اندر کرموں کا بکثرت موجود ہونا اور کاٹنا (۴) آنت میں  
کسی بیرونی چیز کا چھپ جانا (۵) آنت کی فساد۔ یا بواکسیری سوں کا پک جانا۔

علامات (۱) بیمار کو آخری آنت میں ہر وقت جلن اور درد کی تکلیف ہوتی ہے (۲) چیخ ستاہی ہے  
اور پیپ قدرے آؤں کے ساتھ یا خون آمیز آتی ہے (۳) اجابت کے وقت کمال تکلیف ہوتی ہے  
رفع حاجت کے بعد بھی زیادہ دیر تک جلن کی تکلیف رہتی ہے اور بوجہ سے بیمار اجابت کو روکنے پر



مجبور ہو جاتا ہے (۴) بیمار کو میٹھا دشتوار دینا ہے اور اگر زخموں کی تکلیف کا اثر مثانہ تک پہنچے تو پیشاب بھی تکلیف سے آتا ہے (۵) آلہ مفناح المقعد (۱) کے ذریعے سے بھی اس مرض کی تھیں پتی ہے



نصوبہ نمبر ۹۱ آلہ مفناح المقعد کی

Rectum Speculum

علاج (۱) زخم کی صفائی کے لئے شہد میں قدرے پانی ملا کر حقنہ کریں۔ یا ساق۔ پوست انار۔ ہر ایک امانشہ۔ عدرس مسلم۔ جو۔ چاول ہر ایک ایک تولہ لیکر میکوفتہ کر کے پانی میں پکائیے۔ اور صاف کر کے اسمیں چونے بے بھیا ہوا ۳ ماشہ ملا کر حقنہ کریں (۲) اسکے بعد اندمال زخم کے لئے صمغ عربی۔ دم الاخوین۔ گل۔ زنی۔ عصارہ ریشہ برگدہ کا غد سوختہ۔ ہر ایک بقدر مناسب لیکر آب بارتنگ بزاور آب توت خام میں پیکر چھان لیں اور حقنہ کریں (۳) اگر زخم پرانا ہو تو چھتہ مفید ہے صفقہ رائیخ ایک ماشہ۔ صمغ عربی۔ دم الاخوین۔

اقاقیا بلوط ہر ایک ۴ ماشہ خشک روٹی جلی ہوئی۔ زریخ سرخ۔ زردیخ زرد پھلکری۔ مازوسنر چونے بے بھیا

ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ افیون خالص ۱ تولہ بسکو باریک کوٹ چھانکر پانی میں گیندھکر قرص تیار کر لیں پھر اس سے

قریب ۲ ماشہ کے لیکر چاول۔ اتولہ کی چچ میں ملائیں۔ پھر اس میں روغن گل ۲ تولہ ملا کر حقنہ کریں (۴) اس طرح چھتہ بھی

مفید ہے صفقہ گل سرخ۔ گلنار ہر ایک ۴ ماشہ عدرس مہتر چاول خشکاش جو مہتر ہر ایک کیتولہ۔ پانی میں پکا کر

صاف کریں اور کندر دم الاخوین۔ افاقیا سفیدہ کا شغری۔ صمغ عربی ہر ایک ۱۰ ماشہ باریک پیکر چھان لیں

اور روغن گل ۲ تولہ اضافہ کر کے حقنہ کریں (۵) اگر خلا تیز سب ہو تو چھتہ مفید ہے صفقہ خرفہ سبز کا پانی

بارتنگ بزاور پانی ہر ایک ۱۰ تولہ۔ زردی سفیدہ مرغ ایک عدد۔ روغن گل ۲ تولہ گل مختوم کمر یا مہرجان سفیدہ کا شغری

ہر ایک ۳ ماشہ افاقیا ۱۰ ماشہ دم الاخوین ۲ ماشہ باریک پیکر ملائیں اور حقنہ کریں (۶) چاول مصور جو مہتر

باجرہ ہر ایک ۱۰ تولہ گل سرخ۔ گل نارچھت بلوط ہر ایک کیتولہ مازوسنر عدرس کونیکوفتہ کر کے پانی میں

جوش دیں اور صاف کریں اور کا غد سوختہ سفیدہ کا شغری ہر ایک ۳ ماشہ گل ازنی ۲ ماشہ زردی سفیدہ مرغ

ایک عدد۔ روغن گل ۲ تولہ اضافہ کر کے حقنہ کریں (۷) اگر آستوں میں کیڑے ہوں تو چھتہ مفید ہے صفقہ پوست

درخت شاہ توت۔ پوست درخت انار ترش ایک تولہ کوٹ کر ایک ات دن پانی میں بھجو کر خوب جوش دیں پھر

فونٹ۔ قرس رائیخ ہندوستانی دواخانہ دہلی سے عمدہ ملے گا ۱۲ مولف

فونٹ رائیخ

عذر صحت اور

عذر قوت و زبان

صاف کر کے آڑو کے پتوں کا عرق ۵ تولہ اضافہ کر کے حقنہ کریں (۸) آتشکی زخموں کے لئے ریحقنہ مفید ہے۔  
 صفتہ رما میں مازو ہر ایک ۵ ماشہ کو کنار کشنیر خشک گلنار ہلید سیاہ جب لاس برگ لاس گلنار بیرہ گل آتشکی  
 برگ خاہر ایک ۵ ماشہ بکس متشر ایک تولہ سب کو پانی میں جوش دیکر صاف کریں اور آب بارنگ سبز ۵ تولہ اضافہ  
 کر کے سروت بگل ارنی صندل سرخ اتاقیا ہر ایک ۳ ماشہ میکہ ملائیں اور حقنہ کریں (۹) مرین کو آرام سے کریں  
 اور غذا نہایت ہلکی دیں۔

**فصل گیارھویں۔** ناسور المعاء المستقیمہ (سائی سن ان دی رکیم) یعنی معار مستقیم کے  
 اندر ناسور پہنچانا یہ ناسور کبھی معار مستقیم کا دم پکے سے اور یا خراج المعائی، النور کی (اسکی اور کٹل ایس) کے معار مستقیم کی طرف پھوٹنے سے اور زخم ہو کر مدت تک مندل نہ ہوئیے ہوتا ہے اور کبھی پرانی چیش کی نتیجہ  
 ہوتا ہے اور اسکی دھوڑیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک تو یہ کہ ناسور معار مستقیم کی ساخت میں ہوتا ہے اور دوسری  
 صورت یہ ہے کہ مستورات میں اندام نہانی تک بڑھتا ہے جبکو ڈاکٹری اصطلاح میں رکتویجائیل فنچو کہتے ہیں  
**اسباب۔** (۱) معار مستقیم کا سا دوزخ جس کے علاج میں تساہل کیا جائے دس خراج  
 المعاء النور کی (اسکی اور کٹل ایس) کا معار مستقیم کی طرف پھوٹنا اور اندام میں خرابی ہونا۔  
 (۲) پرانی چیش کی تکلیف سے زخم تک نوبت پہنچنا (۳) خون میں آتشکی زہر کا موجود ہونا۔  
**علامات۔** (۱) چیش کی تکلیف اور فضلہ کے ساتھ متفق رطوبت گوشت کے دھوؤں کی سی  
 یا زور رنگ کی گلنا۔ (۲) اجابت کے وقت مرین کو سخت تکلیف ہونا (۳) اکثر حقن شکم  
 اور نفع امعاء کی شکایت ہونا (۴) خسا خون کی علامات پایا جانا۔

**علاج۔** (۱) ناسور کو صاف کر نیکی لئے دودھ میں شہد ملا کر حقنہ کریں (۲) برگ نیب۔ برگ خار مکہ  
 خشک شاہترہ بگل سرخ بگل بابونہ کیمید کے جو شانہ سے حقنہ کرنا بھی مفید ہے (۳) اسکے بعد حقنہ کا نسخہ  
 راتینج والا اور سطح مائیں مازو والا بھی مفید ہوتا ہے (۴) مرہم ناسور اور مرہم کا فوری کا استعمال بھی مفید ہے  
**صفت مرہم ناسور۔** ہلیدی مرہارنگ ہر ایک ۲ تولہ نہایت باریک پسا ہوا بیوم سفید تولہ ۵ غول تولہ  
 سب کو ملا کر قدرے پانی میں شامل کریں اور مرہم آرنج سے اس قدر پکائیے کہ مرہم تیار ہو جائے۔  
**نسخہ مرہم کا فوری۔** بیوم سفید ایک تولہ روغن اسی ایک تولہ میں لگلائیں اور سفید کا فوری  
 معقول ایک تولہ کا فوری ۲ ماشہ باریک پیکر اس میں ملائیں اور دستہ سے خوب حل کریں جب ہر دھونے کے

قرب پہنچے تو سفیدی ہفینہ مرغ و عدد ملا کر سکو یکذات کریں۔ (۵) اس مرض میں قبض شکم رکھنا اور دوسرے یا تیسرے دن عمل کے ذریعہ سے فضلہ خارج کر اگر ناسور کو کچکاری سے دھونا ضروری ہے اسلئے غذا میں صرف دودھ کم شیریں پلانا کافی ہوتا ہے۔

**فصل بارہویں** تضیق المعاء المستقیم (اسٹرکچر آف دی رکٹم) یعنی معاء مستقیم کا تنگ ہو جانا۔ اس مرض میں بیمار کو اجابت نہایت قبض کے ساتھ اور دشواری سے ہوتی ہے فضلہ آنتوں میں بھرا رہتا ہے اور اکثر بلا عمل کے خارج نہیں ہوتا۔ اس طرح اخراج ریا ح بھی مشکل ہوتا ہے۔ اسلئے قراقراد فح شکم اس مرض کے لوازمات میں سے ہے بلکہ فضلہ کی تجمیر سے کبھی خفقان اور دلچوکیا مرقی جیسے عوارضات لاحق ہونے تک نسبت پہنچتی ہے۔ یہ مرض تین قسم کا ہوتا ہے (۱) یعنی (۲) آتشکی (۳) سطلنی (۴) تضیق یعنی (فائبرس) اسٹرکچر یعنی معاء مستقیم کی ساخت میں ریشہ دار مادہ پیدا ہونے سے اس کے جوف کا تنگ ہو جانا۔ اکثر یہ تنگی مقعد سے چار یا پانچ انچ اوپر یعنی معاء مستقیم کے پہلے حصہ میں معاء قولون کی تخریج سیننی (سگ ماڈ فلکشر) کے قریب ہوتی ہے۔

**اسباب**۔ یہ مرض اکثر اسہال مہوی (ڈائریا) اور ذوسطاریا مزمن (کروانک ڈی ہنٹری) کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک مدت تک دست آنے سے آنتوں کی ساخت ضعیف ہو کر سکوڑے لگتی ہے۔ اور ذوسطاریا مزمن میں زیریں آنتوں کے اندرونی سطح میں جابجا زخم ہو کر ان کی ساخت سکوڑے اور سخت ہونے لگتی ہے۔ اور چونکہ معاء مستقیم کا پہلا سب سے تنگ ہوتا ہے۔ اس لئے سکوڑے اور بھی زیادہ تنگ ہو جاتا ہے۔

**علامات** (۱) مریض کو اجابت دشواری سے ہوتی ہے (۲) اخراج فضلہ کے لئے زور کرنا پڑتا ہے (۳) اگر فضلہ قدرے نرم ہو تو صیٹا دھاریدار ہو کر سدوں کی طرح مشکل سے نکلتا ہے (۴) اگر فضلہ سخت ہو تو اس حالت میں یا تو ایسی رگڑے آنت کی سطح جھلکے اس کے ساتھ قدرے خون بھی آتا ہے (۵) اور یا وہ آنت میں اس قدر بھین جاتا ہے کہ بلا عمل کے نکل نہیں سکتا۔

**علاج** (۱) پہلے نیگرم پانی میں روغن بیدانجیر ۲ تولہ ملا کر حقنہ کریں تاکہ آنتیں خشک فضلہ اور سدوں سے پاک ہو جائیں (۲) اسکے بعد گل بالونہ۔ گل سرخ۔ تخم خطمی۔ تخم کنوچہ۔ تخم اسی ہر ایک، ماشہ لیکر پاؤسیر بانی میں جوش دیں اور صاف کر کے ہر روز نیگرم بذریعہ حقنہ کے مقام ماؤف تک پیچائیں (۳) اور

اگر مذکورہ بالا دواؤں کو زیادہ مقدار میں لیکر ان کے جوشاندہ سے آبرن کر ایسے تو ان تدریسوں سے آنت میں ڈھیلا پن ہو کر وہ اصلی حالت پر آجائے گی (۴) اگر ضرورت ہو تو گلابی سیرین قدسے نیکر پانی میں حل کر کے بذریعہ پکاری کے معاستقیم میں پیچانے سے بھی فوراً اجابت ہوتی ہے (۵) موثر تفتی - مکوہ خشک - تخم کنوچہ - مغز الماس - آب مکوہ سبز میں باریک پیس کر زردی بیضہ مرغ - روغن گل ملا کر اسکا شیافہ (سازنی ٹری) بنا کر مقعد میں رکھا بھی مفید ہے - (۶) غذا صرف بخنی اور دودھ -

انجام - یا تو اس علاج سے مرہین کو رفتہ رفتہ آرام ہو جاتا ہے اور یا بذریعہ مرض بڑھ کر معاستقیم کو بالکل بند کر دیتا ہے - یا فضلہ خارج ہونکی دائمی تکلیف کے سبب آنت میں دل ہو کر آنت کا راستہ ہو جاتا ہے غم کے اندر فضلہ حج ہو جانکی تکلیف سے اور نہایت کمزور ہو جانکی وجہ سے بالآخر مرہین ہلاک ہو جاتا ہے - (۴) تصنیق آشنگی (سفلیک اسٹرکچر) یعنی آشنگی مادہ کے اثر سے معاستقیم کی غشا مخاطی مونی ہو کر اسکی تجویف تنگ ہو جائے - یہ مرض مستورات میں بہ نسبت مردوں کے زیادہ پایا جاتا ہے -


علامات (۱) مقعد میں آشنگی داخل کر کے ٹوٹنے سے معاستقیم کی اندرونی پھلی مونی اور سخت محسوس ہوتی ہے (۲) اگر آکہ مفتاح المقعد کے ذریعہ سے امتحان کیا جائے تو آشنگی زخم پائے جاتے ہیں - (۳) امتحان کے وقت بیمار کو زخموں کی تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے (۴) مرہین آشنگی کی دیگر علامات موجود ہوتی ہیں - (۵) اجابت کے وقت مرد ڈرہوئی ہے - اور فضلہ کم - لیکن مواد اور آٹوں اسقدر زیادہ خارج ہوتی ہے - کہ مرہین کمزور ہو کر ہلاک ہوتا ہے -

علاج (۱) آشنگی علاج کے قاعدہ کے مطابق تمام کھانے پینے کی دوائیں دیں - (۲) برگ شاہزہ - برگ نیب - برگ حنا - مکوہ خشک - گل سرخ - گل بابونہ ہر ایک ۲ ماشہ لیکر پانی میں جوش دیں اور صاف کر کے حقہ کریں (۳) اگر حقن شکم کی زیادہ شکایت نہ ہو اور علین اور گرمی زیادہ پائی جائے تو دوسرے یا تیسرے دن حقین کریں تو بہت جلد فائدہ ہوگا صفقتہ - مائیں چھوٹی بڑی ہر ایک ۲ ماشہ - مکوہ خشک - پوست خشخاش کشینز خشک - گلاب زہرہ - گل تاج خروس - برگ حنا - گل بنفشہ - ہر ایک ۲ ماشہ عدس مقشر - تخم کاہو مقشر - ہر ایک ایک تولہ آدھ سیر پانی میں جوش دیں جب پاؤسیر پانی سے صاف کر کے برگ چولانی سرخ - مکوہ سبز کشینز ہر ایک کا پانی ۵ تولہ برگ کاہو سبز کا پانی ۳ تولہ اسپنول ۲ ماشہ کا لبا فائدہ کریں اور صندل سرخ - گل ارمی - آقا قیا - رسوت ہر ایک ۲ ماشہ باریک پیس کر اس میں لاییں اور حقہ کریں

حقہ کر کے آشنگی

(۳) **تضیق سرطانی** (سے لگ نٹ اسٹریکچر) یعنی معار مستقیم کی ساخت میں سرطان پیدا ہونے کے سبب سے وہ سکرٹھلے اور اس کا جوف تنگ ہو جائے۔ اکثر یہ مرض اس سورتدیر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو غلطی سے علاج اور ام میں واقع ہو۔ لیکن کبھی ابتداء بھی درم سرطانی پیدا ہو جاتا ہے۔

**علامات** (۱) مریض کو پیش کی سخت تکلیف ہوتی ہے (۲) فضلہ کے ساتھ متضن رطوبت خارج ہوتی ہے (۳) مقام ماؤف میں ہر وقت درد شدید رہتا ہے۔ بنید جاتی رہتی ہے (۴) مقعد میں انگلی داخل کرنے سے مقام ماؤف سخت اور سکرٹھلہ محسوس ہوتا ہے۔ (۵) آلہ مفتاح المقدر (رکٹل لمپے کیلم) کے ذریعہ سے دیکھا جائے تو درم سرطانی کی پوری کیفیت معلوم ہو سکتی ہے (تصویر حسب ذیل ہے)



(تصویر نمبر ۹۲ آلہ مفتاح المقدر کی)

**علاج** (۱) برگ نیب۔ برگ ٹا  
ایک ایک تولہ صندل سرخ۔ گلنار  
عس مقشر۔ پوست خنخاش ہر ایک

۱ ماشہ پانی میں جوش دیکر صاف کریں۔ اور آب مکوہ بنز۔ آب کشیز بنز۔ آب برگ کا ہو بنز۔ ہر ایک ۲ تولہ فام  
کر کے اس میں کا ذرہ سرخ۔ رسوت ۳ ماشہ حل کر کے حقنہ کریں (۲) اس طرح مائیں اور مازودال حقنہ بھی لے  
موقع پر مفید ہوتا ہے (دیکھو صفحہ کتاب ہذا) پیسے کے لئے شیرہ بادیان۔ شیرہ مکوہ خشک۔ عرق مرکب  
مصفی خون۔ شربت عناب دینا چاہئے۔ (۳) اگر ضرورت ہو تو مقعد کے گرد اور پشت عجز پر صندل و محلات  
جس میں رسوت۔ گل سرخ۔ صندل سرخ شامل ہو گائیں (۵) غذائیں آتش جو رقیق یا مزنگ کی تہی  
دال کھلائیں۔ دودھ بھی اچھی غذا ہے۔ اور اگر کبری کا دودھ شربت عناب کیسا کھلا پلا جائے تو دوا اور غذا کا کام

**فصل تیرھویں** انسداد المعاء المستقیم۔ (اڑے سیا آف دی رکٹم) یعنی معار مستقیم کا بند

ہونا۔ اور انسداد المعاء المستقیم (ایبیس آف دی رکٹم) یعنی معار مستقیم کی ساخت کا بالکل معدوم  
ہونا۔ یہ مرض پیدائشی ہوتا ہے۔ اس میں مقعد تو حسب معمول کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے قریب ٹیڑھ  
انچہ اوپر معار مستقیم کا زیریں سرا بذریعہ ایک جھلی کے بند رہتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ  
معار مستقیم بالکل معدوم ہوتی ہے اور فضلہ کا راستہ اندام نہانی یا مجرائے بول میں کھلتا ہے۔ اسباب اکثر  
یہ مرض پیدائشی خرابی سے ہوتا ہے۔ علامات (۱) بچہ کو اجابت نہ ہونا۔ اور اس کے شکم میں فضلہ  
جمع ہونے کے آثار پائے جانا (۲) اسہال کے لئے گھونٹی وغیرہ دینے کے بعد شکم میں تکلیف ہو کر بچہ


(۴) اگر فضلہ کا راستہ اندام نہانی میں یا مجرا سے بول میں کو ہو اس طرف سے فضلہ خارج ہوتا ہے۔  
علاج۔ اگر مقعد کے اندر معاً مستقیم کا زیریں سر اچھلی سے بند ہو تو آلہ میز (ٹوکا ر) سے اس جھلی میں خوب سوراخ کر دیں۔

(تصویر نمبر ۹۳ آلہ میز لمعائے کی)



اور اگر معاً مستقیم بالکل معدوم ہو تو علاج بنایت دشوار ہے۔ ایسے موقع پر ہوشیار اور ماہر فن جراح بائیں جگہ اسے اور کولے سے قدرے اوپر شکاف دیکر معاً قوتوں کے آخری حصہ میں سے باہر کو مصنوعی راستہ اخراج فضلہ کیلئے بنادیتے ہیں۔ اس دشکاری کو ڈاکٹری اصطلاح میں کولہ ٹومی اپریشن کہتے ہیں۔  
طریقہ دشکاری۔ مریض کو داہنی کروٹ پرٹا کر اسکی گھر کے نیچے تکیہ رکھیں۔ اور کلوروفارم سے بیہوش کر کے عظم الحاصرہ (اسے لی ام) کے اگلے اور پچھلے دونوں گوشوں کے بالائی نکالوں (اینٹی ری اسوپیری اور پوسٹیری اسوپیری اسپائنٹر) کے درمیانی نقطہ سے جو کہ عروق جرقی

(تصویر نمبر ۹۴ دشکاری کی جگہ اور مریض کی ہیئت)



(ایلیک کرسٹ) سے قریب ایک انچ پور قائم کیا گیا ہو ایک خط شروع کر کے اوپر اور پچھلے کو تین یا چار انچ لمبا کھنچیں اس خط کا پچھلا سر عضلہ ثا صبتہ (ایرکٹر اسپائن) کے بیرونی کنارہ پر ختم ہوگا۔ اب جلد اور اس کے نیچے کی جھلی چیرنے

سے اوپر اور سامنے کی طرف تو شکم کا عضلہ موربہ ظاہرہ (انٹرنل آبلک) اور اس کے مقابل بیٹھے اور پچھلے کو عضلہ موربہ ظاہرہ (ایکسٹرنل آبلک) منوردار ہوگا۔ پھر ان دونوں کے قریبی کناروں کو قدرے قطع کرنے سے عضلہ موربہ ظاہرہ (انٹرنل آبلک) اور صفا ذقطنیہ



مسکن حرارت ہو اور اس غرض کے لئے دو دھکم شیریں سبب بہتر غذا ہے۔

**فصل چودھویں** خراج المعاء المستقیم (پروکس آف دی رکٹم) یعنی مستقیم کے اندرونی پرت کا باہر نکل آنا۔ کتاب ترویج الارواح میں لکھا ہے کہ اسہال کی بیماری میں جس کے ساتھ پیش کی شدت تھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایسی چیز حبشی آنت ہوتی ہے ایک بالشت کے برابر مقعد سے نکلی اور تین دن کے بعد سیاہ ہو کر گر پڑی اور اس عارضہ سے دو آدمی تو اچھے ہو گئے اور تین چار آدمی ہلاک ہوئے۔ غالبہ گمان یہ ہے کہ وہ مستقیم کا اندرونی طبقہ تھا۔

مؤلف کی رائے یہ ہے کہ جن دو مرلصیوں نے شفا پائی انکی معالجتیم کا اندرونی پرت نکلا ہو گا اور وہ زیادہ ضعیف نہونگے۔ اور جو تین یا چار ہلاک ہوئے انکی معالجتیم کا غرضی پرت بھی اندرونی پرت کے ساتھ نکلا ہو گا۔ جسکی ناقابل برداشت اذیت اور شدت ضعف کے سبب وہ جانبر نہ ہو سکے۔ چنانچہ جناب ڈاکٹر برج لال صاحب گھوش مدیس فن جراحی میڈیکل کالج لاہور نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس مرض میں آنت کا غرضی پرت ہمراہ غنائی پرت کے باہر نکل آتا ہے۔ یہ مرض کمزور بچوں میں پیش واسہال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور کبھی مثانہ کی پتھری کے دباؤ سے بھی یہ صورت پیش آتی ہے۔ اس مرض کے علاج میں کسی قسم کی دستکاری جائز نہیں ہے۔

**اسباب** (۱) ضعف اور تقاہت کے سبب سے اور نیز کثرت رطوبت کے باعث اعضا کی ساخت کا اور ان کے باہمی اتصال کا ڈھیلہ اور مست ہو جانا (۲) قبض شدید یا پیش کے موافقہ پر دفع فضلات کے لئے مرض کا زور سے کوشش (۳) ممکن ہے کہ مثانہ کی پتھری کا دباؤ بھی کمزوری اور غلبہ رطوبات مرضیہ کی حالت میں اس مرض کا سبب ہو جائے۔

**علامات** (۱) سبب مرض کا موجود ہونا (۲) مقام مآؤف میں درد شدید ہونا (۳) مقعد سے باہر ہوئے حصہ کا رنگ اور اس کی صورت اور اندرون جسم کے ساتھ اسکا اتصال بھی مرض کا سچا گواہ ہوتا ہے علاج۔ حسب قدر علاج ممکن ہو فوراً اس نکلے ہوئے حصہ کو روغن کنجد سے یا روغن گل سے چکنا کر کے نرمی کے ساتھ داخل کریں۔ اس کے بعد گلاب میں روغن گل ملا کر حقنہ کریں اور مرلص کمزور لیٹر پر آرام جیسے لئے رکھیں۔ اسکی چارپائی پاؤں کی طرف سے قدرے اونچی رکھیں۔ چھوٹے آلہ متقارح المقعد



نہایت اور کثرت

پر قابض دوا میں لگا کر معاً تقسیم کے اندر اسطرح رکھیں کہ مریض کو تکلیف نہ ہو۔ اور ننگوٹ نہاٹی سے اسکو ہدایت کریں کہ رفع حاجت کے لئے بھی بستر سے نہ اٹھے۔ بیمار دار کو تاکید کریں کہ اجابت کے وقت مریض کے نیچے بیڈ پان رکھ دیا کرے۔ ہر بارہ گھنٹے کے بعد آکہ کو نکال کر اور غلاب میں قدرے پھلری حل کر کے حقہ کریں اور پھر آکہ مذکور کو بدمستور داخل کر کے باندھ دیں۔ تین دن کے بعد آکہ داخل کرنی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ دوائیں استعمال کریں جنکا بیان خروج معقد میں آئیگا۔ غذا مریض کو لطیف اور نود مضعم دیں۔

**فصل نیندرھویں۔** دیدان المعاء المستقیم (اگزی یورس ورمی کیولے کس) یعنی وہ کم جو نہایت چھوٹے اور باریک ہوتے اور اکثر انکی پیدائش معاً مستقیم کے اندر ہوتی ہے۔ اس لئے ان کو دیدان صغارا (اسمال بھریڈ ورم) یا چھتے بھی کہتے ہیں۔ آنتوں میں جو کرم پیدا ہوتے ہیں یونانی اطباء کے قول کے مطابق) یہ انکی چوتھی قسم ہے۔ یہ مرض بچوں کو اکثر ہوتا ہے۔ لیکن مناسب تدابیر سے بہت جلد نائل ہو جاتا ہے اور اس عمر کے بعد بہت کم ہوتا ہے لیکن شکل سے زائل ہوتا ہے خصوصاً جبکہ زیادہ عرصہ کا ہو۔ ڈاکٹروں نے کرم شکم کی اول دو جنسیں (جوف دار اور بے جوف) ثابت کر کے جنس اول کی چار اور جنس دوم کی تین کلی سات جنسیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر رحیم خاں صاحب مرحوم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ (۱) (لانگ بھریڈ ورم) یہ کرم ڈیڑھ انچ سے دو انچ تک لمبے اور نہایت باریک ہوتے ہیں اکثر انکی پیدائش معاً وغیرہ میں اور کبھی قولون میں بھی ہوتی ہے۔ اکثر یہ کرم تندرست آدمی کے شکم میں پائے جاتے ہیں اور اس کو شکایت اس امر کی نہیں ہوتی ہے (۲) (لارج رائونڈ ورم) (دیدان طوال یا جیٹا) یعنی کچھ جہاں کرم بھریڈ ورم سے ۱۲ یا ۱۴ انچ تک لمبے ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش اگرچہ معاً و دقاق میں ہوتی ہے لیکن کبھی معدہ میں پہنچ کر تکلیف دیتے اور قے میں نکلتے ہیں۔ (۳) (اسمال بھریڈ ورم) (دیدان صغارا) یہ نہایت باریک اور چوتھائی انچ لمبے اور اکثر معاً مستقیم کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی معاً و قولون کی تفریح سینے (گمائیڈ فلکشر) تک پائے جاتے ہیں (۴) (سکلی اس ٹوائیڈ ورم) (نی) یہ قریب تہائی انچ کے لمبے اور باریک ہوتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں نہیں ہوتے بلکہ مصر اور شمالی اٹلی میں پائے جاتے ہیں (۵) (ٹیپ ورم) (دیدان عریض) یہ کرم کہ وہ کہتا ہے جس میں ان کا ام کہ وہ دانہ مشہور ہوا ہے۔ یہ بہت سے باہم مل کر ایک لمبی جیل کی صورت بناتے ہیں جسکی طوالت ۵ گز سے ۵ گز تک ہوتی ہے اور انکی سکونت اکثر معاً و دقاق (چھوٹی آنتوں) میں ہوتی ہے۔ (۶)

علہ یہ ادھر کی تین آہنیں، اتنا عشری، صائمہ، دقیق ہیں۔ ان میں یہ کرم اکثر معاً و دقیق میں پیدا ہوتے ہیں ۱۲ مولف

لے طبیامیڈ کوکانے لینا (دیدان غلاط) جو کدو والوں سے قدرے بڑے ہوتے ہیں۔ (۷)  
بادری اوسے فے لس لے لس۔ یہ اس ملک میں نہیں پائے جاتے۔

یونانی اطباء نے ان سات قسموں میں سے نمبر اول غالباً اس وجہ سے نہیں بیان کی کہ انکے متعلق  
مریض کو کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ اور غیر م وے کا اسلئے ذکر نہیں کیا کہ وہ اس ملک میں نہیں پائے  
جاتے۔ چنانچہ اب ہم ان بقیہ چار قسموں میں سے اس قسم کو درج ذیل کرتے ہیں جو معاً مستقیم میں پیدا ہوتے ہیں  
**اسباب۔** امعاء میں ہر ایک قسم کے دیدان پیدا ہونے کے عام اسباب یہ ہیں کہ (۱) میدہ و کشتہ  
دار چیزیں اس قدر بکثرت کھائی جائیں کہ پورے طور سے ہضم نہ ہوں (۲) اسی طرح کچا یا کم پکا ہوا گوشت  
بکثرت کھانا (۳) خراب قسم کی ترکاریاں اور فاسد میوے بکثرت کھانا یا دودھ افراط سے پینا (۴) غلط  
الھوام اور چپکا و دار غذاؤں یا خراب پانیوں کا ایک مدت تک استعمال کرنا (۵) اس قسم کی  
خراپیوں سے مدہ اور آنتوں میں کیلوس کا عمدہ تیار نہ ہونا (۶) ہضم کی خرابی سے رطوبات  
پیدا ہو کر آنتوں میں ان کا اس طرح متعفن ہونا کہ اس سے کرم پیدا ہو سکیں (۷) ڈاکڑوں  
نے بیان کیا ہے کہ فاسد غذا اور کچے گوشت اور خراب پانیوں میں ان کے کرموں کے انڈے  
ہوتے ہیں جو آنتوں میں بچکر دیدان کی پیدائش کے موجب ہوں۔

**علامات۔** معاً مستقیم کے اندر کرم ہوں تو (۱) کبھی براز میں بکثرت نکلتے ہیں۔ اور مریض کی مقدس  
خارش اور جلن ہوتی ہے جسکی تکلیف اکثر رات کو یا اجابت کے بعد زیادہ ہوتی ہے کبھی ہمز میں تکرر و دم  
اور سرخی بھی نمودار ہوتی ہے (۲) کبھی ان کرموں کے کاٹے سے معاً مستقیم کی ساحت میں ورم یا زخموں  
تک نوبت پہنچتی ہے۔ اگر مریض بچہ ہو تو رات کو زیادہ روتا اور بے چین رہتا ہے (۳) سنوڑات میں  
اندام بنانی کی خارش اور سیدان رطوبت کبھی ان ہی کرموں کے سبب سے ہوتی ہے۔

**علاج۔** معاً مستقیم کے دیدان کا علاج حقنہ اور شیاف کے ذریعہ سے کرنا بہ نسبت کھلانے یا لاشکی  
چیزوں کے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اسلئے مناسب کرم لہی کے مزاج کا لحاظ رکھکر دواؤں کا استعمال

علیہ دیگر اقسام کے کرموں میں مریض کا لاغر ہونا۔ درد شکم اور متلی منہ سے بدبو آتی۔ رات کو اور صبح کے وقت بے چین ہونا  
سوئے میں دانت چبانا۔ اور منہ سے رال بینی۔ وسط سر میں درد اور کانوں میں سس۔ کبھی تشج اعصاب اور مرع یا خلط  
غفل اور اختلاج تک نوبت پہنچتی ہے۔ اور دیگر عوارض شدید بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ۱۷ مؤلف

کیا جائے۔ چنانچہ گرم مزاج والے کو یہ نسخہ مفید ہوگا (۱) آب کاسنی۔ آب برگ شفتالو۔ آب شاہ توت۔  
 آب خرفہ۔ آب کوکر جھنگرہ بقدر مناسب لیکر حقنہ کریں (۲) کبیلہ ایک ماشہ۔ برگ خنکشا یک انشہ پیکرم  
 سفید ۷ ماشہ میں ملا کر شایات بنائیں اور استعمال کریں (۳) آب برگ لکڑوندہ میں ایلوہ پیکر صماد کرنا بھی مفید ہے  
 (۴) اگر مزاج میں زیادہ گرمی نہ ہو تو یہ حقنہ بہت مفید ہے صفقتہ بالوندہ کللیل الملک۔ درمنہ ترکی۔ برنجی سف  
 افنتین۔ ترمس ہر ایک ۷ ماشہ۔ برگ صداب۔ برگ شفتالو۔ برگ حقنہ ہر ایک ۳۰ تولہ۔ سب کو پانی میں  
 جوش دیکر چھان لیں۔ پھر شحم خنظل ۴ رتی باریک مسکرا اور قدر سے روغن زیتون شامل کر کے حقنہ  
 کریں (۵) شحم خنظل ۴ رتی۔ کبیلہ ایک ماشہ۔ مغز خروٹ ۷ ماشہ باریک پس کر موم زرد میں ملائیں اور  
 شایات بنا کر استعمال کریں (۶) کچلہ۔ آب برگ لکڑوندہ سبز۔ آب برگ کاسنی سبز میں گھسکر صماد کرنا بھی مفید  
 ہے (۷) کواشیا کے فتوح سے حقنہ کرنا بچوں کیلئے نہایت مجرب ہے (۸) اسطیرج۔ روغن خستہ زرد آلو تیلخ میں  
 روئی تر کر کے مقد میں رکھنا بھی فوٹا ہے (۹) ہلیہ کلان ایک عدد۔ زنجبیر مساوی لے کر  
 گندھا ہوا آٹا دونوں پر لپیٹ کر گرم راکھ میں دبا لیں جب آٹا سرخ ہو جائے تو کالک آٹا علیحدہ کریں  
 اور ان دونوں چیزوں میں سے بقدر ایک ایک رتی لے کر پانی میں گھس کر چند روز تک بچہ کو پلانے  
 سے چمنوں کی پیدائش موقوف ہو جاتی ہے۔

**فصل سولہویں** درم المقعد (انفلاص ش آف دی انس) یعنی مقعد کے گرد کی  
 نرم ساختوں میں ورم ہونا۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک گرم مادہ سے اور دوسرا سرد (بلغم یا بوائے)  
 پہلی قسم۔ ورم گرم یہ اکثر واقع ہوتا ہے اسباب (۱) بدن میں خون گرم صفراوی کا غالب ہونا  
 (۲) کھانے پینے میں گرم چیزوں کا استعمال (۳) بواسیری مسول یا ان کے کاٹنے کی اذیت پہنچنا (۴) مقعد  
 میں اشتقاق یا زخم یا خارش کی تکلیف سے اسکی ساخت میں خون کا کثرت جمع ہونا۔

سلہ مقعد کے قریب کی جلد کے نیچے قدس عضلاتی ریشے ہوتے ہیں جو باہر کی طرف بیسج تحت الجلد (سبکیوٹنی ہسٹو) سے اور اندر  
 کی طرف بیسج تحت الغشاء المخاطی (سبکیوٹسٹ) سے ملے رہتے ہیں۔ ان کا نام مجعدہ المقعد (کاؤگٹیر نیائی) ہے ان ریشوں کے  
 سکڑنے سے مقعد کی غشا مخاطی اندر کو چلی جاتی ہے۔ انکے اندر چند غدود ہند (سی بی ٹی) ہوتے ہیں جنکی  
 رطوبت سورخ مقعد کو تر اور چکن رکھتی ہے۔ ان غدود میں ورم ہو کر پکنے سے خراج المقعد (این ایکسچس) ہو جاتا ہے  
 اور اسکے پھوٹنے سے قرصہ المقعد اور قدر کے زیادہ مدت تک مندر نہ ہونے سے ناسور المقعد ہو جاتا ہے۔ ۱۰۱۲۔ لکھ۔

**علامات (۱)** ورم کی جگہ میں گرمی جلن۔ درد شدید ہونا (۲) بدن میں حدت خون کی علامات کا پایا جانا (۳) مزاجی گرمی کے باوجود گرم چیزوں کا پہلے استعمال کرنا (۴) بواسیری سولوں وغیرہ کی تکالیف کا پایا جانا۔  
**علاج (۱)** اگر خون غالب اور زمین فربہ و توانا ہو تو سب سے پہلے فصد باسلیق کھولیں (۲) لعاب بہہ اندہ شیرہ عذاب۔ عرق شامہترہ۔ شربت نیلوفر۔ اسپنول سلم کے ساتھ پلائیٹ (۳) شامہترہ۔ منڈی۔ گل نیلوفر۔ تخم خطی۔ تخم خبازی۔ مکوہ خشک۔ ہر ایک ۷ ماشہ۔ آلو بخارا ۱۵ دانہ رات کو پانی میں بھجوا کر صبح کو کھچا لیں اور شربت عذاب ۲ تولہ حل کر کے پلائیٹ (۴) رسوت۔ صندل سرخ۔ کالی۔ مغز ملتاس۔ بکاسنی سبز۔ آب مکوہ سبز۔ آب کشنیز سبز میں پیس کر اور سفیدی بھیند مرغ روغن گل ملا کر صناد کریں (۵) اگر بواسیری سے یا انشقاق وغیرہ موجود ہوں تو مرہم سفیدہ کا فوری لگانا مفید ہوگا۔ (۶) جب ورم کی گرمی اور جلن کم ہو جائے تو بزرگ چھدر کوٹ کر روغن گل میں کھائیں۔ اور تخم سخی کا آٹا اسی ملا کر لکھائیں (۷) اگر ان تدابیر سے ورم تکمیل نہ ہوا اور پکنے کی علامتیں ظاہر ہوں تو اس کے خوب پکنے سے پہلے شکاف دے کر پیپ کھالیں۔ اور تخم کوچہ داسی کی ملیش باندھیں۔ اور زخم صاف ہونے کے بعد مرہموں کا استعمال کریں۔  
 دوسری قسم۔ ورم سرد۔ یہ بہت کم ہوتا ہے۔

**اسباب (۱)** بدن میں ٹیٹنی فاسد خون کا موجود ہونا (۲) باوی اور قالین چیزوں کا ایک ساتھ تک کثرت استعمال کرنا (۳) گرم اصاار یا خارش وغیرہ کی تکلیف سے معقد کی ساخت میں فاسد مادہ کا جمع ہونا (۴) خون میں سودا ویت یا آتشکی فساد کا موجود ہونا (۵) بواسیری سول میں خون فاسد کا جمع ہونا۔  
**علامات (۱)** اسباب مرض کا پایا جانا (۲) ورم گرم کی علامات کا نہ ہونا (۳) اگر ورم ملنچ ہو تو مقام ماؤف کی زمی اور ڈھیلا پن (۴) اگر ورم سوداوی ہو تو اس میں سختی و کمودت پایا جانا۔ (۵) اگر آتشکی فساد ہو تو اس کی خاص علامات کا موجود ہونا۔

**علاج (۱)** ورم ملنچ کے لئے مرہم صافیت سفیدہ صفتہ گل سرخ۔ گل بابونہ۔ اکلیل الملک۔ تخم کنجہ۔ تخم میٹھی۔ مغز فلوس۔ آب مکوہ سبز میں پیکر روغن گل اضافہ کر کے نیگرم صناد کریں (۲) اگر ورم سوداوی تو یہ نسخہ پلائیٹ صفتہ شامہترہ۔ چرائہ۔ عذاب۔ مکوہ خشک۔ فیتون۔ سفینج۔ فستق۔ بکاؤ زبان۔ رائیو پانی میں بھجوا کر صبح کو کھچا لیں۔ اور گلقد حل کر کے پلائیٹ (۳) مغز فلوس۔ بقیہ۔ تخم خطی۔ تخم کنجہ۔ اکلیل الملک۔ عدس معشر۔ آب مکوہ سبز میں پیس کر روغن گل اضافہ کر کے نیم گرم صناد کریں۔ (۴) زفت رومی

زردی صفینہ مرغ چربی بطہ چربی مرغ روغن گل میں ملا کر صنادک کرنا بھی مفید ہے۔ (۵) مرہم داخلین میں جدوار اصلی۔ ایلوہ۔ زعفران ملا کر صنادک کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے (۶) اگر آتشکی فساد موجود ہو تو اس کا علاج کریں (۷) مرہم کو غذا میں آتش جو کھلانا اور یا دودھ پلانا چاہئے۔

**فصل سترھویں۔ قرحۃ المقعد (السرآف دی اے نس)** یعنی مقعد میں زخم ہو جانا۔ یہ زخم کبھی تو ورم کے پکنے سے یا بواسیری مسوں کے کاٹنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور کبھی انشقاق کی بنا پر سے یا کرم اعمار کے خراش یا کاٹنے سے پیدا ہوتے ہیں

**علامات** (۱) اگر باہر کی طرف ہوں تو دیکھنے میں آتے ہیں (۲) اگر اندر ہوں تو ریم کا بہنا اور درد کا موجود ہونا انکی علامت ہے (۳) آئہ مفتاح المقعد کے ذریعہ سے بھی امتحان کیا جاسکتا ہے

**علاج** (۱) زخم کو برگ نیب اور مکوہ کے جو شانڈہ سے دھو کر مرہم سفیدہ کا فوری لگانا چاہئے (۲) اگر زخم زیادہ گندہ ہو تو صفائی کے لئے اس جو شانڈہ میں قدرے سہاگہ ملا کر مناسب ہے۔ اس کے بعد مرہم کیلہ لگانا چاہئے۔ (۳) اگر زخم زیادہ گہر نہ ہوں اور باہر سے نمودار ہوں تو زخم گل پھری لگا کر سفیدہ کا شغری اور مردار سنگ باریک لپٹا ہوا چھڑک کر نرم گدی سے باندھ دینا کافی ہوتا ہے (۴) مرہم باسلیقون یا مرہم رسل کا استعمال بھی مفید ہے (۵) اگر پینے کی دوا کی ضرورت سمجھی جائے تو مرہم کے مرقع معنیخ کا استعمال کریں (۶) اگر چنپنوں کے کاٹنے سے زخم پیدا ہو گئے ہوں تو ان کے مارنے کی بھی تدبیر کرنی چاہئے جو انکی بحث میں درج ہے (۷) اور غذا لطیف زود ہضم اور مسکن صحت خون کھلائیں۔

**فصل اٹھارھویں۔ فواسیس (فنجولا ان الو۔ یا۔ سانی نس آف دی امینس)** یعنی مقعد کا ناؤ جو اکثر تو عضلہ عاصرة المبرز (اسفٹا ربائی) کے بیچ میں لیکن کبھی اس سے اوپر ہوتا اور جھرہ و کریمہ مقعر (اکی اور کیٹل فاسہ تک پہنچتا ہے۔ اسکو ہندی میں بھگنڈر کہتے ہیں۔ اس کے منہ پر سرخ انگور پائے جاتے ہیں اور پتی رطوبت بہا کرتی ہے یہ ناسور دو قسم کا ہوتا ہے۔

(۱) ناسور نافذ۔ (فنجولا ان الو) جس کا بیرونی سوراخ تو کنارہ مقعد سے ایک یا دوھانچے کے فاصلہ پر لیکن اندرونی سوراخ عضلہ عاصرہ سے اوچا مقعد کی اندرونی بھلی میں ہوتا ہے۔

آئہ مفتاح المقعد کی



تصویر نمبر (۹۷)

(۲) ناسور غیر نافذ (سائیٹس آف دی انس) جسکی دو صورتیں ہوتی ہیں (الف) ظاہر الفم (بلائیٹڈ اسٹریٹل) یعنی بیرونی منہ والا جو کہ صرف باہر کی طرف ہوتا ہے۔ اور اندر مکا تقسیم تک نہیں پہنچتا (ب) باطن الفم (بلائیٹڈ انٹریٹل) یعنی اندرونی منہ والا جس کا رخ اندر کی طرف ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابل جلد میں سرخی اور سختی پائی جاتی ہے۔

**اسباب**۔ زخم مقعد کے اندمال میں خرابی واقع ہونا (۲) خراج المعانی الور کی (اسکی اور کٹل ایسب) کا علاج پورے طور پر سپریمیر ہونا (۳) خون میں ہتھکی زہر یا کسی دوسری قسم کا فساد موجود ہونا (۴) گناہ یہ مرض سل کے ساتھ پایا جاتا ہے۔

**تشخیصی علامات** (۱) اگر ناسور کا سوراخ چوڑا ہے تو قاعدہ کو دریافت کرنا چاہئے کہ اسکے راہ سے کتنے براز خارج ہوتا ہے یا نہیں (۲) اگر سوراخ ایسا ہے کہ سلائی داخل کی جا سکے تو قاعدہ اس میں سلائی داخل کرے اور مقعد میں بائیں ہاتھ کی انگلی۔ اگر سلائی کی نوک انگلی تک پہنچے تو سمجھنا چاہئے کہ ناسور نافذ ہے (۴) اگر مقعد میں دیر اور درد کے ساتھ اس سے ہمیشہ پتلی ریم بہتی ہو اور اس کے باہر کسی طرف سرخی دیکھی جاتی ہو تو سمجھنا چاہئے کہ ناسور مقعد کے اندر ہے (۵) آگہ مفتاح المقعد کے ذریعے بھی اسکو دیکھا جاسکتا ہے **علاج**۔ اگرچہ اس مرض کے علاج میں چند وجوہ سے کامیابی کی توقع نہیں ہوتی ہے مثلاً (۱) زخم کے ہتھکا قریب یا خاص اس کی سطح پر متعین فضلات برازیہ کا ہمیشہ گزرنا (۲) زخم کا ہمیشہ ریم آلودہ رہنا اور پورا طور پر صاف نہ ہو سکا (۳) زخم کے اندر مریم یا کسی دوا کا مشکل سے پہنچنا اور اس کا قائم نہ رہنا۔ (۴) عھن کی ساخت کا نرم اور پھیلنا ہو تا جو کہ مواد فاسدہ سے جلد متاثر ہو سکے (۵) ان وجوہات کے علاوہ عضلہ رافعة الاحست (لیوے ٹرانسپائی) اور عضلہ عاصرة المبرور (سٹرنکٹور انائی) کی حرکت بھی مانع اندمال ہے۔

لیکن پھر بھی مریض کی کٹالین پر نظر کرتے ہوئے علامات سے چشم پوشی کرنا معالج کے لئے جائز نہیں ہے اسلئے تدابیر مندرجہ ذیل اختیار کرنی پڑتی ہیں (۱) اگر ناسور غیر نافذ ہو اور اس کا منہ باہر کو ہو اور اس میں دوا پہنچانا ممکن ہو تو اول اسکو ہاتھ سے دبا کر پیپ کٹالین اور اس جو شانہ سے بذریعہ پکچاری کے دھو کر صاف کریں صفتہ۔ برگ نیپ۔ برگ بھنگرہ۔ مکو خشک۔ شامبرہ۔ گل بالونہ۔ سہاگہ۔ شہد فاہا۔

علاج میں ناکامی کے اسباب

تدابیر معالجہ

نسخہ ثانی عربی

پانی میں پکا کر چھان لیں اور باریک ٹلی کی پچکاری سے زخم کو دھوئیں۔ پھر شیا ف غرب کو باریک پس کر لوب صمغ عربی میں ملائیں اور صاف روئی آلودہ کر کے چاندی کی سلائی سے زخم کے اندر رکھیں۔ صفقتہ۔ ایلوہ مصفی۔ کذر۔ دم الاخوین۔ گلتار۔ سرمہ سیاہ۔ پٹگری۔ ہر ایک ۳۰ ماشہ۔ زنگار دور تی سب کو نہایت باریک پس کر چھان لیں۔ اور گلاب میں گوندھ کر شیا ف بنائیں۔ اور اگر ناسور میں سلائی نہ جاسکے تو مرہض کو اوندھا ل کر اس کے سرین کو اونچا کریں اور شیا ف غرب کو عورت کے دودھ میں گھول کر ناسور کے اندر پیچیں۔ اور کچھ دیر اسے اسی حالت میں رکھیں۔ لیکن یہ عمل باریک ٹلی کی پچکاری سے کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ناسور پر گدی رکھ کر لنگوٹ نہا پی سے ہاندھ دیں۔

نسخہ سوم رسل

(۲) اگر ناسور غیر نافذ کا منہ مقعد کے اندر کو ہو تو ۲۰ ماشہ مفتاح المقعد (سے کیو لم ایٹائی) سے مقعد کو کھول کر مذکورہ بالا عمل کرنا چاہئے۔ اور تدابیر مذکورہ کے علاوہ مرہم رسل کا استعمال بھی مفید ہو تب سے صفقتہ۔ جاؤ شیر۔ زنگار۔ مرکی۔ بہر وزہ خشک۔ سکنج ہر ایک ۲ ماشہ۔ کذر۔ زردا ند طویل ہر ایک ۳ ماشہ۔ مردار سنگ ۴۰ ماشہ۔ سب کو باریک میکس چھان لیں۔ اور گوگل مصفی ۱۵ ماشہ۔ اش ۲ ماشہ۔ علق ۱۵ ماشہ۔ سرکہ خالص ۳ تولہ میں گھول کر چھان لیں۔ پھر موم سفید ۱۵ ماشہ۔ کورون زیت ۲۰ تولہ میں پکھا کر پیلا پیٹی دوائیں ملائیں۔ اور ان کے بعد سرکہ والی دوائیں ڈال کر نرم آنچ سے اس قدر پکائیں کہ مرہم کا توام درست ہو جائے (۳) اگر ناسور نافذ ہو تو اس کا علاج بھی پچکاری اور مرہموں سے مذکورہ بالا طریقہ پر کیا جائے اور یہ مرہم نہایت مفید ہے صفقتہ۔ بارود بندوق کی ۵ تولہ۔ روغن کجد پاؤسیر میں حل کر کے بندر یونی کے ناسیروں پہنچائیں۔ لیکن ان تدابیر سے فائدہ نہ ہونے کی حالت میں بالآخر دستکاری کرنی پڑتی ہے بشرطیکہ زمین کہ امراض گردہ کی شکایت نہ ہو یا وہ سل میں مبتلا نہ ہو کیونکہ ان دو صورتوں میں دستکاری ممنوع ہے۔

نسخہ دستکاری

طریقہ دستکاری

طریقہ دستکاری جب دستکاری منظور ہو تو سب سے پہلے مرہض کی آنتوں کو بذریعہ حقنہ کے صاف کریں پھر اگر ناسور نافذ ہے تو مرہض کو مزید پر لٹا کر بندر یونی کلور و فارم کے بیہوش کریں۔ اور بائیں ہاتھ کی سبابہ انگلی روغن گل میں چکنا کر کے مقعد میں داخل کریں۔ اور گول سر کا ٹیڑھا تشر (پروپ پائینڈ کر وڈ یسٹری)

۱۔ اس عمل کے لئے ایسی چھوٹی سی پچکاری درکار ہوتی ہے جسکی ٹلی ہائپرورمک سرخ کی طرح باریک لیکن گول۔ کی ہوتی ہے۔  
۲۔ مرہم رسل اگر آپ تیار نہ کر سکیں تو ہندوستانی دواخانہ دہلی سے عمدہ مل سکتا ہے ۱۲ مولف۔

ناسور میں باہر سے اسقدر داخل کریں کہ اس کا سر مفقہ کے اندر کی انگلی سے جا لگے۔ پھر نشتر اور انگلی کو نیچے کے ساتھ باہر کی طرف کھینچ کر ناسور کو مفقہ کے بیرونی کنارہ تک چیریں اور ناسور کی سطح کو بھی کھرج کر زخم کو تباہ کریں۔ پھر حبث کا سفیدہ (کلورائیڈ آف زنک) ایک ماشہ لیکر عرق کلاب ایک تولہ میں حل کر کے پھر یہی سے زخم کی تمام سطح پر نکالیں اور اس پر آئینڈ و فارم چھڑکیں۔ اسکے بعد جو پیراغیون (پارفیا) بقدر درجہ اولیٰ موم روغن میں ملا کر شیان بنائیں۔ اور مفقہ میں رکھ کر زخم پر روئی رکھیں اور لنگوٹ ناچی باندھیں۔ یہ پٹی تین دن تک نہ کھولیں۔ اور چار دن تک پانچا نہ مقض رکھیں۔ اسکے بعد زخم کو ہر روز سہاگہ خول (بورلیک لوشن) سے دھو کر بستور آئینڈ و فارم چھڑکیں اور روئی کی گدی رکھ کر باندھ دیا کریں اگر کسی شریان کے کٹ جانے سے جریان خون بہترت ہو تو اسے بند کر نیچے لے برف رکھیں اور پیکلورائیڈ آف آرگن ٹین میں روئی تر کر کے زخم کی تہ میں رکھ کر اسکے اوپر آئینڈ و فارم کی روئی رکھیں۔ اور پٹی باندھ دیں۔ اگر درد کی تکلیف زیادہ ہو تو پوسٹ خشکاش۔ گل سح۔ گل بابونہ۔ مکو خشک۔ برگ نیب پانی میں جوش دیکر اس سے نمکید کریں اور اسی جوشاندہ سے زخم کو دھو کر ہر روز پٹی باندھ دیا کریں۔

اگر ناسور کا منہ باہر کو ہو تو مرہین کو گھٹنوں اور کہنیوں کے رخ اوںڈھا لٹا کر اسکی مفقہ میں بائیں ہاتھ کی سبابہ انگلی داخل کریں اور داہنے ہاتھ سے ناسور میں سلائی داخل کر کے اسکی حد معلوم کریں۔ اگر ناسور گہرا ہو اور سلائی معارضتقیم کے بہت قریب پہنچ گئی ہو تو اسے زور سے دبا کر معارضتقیم کو چھید دیں تاکہ ناسور کا اندرونی سوراخ آنت میں ہو جائے۔ اور اگر ناسور بہت گہرا ہو تو نوک نشتر (شارپ پائینڈ لیٹری) کے ذریعہ سے ناسور کے سوراخ کو معارضتقیم تک پہنچائیں۔ لیکن مفقہ کے اندروالی انگلی پر باریک کپڑا یا (یا اسٹنگ پلاسٹر) لپیٹ لینا چاہئے۔ تاکہ انگلی نشتر کی نوک سے زخمی نہ ہوئے۔ پائے اور مفقہ میں انگلی داخل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ معارضتقیم کا صمیم حصہ زخمی ہونے سے محفوظ رہے۔ اگر ناسور کا منہ اندر کو ہے تو مرہین کی مفقہ کو آگے سے کھول کر ناسور میں چاندی کی سلائی داخل کریں اور

تصویر نمبر ۹  
اس نشتر کی

تیز نوک کا نشتر



تصویر اس سلائی کی



اسکو اندر سے باہر کی طرف اس قدر دبا میں کہ ناسور کے باہر کی جلد ابھر آئے اور سلائی کو حرکت دینے سے جلد میں جنبش ہونے لگے۔ پھر اس بلند مقام کی جلد کو اسکا پیل سے اس قدر کاٹیں کہ سلائی زخم کے راستہ سے باہر نکل آئے۔ اور ناسور نافذ ہو جائے اور ان دونوں دستکار یوں کے بعد زخم کو باندھنے کا طریقہ بالکل وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا ہے۔

**فصل امیسویس** تضیق المقعد (اسٹرکچر آف دی اے نس) یعنی مقعد کا تنگ ہو جانا۔ یہ مرض اکثر عضلہ عامرۃ المبرز (اسفنکٹر اینائی) کے سکڑنے سے ہوتا ہے۔ لیکن کبھی مرض بواسیر کے سبب یا اندمال قرصہ مقعد کے بعد بھی ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اجابت کے وقت تکلیف ہوتی اور فضلہ نکل خارج ہوتا ہے اسباب (۱) صرف عضبی تحریک سے عضلہ عامرۃ المبرز (اسفنکٹر اینائی) کا سکڑ جانا جیسا کہ مرض اختناق الرحم یا صرع کے دورہ کے وقت یا یقین شکم یا فساد عظم کی بعض صورتوں میں ہے یا مرض بواسیر یا بواسیر یا زخم مقعد کی تکلیف سے ہوتا ہے (۲) کبھی قرصہ مقعد کے اندمال کے بعد عضلہ مقعد کی ساخت سکڑ کر سخت ہو جانے سے مقعد کا راستہ نہایت تنگ ہو جاتا ہے (۳) کبھی بواسیر سے پھول کر راستہ کو تنگ کر دیتے ہیں علامات (۱) کسی سبب مرض کا موجود ہونا جیسے عضبی تحریک یا اذیت یا بواسیر سے پھولے ہوئے (۲) سبب مرض کا پہلے ہو چکنا اداس کا اتر باقی رہ جانا جیسے اندمال زخم کے بعد مقامی سختی۔

**علاج (۱)** اگر عضبی تحریک سے مقعد کا عضلہ سکڑ گیا ہو تو اس تکلیف کو دور کرنے کی تدبیر کریں جو کہ اس مرض کا سبب ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ مقامی حس کو کسی قدر کم کرنے کیلئے پوسٹ ختنش اور گل بالونہ گلاب میں جوش دیکر اس سے نمکید کرنا اور روغن ختنش میں موم سفید لگا کر اسکی ماسف کرنا مفید ہے۔ اسی طرح بلا ڈونا کا شیا ف بنا کر مقعد میں رکھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

(۲) اگر اندمال زخم کے بعد مقعد کی ساخت میں سختی پیدا ہو گئی ہو تو روغن بالونہ روغن منرکد روغن ختنش میں حرابی مرعی کی۔ منر ساق لگا کر اسیں قدر سے زعفران ملائیں۔ اور جب درد و تنگ مقعد پر اسکی مائش کریں۔ اسی طرح مریم داخلیوں کا استعمال بھی مفید ہے۔ اگر فائدہ نہ ہو تو مرہن کو بیہوش کر کے انگلیوں یا آلہ مفتاح المقعد سے اس کو اچھی طرح کشادہ کرنا آخری علاج ہے اور اس کے بعد مریم داخلین کے استعمال سے ضرور فائدہ ہو جاتا ہے (۳) اگر بواسیر سے پھولے ہوئے ہیں تو انکا علاج کرنا چاہیئے۔ اس غرض کیلئے گدھے کے سم اور بھینس کے پرلے سنگ کی دھونی دینا مفید ہے۔

اور جھنگ کی ٹکلیہ باندھنے سے بھی درد کو تسکین ہوتی ہے۔ اسی طرح کا فور۔ افیون۔ زعفران۔ بوم۔ روغن میں ملا کر اور اس میں انڈے کی سفیدی شامل کر کے مسوں پر لپیپ کرنا بھی مفید ہے۔

**فصل بیسویں** السندان المقعد (اڑے سیایانی) یعنی مقعد کا بند ہونا۔ ڈاکٹری میں اس کا دوسرا نام کلوزر آف دی اے انس بھی ہے۔ یہ مرض پیدا کئی ہوتا ہے اور اسکی تین صورتیں ہیں۔ ایک کہ مقعد بذریعہ ایک موٹی جھلی کے بند پائی جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ اسجگہ کی جلد خوب جڑی رہتی ہے اور مقعد کے وقت پر ایک سیاہ داغ سا معلوم ہوتا ہے۔ اگر بچہ کے رونے یا کھانسنے کے وقت اسجگہ پر انگلی رکھیں تو انگلی کو اندر سے جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے۔ تیسری یہ کہ مقعد بالکل معدوم ہوتی ہے اور باہر سے اسکا نشان تک محسوس نہیں ہوتا۔ اس حالت میں اس کو اندام المقعد (ایپینڈیکس) سے علاج (۱) اگر مقعد باریک جھلی سے بند ہو تو بچہ کی پیدائش کے وقت فوراً دایہ ہسٹو اپنی انگلی سے بھار کر مقعد کو درست کر سکتی ہے (۲) اگر جھلی موٹی ہو تو اس میں چلیپا شکل کا شکاف دیکر انگلی سے مقعد کو خوب کشادہ کرنا چاہئے۔ اس کے بعد روغن گل میں روئی ترکیہ کے مقعد میں رکھیں (۳) اگر مقعد کے گرد کی جلد خوب جڑی ہوئی ہو تو اسے سب سے سوراخ بالکل بند ہو رہا ہے تو آگہ ہنزلہ (اڑدہن) سے اجمعی طرح سوراخ کر کے آگہ مفتاح المقعد (اے نل ایپے کیولم) کے ذریعہ سے مقعد کے سوراخ کو خوب فراخ کر دیں۔ اور روغن گل میں یا کاربو لکٹائل میں روئی ترکیہ کے وہاں رکھیں تاکہ مزید سوراخ کے کنارے درست ہو جائیں (۴) اگر مقعد بالکل معدوم ہو تو عظم العصعص (اکا کس) کی نوک سے سامنے کی طرف کو ایک پچھلے شکاف دیکر معافیم کے زیریں سے کو سطح تلاش کرنا چاہئے کہ ایک طرف سے تو اندام ہناتی میں انگلی یا سلائی داخل کریں اور دوسری طرف سے زخم کو احتیاط کے ساتھ گہرا کرتے جائیں جب پھری آنت ظاہر ہو جائے تو اس میں سوراخ میں در اگر ہو سکے تو آنت کے اندر کی غشاء مخاطی کو آہستگی سے نیچے کی طرف کھینچ کر دینی جلد کے ساتھ ہی دیر۔

**فصل اکیسویں** الشقاق المقعد افشرس آف دی اے انس (یعنی مقعد میں شقاق ہو جانا) یہ بچہ اور گہرے شقاق ہوتے ہیں جو کبھی تو باہر سے معلوم ہوتے ہیں اور کبھی اندر ہوتے ہیں جو مقعد کو انگلی سے یا آگہ مفتاح المقعد (اے نل ایپے کیولم) سے کھولنے پر معلوم ہو سکتے ہیں۔

**اسباب** (۱) مقعد کے گرد کی زخم ساخت میں گرمی اور خفگی غالب ہونے سے کبھی یہ مرض پیدا

طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ ہاتھ پاؤں چہرہ اور لبوں کی جلد میں خشکی سے تشکاف ہو جاتے ہیں (۲) مفقہ کی گرد کی ساخت میں گرم ورم پیدا ہو جانے سے بھی کبھی یہ مرض ہو جاتا ہے (۳) مفقہ کی رگوں میں خون بکثرت جمع ہونے سے (۴) یا کبھی مرض بواسیر سے بھی یہ تشکاف پیدا ہو جاتے ہیں (۵) خشک فضلہ کے سخت سدوں کے مشعل نکلنے سے بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔

**علامات (۱)** اگر تشکاف باہر ہوں تو اوپر سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اندر ہوں تو مفقہ میں انگلی یا آلہ داخل کر کے دیکھنے پر لمبے تشکاف محسوس ہوتے ہیں (۲) اجابت کے وقت مرہین کو درد کی مقدار تکلیف ہوتی ہے کہ وہ درد کے خون سے حتی المقدور اجابت کو روکنے پر مجبور ہو جاتا ہے (۳) اسلئے مرہین کو اکثر قبح شکم کی شکایت رہتی ہے (۴) خشک فضلہ کے ساتھ قدرے خون نکلا ہوا آتا ہے۔ اور اجابت کے بعد کچھ دیر تک مرہین کو سخت درد کی سی تکلیف ہوتی ہے (۵) مفقہ میں گرمی اور خشکی یا ورم گرم یا وہاں کی رگوں میں کثرت خون کی علامات کا موجود ہونا۔ (۶) مرض بواسیر کا موجود ہونا (۷) فحش شدید و فضلہ کے سخت سدوں کا برآمد ہونا۔


**علاج (۱)** اگر صرف گرمی و خشکی سے یہ مرض ہوا ہو تو اس قیر و طی کا لگانا مفید ہے صفیہ موم سفید چنی ہر ایک ۷ ماشہ۔ روغن گل ۲ تولہ میں لکھا کر آمیں سفیدہ کا شغری۔ مردارنگ ہر ایک ۷ ماشہ۔ نشاستہ گندم کثیر۔ چکی کا غبار۔ ہر ایک ۵ ماشہ نہایت باریک پیس کر ملائیں اور لعاب اسپنول۔ لعاب بیدانہ ہر ایک ۴ ماشہ کا تیار کر کے اس میں سیسہ کے درتے سے خوب حل کریں۔ مرغن اور سرد تر غذا میں کھلائیں۔ (۲) اگر صفر کا غلبہ ہو یا گرم ورم ہو تو سرد منفعی پلا کر مطبوخ ہلیہ سے تقیہ صفر کا کریں (۳) اگر مقامی رگوں میں خون کی کثرت ہو تو علاوہ تدبیر مذکور کے فصد بھی مفید ہے اور شیرہ مغز تخم کدوے شیرین شیرہ تخم خرفہ۔ لعاب بیدانہ عرق مصفی خون۔ شربت نیلوفر یا شربت غلاب حل کر کے پلائیں (۴) اگر بواسیر یا قبح شکم کے سبب سے مرض پیدا ہوا ہے تو اس کا علاج کریں (۵) تسکین درد کے لئے روغن گل میں موم سفیدہ مغز ساق لکھا لکھائیں اور سفیدہ کا شغری۔ مردارنگ۔ زفت سب کو باکوبہ پیس کر ملائیں اور لکھائیں۔ اگر موضع ماؤف سے خون جاری ہو تو اسے روکنے کے لئے یازن مہینہ صفیہ۔ مار و سبز۔ برگ آس۔ گلنار۔ گل سرخ۔ پوست انار جو اسرہ۔ مائیں پانی میں جوش دیکر صاف کریں۔ اور اس میں مرہین کو بٹھائیں۔

**فصل بالیسویں**۔ استرخاء المقعد (پہلے رلے سس آن دی لے نش) یعنی مقعد کا ڈھیلا ہونا  
یہ مرض فی الواقع اس عضلہ کا ڈھیلا ہو جانے سے جو کہ مقعد کے دہانہ پر محیط ہے۔ اس میں مرضی ریح  
ریح اور نقل کو حسب معمول روک نہیں سکتا۔

**اسباب** (۱) جو سچھے کہ مقعد کے گرد والے عضلہ میں آتے ہیں ان میں سے کوئی کبھی کسی چوٹ  
وغیرہ کے سبب سے کٹ یا ٹوٹ جائے (۲) بلواسیر کے کاٹنے سے عضلہ مذکور کو اذیت پہنچے اور وہ سخت  
ہو کر ڈھیلا ہو جائے (۳) بیرونی سردی اور تری کے اثر سے یا بلغم کے غلبہ سے عضلہ مذکورہ کی ساخت  
ڈھیلی ہو جائے (۴) یا عضلہ مذکورہ میں ورم بلغمی پیدا ہو کر اسکی ساخت کو ڈھیلا کر دے۔

**علامات** (۱) چوٹ وغیرہ یا قطع بلواسیر کے بعد اس مرض کا دفعتاً پیدا ہونا ان کے سبب ہونے کی علامت  
ہے۔ (۲) اگر سردی اور تری کی جگہ مدت تک بیٹھنے کا یا پانی میں رہنے کا اتفاق پڑے تو سمجھنا چاہئے کہ  
خارجی اثر سے مرض پیدا ہوا ہے (۳) اگر مقام باؤف کے عضلہ میں بلغم کے نفوذ کرنے سے مرض پیدا ہوا ہو  
تو غلبہ بلغم کی علامتیں پائی جائیں گی (۴) اگر ورم بلغمی اس مرض کا سبب ہو تو ورم کی علامتیں موجود ہوں گی  
**علاج** (۱) اگر سچھے کے ٹوٹنے یا کٹنے سے یا قطع بلواسیر کے بعد مرض ہوا ہو تو لا علاج ہے (۲) اگر خارجی  
سردی کا اثر سبب ہوا ہو تو مقعد اور پشت کے زیریں مہروں کے موقع پر گرم روغنوں کی مالش مفید ہوتی  
ہے جیسا کہ روغن قسط تلخ میں جذبید ستر امد فرغیون ملا کر سینے سے یا روغن مصطکی کی مالش سے فائدہ  
ہو تا ہے۔ (۳) اگر غلبہ بلغم کے سبب ہو تو پہلے اس کے مسخبات پیدا کر تنقیہ کرنا چاہئے۔ اس کے بعد گرم  
اور قلیں چیزوں کے جو شاذہ سے آہرن کرنا مفید ہے۔ جیسا کہ بالچھر قسط تلخ جو زلسر و تخم سویہ  
اکلیل الملک وغیرہ۔ اور آہرن کے بعد روغن مصطکی کی مالش مفید ہے (۴) اگر ورم مقعد اس کا سبب  
ہو تو ورم کا علاج کرنا چاہئے۔ جیسا کہ اس کے بیان میں مذکور ہے۔

**فصل تیسویں** خروج المقعد (پروکپسلیائی) یعنی مقعد کا باہر نکل آنا۔ اس مرض  
میں معاصر ستقیم کے زیریں حصہ کی اندرونی غشا و مخاطی (میوسک ممبرین) ڈھیلی ہو کر اپنے موقع سے علیحدہ  
ہو کر چپٹ دار سرخ نانبجی رنگ کے گول پھلے کی طرح مقعد سے باہر نکل آتی ہے جس سے مرضی کو سخت  
لکھٹ ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ مقعد میں پھنس کر مردار پڑ جاتی ہے۔ یہ مرض اکثر بلغمی مزاج والے  
لے مقعد کے گرد والے عضلہ (عاصق الملبرنی) میں سچھے جو تھے عصب عجزی سے اور ضفیہ عجزیہ کے آہرن میں



ضعیف بچوں کو یا بہت تا تو اس ہمارے کو قبض شکم کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور کبھی مثانہ کی پتھری کے دباؤ سے یا مقعد کے ورم شدید سے بھی ہوتا ہے۔

**اسباب (۱) ورم مقعد (۲) قبض شدید اور زور سے کوٹھنا با عرصہ تک اسہال میں مبتلا**


رہنا (۳) ضعف عضلات اور ناتوانی (۴) استرخا مقعد (۵) مثانہ کی پتھری کا دباؤ۔

**علامات۔** اسباب مرض کا موجود ہونا۔ اور ہر ایک سبب کی متعلقہ علامات کا پایا جانا۔

**علاج** دو طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کو اندر چڑھانا اور دوسرے اسی تدابیر کرنا جن سے آئندہ کی پیش بندی کرنا۔

**چنانچہ** اس کے چڑھانے کی ترکیب یہ ہے کہ روغن گل مقعد پر لگا کر گلناز، مازو، پوست انار اقا قیا، ریشہ برگد، صدف سوختہ، بھنگری، سرمہ سب کو نہایت باریک پیس کر اسے چھڑکیں اور اعلیٰ کا

اندر چڑھائیں اور گدی رکھ کر لنگوٹ ناچی سے باندھیں (تصویر نمبر ۱) لنگوٹ نامکائی (دارمیٹ کی)



اگر مقعد زیادہ بھٹی ہوئی ہو اور چڑھانا مشکل ہو، تو روغن گل سے مقعد کو چکنا کریں۔ اور اپنی انگلی چکنا کر کے اندر داخل کریں۔ انگلی کے ساتھ وہ بھی اندر کو چڑھ جائیگی۔ اگر انگلی ہوئی مقعد میں زخم ہو گئے ہوں تو اس کو روغن گل سے چکنا کر کے اس پر سمان گلاب

مردار سنگ باریک لپا ہوا لگا کر چڑھانا چاہئے۔ اس کے بعد مرہین کی ٹانگوں کو دراز کر کے بہتر پر

چت لٹائیں۔ اگر ضرورت ہو تو اسٹینڈ پلاسٹر کی ایک جانب سے دوسری جانب کے سرین تک

چپکائے رکھیں، اور ایسی لطیف غذا دیں جس میں فضلہ کم ہو۔ اور اجابت کی حاجت کم پڑے

لیکن قبض کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اگر مرہین چت بلٹے رہنے کی حالت میں اجابت سے فارغ

ہو تو بہتر ہے۔ اور اجابت کے بعد اگر مقعد نکل آئے تو پھر اسے بدستور چڑھا کر قاضی دواؤں

مثلاً گلاب اور بھنگری کی کچکاری کرنا بھی مفید ہے۔

اسکے بعد وہ تدابیر کریں جن سے آئندہ کے لئے مرض کا احتمال نہ رہے چنانچہ (۱) اگر ورم مقعد اس کا سبب ہو تو وہ تدابیر کریں جن کا بیان سولھویں فصل میں ہو چکا ہے۔ اور ایسے موقعہ پر یہ آئینہ تحلیل ورم اور سنگین درد کے لئے معین ہوتا ہے۔ تخم اسی۔ شلغم۔ برگ کرنب پانی میں جوش دیکر صاف کریں۔ اور اس میں بیمار کو بٹھائیں۔ اسطرح ردغن بالونہ۔ روغن شبت۔ موم سفید کی قیر و طیبت کر لگانے سے نرمی پیدا ہو کر مقعد اندر کوداغل ہو سکیگی (۲) اگر قنغم اس مرض کا سبب ہو تو اسے رفع کر نیکیے لئے طینات کا استعمال کریں۔ اور اگر کثرت اسہال سے ضعف اعصاب ہو گیا ہو تو مقوی اعصاب ایٹ کھلائیں (۳) اسی طرح ضعف عضلات کی حالت میں بھی مقوی اشیاء کا استعمال ضروری ہے۔ استرخاء مقعد کا علاج اس کے بیان میں درج ہے اور اس کے لئے قلعن چیزوں کے جو شانہ سے استغنا کرنا بھی ہے جیسا کہ شاہ بلوط۔ گنار۔ برگ آس۔ مازوسنہ۔ گلاب زیرہ وغیرہ۔ (۵) اگر مثانہ کی پتھری کے سبب سے یہ مرض ہوا ہو تو اس کا علاج کرنا چاہئے۔

**فصل چوبیسویں حکۃ المقعد** (پرورائی لٹس اینائی) یعنی مقعد میں غارش معلوم ہونا اس میں مرتضیٰ اس قدر بے چین رہتا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی۔ ہر وقت کھانے سے یا موقعہ سرخ ہو جاتی ہے اور یا ورم ہونے تک ٹوٹ پھٹتی ہے۔ اور کبھی زیادہ کھانے سے زخم ہو جاتے ہیں یہ مرض اکثر بوڑھوں کو یا حاملہ عورتوں کو حمل کے آخری زمانہ میں یا بچوں کو آنسوؤں کے چمنوں سے ہوتا ہے۔ اور کبھی بواکیر ہونے سے کچھ پہلے پایا جاتا ہے۔

**اسباب** (۱) مقعد کی رگوں میں خون کے ساتھ ملغم شور یا صفرا کا جمع ہونا جیسا کہ بوڑھوں یا حاملہ عورتوں کو ہوتا ہے (۲) ان رگوں میں فاسد خون کا جمع ہونا جیسا کہ بواکیر سے پہلے ہوتا ہے (۳) ان رگوں میں ملغم ترش کا جمع ہونا جیسا کہ بدھنچی کے مرض میں مبتلا رہنے والوں کو اکثر ہوتا ہے (۴) چمنوں کا پایا جانا جیسا کہ اکثر بچوں کو ہوتا ہے۔

**علامات** جس سبب سے یہ مرض پیدا ہوا ہو، اس کی علامتیں موجود ہوتی ہیں۔ اور سبب مرض کا پایا جانا سب سے بڑی علامت ہے۔

**علاج** جس خلط کا غلبہ ثابت ہو اس کا تنقیہ حسب قاعدہ کریں مثلاً اگر ملغم شور یا صفرا کا غلبہ ہو تو گل بنفشہ۔ عناب۔ بادیان۔ آلو بخارا۔ مکر سندی۔ تخم بنارسی۔ گیل نیلوفر۔ کاؤزباں کا نفور۔

حذر و زنگ ہلا کر سناو کی۔ مخرالمتاس۔ رتجین۔ ریشخشت سے متقیہ کریں۔ بوترھوں کے لئے دھڑی  
بر سینکیاں لگوانا بھی مفید ہے۔ اور اگر غلط سوداوی کا غلبہ ہو تو مطبوخ افیمون پلائیں۔ اگر  
بدبھنی کے سبب سے ہو تو قوت ہاضمہ کو قوی کریں۔ اگر حمینوں کے سبب سے ہو تو انکے کھانے کی  
تذہیر کریں۔ تمام اقسام میں مرلین کو قبض نہ ہونے دیں۔ اسلئے دوسرے تیسرے دن لکھاہل دیا  
جلئے اور غذا ہلکی زود ہضم اور کم تنگ ہونی چاہئے۔ جیسے گرم مصلحہ نہ ہو۔

**مجرّب نسخے** (۱) اگر حمینوں کے سبب سے خارش ہو تو اولیہ کالیپ کرنا۔ یا زرد آلو کی گٹھلی کے مخرکا  
روغن لگانا مفید ہے (۲) کلورافارم چربی میں ملا کر لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے (۳) متبا کو ۶ ماشہ دو  
سیرابی میں جوش دیکر اس سے آبدست کرنا ہر قسم کی خارش کے لئے نافذ ہے (۴) سہاگہ ماشہ روغن  
بادام ۲ تولہ عرق گلاب یا دوسرے ملا کر آبدست لیں۔ حاملہ کی خارش کے لئے مفید ہے (۵) کروسیلی منٹ  
پم گرین۔ ہائیڈروسیانک سیڈ ڈائلیوٹ ۲ ڈرام۔ عرق گلاب ۸ اولس۔ سب کو ملا کر لگائیں۔

**فصل چکیپیوس**۔ بواسیس (پائلز۔ یا۔ ہیمرائڈس) بھجھوٹے چھوٹے مسے ہیں جو کہ مقعد کے  
گرد کبھی تو اس کے باہر اور کبھی اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سوزش تناؤ۔ درد۔ دم۔ جلیع خون  
کبھی کم پائے جاتے ہیں۔ کبھی مسے اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیشہ مقعد کے گرد لٹکے رہتے ہیں۔

**مسوں کی ساخت**۔ بواسیری سے اگر اندرونی ہوں تو ان کے ظاہری حصہ میں لعابی جھلی اور  
اس کے نیچے کی ساخت ہوتی ہے۔ اور اگر بیرونی ہوں تو جلد اور اسکے نیچے کی ساخت ہوتی ہے  
لیکن دونوں کے اندر اور وہ باسوریہ ریمپورائڈل وینز کی آختری شاخیں پھیلی ہوئی (ویری کئی)  
حالت میں پائی جاتی ہیں۔

ان وریڈوں کے اندر جب اجتماع خون شروع ہوتا ہے تو اول ان کی ساخت پھیلنے لگتی ہے  
پھر دم پیدا ہو کر مسے بنتے ہیں۔ اس حالت میں مسے نرم ہوتے اور دبائے سے دب جاتے ہیں ان  
میں خون زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی مسہ کاٹا جائے تو اس کے اندر خانے خون سے  
نظر آتے ہیں۔ جو کہ پھیلی ہوئی وریڈوں سے بنتے ہیں۔ اسکے بعد مسوں میں سوزش پیدا ہو جاتی  
ہے اور ان کے اندر کی دریدی ساخت موٹی ہو جاتی ہے۔ ان کے خالوں میں کارٹھا خون بھر جاتا

سہ سینکیاں لگوانے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ استلاء بدئی کے موقع پر اول تغیر کرنا چاہئے ۱۲ مولفہ۔

اگر اس حالت میں مہ کاٹ جائے تو اس کے اندر سفنج کے سے خانے خون سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن بیرونی مسوں میں خون بہت ہی کم ہوتا ہے۔

اسباب (۱) یہ مرض اکثر موروثی ہوتا اور بڑھاپے میں اکثر حمل کرتا ہے۔ لیکن کبھی جوانوں کو بھی ۱۸ سال سے ۲۰ سال کی عمر تک ہوتا ہے (۲) اس مرض میں عورتیں بہ نسبت مردوں کے کم مبتلا ہوتی ہیں خصوصاً زمانہ گل میں جو فغانہ کی دریدوں پر دباؤ پرٹنے سے یا احتباس طمث کی حالت میں فساد خون کے سبب سے یہ مرض ہو جاتا ہے (۳) گرم ملکوں میں نرم بستر کے زیادہ استعمال سے اور کثرت شراب خوری یا ریاضت کم کرنے سے پیدا ہوتا ہے (۴) سخت جگہ پر مدت تک بیٹھنا یا گھوڑے کی سواری بکثرت کرنا اور حد سے زیادہ ریاضت کرنا (۵) فعل جگر کا خراب ہونا مقن شکم کی دائمی شکایت۔ اجابت میں اکثر خشک سداوں کا کھانا (۶) معاشقہ میں خراش پیدا کر نیوالی چیزوں کا کثرت استعمال کرنا۔ جیسا کہ تیز شایف یا قوی مہل یا مرج سرخ کی کثرت (۷) ان کے علاوہ تمام وہ امور جن سے بدن میں خون غلیظ سوداوی کا غلبہ ہو اور مقصد کی طرف دوران خون زیادہ ہو کر اس کی رگوں میں خون بکثرت جمع رہنے لگے۔

مسوں کے اقسام جلے وقوع کے اعتبار سے دو ہیں (۱) بیرونی (۲) اندرونی۔ پھر انہیں سے ہر ایک قسم باعتبار سیلان خون کے دو قسموں پر منقسم ہے (۱) جس سے کبھی خون بہا کرتا ہو (۲) جس سے کبھی خون نہ نکلتا ہو۔ پھر ان میں سے ہر ایک قسم باعتبار شکل کے سات قسم کی ہوتی ہے (۱) معتد کے کنارے متوزم ہو کر ہر طرف سے پھولی جائیں اور قدرے مواد فاسدان میں سے رستا رہے (۲) انہیں شاخیں اور جڑیں ہوں اور ان کو خلی کہتے ہیں (۳) مے گول اور چوڑے مثل، اندہ انکور کے ہوں ان کو عنبی کہتے ہیں (۴) مشابہ انجیر کے ہو اسکو تینی کہتے ہیں (۵) چھوٹے اور سخت ہوں انکو ان لہی کہتے ہیں (۶) لمبے اور سخت ہوں جیسے چھوڑا کی گنگلی اسکو تہی کہتے ہیں (۷) لمبے اور نرم ہوں مثل دانہ شادوت کے اس کو توتی کہتے ہیں۔

یاد رکھو کہ ان اقسام میں سے نغلی نہایت خراب ہے۔ اسکے بعد تینی اسکے بعد عنبی جس کا سر نیچے یا پیچے کو مائل ہو۔ اب ہم ان اقسام میں سے اندرونی اور بیرونی کا بیان جداگانہ درج ذیل کرتے ہیں

نغلی۔ اگر کسی ورید کا کوئی خاص حصہ جتماع خون کے سبب بھیل جائے تو اس حالت کو ویری کوڑ میں کہتے ہیں انکو



**قسم اول** بولاسیر بیرونی (کسٹرن سمیورائڈس) یہ سے مقعد کے کناروں سے باہر پیدا ہوتے ہیں اور انکے نیچے کی ساخت سے مندرجہ ہوتے ہیں۔ انکا رنگ سیاہ اور ہوتا ہے جیسا کہ بکثرت صلیب خون ہوتا ہے تو بہت بڑھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات سخت اور سختی نرم ہوتے ہیں لیکن جو سے کنارہ مقعد کے قریب ہوتے ہیں انکا بیرونی نصف حصہ تو صلب سے لیکن اندرونی نصف حصہ عشاوی می سے پوشیدہ ہوتا ہے۔

**عوارض** (۱) جب تک یہ سے چھوٹے رہتے ہیں اس وقت تک مریض کو زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی (۲) لیکن کبھی قدرے خارش ہوتی ہے۔ اور مقعد کو ملنے یا کھانسنے سے اچکے سرخی اور طبع پیدا ہوتی اور گلے کیسی قدر خارش بھی ہو جاتی ہے۔ (۳) مقعد کی ساخت میں تناؤ اور بوجھ محسوس ہوتا ہے جسکی وجہ سے مریض فکر مند رہتا ہے (۴) پھر التهاب شروع ہوتا ہے اور ٹیس کا سادرو معاً مستقیم اور سین اور سرین تک پھیلتا ہے۔ مریض کو چلنے پھرنے اور دیر تک بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے (۵) چند روز کے بعد سے بڑے ہو کر سخت ہو جاتے ہیں۔ جو دبائے سے چک نہیں سکتے۔ کیونکہ امین خون بھر کر بہت گاڑھا یا منجمد ہو جاتا ہے (۶) پھر مسوں کے دباؤ اور تناؤ سے مقعد انکے باہر کو نکل آتی ہے (۷) اگر سے کنارہ مقعد کے قریب ہوں تو ان سے کبھی خون بھی نکلتا ہے (۸) اور کبھی ریم پیدا ہونے تک نوبت پہنچتی ہے۔

**قسم دوسری** بولاسیر اندرونی (انٹرنل سمیورائڈس) یہ سے کنارہ مقعد پر یا اس سے اندر کی طرف ہوتے ہیں۔ اور اکثر دو قسم کے دیکھے جاتے ہیں۔

(۱) لمبوترے جو معاً مستقیم کے اندر ایک یا دو انچ تک گہے چلے جاتے ہیں۔ اکثر یہ سخت پکڑاؤں کی طرح چوری جڑوں کے ہوتے ہیں اور انکا رنگ بھورا یا سیاہ ہوتا ہے۔ اسنے درمیان میں عشاوی می کی چینٹیاں پائی جاتی ہیں۔ اور انکی شکل پھیلی نما ہوتی ہے جس کا منہ اوپر کو ہوتا ہے۔ ان سے فضلہ نکلتا ہے (۲) گول چوڑی جڑوں کے مقعد میں نیچے کو لگے رہتے ہیں۔ انکی سطح چکنی اور اسے باریک رگوں کا مال ہوتا ہے۔ انکا رنگ سیاہ یا نیلگوں ہوتا ہے۔ گاہے ان میں زخم ہو جاتے ہیں۔

**عوارض** (۱) مقعد میں گرمی علین۔ کبھی جھین معلوم ہوتی ہے (۲) معاً مستقیم کے اندر تناؤ اور بوجھ سا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی غیر جنس اندر اٹکی ہوئی ہے (۳) اجابت کے وقت مریض کو تکلیف ہوتی ہے اسنے رفع حاجت سے ڈرتا ہے (۴) قبض ٹکم کی شکایت رہتی اور فضلہ اکثر خشک خارج ہوتا ہے (۵) ہر مرتبہ اخراج فضلہ کے لئے کونھنے سے یا خشک فضلہ کی رگڑ سے آنت پھلکا کر ترچیش ہوتی ہے

(۶) کبھی سخت سداہ خطہ وقت زور کرنے سے مقدمات باہر نکل آتی ہے یا مچھلیکھ خون جاری ہو جاتا ہے۔  
 (۷) معائنہ مستقیم کے اندر کی لعابی جھلی (میوکس ممبرین) متورم ہو جاتی یا ڈھیلی ہو کر باہر نکل آتی ہے (۸) مسوں  
 میں درد شدید ہو نیکی علاوہ کم گاہ اور غجز اور سیون کی جگہ سے خاصہ اور شرم گاہ اور رانوں تک درد کی تکلیف  
 پہنچتی ہے (۹) مریض کے کپڑے خراب رہتے اور قریبی اعضا میں خراش پیدا ہوتی ہے (۱۰) بواسیری  
 خون جاری ہونے سے پہلے مریض کو مقدمات اور اسکے قرب وجوار میں تناؤ کا سادرو اور بوجھ معلوم ہوتا  
 ہے (۱۱) جریان خون کبھی دورہ کے ساتھ اور کبھی ہر روز ہوتا ہے۔ لیکن جب دورہ ہوتا ہے تو اکثر تین  
 چار دن کے بعد سیلان خون بند ہو جاتا ہے (۱۲) اگر سیلان خون بکثرت ہو تو مریض کمزور ہو جاتا ہے اور  
 کئی خون کی علامات ظاہر ہوتی ہیں (۱۳) گاہے بواسیری جریان خون بعض طہمت کے ہوتا اور اس کا  
 رنگ سرخ ہوتا ہے (۱۴) خون بند ہونے کے بعد بعض مریضوں کے مسوں سے پانی بہتا ہے۔  
 (۱۵) کبھی بواسیری سے پک کر ان میں زخم یا ناسور ہو جاتے ہیں (۱۶) کبھی بواسیری مسوں کے درم  
 کا دباؤ مثانہ پر پڑنے سے پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔

انجام۔ اس مرض کا انجام تین صورتوں میں ہوتا ہے (۱) اگر بواسیر اندرونی تازہ ہو اور عمدہ تدابیر  
 میرا آئیں تو مے بیجھ جاتے اور بالکل معدوم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر مرض پرانا ہو اور مسوں میں التهاب  
 پیدا ہوتے تک نوبت آگئی ہو اور مے بیرونی ہوں تو عمدہ تدابیر سے انکی افزائش موقوف ہو کر وہ خشک  
 ہو جاتے اور مقدمات کے گرد نکلے رہتے ہیں۔ (۲) کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مے بیرونی ہوں  
 تو وہ سخت ہو کر اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں (۳) کبھی مسوں میں درم ہو کر پیپ پڑ جاتی اور زخم  
 ہو جاتے ہیں۔ یا ناسور ہو کر مدت تک بہتے رہتے ہیں۔

تشخیص۔ پیش کے خون اور بواسیری خون میں یہ فرق ہے کہ پیش کا خون اکثر کم مقدار اور  
 فضلہ میں ملا ہوا اور زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن بواسیری خون اکثر زیادہ مقدار میں اور فضلہ پر لگا ہوا اور  
 سرخ رنگ ہوتا ہے اسکے علاوہ مقدمات انگلی داخل کر کے مسوں کا وجود معلوم ہو سکتا ہے۔  
 علاج۔ مرض کی بالکل ابتدائی حالت میں جبکہ مقدمات کی طرف دوران خون میں زیادتی ہونے  
 سے مقدمات جلن یا غارش اور وہاں کی رگوں میں تناؤ محسوس ہونا شروع ہو اور قبض  
 شکم کی اکثر شکایت رہنے لگے صرف ایسی تدابیر کافی ہوتی ہیں جن سے بدن میں خون عمدہ پیدا ہو

نکاح

اور خون کا موجودہ فساد رفع ہو جائے۔ نیز تلیئیں بھی ہوتی رہے۔ اس غرض کے لئے یہ گولیاں مفید ہیں صفتہ۔ مقل ایک تولہ کو گندنا سبر کے پانی میں ایک رات ڈال سمجھو رکھیں۔ پھر اسے مل کر چھان لیں اور پوست ہللیہ زرد پوست ہللیہ کابلی۔ پوست ہللیہ۔ پوست ہللیہ سیاہ۔ آملہ خشک۔ جدا جدا کوٹ کر ہر ایک تولہ لیکر سب کو مقل مذکور میں ملائیں اور چنے کے برابر گولیاں بنا کر ان میں سے ۹ گولیاں خلوصعدہ کے وقت کھلائیں۔ اسی طرح اطریفیل مقل اور اطریفیل شہترہ رات کو سوتے وقت کھانا بھی مفید ہے۔ اگر مزاج گرم ہو تو یہ نسخہ بھی مفید ہوتا ہے صفتہ لعاب سہدانہ ۳ ماشہ۔ شیرہ عناب ۵ دانہ۔ عرق شہترہ ۵ تولہ۔ عرق شیرہ تولہ۔ شربت نیلوفر ۲ تولہ۔ اسپنزل سلم، ماشہ کے ساتھ پلائیں اور غذا میں کدو سفید۔ خرفہ پالک توری وغیرہ سرد ترکاریاں بکری کے گوشت میں یا بلا گوشت کے کھلائیں۔ اگر مزاج میں گرمی زیادہ نہ ہو تو موی کی ترکاری مفید ہے اور بکری کا۔ ادھ گوشت اور چوزہ مرغ کھلانے میں بھی مفید نہیں ہے پر سہنر۔ بگین۔ اروی۔ آلو۔ کدو مرغ۔ گوچی۔ گوشت گاؤں مچلی۔ دال مسور۔ ساگ میٹھی۔ تیز نک مرچ اور تمام ترشیاں۔ نفاق اور قابض خیریں ترش اور بادی میوے سخت مضرب ہیں۔ اس طرح زیادہ چٹنے پھرنے اور بکثرت کھڑے رہنے یا سخت فرزش پر زیادہ بیٹھنے اور گھوڑے کی سواری سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے جب مرض کی تکالیف ظاہر ہونے لگیں اور مے پیدا ہونے شروع ہو گئے ہوں تو مذکورہ بالا تمام تدابیر کے علاوہ ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں جن سے مسوں کی طرف دوران خون میں کمی ہونے لگے۔ اور ان کا بڑھنا موقوف ہو جائے۔ اس غرض کے لئے (۱) یہ دھونی مفید ہے صفتہ۔ برگ آس۔ کلاہ بادنجان۔ جوزا سرو۔ مرکبی۔ تخم حنظل۔ پوست بیخ کبر سانب کی کنچلی۔ گوگل ہر ایک بقدر مناسب لیکر نیکو قوتہ کریں اور دسٹے کی میٹگنیاں ایک گڑھے میں جلائیں جب دھواں موقوف ہو جائے تو ایک کوندٹے میں سوراخ کر کے اس پر اٹا دھکتے اور آگ پر وہ دوائیں ڈال کر مرین کو ایک کرسی پر اس طرح بٹھائیں کہ دھواں مسواں پر پہنچتا رہے (۲) یہ مناد بھی مجرب ہے صفتہ۔ پوست انار۔ کندر۔ جفت بلوط۔ جوزا سرو۔ سب کو نیم لوندہ کر کے انگور کے پانی میں پکھائیں۔ پھر کھل میں نہایت باریک پیس کر رکھ چھوڑیں۔ اور ضرورت کے وقت اس میں سے حذرے لے کر پانی میں گھولیں اور نیم گرم کر کے بویسیری مسوں پر صفا کریں (۳) اسی طرح بارہ نگھا پانی میں گھس کر صفا کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے (۴) اگر مزاج گرم ہونے لگے

کی چھانچھ کے اوپر کا صاف اور مقطر پانی شربت نیلوفر کے ساتھ چند روز تک پلانے سے مرض کی زیادتی رک جاتی ہے لیکن جب سوں میں بواسیری خون جمع ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے اور سستے پھول کر انہیں تناؤ اور مٹس یا چھین کا درد پیدا ہو کر ان میں سے خون جاری ہونے کے دو لے پڑنے لگیں تو شدت درد کے وقت سب پہلے ایسی دوائیں لگائی جائیں جن سے درمیں تسکین ہو اور سستے نرم ہو کر ان کا تناؤ موقوف ہو جائے۔ اس غرض کے لئے (۱) یہ صمد نہایت مجرب ہے صفتہ۔ پوست سرخ نیب کا باریک گھسا ہوا ۳ تولہ۔ سہاگہ چوکیہ ۶ ماشہ۔ گائے کا مکھن ۵ تولہ سب کو ملا کر صناد کریں (۲) مرہم سفیدہ کا شغری بھی فائدہ کرتا ہے صفتہ۔ موم سفیدہ ۶ ماشہ۔ روغن گل ۲ تولہ میں گچھلا کر اس میں سفیدہ کا شغری ایک تولہ ملائیں اور اس میں سے قدرے لیکر مسوں پر لگائیں (۳) پیاز کو گائے کے گھی میں پکا کر نیگم مسوں پر باندھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے (۴) برگ کرب کو خوب پکائیں جب گل جائے تو اس میں روغن گل۔ سفیدی بھینہ مرغ اور قدرے افیون ملا کر صناد کرنے سے درد فوراً ساکن ہوتا ہے (۵) اونٹ کی چربی ۳ تولہ مرغی کی چربی ۳ تولہ گچھلا کر اس میں پیاز کتری ہوئی ۲ تولہ پکائیں اور سلاراس (سید سائلہ) ۹ ماشہ۔ مقل ایک تولہ۔ افیون ۳ ماشہ ملائیں۔ پھر اکلیل الملک۔ تخم خطمی۔ تخم اسی۔ ہر ایک ایک تولہ نہایت باریک پیس کر ملائیں آخر میں انڈے کی زردی ۳ عدد ملا کر لوہے کے دستے سے اس قدر گھوٹیں کہ سب یک ذات ہو کر مثل مرہم کے ہو جائے۔ اس کا صناد کرنے سے بواسیر کا درد موقوف ہو جاتا اور مسوں کا خون بھی نکل جاتا ہے (۶) ان تدابیر کے علاوہ رفع قبض شکم کے لئے پیئنے کا یہ نسخہ بھی دینا چاہئے۔

صفتہ۔ معجون مقل ۵ ماشہ۔ لعاب ریشہ خطمی ۵ ماشہ۔ شیرہ بادیان ۵ ماشہ۔ عرق مکوہ۔ ۱ تولہ۔ شربت نقشبہ ۲ تولہ۔ اسجندی سلم ۷ ماشہ۔ (۷) اسی طرح یہ نسخہ بھی رفع قبض شکم کے لئے بہت مفید ہے

صفتہ۔ گل منڈہ۔ گل سرخ۔ تخم خطمی۔ ریشہ خطمی۔ بادیان۔ ہر ایک ۷ ماشہ۔ گاوڑیاں ۵ ماشہ سب کو شام کے وقت پانی میں بھجوا کر صبح کو مل کر چھان لیں اور نہات سفیدہ سے شیریں کر کے حب رسوت مرکب ایک عدد کے ہمراہ پلائیں دہا نسخہ حب رسوت کا یہ ہے صفتہ۔ رسوت خالص کھنہ سفید۔ ہر ایک ایک تولہ باریک پیس کر لعاب اسچنول مسلم میں ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں (۹) مسوں پر شکم پر میوہ دین کا طلاء کرنا بھی بہت جلد ان کو خشک و تحلیل کر دیتا ہے

اگر بوا سیری مسول میں سے خون سرخ و صاف و رقیق بکثرت جاری ہو اور بیمار نہایت ضعیف ہو جائے تو خون کو روکنے والی چیزیں استعمال کرنی چاہئیں۔ اس غرض کے لئے بھون متل ۵ ماشہ۔ لعاب ریشہ خطمی ۵ ماشہ۔ شیرہ حب لاس۔ شیرہ بخ انجبار ہر ایک ۳ ماشہ شرب خشک ۲ تولہ۔ تخم بارتنگ ۳ ماشہ چھپرک پلائی (۲) اگر مزاج گرم ہو تو پینے کے نسخہ میں لعاب بہدانہ شیرہ تخم خرفہ۔ شیرہ تخم کاہو شیرہ کشنیر خشک۔ ہر ایک ۳ ماشہ۔ عرق گذر عرق گاؤزباں ہر ایک ۵ تولہ۔ شربت انار ۲ تولہ۔ اسپغول مسلم ۵ ماشہ دینا چاہئے (۳) یہ گولیاں بھی مفید ہیں۔

صفقتہ۔ گل ارمنی ۲ تولہ۔ باریک پس کر اکب برگ بھنگہ سیاہ میں گوندھ کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ان میں سے ایک گولی صبح اور ایک شام تازہ پانی کے ساتھ کھلائیں (۴) **حب متل** بھی خون بوا سیری بند کرنے میں عجیب تاثیر میں صفقتہ۔ پوست ہلیہ کا بلی۔ آملہ خشک۔ پوست ہلیہ۔ گل ارمنی۔ گیرو۔ سنگوحت۔ دم الاخوین۔ سندروس۔ صمغ عربی۔ ماند سبز ہر ایک ۶ ماشہ۔ سب کو باریک پس کر چھان لیں۔ اور منتر تخم نبیب۔ منتر تخم بکان۔ مقل مصفی ہر ایک ایک تولہ کو آب گندنا سبز میں پس کر مذکورہ بالا دوائیں ملا کر پینے کے برابر گولیاں بنائیں۔ ان میں سے ۳ گولیاں صبح اور ۳ شام کو تازہ پانی کے ساتھ کھلائیں (۵)۔

**ایضاً**۔ ہلیہ سیاہ۔ پوست ہلیہ کا بلی۔ پوست ہلیہ۔ آملہ خشک۔ مقل مصفی ہر ایک ۳ ماشہ۔ مرجان۔ کہر۔ با۔ صدف سوختہ ہر ایک ۳ ماشہ۔ مقل کولہا روں کے پانی میں گھول کر چھان لیں اور باقی دوائیں کوٹ چھان کر اس میں ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ انہیں سے ۳ ماشہ گولیاں لے کر تازہ پانی کے ساتھ کھلائیں (۶) خون بند ہونے کے بعد ان دوائوں کے جو شاذہ سے آبدست کرائیں یا اکبرن میں بٹھائیں صفقتہ۔ پوست انار۔ حب لاس۔ تخم گل سرخ۔ مازو سبز۔ افاقیا۔ اس سے بوا سیری مسول میں دوبارہ خون کم جمع ہوتا ہے (۷) اسی طرح یہ دھونی بھی مسول کے خشک کرنے میں قوی اثر رکھتی ہے صفقتہ۔ سیج کیر۔ تخم اسپند۔ کندر۔ مقل ریشہ

سلہ یا درگھو کہ اگر بوا سیری خون سیاہ اور گٹھا ٹھانکے اور بیمار زیادہ ضعیف تو اس کے بند کرنے میں جلدی نہ کرنی چاہئے۔ کیونکہ خون طمث کی طرح اس کے نکلنے سے بھی مرہق اکثر امراض سوداوی سے محفوظ رہتا ہے

جسک کہ ماخو لسیا خفقان و جج الورک دہ گردہ در درجم سرد دوار طلعت بھر ۲ مؤلف

علک اہل سب کو بقدر مناسب لے کر نیکو فتنہ کریں اور حسب دستور دھونی دیں (۸) ان تدابیر کے علاوہ معجون خبث الحدید اور سفوف فولاد بھی اس مرض کے لئے خاص دواؤں میں سے ہیں جو ہندوستانی دواخانہ دہلی سے عمدہ ملتی ہیں (۹) اگر اسہال بواسیری ہوں تو یہ نسخہ معجون کا بہت مفید ہے۔  
 صفتہ - کھرباگل - ارمنی ہر ایک ۶ ماشہ - اتیس - نشاستہ بریاں - حب آلاس - کشمیر خشک بریاں -  
 بخ انجبار - طراشیت - زبرہ سفید (جو کہ سرکہ میں تر کر کے سکھا لیا گیا ہو) مغز بیل - ناگ موٹھ -  
 رال ہر ایک ایک تولہ - طباشیر ۲ تولہ - سب کو باریک کوٹ چھان کر شربت حب آلاس ۵۰ تولہ  
 میں ملا کر معجون تیار کریں - مقدار خوراک ۶ ماشہ سے ایک تولہ تک ہے - عرق بادیان میں شربت  
 انجبار حل کر کے اس کے ساتھ کھلائیں (۱۰) اگر ان تدابیر سے فائدہ نہ ہو یا تکالیف مرض سے  
 دائمی نجات پانے کی امید پر مرہین کی خواہش ہو کہ بواسیری مسوں کو عمل جراحی سے کاٹ  
 دیا جائے تو اول اسے ان خطرات سے آگاہ کرنا چاہئے جو اس عمل سے اکثر پیش آتے ہیں پھر  
 اگر وہ رضا مندی ظاہر کرے تو دستکاری کی جائے۔

شرائط دستکاری (۱) مرہین کا قوی ہونا (۲) مسوں میں التهاب ہونا (۳) مسوں کی  
 تکلیف سے معائنہ مستقیم اور دیگر احتیاء میں اجتماع خون یا التهاب نہ پایا جانا - کیونکہ اگر مرہین  
 کمزور ہو یا مسوں میں التهاب موجود ہو یا معائنہ مستقیم اور نزدیک دملے دیگر احتیاء میں التهاب  
 پایا جائے تو دستکاری ہرگز جائز نہیں ہے (۴) جب شرائط مذکورہ بالا کی رو سے دستکاری  
 جائز نہ ہو تو اس سے ایک دن پہلے روغن بید بخیر سے تلین کرائیں (۵) اور دستکاری سے ایک  
 گھنٹہ پہلے بذریعہ حقن کے آنتوں کو صاف کریں (۶) اگر مے اندرونی ہوں تو دستکاری سے  
 نصف گھنٹہ پہلے بیمار کی مفقہ کو گرم پانی کا بھارا دس تاکہ مے ظاہر ہو جائیں اور نرم ہو جائیں  
 (۷) بقراط نے وصیت کی ہے کہ بواسیر کے سب مسوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے - بلکہ ان میں

۱۔ نسخہ معجون خبث الحدید - عود خام - ناگ موٹھ - سوٹھ - مرچ سیاہ - اجوان اُنڈر کی ہر ایک ۶ ماشہ  
 ہلید سیاہ - ہلید کابی - آملہ خشک ہر ایک ۱ تولہ - خبث الحدید (جو کہ سرکہ میں ایک سہفتہ تک تر کر کھسکا لیا گیا ہو)  
 ۲۔ تولہ سب کو باریک کوٹ چھان کر اس شہد میں جس میں آٹے جوش دے گئے ہوں یا آملہ ربی کے شیرہ قائم  
 میں ملا کر معجون تیار کریں - مقدار خوراک ۶ ماشہ سے ایک تولہ تک ہے ۱۲ مؤلف

سے ایک کو بدستور چھوڑ دینا چاہیے تاکہ دستکاری کے بعد جو بواسیری مادہ وہاں آئے وہ اس باقی مسہ کے ذریعہ سے نکلتا رہے۔

**دستکاری کے طریقے** (۱) مسوں کا جلا دینا۔ اگر مسے اندرونی ہوں اور زیادہ ابھرے ہوئے ہوں یا ان پر زخم پر موجود ہوں تو بذریعہ تیزاب کے اس طرح جلا دیا جاتا ہے کہ آلہ منقح المقعد سے مقعد کو پھیلا کر مسوں پر ستورہ کا تیزاب پھیری سے اس قدر لگائیں کہ وہ خوب جل جائیں۔ پھر کاربونیٹ آف پوٹاش کے عرق سے بذریعہ پجکاری کے خوب دھو کر آلہ کو نکال لیں اور بیمار کو تاکید کریں کہ آرام سے بستر پر لیٹا رہے۔

(۲) مسوں کا باندھنا۔ اگر مسے اندرونی ہوں تو پہلے بھپارہ و بکیران کو نرم کر لیا جائے اور بیمار کو تاکید کریں کہ زور سے کو تھخے۔ جب مسے باہر نکل آئیں تو بیمار کو بائیں کر دٹ پر لٹا کر سب سے بڑے سے کو حلقہ دار فارسیس میں بکڑیں اور قدرے باہر کو کھینچیں اور بندش کے تانگے لگیجے خوب کس کر باندھ دیں۔ اس دستکاری سے بیمار کو تکلیف تو ہوتی ہے لیکن مسے چند روز میں خشک ہو جاتے ہیں (۳) مسوں کو تراشنا۔ اگر مسے بیرونی ہوں تو آلہ سے پکڑ کر مفرض سے کاٹ ڈالیں اور زخم میں ٹانکے بھکا کر اوپر سے آئیوڈو فارم چھڑک کر بندش کر دیں۔ اگر جریان خون زیادہ ہو تو سرد پانی کی گدی رکھیں۔ اگر اس سے بند نہ ہو تو اس جگہ کو کاسٹک سے جلائیں۔

**خطرات** (۱) مسوں کو تیزاب سے جلانے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ تیزاب مسوں پر سے بہہ نہ جائے۔ کیونکہ مسوں پر تیزاب لگنے سے بیمار کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر تیزاب کا ایک قطرہ بھی معاصر مستقیم کی اندرونی جھلی کی سطح پر لگ جاتا ہے تو جلن کی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اور التهاب یا ورم شدید تک نوبت پہنچتی ہے (۲) مسوں کو باندھتے یا کاٹنے میں یہ اندیشہ ہے کہ شدت تکلیف کے سبب سے عصمو ماؤف کی طرف دوران خون تیز ہو کر سرخ بادہ (اپری سلپس) نہ ہو جائے (۳) اسی طرح زخم کا اندمال نہ ہونے سے مرض نواسیر تک بھی نوبت پہنچتی ہے۔

# مقالہ چہارم

## امراض پستان

اس مقالہ میں چند فضلیں ہیں اور ہر ایک فصل میں پستان کے ایک مرض کا مفصل بیان مع اسباب و علامات اور علاج کے درج کیا گیا ہے۔

**فصل پہلی عظم الشدحی (اٹپر ٹرونی آن وی مییری)** یعنی پستان کا معمولی مقدار پر بڑا ہو جانا۔ یہ ایسا جی عیب ہے کہ سینہ پر ناواجبی گرانی اور بدنمانی کے علاوہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی پستان میں دودھ کی پیدائش ضرورت سے بہت کم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسی حالت میں دودھ کی پیدائش کا مادہ بھی پستان کی پرورش میں خرچ ہونے لگتا ہے اور دودھ کی نالیوں پر غیر معمولی دباؤ پڑنے سے دودھ کا اخراج بھی کم ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے خاص پستان کی طرف دوران خون زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت ان میں چربی دار مادہ یا کسی دوسری قسم کی ساخت زیادہ پیدا ہو کر انکی جسامت غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح فربہ کی حالت میں بھی اور تمام اعضا کی طرح پستان موٹے ہو جایا کرتے ہیں۔ بعض مستورات میں خاندانی اثر سے ایسا ہوتا ہے۔

**اسباب (۱)** خاص پستان پر کسی چیز کی مالش سے یا ان کے ٹکے رہنے سے انکی طرف دوران خون کا زیادہ ہو جانا (۲) خون میں بلغمیت اور چربی دار مادہ کی زیادتی سے عام بدن کی فربہ (۳) خاندانی اثر یا ملکی آب و ہوا کی تاثیر۔

**علامات**۔ اگر دوران خون کی زیادتی سے ہو تو اس کے اسباب کا وجود اور پستان کی سرخی وغیرہ علامات موجود ہوں گی (۲) خون میں بلغمیت اور چربی دار مادہ کی زیادتی تمام مزاجی علامات سے ظاہر ہو سکتی ہے (۳) خاندانی اثر دریافت حالات سے معلوم ہو سکتا ہے۔

**علاج**۔ حمام کے استعمال سے ونیز انکو دبانے اور زیادہ چھونے سے قطعی پرہیز کرنا چاہئے اور ایسا



لباس پہننا چاہئے جس سے پستانوں کو سہارا پہنچے اور انکا لٹکاؤ موقوف ہو جائے اور اگر دورانِ جنین کی زیادتی اس کا باعث ہوئی ہو تو (۱) کھریا مٹی۔ مازوسبز ہر ایک ۶ ماشہ۔ سفید ازیر۔ بزرالینج ہر ایک ۳ ماشہ۔ ان سب چیزوں کو پس کر سرکہ خالص میں ملا کر لپک کریں (۲) انار ترش کے پتے اور اندرونی زرد گوڑے اور بھولوں اور چھال ہر ایک ۲ تولہ کو ۶۰ تولہ پانی میں آٹھ پہر تک بھلور رکھیں اور بھولوں کو جوش دے، جب چوتھائی پانی باقی رہ جائے تو اس میں کرٹوا سیل ۵ تولہ ملا کر نرم آگ پر رکھیں اور جب دیکھیں کہ پانی بالکل جل کر صرف تیل باقی رہ گیا ہے اس وقت اس تیل کو ٹھنڈا کر کے حقائق سے رکھیں اور وقتاً فوقتاً اس تیل کو پستانوں پر لگایا کریں (۳) مازوسبز ۶ ماشہ۔ تخم مٹر ہندی پوست انار ہر ایک ۳ ماشہ۔ شکر سرخ ۲ تولہ۔ سان سب کو کوٹ پس کر ایک ایک تولہ اس میں سے لیکر صبح شام کھانا کھانے سے پہلے تازہ پانی کے ساتھ بھانک لیا کریں۔ اور اگر عام بدن کی فربہی کے ساتھ پستان بڑھ گئے ہوں تو ایسی صورت میں مناسب ہے کہ (۱) روزانہ کچھ نہ کچھ درزش کرنی چاہئے (۲) بدن کو موٹا کرنے والی اشیاء کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہئے (۳) زیرہ سیاہ پیکر کرک میں ملا کر پستانوں پر لپک کرنا چاہئے (۴) بادیان ناخواد۔ زیرہ سیاہ۔ سداب ہر ایک ایک تولہ لک معقول ۶ ماشہ۔ مرزنجوش۔ بوبہ ارمنی ہر ایک ۲ ماشہ۔ ان سب چیزوں کو کوٹ کر سفوف تیار کریں اور صبح و شام تازہ پانی کے ساتھ بھانک لیا کریں۔

**فصل دوسری صغیر الشد ہی (اٹرونی آف دی میمری گلیٹ)** یعنی پستان کا معمول سے جھپٹا ہونا ظاہر ہے کہ جس سنواں میں اس ضروری عضو کا حسب معمول مناسب مقدار تک بڑا ہونا قدرتی فعل ہے۔ اور اس کا معمولی حالت سے بہت جھپٹا ہونا اکثر دودھ کی کمی یا فساد کا موجب ہو کر پردیش والا دیں ایک حد تک خلل انداز ہونے کے لحاظ سے ضرور اس قابل ہے کہ اسباب تلاش کئے جائیں۔ اور حتی المقدور ان کے دفعیہ کی تدابیر عمل میں لائی جائیں۔

**اسباب (۱)** کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پستان کی قوت جاذبہ (غذا کو جذب کرنی والی قوت) کسی مرض کے سبب سے ضعیف ہو جاتی ہے۔ اسلئے پستان کی ساخت کو اپنی پردیش کیلئے بقدر کافی خون نہیں ملتا ہے (۲) کبھی ان رگوں میں غلطی سدہ پڑھاتا ہے۔ جن کے ذریعہ سے پستان کی طرف خون (پردیشی مادہ) آیا کرتا ہے۔ اسلئے پستان میں بقدر کافی خون نہیں پہنچ سکتا ہے (۳) کبھی کثرتِ تحلیل یا

استقرافات کے سبب عام بدن میں لاغری ہوتی ہے اور اسکے ساتھ ہی پستان بھی لاغر ہو جاتی ہے (۴) کبھی مزاج بدن میں خشکی غالب ہونے اور خندا خون کے سبب سے بدنی پردریش میں خلل ہوتا ہے اسلئے پستان بھی چھوٹے رہ جاتے ہیں (۵) مثلاً ذوالا دریا بھی ہوتا ہے کہ اعضا و تولید میں پیدائشی نقص موجود ہونے سے یا کسی فعل اختیاری کے سبب سے یا اقتصائے سن کی وجہ سے وہ اعضا بالکل بیکار ہو جائیں تو اس حالت میں بھی پستان چھوٹی ہوتی ہیں۔

**علامات۔** ایسی علامتیں تلاش کرنی چاہئیں جن سے کہ سبب مرض کا پتہ چل سکے مثلاً (۱) اگر پستان کی قوتہ جاذبہ کسی سبب سے ضعیف ہو گئی ہو تو اسکی علامتیں موجود ہوں گی (۲) رگوں میں سدہ ڈالنے والے خلط کی علامتیں ظاہر ہونگی (۳) کثرت تخلل کے اسباب یا استقرافات کے پہلے واقع ہونا دریافت کرنے سے معلوم ہو سکے گا (۴) مزاجی خشکی اور خندا خون کی علامتیں گواہی دیں گی دھشت و دیگر لوازمات بلوغ کے معدوم ہونے سے اعضا و تولید کا پیدائشی نقصان معلوم ہو سکتا ہے اسلئے فعل اختیاری کا معلوم کرنا اور عمر بھی گواہ ہوتے ہیں۔

**علاج۔** اگر پستانوں کی قوت جاذبہ کی کمزوری اس کا باعث ہوئی ہے تو ایسی حالت میں (۱) اخراطین خشک اور چونک خشک دونوں کو باریک پیس کر روغن قسط میں ملا کر ملا کریں (۲) گج پیل قسط۔ سنگند۔ ان تینوں چیزوں کو ہوزن لیکر باریک پیس لیں۔ اور روغن بابونہ میں ملا کر ملا کریں اگر پستان کی رگوں میں خلط غلیظ چپکا و دار بلغم سے سدہ پڑ گیا ہو تو (۱) بادیان۔ تخم کنوٹ۔ پوٹلی میں باناھ کر ہر ایک ۵ ماشہ۔ برنجاسف۔ دارچینی ہر ایک ۳ ماشہ۔ ان سب چیزوں کو رات کو گرم پانی میں بھگو رکھیں۔ اور صبح کو قدرے گرم کر کے خمیرہ بنقشہ تم تولہ ملا کر پلائیں (۳) سولفت۔ گلیل اللہ۔ تخم خطمی۔ تخم کرنب۔ تخم سویہ۔ جننتین۔ انجیر۔ مرکی۔ ان سب چیزوں کو ہوزن لے کر پانی میں پیسیں اور روغن قسط میں ملا کر پستانوں پر نیگرم ضاد کریں۔

اگر عام بدن کی لاغری کی وجہ سے پستان معمول سے چھوٹے ہوں تو اسوقت (۱) بدن کو ٹھنڈا کرنے لے مرغن و شیریں غذائیں کھائیں (۲) ایسی تدابیر سے قطعی پرہیز رکھیں جو بدن کو دہلا کر نہ والی ہیں (۳) مغز بادام۔ کثیرا۔ نشاستہ۔ شکر سفید ہوزن لے کر کوٹ لیں اور سفوف طیار کریں۔ اور اس میں سے ایک تولہ صبح اور ایک تولہ شام بکری یا بھیڑ کے تازہ دودھ کے ساتھ کھائیں

(۴) بھینس کی چربی اور ہاتھی کی چربی دونوں کو سموزن لیکر گرم کر کے انکے ساتھ چند روز تک نستانوں پر مالش کریں (۵) یہ روغن بنا کر استعمال کریں صفقتہ بیخ بنفتہ ۶ ماشہ مغزیہ ۷ مغز چروچی ۸ مغز مینہ دانہ ۹ مغز بادام شیریں ۱۰ ہر ایک ۹ ماشہ ۱۱ مغز فندق ۱۲ مغز انجلیک ۱۳ مغز تربوز ہر ایک ایک تولہ ۱۴ مغز حلچوزہ ۱۵ مغز حب لقرظ ۱۶ مغز تخم حیارین ۱۷ مغز تخم کدو ۱۸ شیریں ۱۹ کثیر ہر ایک ۲۰ تولہ ۲۱ چوب صینی ۲۲ تولہ ۲۳ موم کا فوری ۱۲ تولہ ۲۴ کشتیز تازہ ۲۵ تولہ ۲۶ ان سب چیزوں سے حسب دستور روغن تیار کریں اور خوب گرم پانی سے نہانے کے بعد یہ تیل سارے بدن پر خصوصاً نستانوں پر خوب ملیں لیکن نہانے کے بعد بدن کو سرد ہوا سے بچائیں۔ اور یہ روغن مل کر دھوپ میں کچھ دیر تک بیٹھے رہیں اور بدن کو اور نستانوں کو خوب ملے رہیں۔ اگر مزاجی خشکی کے سبب سے نستان چھوڑ دیں تو کبھی دودھ کا استعمال زیادہ کر لیں۔ مرہضہ کو آرام دیں اور گرم اشیا کے کھلانے سے بالکل پرہیز کر لیں۔ اور شیرہ مغز بادام شیریں ۵ دانہ ۶ شیرہ مغز تخم کدو شیریں ۷ شیرہ مغز تخم تربوز ہر ایک ۸ ماشہ ۹ عرق شیریں ۱۲ تولہ میں نکال کر شربت بنفتہ ۲ تولہ ملا کر صبح و شام پلائیں۔ اور بھڑک کی چربی ۱۰ بھڑک کی چربی ۱۱ اور مغز ساق گاؤ ۱۲ موم سفید باہم ملا کر آگ پر گرم کر کے نستانوں پر ملیں اگر اعضاء تولید میں پیدائشی نقصان یا مقصنائے عمر اس مرض کا موجب ہو تو لا علاج ہے۔

**فصل تیسری۔** استرخاء البندی (ری لکشن آف میا) یعنی نستان کی ساخت کا دھیلنا ہو جانا۔ اگرچہ نستان کی ساخت کا اکثر حصہ غدودی نرم گوشت سے بنا ہے لیکن اسکے اجزاء کا زیادہ دھیلنا اور کست ہو جانا جس فصلی مادہ سے ہوتا ہے وہ دودھ کی پیدائش میں کچھ نہ کچھ ضرور اثر کرتا ہے اسلئے اس کا تدارک ضرور کرنا چاہئے۔

**اسباب (۱) مزاج میں لبنی رطوبات کی زیادتی (۲) ریاضت بالکل بکھرنا (۳) نستان کی گواں اور اس کی ساخت کا خون اور دودھ سے خالی ہونا۔ چنانچہ بعض اوقات جب عورت زیادہ دودھ پلاتی ہے یا خون کی کمی سے دودھ کم پیدا ہوتا ہے۔ تو بھی نستانوں کی ساخت ڈھیلی ہو جاتی ہے (۴) کبھی حمام کا زیادہ استعمال بھی اس سببیت کا باعث ہوتا ہے**

**علامات (۱) تمام بدن کا موٹا اور ڈھیلنا اور بادی سے پھولا ہوا ہونا (۲) کثرت بلغم کی دیگر علامات (۳) یہ صناد بھی مفید ہے۔ گج پیل۔ سچ۔ قسط نخ۔ اسکند ہر ایک ۶ ماشہ پانی میں باریک میکس صناد کریں ۱۲ انبوت**

موجود ہونا (۳) ہر طرح سے آرام طلبی اختیار کرنا اور مدت سے ریاضت اور کام کاج کا چھوڑ بیٹھنا۔  
(۴) گرم پانی سے نہانے اور گرم حمام میں غسل کرنے کا بکثرت اتفاق پڑتا۔

علاج۔ ان سب صورتوں میں (۱) منفعیہ بلغم پلا کر باقاعدہ سہل دیں (۲) مازوسبز گلتا رہ پوسٹ انار کر مازج حقت بلوط۔ افاقیا۔ ہر ایک ۷ مائٹہ لیکر ان سب کو سرکہ خالص میں باریک پیکر پستانوں پر مناد کریں (۳) معمولی حالتوں میں صرف بہ بھی کافی ہوتا ہے کہ سرکہ میں کپڑا کر کے ہر وقت پستانوں پر پیٹے رہیں (۴) ریاضت کرنا اور حمام میں جانے سے پرہیز کرنا۔ روغن مصطلکی ملنا فائدہ کرتا ہے (۵) ایسی غذائیں بالکل نہ کھلائیں جن سے بلغم اور فضلی رطوبات کی زیادتی ہو (۶) ایسا لباس پہنیں جس سے پستان کو سہارا ملے تاکہ ہر وقت انکے ٹکے رہنے سے شکایت زیادہ نہ ہونے پائے (۷) غذائیں اسی چیزیں دینی چاہئیں جو رطوبت کو چوسنے والی اور خشک ہوں۔

**فصل چوتھی** حساس اللہین (ڈی کمپوزیشن، اینڈری مولی کیولائی ٹریشن آؤف ملک) یعنی دودھ کا خراب ہونا۔ یاد دودھ کی پیدائشی ترکیب میں اسکے کمیائی اجزاء کا معمولی نسبت پر موجود ہونا جس سے دودھ اچھی طرح بچہ کی پرورش کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسے دودھ کا قوام یا تو معمولی حالت سے پتلا یا بہت گاڑھا یا مختلف القوام ہوتا ہے یا اس کے رنگ اور ذائقہ میں کوئی خاص تغیر پایا جاتا ہے یا اس میں کوئی خاص قسم کی غیر معمولی بو پائی جاتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دودھ میں کچھ بظاہر کوئی نقص محسوس نہیں ہوتا۔ پھر بھی وہ بچہ کو بخوبی سہتم نہیں ہو سکتا۔ بچہ دودھ زیادہ ڈالتا یا اسے دست بکثرت آتے ہیں۔ یا بعض شکم و کثرت ریاح و نفخ شکم وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے یا اس کے قسم کی شکایات میں سے کوئی بھی ظاہر نہ ہونے کے باوجود اسکی پرورش بدنی بخوبی نہیں ہوتی ہے بچہ فربہ نہیں ہوتا۔ روز بروز لاغر و ناتوان ہوتا جاتا ہے۔

**اسباب (۱) تمام بدن کے یا صرف پستانوں کے مزاج میں حرارت معمول سے زیادہ بڑھ جانا** (۲) ان کے مزاج میں سردی کی زیادتی ہونا اور اسکی وجہ سے خون کو اچھی طرح نفیج دے کر دودھ نہ بنا سکا (۳) مزاج میں رطوبت کی کثرت ہونا۔ اور اسی وجہ سے خون میں بعض فضلات کا موجود رہنا۔ اور پستان کا انگہ پھیل نہ کر سکا (۴) پستانوں کے مزاج میں خشکی زیادہ ہونا اور اسی وجہ سے دودھ نہ بنا سکا یہ مناد بھی مفید ہے جو مقشر۔ مائیں۔ پوسٹ انار نہایت باریک پیکر دودھ میں گھول کر چند روز تک لپ کریں تاکہ

کے بعض ضروری اور قابل پرورش اجزاء کا خشک و تحلیل ہو جانا (۵) بدن کی مزاجی خرابی سے یا خراب غذاؤں کے استعمال سے خراب خون کا پیدا ہونا (۱) اس میں صفراء یا سودا یا لیم کا غلبہ ہونا سمیرا اس خون کا عمدہ دودھ کی صورت حاصل نہ کر سکا۔ (۶) پستان میں دودھ کا بکثرت پیدا ہونا بھی اسکے ذاتی فساد کا باعث ہو سکتا ہے جبکہ پستان کی قوت دودھ کے مادہ (خون) کو عمدہ دودھ کی صورت میں لانے سے عاجز ہو جائے۔ عورت کا بعض ایسی بیماریوں میں مبتلا ہونا کہ جو ماہرین کے مزاج کو خراب کر دیں جیسے استقاء اور برص عام اور فالج وغیرہ (۸) عورت کے بدن میں تشکی فساد یا خنازیری مادہ۔ یا کسی دوسرے شدید مرض جیسے (ٹوبرکیولوسس) کی استقاء یا جانا۔

(۹) اسباب مذکورہ کے علاوہ بعض دوا میں ایسی ہوتی ہیں۔ جن کے اجزاء خون کے ذریعہ سے دودھ میں شامل ہوتے۔ اور اسکی ذاتی ترکیب کو بدل دیتے ہیں۔ چنانچہ لہسن۔ ہینگ۔ کباب چینی۔ روغن تالین وغیرہ کے اجزاء دودھ میں شامل ہو کر اس کو اسقدر بد ذائقہ اور بدبودار کر دیتے ہیں۔ کہ اکثر بچے اس کو نفرت کے سبب سے نہیں پیتے ہیں۔ اسی طرح نکلیں اشیاء اور نمک بکثرت کھانے سے دودھ میں نمک کے اجزاء زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور ترش چیزوں کے بکثرت استعمال کرنے اور تیرالوں کے استعمال سے دودھ میں تیرابی اجزاء شامل ہو کر بچہ کو چیش ہو جاتی ہے۔ افیون اور لوہے کے مرکبات کے استعمال سے بچہ کو تھن شکم کی شکایت ہوتی ہے۔ اور سنا، مکی، رجلا پا، سموتیا، ریونڈ چینی۔ روغن بیدانجیر کے اجزاء دودھ میں شامل ہو کر بچہ کو اسہال آنے کے موجب ہوتے ہیں۔

علامات (الف) غلبہ حرارت اور خشکی کی حالت میں (۱) پستانوں کا حجم بڑا ہوتا ہے (۲) دودھ کی مقدار نہایت کم ہوتی ہے (۳) دودھ معمولی حالت سے زیادہ گرم اور گاڑھا ہوتا ہے (۴) اس میں سفیدی پوری طرح نمایاں نہیں ہوتی ہے۔

(ب) سردی اور تری کی حالت میں (۱) پستانوں کا حجم بڑا ہوتا ہے (۲) دودھ کی مقدار زیادہ اور اس کا قوام اکثر بتلا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی غلبہ سردی کی وجہ سے قوام گاڑھا بھی ہوتا ہے (۳) اسکے علاوہ عام طور پر سردی اور تری کی علامات مزاج میں پائی جاتی ہیں (۴) گرم خشک اشیاء کے استعمال سے شکایت میں تخفیف معلوم ہوتی ہے۔

(ج) پانچویں اور چھٹی صورت کی علامات ظاہر ہیں۔ اور آسانی سے معلوم کی جاسکتی ہیں۔

(۵) اگر عورت کے بدن میں ہنٹکی فساد یا کسی دوسرے مفسد مرض کی استقامت پائی جائے تو ان امراض کے متعلق علامات اور فساد خون کے دیگر لوازمات پائے جائیں گے۔ ان علامات کے علاوہ ہر قسم کے فاسد اور خراب دودھ کی بڑھی علامت یہ ہے کہ فاسد دودھ کے پینے والے بچہ کی صحت خراب حالت میں ہوتی ہے۔ دودھ مضیم نہیں ہوتا ہے۔ اور نفخ شکم یا اسہال یا قبض یا در شکم وغیرہ تکالیف میں اکثر مبتلا رہتا ہے۔ اور کبھی یہ عوارض بھی نہیں پائے جاتے۔ لیکن بچہ لاغر اور ضعیف ہوتا ہے۔ اگر بچہ کا علاج کیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جب دودھ کی اصلاح کی جائے تو بچہ کی حالت درست ہونے لگتی ہے۔

علاج جب تک دودھ کی اصلاح نہ کی جائے اس وقت تک ایسی عورت کا دودھ بچہ کو پلانا ہرگز نہیں چاہئے۔ فاسد دودھ کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ (۱) اگر مزاج میں خشکی غالب ہو تو شیر و عنب ۵ دانہ شیر و مغز تخم کدو شیریں شیر و مغز تخم تربوز۔ لعاب بہدانہ ہر ایک ۳ ماشہ۔ عرق گاؤں زباب ۱۰ تولیں لکال کر شربت بنفشہ ۲ تولہ ملا کر صبح و شام پلائیں (۲) پیاس کے وقت کبھی کبھی عرق گاؤں زباب خرق کیڑہ میں شربت سیب شیریں یا شربت نیو فر یا شربت بنفشہ ملا کر پلائیں (۳) گرمی خشکی یا بچہ پر کرنے والی اشیاء سے قطعی پرہیز کر لیں (۴) امرود۔ انگور۔ سیب۔ ناشپاتی۔ کیلہ۔ دودھ۔ مکھن۔ گھی دہی کا حذب استعمال کر لیں (۵) سردی اور تری کی حالت میں ملغم کا منضج پلا کر حسب دستور مہل دیں (۶) جوارش جالینس یا جوارش زنجبیل یا جوارش عود شیریں یا جوارش مصطکی اول کھلا کر اوپر سے عرق بادیان میں مصری ملا کر پلائیں (۷) تر غذاؤں اور میوہ جات سے بالکل پرہیز کر لیں۔ (۸) مناسب حال ریاضت کرنے کی سخت تاکید کریں (۹) اگر بدن میں فساد اخلاط کا غلبہ ثابت ہو تو انکی اصلاح اور تفتیہ باقاعدہ کرانا چاہئے۔ اور ان اخلاط کو بڑھانے والی غذاؤں یا لکھن چھڑا دیں (۱۰) اگر بعض امراض اس شکایت کا باعث ہوئے ہوں تو جب تک ان امراض کا علاج پوری طرح نہ ہوگا اس شکایت میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوگا۔ ایسی صورت میں بچہ کا دودھ چھڑا دیں اور کسی اور دودھ پلانے والی کے سپرد کریں۔ اور ان امراض کا علاج طبی اصول سے شروع کریں (۱۱) فساد خون کی حالت میں شائترہ چائٹہ والا منضج پلا کر مہل دیں اور مہل کے بعد شیرہ عناب عرق مرکب مصفی خون پلانے لگا کر شربت عناب ملا کر صبح و شام چند روز تک پلاتے رہیں۔

**فصل پانچویں۔** کثرۃ اللبن (گے لیکٹوریا) یعنی پستان میں دودھ کی پیدائش معمول سے زیادہ ہونا۔ جب دودھ پستان میں اس قدر زیادہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ بچہ اس کو پی نہ سکے۔ اور اس کی پرورش بدنی کی ضرورت سے زیادہ ہو تو اس حالت میں (۱) پستان کے اندر غیر معمولی تناؤ کے سبب سے پہلے تو سخت درد کی تکلیف ہوتی ہے۔ (۲) پھر پستان کی طرف خون تیز ہو کر اس کی ساخت میں ورم پیدا کرنے والا مادہ جمع ہو جائے تو اس میں ورم پیدا ہو جاتا ہے (۳) اگر دودھ کی کثرت سے پستان کی قوت ماسک کمزور ہو جائے تو پستان سے دودھ بکثرت بہنے لگتا ہے (۴) اس طرح دودھ کے بکثرت بہنے اور بیکار صانع ہونے سے عورت روز بروز اسلے لاغر ہونے لگتی ہے کہ خاص کے بدن کی پرورش کرنے والا خون ضرورت سے زیادہ دودھ بن کر صانع ہوتا رہتا ہے (۵) جب پستان میں دودھ بکثرت پیدا ہوتا ہے تو اس حالت میں یہ بھی ممکن ہے کہ پستان کی قوت اس کو اچھی طرح پکالنے اور اس کے تمام ترکیبی اجزاء کو عمدہ اور ہر طرح سے مکمل دودھ کی صورت میں لانے سے عاجز ہو جائے اور ظاہر ہے کہ ایسا دودھ بچہ کی پرورش کے لئے بجائے مفید ہو نیکی کبھی سخت مضر ہوتا ہے۔

**اسباب (۱)** بدن میں خون کی مقدار معمول سے زیادہ ہونا (۲) خون کا پتلا اور بلغمی ہونا اور پستان کے مزاج میں گرمی اور تری قدرے زیادہ ہونا (۳) پستان کی قوت جذبہ کا اس قدر زیادہ ہونا کہ وہ خون کو اپنی طرف معمول سے زیادہ جذب کرے (۴) ایسی غذاؤں یا دواؤں کا بکثرت استعمال کرنا جن سے دودھ کی افزائش اور یا خون کی پیدائش زیادہ ہو۔ جیسے دودھ اور گھی اور آتش جو یا چاول کی پیچ اور ماش کی دال۔ اسی طرح تو دومی۔ تخم سویہ۔ سولف وغیرہ کھانا۔ (۵) اکثر زیادہ نازک مزاج اور لطیف الطبع مستورات کو اپنے بچہ کے ساتھ معمول سے زیادہ الفت ہونا بھی کثرت دودھ کا موجب ہوتا ہے۔

**علامات۔** جس قسم کے اسباب سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ ان کی علامتیں بھی یا تو ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یا تلاش کرنے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔

**علاج۔** اگر خون کی زیادتی اس مرض کا سبب ہو تو (۱) فصد لیکر خون کی مقدار کو کم کریں (۲) تھرمسیدی اور مسور رات کو پانی میں بھگو کر صبح کو صاف کر کے شربت عنورہ ملا کر پلائیں (۳) اور شام کو شیرہ زرشک۔ شیرہ آلو بخارا۔ شیرہ تخم کا ہو مقشر پانی میں کھلا کر شربت انار ترش ملا کر پلائیں (۴) اگر

موسم سرما ہوتا تو سوریا مونگ کی دال یا پی میں ابال کر پلائیں (۵) اور عیسیٰ روٹی اور نمک کے سوا دوسری چیزیں کھانی چھوڑ دیں۔ اور ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں جن سے خون زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر خون کا پتلا ہونا اور اسکی بلعیت اسکا سبب (تو) جوارش کمونی ایک تولہ ہمراہ شیرہ بادیاں شیرہ تخم کنوٹ۔ شیرہ انیسوں سکینین کے ساتھ پلانا مفید ہوتا ہے (۶) تخم بادروج۔ تخم سنہیا لوہر ایک ۲ تولہ۔ سداب خشک۔ تخم کاہو مقشر۔ عدس مقشر ہر ایک ۱۰ تولہ۔ ان سب کو کوٹ پیس کر سفوف بنائیں اور اس میں سے ۱۰ ماشہ کے قریب لے کر تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں (۷) تخم کاہو مقشر ہر ایک ایک تولہ۔ ساق۔ انار دانہ ہر ایک ۶ ماشہ۔ آرد باتلہ۔ آرد جو ہر ایک ۲ تولہ۔ ان سب چیزوں کو سرکہ خالص میں پیکر پتانوں پر صناد کریں (۸) اسطرح اکثر کثرت بلا ڈونا پستان پر صناد کر کے برگ ارنڈ نیگرم باندھنے سے بھی دودھ کم ہوتا ہے (۹) مردار سنگ نہ کہ میں گھسکر صناد کرنا بھی مفید ہے اگر پتانوں کی قوت جاذبہ قوی ہو یا ان کے مزاج میں گرمی اور تری زیادہ ہو جائے تو (۱۰) بھنگ ہاشہ تخم کاہو مقشر ۶ ماشہ۔ عدس مقشر۔ آرد باتلہ ہر ایک ایک تولہ۔ اذیون ایک ماشہ۔ سرکہ خالص میں پیکر کریں۔ (۱۱) ایسی تریں کریں جن سے ایم ماہواری جاری ہو جائیں چنانچہ اس غرض کیلئے یہ نسخہ مفید ہے صنفۃ جوارش قرطم ۵ ماشہ ہمراہ تخم خزہ۔ پوست خرپڑہ۔ بادیاں۔ پرسسیا و شال۔ گلاؤنڈاں ہر ایک ۳ ماشہ پانی میں جوش دے کر صاف کریں۔ اور مہینہ کے مقررہ دنوں سے ۵ دن پہلے پلانا شروع کریں (۱۲) گل بابونہ۔ اکلیل الملک۔ تخم سداب۔ تخم میثقی۔ تخم سویہ۔ پانی میں پیکر پڑو پر نیگرم صناد کریں (۱۳) روغن بادرنجبینی۔ روغن سویہ عطر حنا۔ لہذر مناسب لیکر اسمیں روٹی کا چھایہ کر کے حمو کرنا ۱۱ اجراء طمٹ کے لئے مجرب ہے۔

اگر عورت کو بچہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونا اس مرض کا سبب قرار پائے تو اکثر اوقات بچہ کو اس سے علیحدہ رکھنا اور کثرت دودھ کے نقصانات اسکو سمجھانا بھی ایک بہترین تدبیر ہے۔

**فصل چھٹی** قلة اللبن (وانرٹ آف ملک) یعنی پستان میں دودھ کی پیرالٹس معمول سے کم ہونا۔ یہ مرض بچہ کی ماں کے لئے نہایت ہی دلی صدمہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ پیار بچہ دودھ کے لئے روتا اور بھوک سے بیتاب ہوتا ہے اور وہ بار بار اسے پستان سے لگاتی ہے لیکن اسے سیر نہیں کر سکتی۔ نچا سا بچہ ہر وقت دودھ کے لئے بلکتا ہے اور وہ نہایت مایوسی کیا تھا اس



کی صورت کو نکلتی ہے۔ لیکن کچھ نہیں کر سکتی۔ بچہ جھوک سے پریشان رہتا اور نہ صرف دبلا ہوتا جاتا ہے بلکہ اس کے بدن کی پرورش پورے طور پر نہ ہونے سے سبب سے اسکی بالیدگی اور نمو میں بھی کمی رہ جاتی ہے۔ اور قوتیں ہمیشہ کے لئے کمزور ہو جاتی ہیں۔ اسی کمزوری کی وجہ سے ایسا بچہ آئے دن طرح طرح امراض میں مبتلا رہتا ہے۔

چونکہ دودھ کی معمولی پیدائش کے لئے ماں کے خون کا عمدہ ہونا اور اسکی معمولی مقدار کا پستان میں پہنچنا اور پستان کی قوت جاذبہ و باہمنہ کا درست ہونا ضروری ہے اور ان امور میں سے کسی میں خلل ہونا دودھ کی کمی کا موجب ہو سکتا ہے۔ اس لئے معالج کو اسباب مفصلہ ذیل کی طرف توجہ کر کے ان کا تدارک کرنا چاہئے۔

**اسباب (۱)** بدن میں خون کی پیدائش ضرورت سے کم ہونا (۲) خون کا فساد اور اس کے ذاتی اجزاء کی باہمی ترکیب میں خلل واقع ہونا (۳) کثرت طمث یا کثرت نفاس یا بواسیر وغیرہ سے یا فصد یا سینگیوں یا جو نکلیں لگوانے سے یا کسی رگ کے کٹ جانے سے بکثرت خون نکل جانا (۴) غم غصہ رنج۔ فکر۔ خوف وغیرہ سے خون کا خشک و تحلیل ہو جانا (۵) پستان کی قوت جاذبہ کے ضعیف ہو جانا یا اسکی رگوں میں سدہ وغیرہ پیدا ہو جانے سے انکی طرف دوران خون بخوبی نہ ہونا (۶) پستان کی قوت باہمنہ کا ضعیف ہونا اور دودھ کو بخوبی پیدا نہ کر سکرنا (۷) دودھ پلاسٹوالی کا بچہ کھانا نہ کھانا **علامات**۔ ہر ایک سبب کی علامات دریافت کرنے اور تلاش کرنے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ اور سبب مرض مقرر ہونے کے بعد اس کا علاج سہل ہوتا ہے۔

**علامات**۔ اگر بدن میں خون کی پیدائش کم ہونے سے یا اس کے زیادہ نکل جانے یا بکثرت تحلیل ہو جانے سے پستان میں دودھ کی مقدار کم ہو تو یہ نذرانہ برکری چاہئیں (۱) شیرہ مغزینہ پانہ شیرہ مغز خلدانہ شیرہ مغز حلیغوزہ۔ شیرہ مغز بادام۔ شیرہ تودری گلگوں بکری کے تازہ دودھ میں مہری ملا کر اس کے ساتھ بھانک لیا کریں (۲) اور رات کو یہ سفوف بنا کر استعمال کریں۔ تخم بادروج۔ تخم کونچہ تخم ریحاں۔ تخم گدڑ۔ تودری گلگوں۔ شقاق۔ تخم کدوے شیریں۔ تخم تربوز۔ تخم حنظلہ۔ ہر ایک میں سے ایک تولہ لے کر کوٹ کر سفوف طیار کر لیا جائے۔ اور اس میں سے ۲ تولہ کے قریب روزانہ تازہ بکری کے دودھ یا تازہ پانی کے ساتھ بھانک لیا جائے (۳) لطیف اور جلد ہضم بخوبی

اور زیادہ خون پیدا کرنے والی غذائیں کھانی چاہئیں (۵) گاجر کا حلوہ اور انڈے کا حلوہ۔ دودھ چائے  
انڈے نیم برشت۔ دودھ شکر کا زیادہ استعمال کرنا یہ سب مفید تدابیر ہیں۔

اگر کثرتِ غم کی وجہ سے بیماری لاحق ہوئی ہو تو صبح کو (۱) زبر مرہ۔ منلوچن۔ صندل سفید گلاب  
میں گھسایا (ہوا) سب کو باریک کر کے آملا مربی کو دھو کر اس میں ملا کر چاندی کے ورق میں لپیٹ کر  
اول کھلائیں۔ اور اس پر عرق کیوڑہ عرق بید مشک میں شربت سیب ملا کر پلائیں (۲) شام کو  
مفرح یا قوتی معتدل چاندی یا سونے کے ورق میں لپیٹ کر اول کھلائیں۔ اور اس پر عرق گلاب  
و گلاب شربت صندل ملا کر پلائیں (۳) ایسے اسباب دور کریں جن سے غم و خوف میں زیادتی ہو  
اور غذائیں دہی کھلائیں۔ جو اوپر بیان کی گئیں

اگر فسادِ خون اس مرض کا سبب ہو تو اسکی اصلاح کرنی چاہئے۔ چنانچہ خون کے رقیق ہونے کی علامات  
میں اگر مزاج میں گرمی زیادہ ہو تو شیرہ غلاب۔ شیرہ تخم کا ہو۔ مستشر۔ شیرہ تخم خرفہ سیاہ عرق گلاب  
میں نکال کر شربت غلاب ملا کر پلائیں۔ اور اگر مزاج سرد ہو تو یہ سفوف معینہ ہے صفتہ۔ تخم گدڑ  
تخم شلغم۔ تخم پیاز۔ تخم سویہ۔ تخم مولی۔ سولف ہر ایک ایک تولہ۔ چنے بھنے اور چھلے ہوئے ۶ تولہ سب کو  
کوٹ چھان کر رکھیں۔ اور ہر روز صبح کو اس میں سے ۱ تولہ لیکرے تولہ تازہ دودھ کیساتھ کھلائیں۔  
اگر سودار کے غلبہ کی وجہ سے خون گاڑھا ہو تو اس مرض کا سبب ہو تو (۱) منضج پلا کر مہل دیں۔ اور  
جب مہلوں سے اچھی طرح فراغت ہو جائے تو (۲) شیرہ شیرہ مغز تخم کدو شیریں۔ شیرہ مغز بادام شیریں  
شیرہ مغز تخم تربوز۔ شیرہ تخم خیارین۔ عرق مرکب مصفی خون۔ اور عرق شیریں نکال کر شربت غلاب۔  
ملا کر پلائیں (۳) دہی غذائیں دیں جو اوپر بیان کی گئیں (۴) اور بلغم غلیظ کے سبب خون گاڑھا  
ہو تو زبرہ سفید کھلانے اور روغن سویہ و روغن زعفران پستان پر ملنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر  
پستان کی قوت جاذبہ کم ہونے کے سبب سے دودھ کی پیدائش کم ہو تو روغن امینوں کی مالش کیے  
انڈے کے بے باندھنا مفید ہے۔ اور اگر خون کی کثرت کے سبب پستان کی قوت باضمہ کا ضعیف ہونا  
دودھ کی کمی کا موجب ہو تو فصد کھلوائیں۔ اور اسی غذائیں جو خون کو کم کرنے والی ہیں استعمال کریں  
باقی وہی علامات کریں جو کثرتِ اللبن کی شکایت میں خون کی مقدار کو کم کرنے کے لئے بتایا گیا ہے اگر ماں  
پنے بچہ پر شفقت نہ رکھتی تو اسکے لئے بہر صورت یہی ہے کہ ان اسباب کو دور کریں جن کی وجہ سے اسکی شفقت نفرت بگلی ہو

**فصل سائیس** احتباس لبن (ریٹنشن آف ملک) یعنی پستان کی ساخت میں دودھ جمع ہو کر اس کے اندر رک جانا اور دودھ کے نکلنے میں رکاوٹ پیدا ہونا۔ اس حالت میں ظاہر ہے کہ پستان کے اندر دودھ کے رک جانے سے اسکے منبجہ اور فاسد ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ زیادہ دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے زہریلی کیفیت اختیار کرے اور پستان کی ساخت میں تناؤ کا درد پیدا کر کے دوران خون کی تیزی کا موجب ہو کر ورم پیدا کرے۔


**اسباب** (۱) دودھ کا معمول سے زیادہ گاڑھا ہونا (۲) پستان کی رگوں کا یا دودھ کی نالیوں کا طبعی حالت سے زیادہ باریک ہونا۔ یا ان میں رسولیوں کا پیدا ہونا (۳) دودھ کی نالیوں میں بلغم غلیظ کی رکاوٹ سے سدہ پیدا ہو جانا (۴) پستان کے گوشت کا معمولی مقدار سے زیادہ ہو کر اپنے اندر کی رگوں کو دبا دینا (۵) ورم پستان کی وجہ سے دودھ کی نالیوں پر غیر معمولی دباؤ پڑنا (۶) بچہ کو دودھ کم پلانے کے سبب سے پستان میں اس کا بکثرت جمع ہو جانا (۷) دودھ کا زیادہ مقدار میں پیدا ہونا۔ اور اپنی زیادتی مقدار کی وجہ سے دودھ کی نالیوں میں پھنس جانا۔

**علامات** (۱) دودھ کا گاڑھا ہونا اگر بلغم غلیظ کے سبب سے ہو تو اسکی علامات اور اگر غلبہ سودے سے ہو تو اسکی علامات پانی جاییں گی۔ (۲) اور اگر غلبہ گرمی اور خشکی سے ہو تو پیاس کی کثرت اور دیگر علامات گرمی کی نمودار ہونگی (۳) بعض اوقات غلیظ غذاؤں کے استعمال سے بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے (۴) کسی خارجی سبب کے بغیر (جو دودھ کے رکنے کا باعث ہو) اگر دودھ اچھی طرح نکل نہ سکے یا رفتہ رفتہ بالکل بند ہو جائے تو سمجھنا چاہئے کہ پستان میں دودھ کی نالیاں بہت باریک ہیں یا ان میں رسولیاں پیدا ہو گئی ہیں (۵) بلغم غلیظ سے رگوں میں سدہ پیدا ہو جانے کی حالت میں غلبہ بلغم کی علامات کا پایا جانا اور پہلے غلیظ بلغم کی پیدا کرنے والی غذاؤں کا استعمال کرنا اسکی علامت ہوگی (۶) اگر پستان کے گوشت کا دباؤ دودھ کی نالیوں پر ہونے سے دودھ رکنے کو پستان کا بڑا ہونا اسکی علامت ہے (۷) ورم کی نشانی بھی ظاہر ہے (۸) بچہ کو دودھ کم پلانا بھی سبب مرض کی علامت ہے (۹) دودھ کی زیادہ پیدائش کے اسباب و علامات مفصل پہلے ذکر کئے جا چکے ہیں۔

**علاج** سب سے پہلے اس دودھ کو نکالنا چاہئے جو پستان کی ساخت میں جمع ہو گیا ہے تاکہ دودھ کا تناؤ اور درد فوراً موقوف ہو کر دیگر شدید عوارض کے پیدا ہونے کا اندیشہ باقی نہ رہے اور اس

کام کے لئے آلہ منحنی اجماع اللہین (برسٹ پیپ) کا استعمال بہت اچھا ہے لیکن اس کے استعمال سے پہلے دودھ کی حالت معلوم کرنی چاہئے کیونکہ اگر وہ پستان میں منجمد ہو گیا ہو تو اول تکمید وغیرہ کے ذریعہ سے اسکو بکلا کر کھلنے کے لائق کر لینے کے بعد آلہ مذکور سے نکالنا چاہئے۔ اگر آلہ موجود نہ ہو تو کسی کو حکم دیں کہ وہ بچہ کی طرح دودھ کو جس کر کفال ڈالے۔ یا ایک بوتل میں تیز گرم پانی بھر کر اسے خالی کریں اور فوراً پستان کے منہ پر لگا دیں۔ تو اس طریقہ سے بھی دودھ پستان سے نکل کر بوتل میں آنے لگتا ہے

(تصویر نمبر ۱۰۲ استخراج اللہین کی)



پھر پستان کا دودھ نکالنے کے بعد اس مرض کا اصلی سبب دور کرنے کی طرف توجہ کریں جیسا کہ اگر دودھ گاڑھا ہونا۔ یا دودھ کی نالیوں میں گاڑھے بلغم سے سدہ پیدا ہونا اس مرض کا سبب ہو تو بالینہ پودینہ خشک۔ تخم میٹھی۔ تخم خطمی۔ تخم کتان ہر ایک ایک ٹولہ یا نیں جوش دیکر اس سے تکمید کریں اور اسی سے نطول کریں۔ اور اسکا نقل باریک میں کر روغن سویہ ملا کر صاف کر دیں۔ اس سے دودھ کا قوام تیز اور بلغم تحلیل ہو جاتا ہے۔ نیز ایسی غذاؤں کھلائیں جن سے بلغم غلیظ نہ لگا رہا ہوا نہ پیدا ہو۔ اگر پستان میں دودھ کی نالیوں کا باریک پیدا ہوا یا ان میں رسوبوں کا پیدا ہونا اس مرض کا سبب ہو تو اگرچہ علاج مشکل ہے لیکن پھر بھی ایسی چیزوں کا ایک مدت تک استعمال کرنا چاہئے جن سے اعضا کی ساخت میں ڈھیلا پن پیدا ہوتا اور کثیف سو داوی مادے تخلیل ہونے میں جیسے حقیر اور کھنکھن کو پانی میں جوش دیکر اس سے چند روز تک مسلسل تکمید کرنا۔ اور کچے خشک صاف کئے ہوئے پانی میں پکا کر باریک پیکر روغن نرگس ملائیں اور نیم گرم کر کے پستان پر چند روز صاف کر دیں تو پستان کے اندر دودھ کی نالیوں کی ساخت ڈھیلی نہوتی اور ان کے اندر کی رسیاں اور سختی تحلیل ہو جاتی ہے

اگر پستان کی زیادہ فرسہی سے دودھ کی نالیوں پر دباؤ پڑ کر یہ مرض پیدا ہوا ہو تو وہ علاج کریں جو کلائی پستان کے بیان میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ کنڈر میٹھگی ہر ایک ۶ ماشہ۔ برگ سداب ایک تولہ۔ درونج عقرنی سوختہ ایک تولہ۔ سرکہ میں باریک پیس کر ضا دکرنا بھی مفید ہے۔

اگر پستان میں ورم ہونے کے سبب سے اس کے اندر دودھ جمع ہو کر رک گیا تو درم علاج کرنا چاہئے جو کہ اسکی فصل میں آئندہ آئے گا

اگر بچہ کو دودھ کم پلانے سے یا دودھ کی پیدائش زیادہ ہونے سے پستان میں دودھ زیادہ جمع ہو کر نالیوں میں پھنس گیا ہو تو ایسی دواؤں کا ضا دکرنا چاہئے جن سے دودھ کی پیدائش کم ہو اور جن کا بیان کثرت لبن کی بحث میں کیا گیا ہے۔ انکے علاوہ یہ ضا د بھی مفید ہے صفتہ جل سرخ تخم کا ہو منقر تخم باقلا مسور کی دال جو متشرہ گل ارمی۔ ہر ایک ۶ ماشہ۔ سرکہ کے پتوں کے پانی میں پیس کر سرکہ خالص ۶ ماشہ اضافہ کریں اور نیم گرم ضا د کریں۔ اسی طرح تخم سداب اور تخم کرنب پانی میں پیس کر سفیدہ کا شرمی اور قدرے سرکہ خالص ملا کر ضا دکرنا بھی اس غرض کے لئے مفید ہے

**فصل آٹھویں۔ تجتبن اللہ بن (فری زنگ اون ملک) یعنی پستان میں دودھ کا منجمد ہونا** کبھی پستان میں دودھ جم کر دہی یا پنیر کی طرح کثیف القوام ہو جاتا ہے اسلئے وہ پستان سے نکل نہیں سکتا ہے۔ پھر اگر وہ ایک مدت تک پستان میں بدستور موجود رہے۔ اور پگلا کر نہ نکالا جائے۔ یا خود طبیعت اسے پگلا کر وہاں سے دفع نہ کر سکے تو وہ نہایت سخت ہو کر پستان کی ساخت کے اندر سختی پیدا کرتا ہے جس سے پستان کا ماؤن حصہ ہمیشہ کے لئے بیکار ہو جاتا ہے۔ یا اس میں کسی خاص قسم کا ضا د پیدا ہو کر درم پستان کا موجب ہوتا ہے۔

**اسباب (۱) پستان میں دودھ کا خرچ نہ ہونا۔ اور پستان میں یا تمام بدن میں غیہ معمولی حرارت کا غلبہ ہونا جس سے دودھ کے لطیف اجزاء تحلیل ہو کر باقی کثیف حصہ گاڑھا ہو کر جم جائے (۲) خاص پستان میں یا تمام بدن میں سردی کا اس قدر غالب ہونا کہ جس سے دودھ منجمد ہو جائے (۳) پستان پر خارجی سردی کا اثر ہونا جس سے پستان کے اندر دودھ منجمد ہو سکے۔**

**علامات (۱) پستان میں دودھ کو منجمد کرنے والے اسباب کا پہلے واقع ہونا (۲) پستان میں**

لے نوٹ:۔ (کو آگ یو گیشن آن ملک)

دودھ کے موجود ہونے کے باوجود ایک قطرہ بھی نہ نکل سکتا۔ (۳) پستان کی ساخت میں تناؤ کا درد اور سختی کا پایا جانا (۴) اگر منجھ دودھ میں کسی قسم کی خاص سمیت پیدا ہوگی ہو تو مرہینہ کو اکثر سردی محسوس ہو کر تیز بخار ہو جاتا ہے۔ اور اگر سمیت زیادہ ہو تو حقائق یا غشی یا اختلاط عقل تک نوبت پہنچتی ہے (۵) اگر پستان میں درم پیدا ہونے لگتا ہے یا پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اسکی مقامی علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔

**علاج۔** ابتداء مرض میں پستان میں کو تیم گرم پانی کا کھسپا رہ دیں۔ اور اسی پانی کا نلول کر کے روغن بنفشہ نیم گرم طلا کر لیں۔

اگر مزاج میں گرمی غالب ہو تو مغز تخم باقلا۔ جو مقشتر۔ میدہ لکڑی۔ ہر ایک ایک ٹولہ پانی میں پیس کر آب کشیز سبز۔ آب حرقہ سبز۔ زردی بھینہ مرغ ملا کر صناد کریں۔ اور جب مرض انتہا کو پہنچے تو بابونہ۔ اکلیل الملک۔ تخم اسی۔ کنجد سیاہ پانی میں باریک پیس کر موم دروغن کی قیر و طی اس میں ملا کر نیم گرم صناد کریں۔ اگر مزاج سرد ہو تو پودینہ کوٹ کر پانی میں پکائیں اور پھر باریک پیس کر صناد کریں۔ اسی طرح روغن سوسن۔ روغن فسطہ میں موم زرد گھلا کر قیر و طی بنائیں اور پستان پر طلا کر لیں۔ اس کے علاوہ بابونہ۔ پودینہ کوہی۔ تخم میٹھی۔ تخم سویہ۔ برگ سداب۔ ہر ایک ایک ٹولہ لے کر پانی میں پکائیں۔ پھر صاف کر کے پستان پر نکسید کریں۔ اور اسی سے نلول کرنا اور بھپا رہ لینا بھی فائدہ کرتا ہے۔

**فصل نویں** سلعۃ مجاری اللبن (لیکٹی ال میوئر) یعنی پستان کے اندر دودھ کی نالیوں میں چھوٹی چھوٹی رسولیاں پیدا ہو جانا۔ ان رسولیوں سے دودھ کی نالیوں کے راستے ٹھک جاتے ہیں۔ اور پستان کی ساخت میں جو دودھ پیدا ہوتا ہے۔ اسکے نکلنے میں رکاوٹ ہو نیکی سبب سے پہلے تو پستان میں صرف تناؤ پیدا ہوتا ہے اور دودھ کا اخراج کم ہوتا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد یا تو اس رکے ہوئے دودھ کے ثقیل کثیف اجزاء رفتہ رفتہ منہر ہو کر پتھری کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اور پستان میں اس جگہ ایک سخت گرہ سی پیدا ہو کر ہمیشہ کے لئے وہیں رہ جاتی ہے۔ پھر پستان کی ساخت کا وہ حصہ سیکھا رہ جاتا ہے۔ اور یا دودھ کے تناؤ کی تکلیف سے یا اسکی حدت و تیزی سے پستان کی طرف دوران خون تیز ہو کر درم یا دمل پیدا کرتا ہے۔

**اسبیا** (۱) خون میں بلغمی اور سوواوی کثیف اجزاء کا زیادہ پایاجانا۔ اور کسی وجہ سے دودھ کی نالیوں کی ساخت میں ان کا جمع ہونا (۲) ان نالیوں کی ساخت میں ایسی قابلیت پیدا ہو جانا کہ اس فاسد مادہ سے رسولیاں ہو سکیں (۳) ایسے فاسد مادہ کو پیدا کرنے والی غذاؤں کا بکثرت استعمال کرنا۔

**علامات** (۱) پستان میں دودھ کا تناؤ پائے جانے کے باوجود نہایت کم اور تپلا دودھ مشکل سے نکلنا (۲) دودھ کو پستان میں متحد کرنے یا اس کے اجزاء کو روکنے والے دیگر اسباب کا موجود نہ ہونا (۳) دودھ کی کمی اور اس کے فساد کی شکایت رفتہ رفتہ پیدا ہونا (۴) خون میں اس قسم کے فائدہ مند مادوں کی مقدار کو بڑھانے والے اسباب کا ایک مدت پہلے سے پایاجانا (۵) صغیر غذا میں کچھ نہ کچھ فوری ہونا۔

**علاج** (۱) جوارش جالیوس ۵ ماشہ۔ سمراہ شیرہ بادیاں ۵ ماشہ۔ شیرہ پودینہ خشک ۳ ماشہ۔ عرق شامترہ ۱۰ تولہ۔ شربت غناب ۳ تولہ حل کر کے چند روز تک پلائی (۲) اگر قبض عظم ہو اور مزاج زیادہ گرم ہو تو بجائے اسکے معجون عشبہ ۹ ماشہ سمراہ عرق عشبہ ۵ تولہ۔ نبات سفید ایک تولہ حل کر کے لے سکتے ہیں (۳) گل بابونہ۔ مکوہ خشک۔ تخم خطمی۔ تخم کنوچہ۔ تخم شامترہ کے جو شائدہ سے تکیہ کرنا اور اسی کا نفل کرنا بھی مفید ہے (۴) جدوار اہلی۔ صندل سرخ۔ مغز املتا ۳۔ مکوہ خشک ہر ایک ۶ ماشہ۔ ایلود۔ زعفران ہر ایک ایک ماشہ۔ سب کو آب مکوہ سبز میں پیس کر روغن گل اصفافہ کر کے لیپ کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے (۵) ٹنگر آبیوٹین کا لگانا ڈاکٹر ڈن کا معمول ہے (۶) اگر مرہم داخلیوں میں زعفران ملا کر ایک مدت تک لگایا جائے تو اس سے ضرور نفع ہوگا (۷) اسطیج صغیر ۹ ماشہ روغن بنفشہ ۳ تولہ میں گھلا کر اس میں زردی مہنیہ مرغ ایک عدد خوب ملائی اور پستان پر مالش کریں تو اس سے پستان کی سختی اور رسولیاں تحلیل ہوتی ہیں (۸) سداب کے تازہ پتے اور آڑو کے تازہ پتے نہایت باریک پیس کر لیپ کرنا شیخ بوعلی سینا نے رسولیوں کے تحلیل کرنے کیلئے بہت معین بتایا ہے (۹) غذا لطیف اور جلد صغیر ہونے والی کم مقدار میں دینی چاہئے اور تاکید کرنی چاہئے کہ قدرے کسی قسم کی ریاضت کی عادت کرے۔

**فصل دسویں۔** مرض الشدحی (کر خشک آف میمری) یعنی پستان کی ساخت کا کچل جانا کبھی پستان پر سخت چوٹ لگنے سے یا کسی سخت رگڑ کے قومی صدمہ سے اسکی ساخت استدر کچل جاتی ہے کہ اسکے نرم گوشت اور نازک رگیں اور دودھ کی نالیوں کے باہمی ربط کا قدرتی نظام خراب

ہو جاتا ہے۔ پستان کے اعصاب پر صدمہ پہنچنے کے سبب سے اس قدر درد ہوتا ہے کہ مریضہ بے چین رہتی ہے۔ اور اسی وجہ سے پستان کی طرف دوران خون تیز ہو کر التهاب یا ورم تک نوبت پہنچتی ہے تو مریضہ کو بخار ہو جاتا ہے۔ اور دودھ کی پیدائش میں خلل واقع ہوتا ہے۔

**اسباب (۱)** اچانک سینہ کے بل کسی سخت چیز پر گرنا (۲) سینہ پر کسی چیز کی سخت چوٹ لگنا (۳) پستان پر سخت رگڑ لگنا (۴) سخت ہاتھ سے کسی چیز سے کی مالش کرنا۔

**علامات (۱)** اسباب مرض کے واقع ہوتے ہی اگر فوراً ہاتھ سے ہٹو لا جائے تو پستان کی کچلی ہوئی ساخت محسوس ہو سکتی ہے (۲) مریضہ کو بے چین کرنے والا درد پریشان کرتا ہے (۳) اگرچوٹ کے صدمہ سے ورم پیدا ہونے تک نوبت پہنچے تو بخار بھی ہوتا ہے۔


**علاج (۱)** مونگ۔ تخم موین۔ ایک ایک تولہ لے کر سرو کے پتوں کے پانی میں پیسیں اور پستان پر ضما د کریں (۲) گل ارمنی۔ میدہ لکڑی۔ انبہ ملہی۔ تخم کنجد سیاہ۔ ہر ایک ایک تولہ۔ مرکی ۶ ماشہ۔ زعفران ہر ایک ۳ ماشہ باریک پیس کر نیم گرم ضما د کریں (۳) اگر پستان پر چوٹ لگنے کے بعد اس طرف کو دوران خون تیز ہو کر التهاب اور ورم گرم پیدا ہو جائے تو ورم کا علاج حسب قاعدہ کرنا چاہئے۔ چنانچہ ابتدا میں یہ ضما د معنی ہے صفتہ۔ جو منقشر۔ عدس مسلم۔ گل سرخ۔ منقح با قلا۔ ہر ایک ۶ ماشہ لے کر کشیز سبز کے پانی میں پیسیں اور سرکہ خاص ۶ ماشہ ملا کر ضما د کریں۔ اور تیز ایک زمانہ میں یہ ضما د معنی ہوتا ہے صفتہ۔ آرد جو۔ پودینہ کوہی۔ زوفا و رطب۔ ہر ایک ایک تولہ باریک پیس کر نیم گرم ضما د کریں۔ پھر زمانہ انتہا میں تخم کنوچہ۔ تخم السی۔ تخم میٹھی ہر ایک ۶ ماشہ۔ کنجد سیاہ ایک تولہ۔ ایلوہ ۳ ماشہ۔ زعفران ایک ۶ ماشہ۔ سب کو باریک پیس کر نیم گرم پیس کریں اور اس کے اوپر ارنڈ کا پتہ رکھ کر باندھ دیں۔ اور عصا بہ مذویہ (ممیری بندج) کے ذریعہ سے پستان کو سہارا دیں۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً اگر داہنی پستان کو پیٹ سے سہارا دینا چاہیں تو بائیں کی نوک کو داہنی پستان کے نیچے جگہ سے پکڑ کر اس کے اوپر کو بائیں پستان کے نیچے سے لیجا کر پشت پر لے جائیں۔ اور سینہ کے گرد چند گردشیں دینے کے بعد جب بڑی داہنی پستان کے نیچے آئے تو اس کو قدرے سہار کر بائیں کندھے پر لے جائیں۔ اور پشت پر داہنی جانب کو گھمائے تو




دائیں پستان کے نیچے لائیں۔ پھر پستان کو سہارنے والے پہلے پیچ کو دبا کر سینہ

تصویر نمبر ۱۰۳۔ پستان کی بندش



سینہ و پستان کی سیدھی بندش



کے گرد ایک لپیٹ دیں اور جب پٹی پھر دائیں پستان کے نیچے آئے تو حسب دستور سابلن بائیں کندھے پر لچا کر پشت کی طرف گھماتے ہوئے دائیں پستان کے نیچے لاکر بائیں جانب کو سینہ کے گرد گھمائیں۔ اور جب تیسری مرتبہ پٹی دائیں پستان کے نیچے آئے تو پہلے کی طرح بائیں کندھے پر لے جائیں۔ لیکن آخر میں دو گردنیں صرف پستان پر اور دو صرف سینہ پر دیگر بندش کو ختم کر کے اس کے سرے پر سیفیٹین پین لگا دیں۔ اسی طرح اگر دونوں پستان کو سہارا دینا منظور ہو تو اس کے لئے مذکورہ طریقہ پر دوسری بندش کی جاتی ہے۔

ان تدابیر کے علاوہ اگر پنے کے نسخہ کی ضرورت ہو تو ہوسٹیا رمعالج مریضہ کی حالت کے موافق تجویز کر سکتا ہے۔ اسی طرح غذا بھی مناسب حال تجویز کرنی چاہئے۔

**فصل گیارھویں۔ وجع الشدی (نیورال جیا آف میمری) یعنی پستان میں درد محسوس ہونا۔** یہ درد اکثر عصبی تحریک سے (پستان میں آنے والے سچھٹوں کی قوت حس زیادہ ہونے سے) یا سچھٹوں میں تیزی رطوبات کے سرایت کرنے سے۔ یا پستان کی طرف آنیوالے خون میں صفرا غالب ہونے سے۔ یا پستان کی ساخت میں ریاح کے جمع ہونے سے۔ یا دم

کے تناؤ وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے۔

کبھی تو یہ درد صرف ایک ہی پستان میں ہوتا ہے۔ اور کبھی دونوں طرف ہوتا ہے۔ اور کبھی صرف پستان میں ہی ہوتا ہے۔ اور کبھی پستان سے شانہ کے جوڑ تک اور وہاں سے بازو کے اندرونی جانب تک پھیلتا ہے۔ بلکہ کبھی اس کی لہریں ہاتھ کے قبضہ اور سسٹیلیوں کی طرف آتی ہوئی انگلیوں تک پہنچتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پستان میں اگر درد شدید ہوتا ہے تو اس کا اثر نہ صرف دودھ کی پیدائش پر برپا ہوتا ہے۔ بلکہ درد کے مقام کی طرف طبیعت کی توجہ زیادہ ہونے سے وہاں کی حرارت تیز ہو جاتی ہے۔ اور وہ دودھ کے غلیظ ہونے اور بعض اوقات اس کے فاسد ہونے کا باعث ہوتی ہے۔

**اسباب** (۱) پستان کے اعصاب کی جس قوی ہو جانا۔ (۲) رحم کی شرکت سے پستان کے اعصاب میں خاص قسم کی تحریک پیدا ہونا (۳) پھٹوں میں نرمی گرم فصلات کا سرایت کرنا (۴) پستان کے خون میں صفرا کا غلبہ (۵) پستان پر سردی۔ اثر سے یا نفاخ استیاری کے بکثرت کھانے سے ریاخ زیادہ پیدا ہونا اور پستان کی ساحت میں تناؤ پیدا کرنا (۶) درم پستان کا تناؤ اور مادہ درم کا فساد (۷) پستان کے اندر فساد اور مستغن دودھ کا جمع ہونا (۸) پستان پر چوٹ لگنا۔ اور اس کا کچل جانا (۹) عام بدن کی کمزوری اور خون کا پرورش بدنی کے لائق نہ ہونا۔

**علامات** (۱) اگر پستان کی قوت حس کا قوی ہونا اس مرض کا سبب ہو تو لطافت مزاج اور قوت دماغ اور زکاہ و اس کی علامتیں موجود ہوتی ہیں (۲) رحم کے امراض میں سے کوئی مرض جو اس کا سبب ہو موجود ہونا (۳) اسی طرح اس مرض کے دیگر اسباب میں سے جو سبب واقع ہوا ہو اسکی علامتیں پائی جائیں گی (۴) اگر پستان میں درم گرم یا مستغن دودھ بھرا ہوا ہو، تو مرہینہ کو تیز سچا رہی ہوتا ہے۔ (۵) اگر خون کی خرابی اس کا سبب ہو تو مرہینہ کا لاغر و نحیف ہونا اسکی علامت ہے۔

**علاج**۔ اگرچہ مرض کے سبب کو زائل کرنا اس کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ لیکن ازالہ سبب سے پہلے اگر تسکین درد ممکن ہو تو مرہینہ کی تکلیف حلد رفع ہو جانے کے لحاظ سے ایسی تدبیر زیادہ قابل قدر ہوتی ہے۔ اس لئے معالج کو چاہئے کہ سب سے پہلے تسکین درد کی کوشش کے

چنانچہ (۱) تسکین درد کے لئے یہ تکمید مفید ہے صفحہ کو کنارہ گل بالونہ گل سرخ۔ پانی میں جوش دے کر صاف کریں۔ اور اس میں اسفنج یا کوئی موٹا کپڑا بھگو کر اس سے تکمید کریں (۲) اور زیادتی حس کی حالت میں حریرہ تخم خنشاں پلانا بھی مفید ہے (۳) گرم نزلات کی صورت میں تکمید اور حریرہ مذکور کے علاوہ یہ نسخہ بھی دینا چاہئے۔ صفحہ - حمیرہ کاؤزباں ایک تولہ۔ ورق نقرہ ایک عدد میں لپیٹ کر اس کے ساتھ بہدانہ ۳ ماشہ۔ عناب ۵ دانہ۔ سپتال ۹ دانہ۔ شربت بنفشہ ۳ تولہ پانی میں خفیف جوش دیکر صاف کر کے پلائیں (۴) غلبہ صفراء کے موقعہ پر تکمید مذکور کے علاوہ یہ نسخہ بھی دینا چاہئے۔

صفحہ - عناب بہدانہ ۳ ماشہ۔ شیرہ عناب۔ شیرہ آلو بخارا ہر ایک ۵ دانہ۔ عرق شاتہرہ ۱۰ تولہ۔ شربت نیلوفر ۳ تولہ حل کر کے پلایا جائے (۵) آب کاسنی سبز۔ آب خرفہ سبز میں مسندل سفید گھس کر قدرے کافور اس میں حل کریں اور سرکہ خالص روغن گل اضافہ کر کے ضماد کر لیں بھی درد کو فوراً تسکین ہوتی ہے (۶) اگر پستان میں سردی کا اثر پہونچے اور غلبہ ریاہ کے سبب درد پیدا ہو تو یہ نسخہ پلانا چاہئے صفحہ - جوارش کمونی سمراہ شیرہ بادیان۔ شیرہ تخم کثوث۔ عرق پودینہ میں تیار کر کے گلہنڈ ملائیں۔ اور نیم گرم مرہینہ کو پلا لیں (۷) انیسوں۔ زیرہ سیاہ۔ تخم مولی۔ تخم سویہ۔ گل بالونہ۔ گل سرخ۔ پانی میں جوش دیکر اس سے تکمید کرنا۔ اور اسی کے قفل کو باریک پس کر نیم گرم ضماد کرنا سفید ہے (۸) باجرہ کا آٹا اور نمک طعام پوٹلیوں میں باندھ کر ان سے تکمید کرنا بھی مجرب ہے (۹) اگر دم پستان درد کا سبب ہو تو اس کا علاج وہ کریں جو کہ اس کے بیان میں آئے گا (۱۰) اگر پستان پر چوٹ لگنا یا اس میں متعفن دودھ کا جمع ہونا سبب ہو تو اس کا علاج پہلے گذر چکا ہے (۱۱) اگر مشارکت رحم سے یہ مرض پیدا ہوا ہو تو رحم کا علاج کرنا چاہئے (۱۲) اگر خون کی خرابی اس مرض کا سبب ہو تو خون کی اصلاح اور مرہینہ کی تقویت ضروری ہے لیکن اصلاح خون کے لئے مرہینہ کے مزاج کی گرمی یا سردی کا لحاظ رکھنا۔ اور اس کے موافق دواؤں کا استعمال۔ اور نامناسب اشیاء سے پرہیز کرنا چاہئے۔

**فصل بارہویں۔ حکۃ الشدی (پروری ٹسٹ آف میا) یعنی پستان میں خارش ہونا**  
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کو اپنی پستان یا سر پستان میں بعض اوقات میچھٹی

خارش محسوس ہوا کرتی ہے جو کہ اکثر بخور طبعی دیر کے دیر کے بعد خود بخود زائل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ حالت زیادہ دیر تک قائم رہے۔ یا جلد جلد ایسا واقع ہوتا رہے، تو اس کی طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ بعض مستورات ایسے موقعہ پر سمجھ لیتی ہیں کہ ان کا بچہ عنقریب کسی مرض مبتلا ہونے والا ہے۔ اور اکثر اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ میرے نزدیک ان مستورات کا یہ خیال طبی قاعدہ کے موافق ہے۔ کیونکہ پستان میں خارش آنا ایسے مادہ کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ پستان کی ساخت میں دغذغہ پیدا کرے اور ظاہر ہے کہ پستان میں ایسے مادہ کا موجود ہونا دودھ کی ذاتی ترکیب اور اس کی کیمیائی خاصیت پر موثر ہو کر اس کے مناد کا موجب ہو سکتا ہے۔ پھر جب بچہ ایسے فاسد دودھ کو پیتا رہے گا تو ضرور ایک نہ ایک دن کسی مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگلے ہم اس مرض کے اسباب و علامات مع علاج کے درج ذیل کرتے ہیں۔

**اسباب (۱)** پستان کی ساخت میں کسی تیز خلط کا سرایت کرنا (۲) پستان کے ضعف ہضم کے سبب سے اس کی ساخت میں ایسے بخارات کا بکثرت پیدا ہونا جو کہ پستان میں دغذغہ پیدا کریں (۳) بادی اور نفاخ اشیاء کا کھانا جن سے ریاح اور بخارات غلیظہ پیدا ہو کر پستان میں خارش پیدا کریں (۴) معدے یا جگر کے ہضم کی خرابی جس کے بخارات یا فاسد اخلاط پستان میں جا کر خارش پیدا کریں (۵) مریمینہ کے خون میں حدت پایا جانا۔

**علامات**۔ اس مرض کا جو سبب واقع ہوا ہو اس کی علامتیں پائی جائیں گی۔ ان شخص مرض کی اور تین اس کے سبب کی بخوبی ہو سکے گی۔

**علاج**۔ اگر پستان کی ساخت میں یا تمام بدن میں تیز اخلاط کا موجود ہونا یا خون میں حدت پایا جانا اس کی علامات سے ثابت ہو تو ایسی سرد اشیاء کا استعمال مناسب ہے جو اخلاط کی تبدیل کر سکیں۔ اور اگر خون کی حدت اس کا سبب ہو تو مصفیات و مبردات کا استعمال مناسب اور اگر پستان کا ضعف ہضم یا بادی اور نفاخ چیزوں کا استعمال یا معدے اور جگر کے ہضم کی خرابی ثابت ہو تو ان امراض کے اسباب تلاش کر کے ان کا علاج کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ ایک عام تدبیر جو اکثر ایسے موقعہ پر مفید ثابت ہوئی ہے۔ اس کو ہم اس جگہ درج کرتے ہیں۔ مریمینہ کے مزاج کی حالت معلوم ہونے کے بعد اگر یہ مناسب سمجھی جائے تو استعمال کرنی چاہئے۔

وہ تدبیر یہ ہے کہ مریضہ کو ہر روز صبح و شام یہ سفوف بعد غذا کے کھلا یا جائے۔  
 صفحتہ - پودینہ خشک - بادیان مصطلکی - دانہ الاچی خورد - گل سرخ - کشتیز خشک - مکوہ خشک  
 زبرد سہید - مرنج سیاہ - نمک سیام - سہاگہ بریاں ہر ایک ۶ ماشہ - سب کو باریک پس کر سفوف  
 بنائیں - مقدار خوراک ۳ ماشہ ہے۔

**فصل تیرھویں - درم الشدی (انفلامیشن آن میما) یعنی لپٹان کی ساخت میں درم**  
 پیدا ہو جانا - اگرچہ یہ درم دودھ پلانے کے زمانہ میں ادنیٰ بے احتیاطی سے پیدا ہو جاتا ہے۔  
 لیکن کبھی ابتداء سن بلوغ میں شادی سے پہلے بھی حدت خون کے سبب سے یا اتفاقاً چوٹ  
 وغیرہ کے صدمہ سے ہو جاتا ہے۔ اسباب کے اعتبار سے اس درم کی مندرجہ ذیل پانچ قسمیں ہیں  
 قسم اول - درم گرم جو کہ خون میں صفراء کے ملنے سے - یا دیگر اقسام (۲) تشکی زہر وغیرہ کے  
 سے پیدا ہوتا ہے - یہ قسم نہایت تکلیف دینے والی ہے۔

**علامات (۱)** درم میں تیز سرخی کی چمک اور بے انتہا جلن ہونا (۲) سخت میٹھ کا درد اور تیز بخار  
 ہونا (۳) اگر لپٹان میں دودھ موجود ہونے کا زمانہ ہو تو دودھ کا عمدہ تیار نہ ہونا (۴) اور لپٹان  
 میں شدید تناؤ کے سبب سے درد کی لہریں نعل اور شانہ و بازو تک پہنچنا (۵) اس کے ساتھ ہی  
 بار بار سردی لگ کر بخار تیز ہو جانا (۶) اگر خون میں کسی دیگر قسم کی خرابی پائی جائے تو اس کی  
 علامتوں کا پایا جانا (۷) اگر تشکی زہر اس کا سبب ہو تو اسکی خاص علامتوں کا پایا جانا۔

**علاج** - اگر درم صفراء ہی ہو تو (۱) لعاب بہدانہ - شیرہ تخم کا ہو مقشر - شیرہ تخم جزہ ہر ایک ۲ ماشہ  
 شیرہ عناب - شیرہ آلو بخارا ہر ایک ۵ دانہ - عرق شامہزہ ۱۰ تولہ - شربت نیلوفر ۲ تولہ ملا کر پلائیے۔  
 (۲) ابتداء کے زمانہ میں برگ کاسنی ہنر - برگ مکوہ ہنر ہر ایک ۲ تولہ کو ٹکڑے روغن گل ۱ ماشہ - سرکہ  
 خالص ۳ ماشہ ملا کر صاف کریں (۳) زیادتی کے زمانہ میں یہ تکید مفید ہے - صفحتہ - گرم پانی  
 آدھ سیر میں سرکہ خالص ۲ تولہ ملا کر بکری کے مثانہ میں بھریں اور اس سے تکید کریں (۴) شدہ  
 درد کے وقت تسکین درد کے لئے یہ تکید بھی مفید ہے صفحتہ - گل بابونہ - گل سرخ - مکوہ خشک -  
 پوست خشتاش ہر ایک ۶ ماشہ لے کر پانی میں پکائیں اور اس میں اسفنج تر کر کے اس سے حکمید  
 کریں - (۵) یا کنبجین ۲ تولہ - روغن گاو ایک تولہ میں مغز تخم باقلا پس کر ملائیں اور ٹیکم صفا کریں

(۶) انتہا کے زمانہ میں یہ صفا مفید ہے صفحتہ مغز تخم باقلا۔ تخم خلی۔ تخم میٹھی جو مقشر۔ گیہوں۔ کی خشک روٹی ہر ایک ۷ ماشہ۔ زعفران ۳ ماشہ۔ سب کو باریک پیس کر انڈے کی زردی ۳۰ عدد میں ملائیں اور قدرے پانی شامل کر کے نیگرم صفا د کریں (۷)، اگر خون میں ہلکی صفا د ہونا اس مرض کا سبب ہو تو علاوہ تدابیر مذکورہ بالا کے اسکا خاص علاج بھی کرنا چاہئے۔

قسم دوم سری ورم سرد جو کہ خون میں بلغم بکثرت شامل ہونے سے یا خون سوداوی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اکثر بلغمی مزاج کی عورتوں کو پستان میں سردی کے اثر کرنے سے ہوتا ہے۔ علامات (۱) اس ورم میں پستان کی ساخت کے اندر تناؤ بہت کم ہوتا ہے۔ اور سری اور جلن بھی نہیں ہوتی (۲) اسی طرح زیادہ درد اور تیز بھی نہیں ہوتا ہے۔ (۳) مریضہ کے مزاج میں بلغمیت یا سوداویت کی علامتیں پائی جاتی ہیں (۴) اگر ورم بلغمی ہو تو پستان کی ساخت میں نرمی اور اگر سوداوی ہو تو سختی پائی جاتی ہے (۵) ورم سوداوی کے رنگ میں سیاہی کی جھلک قدرے نمودار ہوتی ہے۔

علاج۔ اگر مزاج میں بلغمیت پائی جائے تو (۱) پینے کا یہ نسخہ دینا چاہئے صفحتہ گل بنفشہ بونہی بچکاسنی۔ مکو خشک۔ پرسیا و شاں گھاؤنباں۔ خمیرہ بنفشہ (۲) یہ صفا د بھی مفید ہے۔ میدہ لکڑی تخم میٹھی۔ تخم کرنس۔ گل بابونہ۔ پوست کچال۔ پوست بیخ ارنڈ۔ گیر۔ ہر ایک ۷ ماشہ لیکر پانی میں باریک پیس اور نیگرم لیپ کریں (۳) گل بابونہ۔ اکلیل الملک۔ تخم میٹھی۔ تخم کرنس۔ مکو خشک پانی میں لپکا کر اس میں ترکر کے تمکید کریں (۴) بابونہ سبز۔ برگ سویہ سبز۔ برگ کرنس سبز۔ برگ مکو سبز۔ برگ کشنیر سبز باریک پیس کر روغن گل ملائیں اور نیگرم صفا د کریں (۵) اسی طرح روغن صفا میں زعفران ملا کر صفا د کرنا بھی نہایت مجرب ہے۔

اگر ورم سوداوی ہو تو (۱) شیرہ بادیان۔ شیرہ عناب۔ عرق گاؤنباں۔ عرق ماہ لجن میں تیار کر کے شربت عناب کے ساتھ ملائیں (۲) مغز الماس۔ مکو خشک۔ تخم خلی۔ گل خلی پانی میں پیس کر روغن گل ملا کر نیگرم صفا د کریں (۳) زردی بیضہ میں روغن بنفشہ ملا کر صفا د کرنا بھی مفید ہے (۴) مرہم داخلیوں آب مکو سبز میں ملا کر روغن گل اور قدرے سرکہ اضافہ کر کے لیپ کرنا بھی مفید ہے (۵) کنجد سیاہ۔ تخم اسی۔ باریک پیس کر روغن زیت ملائیں اور نیگرم صفا د کریں۔

**فتم تیسری۔** وہ درم جو پستان میں دودھ جمع ہو کر تناد پیدا کرنے اور اس کے درد کی وجہ سے دوران خون کے تیز ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسکی علامت۔ سبب مرض کا پہلے قح ہونا ہے۔ اسطرح علاج بھی وہی کرنا چاہئے جو اسکے بیان میں مذکور ہے۔ اسکے علاوہ ایلوہ اور زعفران عرق مکوہ سبز میں حل کر کے صناد کرنا بھی مفید ہے۔ اسطرح جو زجذم۔ مغز تخم باقلا۔ مسو کی دال۔ زعفران۔ قدرے نمک گلاب میں پس کر صناد کرنا۔ اور کیکڑا پسکر صناد کرنا بھی دودھ کی پیدائش کو بہت کم کرتا ہے۔ لیکن پستان میں سے دودھ کو نکالنا اور دواؤں میں گرمی اور نرمی مزاج کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

**فتم چوتھی۔** وہ درم جو پستان میں دودھ کے جم جانے یا فاسد ہونے یا متعفن ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ علامت دودھ کے جم جانے کی یہ ہے کہ پستان میں سختی اور کمودت ظاہر ہوگی اور دودھ یا تو نہایت رقیق اور بہت کم نکلے گا یا بالکل نہ نکلے گا۔ اور رضیعہ کو تیز بخار لرز کے ساتھ آئے گا۔

**علاج۔** سب سے پہلے گرم پانی سے پستان پر تھمید کریں۔ اور روغن منفثہ سے مریخ کریں۔ پھر اس خراب دودھ کو پستان سے نکالیں۔ جس نے درم پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ صناد لگائیں صفتہ چقدر کو پانی میں اسقدر لپکا میں کہ خوب گل جائے۔ پھر مغز تخم باقلا اور گیہوں کی رومی کا گودا کوٹ کر اور روغن کنجد ڈال ملائیں۔ اور نیگرم صناد کریں۔ باقی تمام تدابیر پہلے گذر چکی ہیں۔

**فتم پانچویں۔** وہ درم جو کہ پستان میں چوٹ لگنے یا اسکی ساحت کے کچل جانے سے پیدا ہوتا ہے۔

**علامت۔** اسکے سبب مرض کا پہلے واقع ہونا ہے اور علاج بھی وہی ہے جو اس مرض کی بحث میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ صناد بھی مفید ہے۔ صفتہ۔ میدہ لکڑی۔ گل ارمنی ہر ایک ۱۰ ماشہ مرکی۔ ایلوہ۔ زعفران ہر ایک ایک ماشہ۔ سب کو باریک پسکر پانی میں ملائیں اور نیگرم صناد کریں۔

**انجام مرض (۱)۔** اس مرض کی ہر ایک قسم کا علاج اگر حسب قاعدہ عمدہ طور سے چلنے وقت پر مسیر ہو تو درم تحلیل ہو جاتا اور تمام عوارض رفع ہو جاتے ہیں۔ (۲) کبھی یہ درم اپنے مادہ کی خستہ سے یا معالج کی غلطی سے سخت ہو کر ایک گھٹلی یا گرہ کی طرح باقی رہ جاتا ہے (۳) اگر مرض کے ہر ایک درجہ میں مناسب علاج اور تمام ضروری تدابیر مسیر نہوں یا مادہ مرض کی زیادتی اور اسکا ذاتی فساد معالج کی اصلاحی تدابیر کے قابو سے باہر ہو تو درم کا مادہ پکنے لگتا اور درم کے اندر پیپ کی

پیدائش شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت اسکو ڈاکٹری میں سوپر امیری ایبیس کہتے ہیں۔ اسکی علامت یہ ہے کہ ورم کی جگہ میں سرخی اور گرمی اور درد کی مٹیں زیادہ ہو جاتی اور بخار بھی نہایت تیز ہو جاتا ہے۔ ورم پر جو صماد کیا جائے وہ اس جگہ میں جلد خشک ہونے لگتا ہے جہاں ریم پیدا ہونی شروع ہوئی ہے۔

علاج جب ورم پکنا اور اس کے اندر پیپ کا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اسے تحلیل ہونے کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے۔ اس وقت پکانیوالی دواؤں کا لیپ کرنا اور یا لسی کی پلٹس باندھنا چاہئے نسخہ صماد - تخم خطمی - تخم مینقی - تخم اسی - تخم کنوجہ - اسینول ہر ایک ۶ ماشہ نہایت باریک پیس کر نیم گم صماد کریں۔ اسی طرح اخیر کو کوٹ کر پانی میں ملا کر صماد کرنا بھی مفید ہے۔

نسخہ پلٹس - تخم اسی ایک تولہ - تخم کنوجہ ۶ ماشہ - ریونڈ چنی - جانفل ہر ایک ۳ ماشہ بکری کے دودھ میں پیس کر پلٹس تیار کریں اور دن رات میں چند بار گرم گرم باندھیں۔ اس سے ورم بہت جلد پکتا اور درد میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ورم پگنے میں دیر لگے تو الیوہ اور سہاگہ باریک پسپا ہوا پلٹس پر قدرے چھڑک کر باندھنے سے ورم بہت جلد پک جاتا ہے۔

چھڑچب ورم کے اندر پیپ تیار ہو جائے تو اسے خود بخود پھوٹنے کا انتظار نہ کرنا چاہئے بلکہ نشتر سے شگاف دے کر پیپ نکالنی اور زخم کا علاج کرنا چاہئے۔ کیونکہ شگاف دینے میں حذر تاخیر کی جاتی ہے۔ اسی قدر پستان کی ساحت کا زیادہ حصہ پیپ سے گل کر خراب ہو جاتا ہے۔ جس کے اندمال میں زیادہ مدت صرفت ہو جانے کے علاوہ یہ سبھی ممکن ہے کہ پورے طور پر اندمال نہ ہو سکے کے سبب سے پستان کی ساحت میں گڑھا باقی رہ جائے۔ اور اس حصہ میں دودھ کی نالیاں بند یا فنا ہو جانے کے سبب سے دودھ کی پیدائش میں یا اس کے نکلتے میں ہمیشہ کے لئے خلل باقی رہ جائے۔

طریقہ دستکاری - پستان میں شگاف دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سر پستان سے اسکی جڑ کی طرف کو لمبائی میں نشتر سیدھا لگانا چاہئے تاکہ دودھ کی نالیاں کٹنے سے محفوظ رہ سکیں کیونکہ عرض میں یا ترچھا شگاف دینے سے دودھ کی نالیاں کٹ جاتی ہیں۔ اور ان کے کٹنے سے ایک تو دودھ کا بکثرت بہنا عسر اندمال کا سبب ہوتا ہے۔ دوسرے یہ بات ہے کہ وہ نالیاں






مگر چونکہ اس مرض اور دبیۃ الشدی کے اسباب و علامات اور علاج قریب قریب یکساں ہیں۔ اسلئے ان دونوں میں سے ایک ہی کا بیان اس فصل میں درج کرنا منسب معلوم ہوا۔

**اسباب۔** چونکہ یہ مرض اکثر درم لپتان کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اسلئے اس کے اسباب تقریباً وہی ہوتے ہیں جن کا بیان درم لپتان کی بحث میں کیا گیا ہے۔

**علامات (۱)** لپتان کی ساخت میں گہرا درم اور اس کے تناؤ کی تکلیف محسوس ہونا (۲) مقام ماؤف میں قدرے سرخی اور حلقہ کے ساتھ سخت ٹپش کا سادرو ہونا (۳) جب پیپ بننے لگے تو مرینہ کو تیز بخار کا لازم ہونا (۴) پیپ بننے کے بعد موضع علت یا کسی قدر نرمی ظاہر ہونی (۵) لپتان کے ماؤف حصہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیپ کا امتحان کرنے سے اس کے گہراؤ میں پیپ کی حرکت محسوس ہونا۔

**علاج (۱)** اگر مرینہ کو قبض شکم کی شکایت ہو تو سب سے پہلے رفع قبض کے لئے ہلکے ملیّنات پلانے چاہئیں۔ جیسا کہ روغن بیدانجیر یا سناؤکی۔ اور سالٹ کا حلاب پلائیے (۲) اگر لپتان میں دودھ موجود ہو تو آلہ مخراج اللب (برسٹ پیپ) سے یا کسی دوسرے ذریعہ سے دودھ کو نکالیں (۳) اگر پیپ اچھی طرح نہ پیدا ہوئی ہو تو لپتان پر اسی کی ٹپش مگر مگر دن رات میں چند مرتبہ باندھیں۔ (۴) اس غرض کے لئے یہ صناد بھی بہت مفید ہے :-  
صفیہ۔ تخم اسی۔ کنجد سیاہ۔ بیج سوسن۔ سلار سن (مید سائلہ) نظرون علیک بطم بکری کی میٹنی۔ کبوتر کی بیٹ۔ ہر ایک ۶ ماشہ لے کر پیسیں۔ اور مغز ساق گاؤ روغن کنجد ہر ایک بقدر حاجت اس میں ملا کر نگیم صناد کریں۔ (۵) جب دبیۃ میں پیپ بن گئی ہو تو اس کو نشتر کے ذریعہ سے نکالیں۔ لیکن جراح آلہ مبزلہ (ڈرڈوکار) کے ذریعہ سے بھی ہوا کو خارج کرتے ہیں۔ لیکن اس آلہ کا استعمال دبیۃ تحت الشدی (سب میری ایس) میں مناسب ہے۔ بشرطیکہ لپتان کے نیچے کی جانب کو مواد کے لپٹنے کا راستہ قریب ہو اور اس لئے اسی جانب سے آلہ داخل کیا جائے۔ اور اگر لپتان کے پہلو کی طرف کو مواد قریب ہو تو نشتر سے شکاف دینا مناسب ہوتا ہے۔ تاکہ ایک مرتبہ پیپ نکالنے کے بعد رگ کے راہ سے اندر کی پیپ خود بخود آسانی سے نکلتی رہے اور زخم کی صفائی بخوبی ہونی رہے



(۶) شکاف دینے کے بعد زخم کو صاف کر کے اس میں بتی رکھیں تاکہ اس کے اندر کا مواد صاف ہونے سے پہلے اس کا منہ بند ہو جائے۔ پھر زخم میں بتی رکھنے کے بعد حسب قاعدہ زخم کی بندش کریں۔ اور جب تک زخم اچھی طرح سے مندرمل نہ ہو اسکی صفائی اور مرہم پٹی احتیاط سے کرتے رہیں تاکہ زخم کا منہ تنگ ہو کر ناسور نہ ہو جائے (۷) اگر مواد کسی قدر کچا ہو اور ٹیس کا دور تکلیف دیتا ہو تو کسی اور زخم کنوچہ اور جانفل کی ملیٹس باندھیں۔ یا برگ نیب۔ اور برگ بکائیں کا بھر نہ بنا کر باندھیں۔ اس سے مواد پختہ ہو کر نچڑ جاتا، اور زخم صاف ہو جاتا ہے (۸) اند مال زخم کے لئے مرہم کیلہ بہت مفید ہے (۹) مرلیضہ کو یہ بھی ہدایت کریں کہ ستر پر آرام سے لیٹی رہے۔ کیونکہ اکثر اوقات پیٹے رہنا اور چلنا پھرنا مضر ہوتا ہے۔

**فصل پنجم صوفی**۔ سرطان الشدی (کنسر ف دی میمری) یعنی پستان میں سرطانی ورم ہو جانا۔ کبھی توبہ ورم شروع میں ہی سوداوی مادہ سے پیدا ہوتا ہے اور کبھی ورم سوداوی کے علاج میں بے احتیاطی (مخللات گرم کا استعمال) کرنے سے وہ سرطان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ ورم بڑھکر لعل کے نرم گوشت اور غدودوں تک پھیل جاتا ہے۔

**اسباب** (۱) عام بدن میں یا خاص پستان کی رگوں میں خلط سوداوی (سودا پلینی)

یا صفراوی) کا پایا جانا (۳) پستان کی ساخت میں ورم سرطانی کے پیدا ہونے کی قابلیت کا موجود ہونا (۳) پستان کے ورم سوداوی کے علاج میں گھٹلیات کا زیادہ استعمال کرنا۔  
**علامات** (۱) اسباب مرض کا پہلے واقع ہونا (۲) مادہ مرض کے وجود کی علامات کا موجود ہونا (۳) پستان کی متورم ساخت میں سخت گھٹلیاں سی پائی جانا (۴) پستان کی جلد کا سخت ناسہورا اور سیاہی مائل سرخ ہونا (۵) پستان میں ورم کے گرد والی رگوں کا خراب خون سے بھر کر پھیل جانا (۶) سر پستان کا باہر کو مڑا ہوا اور سخت ہونا (۷) پستان میں ہر وقت جلن اور برچھنی کے چھوئے کا سادرد اکثر رات کو ہونا۔

**علاج** (۱) غلط سوداوی کو نکالنے کے لئے فصد باسلیق یا ہفت اندام کھلوانی چاہئے۔  
 (۲) لبتہ طیکہ مرصیہ قوی ہو اور خون بقدر مناسبت نکالنا چاہئے (۳) لعاب بیدانہ ۳ ماشہ شیو عذاب ۵ دانہ عرق مرکب مصفی خون ۱۰ تولہ میں تیار کر کے شربت نیلو فر ۲ تولہ حل کریں اور مرصیہ کو سہرہ ز پلائی (۳) آب کاسنی سبز آب مکوہ سبز آب کاموس سبز آب کشنیز سبز سہریک ۲ تولہ گلاب امینی روغن گل ایک تولہ صندل سفید گھسا ہوا ۶ ماشہ کاغذ ۳ ماشہ سب کو ملا کر سیب کے برتن میں نیم کے دستے سے خوب کوٹیں اور عناد کریں۔ اس سے جلن اور درد کو فوراً مشکین بہتی ہے  
 (۴) چند روز تک فتوح شامیرہ بطور منفعج پلا کر مطبوخ افتیمون یا مطبوخ ساء سے تنقیہ کرائیں (ان کے نسخے صفحہ سرطان چہمیں درج ہیں) (۵) تنقیہ کے بعد تحلیل ورم کے لئے وہ عناد مفید اور میراغاندانی محرب ہے جبکہ نسخہ صفحہ سرطان چہمیں درج ہے (۶) غذائیں آتش جو سب سے بہتر ہے۔ با حلوان کا گوشت جس میں کدو سفید یا خرفہ یا بالک وغیرہ سرد ترکاریاں ڈالی گئی ہوں۔ اور دھنیا وغیرہ سے بھی اصلاح کر لی گئی ہو وہ مناسب ہے۔ (۷) سرطان کے علاج میں ہر طرح سے اسباب کی کوشش کرنی چاہئے کہ متفرج نہ ہونے پائے۔ کیونکہ وہ صورت نہایت خوفناک ہوتی ہے۔  
 انجام۔ یہ مرض نہایت سخت ہوتا ہے۔ اور اکثر اطباء اس کے علاج سے عاجز رہتے ہیں۔ اس مرض میں کو بالکل نجات ملنے کی توقع نہیں ہوتی ہے۔ لیکن علاج سے تین مقصد ملتے ہیں (۱) عمر بڑھنے نہ پائے (۲) یہ کوشش کرنا کہ متفرج نہ ہونے پائے (۳) اگر خدا نخواستہ متفرج ہو جائے تو اس کے اندام کی اور اس کے فساد سے دیگر اعضا کو محفوظ رکھنے کی تدابیر کرنا۔

سرطان متفرج جو سرطان کہ سودا و صفراوی کے سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ باوجود عمدہ بیہ کے بھی اکثر متفرج ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں ایسی تباہی اختیار کرتی چاہئیں جن سے جلن اور گرمی کر تکلیف ہو جائے۔ اور زخم زیادہ نہ ہونے یا ئے۔ یہ ہر قسم نہایت مفید ہے صفیہ سفید سیسہ کا مردار سنگ۔ تو تیسے مضمول۔ گل امینی ہر ایک ۶ ماشہ۔ شاد بخ عدسی مضمول ایک تولہ نشاستہ۔ نو نہ گیر ہر ایک ۱۰ تولہ۔ سب دواؤں کو باریک پیسین۔ اور موم سفید ۶ ماشہ۔ کو روغن گل ۵ تولہ میں بگلا کر پی ہوئی دوا میں اس میں ملائیں۔ اور آب بارتنگ سبز اضافہ کر کے اسد گھوٹیں کہ سب یکذات ہو جائے۔ پھر اس میں سے قدرے لیکر بچا یہ بنائیں اور زخم پر رکھیں اور آب مکوہ سبز۔ آب کشیز سبز میں گل امینی ملا کر زخم کے گرد ضماد کریں۔

اگر ہر قسم کا علاج کر لینے کے بعد بھی سرطان کو آرام ہونے کی توقع نہ ہو اور مرین اور اسکے سر پرست دستکاری کے لئے اصرار کریں تو اسے قطع کر کے نکال دینا چاہئے۔ البتہ طیکہ مسہل یا فصدہ کے ذریعے تنقیہ عام کر لیا ہو کیونکہ بدون تنقیہ کے دستکاری کرنے میں بھی شدہ مرض کا خطرہ ہوتا ہے۔

**طریقہ دستکاری**۔ مریضہ کو میز پر چپ لٹا کر پیٹھ کو رو قارم سنگھائیں۔ جب وہ بیہوش ہو جائے تو ایک مددگار سے کہیں کہ وہ مریضہ کے پیٹھ کی طرف کھڑی ہو کر ماؤن پستان کو کپڑا کر اپنی طرف کھینچے۔ تاکہ سینہ کے عضلات قدرت کھینچ کر تن جائیں۔ اس وقت دستکار کو چاہئے کہ وہ پستان کے زیریں کنارے کے قریب عضلہ صدر درید گبیر (مکپڑے سے بھر) کے اوپر کی جلد پر ایک ہلالی شکاف دے کر ماؤن عضو کو نیچے سے اوپر کی طرف سینہ کی سالم ساخت سے علیحدہ کرنا شروع کرے۔ اور دستکاری کے وقت جو موٹی



نصوبہ نمبر ۱۰۵ (سرطان الثدي کے کٹانے کی)

رگس گنتی جائیں انھیں باندھ کر جیان خون کو بند کرتے رہنا چاہئے۔ جب عضو ماؤت کی تمام خراب ساخت کو علیحدہ کر چکیں تو غور سے دیکھیں کہ خراب ساخت کا کچھ حصہ باقی تو نہیں رہ گیا ہے۔ اگر باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی نکال ڈالیں۔

اس کے بعد زخم کے کناروں میں ٹانکے لگا کر یا سٹیکنگ میلا سٹر سے زخم کے کناروں کو خوب ملا کر اس پر ایسی دوا چھڑکیں جو مانع عفونت ہو۔ اور زخم کو جلد مندمل کرے۔ جیسا کہ یہ نسخہ درور کا عجیب التاثر ہے حقیقتہ۔ کندر۔ صبر۔ انزروت۔ دم الاخوین۔ ہر ایک ۶ ماشہ غبار کی طرح باریک پس کر استعمال کریں۔ اس کا اثر بھی مثل آئیوڈو فارم یا بورو آئیوڈو فارم ہے۔ اور زخم کے زیریں حصہ میں ایک ربڑ کی ٹلی اسٹے رکھ دینی چاہئے کہ زخم کے اندر سے پیپ کے بخوبی نکلنے کا راستہ باقی رہے۔ پھر اس پر صاف رونی رکھ کر اچھی طرح سے باندھ دیں۔ اور اس دیکھ کاری سے فارغ ہونے کے بعد مرہقہ کو اس کے لیٹر پر آرام سے لٹائیں۔ اگر زخم کی مرہم بٹی احتیاط و خبر گیری کے ساتھ کی جائے تو بہت جلد زخم مندمل ہو جاتا ہے۔

**فصل سو طھویں۔ قرحۃ الشدی (السرآف دی مییری) یعنی پستان کی خست**  
میں زخم ہو جانا۔ یہ زخم اکثر ورم کے پکنے اور پھوٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یا بدشویر الشدی (پستان میں پھسپوں) کے پیدا ہونے اور ان کے پک جانے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور کبھی خارجی رگڑ یا چوٹ سے پھلکر اس میں پیپ کے پیدا ہونے سے بھی ہو جاتا ہے۔

اگر زخم خراب متم کے نہیں ہوتے تو ان میں درد زیادہ نہیں ہوتا۔ اور انکی پیپ کا رنگ سفید اور اس کا قوام معتدل ہوتا ہے۔ اور اس میں زیادہ متعفن بو نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر زخم خراب متم کے ہوتے ہیں تو ان میں درد شدید ہوتا ہے۔ اور پیپ کا رنگ سرخی یا سیاہی مائل اور قوام گاڑھا یا گوشت کے دھوون کی طرح پتلا ہوتا ہے۔ اور اس میں بو متعفن ہوتی ہے۔ اگر انکی مرہم پٹی باقاعدہ نہ کی جائے اور وقت پر ان کی صفائی کا لحاظ نہ رکھا جائے اور پیپ زخموں کے اندر بھری رہے تو پستان کی تمام ساختیں گوشت بخونی رگیں۔ دودھ کی نالی وغیرہ گلنے لگتی اور زخم پھیلنے لگتے ہیں۔ زخموں کی یہ حالت خراب ہوتی اور کبھی خطرناک صورت اختیار کرتی ہے۔ اگر ایسے زخم تعداد میں زیادہ اور پستان کی ساخت تک گہرے ہوں تو انکی تکلیف سے

درد قائم مقام آئیوڈو فارم

دودھ کی سپیدائش میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ زخموں کی پیپ دودھ میں اسکو خراب و فاسد کرے۔ اس حالت میں بچہ کو دودھ ہرگز نہیں پلانا چاہئے۔

**اسباب (۱)** پستان کا ورم تحلیل ہونا اور اس کا بک جانا۔ پستان کی معمولی پھنسیوں کا بک کر پھوٹنا۔ اور بے احتیاطی سے یا اخلاط کے فساد سے ان کا پھیل جانا (۲) کسی خارجی سبب پستان کا پھیل جانا اور فساد اخلاط کے سبب زخم کی صورت اختیار کرنا۔

**علامات (۱)** اگر بدنی اخلاط میں فساد نہ ہو تو زخموں کی حالت روز بروز درست ہوتی جاتی ہے۔ اور ان میں درد کی تکلیف زیادہ نہیں ہوتی (۲) اگر خون میں خرابی موجود ہو، تو زخموں کی حالت خراب ہوتی جاتی ہے۔ درد ہوتا ہے۔ اور زخم پھیلے جاتے ہیں۔ پیپ متعفن اور تیلی یگاڑھی اور خراب قسم کی ہوتی ہے۔

**علاج**۔ اگر زخم خراب قسم کے نہ ہوں تو انکے لئے مرہم کمیلہ کو پاں پر رکھ کر گرم کر کے زخم پر لگانا کافی ہوتا ہے۔ اور اگر زخم تر زیادہ ہوں تو ان کے لئے یہ دوا مفید ہے۔

صفیہ مرکبی۔ انزوت۔ ایلوہ ہر ایک ۶ ماشہ۔ کندرا ایک تولہ۔ سب کو غبار کی طرح باریک پیس کر چھان رکھیں اور اس میں سے قدرے نیکر زخموں پر چھڑکیں۔ اس سے زخم بہت جلد مدمل ہوتے اور ان کی رطوبت خشک ہو جاتی ہے۔ اسکے علاوہ سفیدہ کا شغری صرف بھی اندمال زخم کے لئے مفید ہوتا ہے۔ اگر زخم خراب قسم کے اور پھیلنے والے ہوں تو ان کے واسطے صرف مرہموں کا استعمال کافی نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ان کے ساتھ ہی پینے کے لئے مصفی خون اور مسکن حدت دوائیں بھی دینی چاہئیں۔ اگر مرہم کا مزاج گرم ہو تو اس غرض کے لئے کعبہ سہدانہ ۳ ماشہ۔ شیرہ عذاب ۵ ماشہ۔ عرق مرکب مصفی خون ۱۰ تولہ۔ شربت نیلوفر ۲ تولہ حل کر کے پلانا چاہئے۔ اگر تنقیہ کی ضرورت ہو تو نفوق شاہترہ بارد پلائیں اور قلع مادہ کے بغیر بخ فلتیون سے تنقیہ کریں۔ اگر مرہم کا مزاج گرم نہ ہو تو عرق عشبہ ۵ تولہ میں نبات سفیدہ ۲ تولہ حل کر کے اور اس کے ساتھ معجون عشبہ ۹ ماشہ کھلائیں

**نسخہ مرہم کا فوری** جو کہ پرانے زخموں کو جلد بھر لاتا ہے بموم سفیدہ ایک تولہ کو روغن اسی ۲ تولہ میں لگا کر سفیدہ قلعی ایک تولہ کا فورس ماشہ باریک میکس خوب ملائیں اور حبیہ سرد ہو نیکی قریب پہنچے تو اٹھ

کی سفیدی ایک تولہ اس میں ملا کر اس قدر گھوٹیں کہ سب مل کر ایک ذات ہو جائیں۔ اگر حنوں میں  
آتشکی فتنہ موجود ہو تو زحمنوں کے لئے یہ مرہم بہت مفید ہوتا ہے **صفتہ**۔ روغن گاؤدہ تولہ  
میں موم سفید ۲ تولہ لکڑا کر اس میں پاؤہ مصفی ۹ ماشہ۔ شنگرف۔ مردار سنگ۔ کتھ سفید  
ہر ایک ۶ ماشہ باریک پیس کر ملائیں اور اس کا چھایہ زخم پر رکھیں۔ مرصعہ کو غذا ہلکی اور جلد ہضم ہونے  
اور عمدہ خون پیدا کرنے والی دینی پاسٹ۔ اور ہدایت کرنی چاہئے کہ یادہ چلنے پھرنے اور دیر تک  
بیٹھی رہنے سے پرہیز کرے۔ اکثر اوقات لیٹرریٹی رہنا بہتر ہوتا ہے۔

**فصل سترھویں۔ ناسور الشدیدی (سائٹس آف دی میمری) یعنی پستان کی**  
ساخت میں ناسور پیدا ہو جانا۔ یہ زخم نہایت ہی خطرناک اور مشکل سے جانے والا ہوتا ہے۔ معمولی  
زحمنوں سے اس کی حالت بالکل جداگانہ ہوتی ہے اور اس میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں  
جو کہ دیگر معمولی زحمنوں میں نہیں پائی جاتیں۔ مثلاً اس میں درد اور میٹیں اور دیگر لکھا لہٹ  
اکثر نہیں ہوتیں۔ کیونکہ اس کا مادہ اپنے قریب والی ساختوں کی قوت حس کو بالکل زائل کر دیتا  
ہے۔ اس وجہ سے تکلیف کا احساس بالکل نہیں ہوتا۔ اوپر سے تو اس کا منہ نہایت ہی  
تنگ ہوتا ہے۔ لیکن مسدود رہ کر ہوتا جاتا ہے اس قدر گوشت کو گلا کر کھپاتا جاتا ہے۔ اگر اس کا  
باقاعدہ اور جلد علاج نہ کیا جائے تو یہ نہایت آہستہ کے ساتھ اپنا پھیلنا جاری رکھتا ہے۔ اور  
پستان کی گہری ساختوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر اس حالت میں شدت تکلیف کے  
سبب مرصعہ لاغر اور ضعیف ہو کر زندگی سے بیزار ہو جاتی ہے۔ ناسور کا خلا اگر سپردھا  
ہوتا ہے تو اس کے دھونے اور صاف کرنے اور دوا پہنچانے میں سہولت ہوتی ہے۔ لیکن  
اگر ناسور کا خلا اذر سے چھپا۔ اور ٹیڑھا ہوتا ہے تو اسکے علاج میں نہایت دشواری ہوتی  
ہے۔ اسی وجہ سے مشکل سے اچھا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیشہ خراب اور متعفن رطوبت بہتی رہتی  
ہے۔ اس رطوبت کا کوئی خاص رنگ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ رطوبت جن زخمی ساختوں کے  
گلنے سے پیدا ہوئی ہے۔ ان کے رنگ کے موافق اس کا رنگ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا  
بھی ہوتا ہے کہ ناسور میں سے کوئی چیز نہیں بہتی۔ بلکہ بالکل خشک ہوتا ہے۔ اور اس خشکی کے اثر  
سے آس پاس کی جلد بالکل شرمردہ معلوم ہوتی ہے۔ اطباء نے لکھا ہے کہ اگر فروج کی صفائی وغیرہ



کا خیال نہ رکھا جائے تو چالیس روز کے بعد ناسور کی مسورت اختیار کر لیتے ہیں۔


**اسباب** (۱) معمولی زخموں کے علاج میں انکی صفائی و غیرہ کا خیال نہ رکھا جائے (۲) کسی بھپوڑے کا منہ ظاہر نہ ہونا۔ اور اس میں شگاف نہ دینے کے سبب سے اس کی پیپ نکالنا نہ رہ کر اندرونی ساخت کو گلانا (۳) بعض اوقات کسی دل کے شگاف دینے میں اگر نمبر معمولی سستی یا دیر کی جاتی ہے۔ یا شگاف ضرورت سے کم چوڑا دیا جاتا ہے یا بالکل نہیں دیا جاتا تو بھی ناسور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے تیز مواد اندر کی ساخت کو گلانا شروع کر دیتے ہیں (۴) بھپوڑے کو چیرنے میں اس بات کا لحاظ نہ رکھنا کہ زخم کی پیپ آسانی سے بہ کر خود بخود نکلتی رہے۔ اور زخم ہر وقت صاف رہ سکے (۵) مریضہ کے خون میں ایسی خرابی موجود ہونا جس سے زخم کا اندام دشوار ہو جائے جیسا کہ خون میں خنازیری زہر کے موجود ہونے یا کسی دوسرے مرض کے جڑ پکڑنے سے اکثر ہوتا ہے

**علامات** (۱) زخم کا منہ چھوٹا ہونا اور گہرائی میں اس کا خلا زیادہ ہونا (۲) خراب قسم کی ریم اسے اکثر جاری رہنا (۳) اسباب مرض کا پہلے واقع ہونا۔

**علاج**۔ اندام ناسور کے لئے مرہم کا فوری نہایت مجرب ہے۔ اس کے علاوہ مرہم **مصری** کا استعمال بھی مفید ثابت ہوتا ہے **صفقتہ**۔ سرکہ خالص۔ شہد۔ ہر ایک ۳ تولہ۔ دونوں کو ملا کر پکائیں جب قوام ہو جائے تو زنگار ۶ ماشہ۔ انزروت ایک تولہ باریک پس کر اس میں ملائیں اور تہی کے ذریعہ سے ناسور میں رکھیں۔ اسی مرہم بھی نافع ہے **صفقتہ**۔ موم خالص ۶ ماشہ۔ روغن گل ۲ تولہ۔ مردار سنگ۔ ملہری ہر ایک ایک تولہ۔ دونوں کو باریک پس کر سب کو ملائیں اور قدرے پانی ڈال کر اس قدر پکائیں کہ مرہم تیار ہو جائے۔ اگر مریضوں کے استعمال سے ناسور منڈل نہ ہو سکے تو اول سلاخی سے اس کی گہرائی معلوم کر کے گول ٹوک کے شتر سے اس قدر شگاف دیں کہ اس کے اندر مواد جمع نہ ہو سکے۔ اور اس کا دھونا اور اس کے اندر دوا پہنچانا آسان ہو جائے۔ پھر معمولی زخموں کی طرح مرہم پیڑ کریں اور اس بات کی احتیاط رکھیں کہ زخم اندر سے منڈل ہونے سے پہلے اس کا منہ تنگ نہ ہونے پائے تو اس پر ہے کہ اس تدریس سے پھر زخم ناسور نہ ہو سکے گا۔

سلہ یعنی مواد متعفنہ کے اجزائے صغیرہ جو سڑنے والی حرارت کے اثر سے خوردبینی مشابہہ کیفیت میں بدل گئے ہیں۔

(تصویر نمبر ۱۰۶: زہر اللہی کی)



**فصل اٹھارھویں۔** سلحۃ اللہی (چیمز آف میمری) یعنی پستان میں رسولی کا پیدا ہونا۔ یہ ایک ورم نما اٹھا رہتا ہے جو کہ پستان کی جلد کے نیچے پلنی مادہ کے جمع ہو جانے اور وہاں پر غلیظ ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ رسولی میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ گوشت سے بالکل علیحدہ ہوتی اور محض اوپر جلد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اسلئے اگر ہم اس کو ہاتھ سے پکڑ کر مختلف اطراف میں حرکت دلا نا چاہیں تو وہ نہایت آسانی کے ساتھ چاروں طرف کو حرکت دے سکتی ہے۔ یہ رسولی ابتدائی حالت میں چھوٹی ہوتی ہے۔ چنانچہ زیادہ سے زیادہ چنے کی مقدار سے شروع ہوتی ہے۔ اور آخر بالا مرتبہ وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ تو پستانوں پر بد نما ہونے کے علاوہ اپنے دباؤ کی وجہ سے دودھ کے راستوں کو بند کر کے دودھ کی رکاوٹ۔ اور ان تمام شکایات کی باعث ہوتی ہے۔ جو اس رکاوٹ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ کبھی پستان میں دودھ کے متعفن ہونے اور ورم پیدا کرنے تک نوبت پہنچتی ہے۔ یہ ایک خاص جھلی سے ملحق ہوتی ہے۔ جو چاروں طرف سے اس کو گھیرے رہتی ہے۔ اور تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے۔

کہ دشکاری کے وقت جب تک وہ جھلی بالکل نکال نہیں دی جاتی ہے۔ رسولی کے دوبارہ پیدا ہونے کی طرف سے اطمینان نہیں ہو سکتا۔

رسولی بعض اوقات زیادہ سخت ہوتی ہے اور کبھی نرم ہوتی ہے۔ چونکہ سخت رسولی کا مادہ زیادہ غلیظ ہوتا ہے۔ اسلئے کہ دشکاری سے علاج پذیر ہوتی ہے اور اسکے علاج میں جب تک پورے طور سے توجہ نہ کی جائے۔ اس وقت تک خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوتی۔ علاوہ بریں اسکے دبائے سے ایک قسم کا درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ لیکن نرم رسولی میں یہ بات بالکل نہیں ہوتی۔ اور وہ سخت رسولی کے مانند زیادہ دیرینہ علاج کی بھی محتاج نہیں۔

**اسباب (۱)** ایک مدت تک ایسی غذائیں کھانا جن سے بلغم غلیظ کی پیدائش زیادہ ہو۔ (۲) ریاضت کم کرنا اور خون میں بلغم کا غلبہ (۳) پستان کی جلد کے نیچے بلغم غلیظ کا جمع ہونا (۴) مقامی حرارت کے اثر سے یعنی مادہ کا گاڑھا ہونا۔ اور پھر رسولی کی صورت اختیار کرنا۔

**علامات (۱)** اسباب مرض کا پایا جانا (۲) پستان کی جلد کے نیچے گوٹری پیدا ہو کر بہت دیر تک افزائش پانا۔ اور درد نہ ہونا۔ رسولی کو اگر ہاتھ سے کپڑا کر حرکت دی جائے تو جلد کے نیچے کچلی پر بخوبی پھیلتی ہوئی معلوم ہونا۔

**علاج** اول چند روز تک منصفیات بلغم پلا میں اور جب مادہ میں نفع ہو جائے تو سہل بلغم کے ذریعہ سے تنقیہ کرائیں۔ اس کے بعد رسولی پر ایسے قوی تاثیر ضد گھائیں جن سے رسولی کا مادہ تحلیل ہو جائے اور اگر ان سے فائدہ نہ ہو تو آخری دو تدبیروں میں سے کوئی سی اختیار کریں (۱) مشت صابون ہر ایک ۶ ماشہ۔ زیرخ سرخ چونہ بے بھجا ہوا۔ خاکستر۔ بیخ کرب۔ ہر ایک ۴ ماشہ۔ سب کو باریک پیس کر روغن گل میں ملا کر صفا کریں۔ اس سے رسولی بھوٹ کر اس کا مواد خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر کا غلاف بھی گل کر کھل جاتا ہے اور تحلیل ہو جاتا ہے۔ لیکن مریض کو تکلیف زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے (۲) یا شکاف دیکر رسولی کو نکالنا پڑتا ہے۔ اس میں جراح کو یہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ رسولی کے گرد کا غلاف باقی نہ رہ جائے۔ ورنہ غلاف میں پھر مواد جمع ہو کر دوسری ہی رسولی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلئے رسولی کے اوپر کی جلد میں شکاف دیتے وقت خیال رکھیں کہ نشتر غلاف میں نہ لگے۔

**فصل انیسویں۔** خنازیر الشدھی (اسکرافیس المراف میا) یعنی پستانوں کی ساخت میں خنازیری زخم ہونا۔ ان زخموں کی ابتداء اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے ایک خاص قسم کے فاسد بلغمی مادہ سے گردن اور سینہ کے غدوں میں ورم پیدا ہوتا ہے۔ جو کہ نہایت مشکل سے تحلیل ہوتا اور کبھی یک جاتا ہے۔ پھر ورم کے پکنے سے جو غدود زخمی ہو جاتے ہیں۔ ان کے زخموں کا اندام دشوار ہوتا ہے۔ خنازیری ورموں کے پیدا کرنے والے مادہ میں ایک خاص قسم کا فساد ہوتا ہے جو رسولیوں کے پیدا کرنے والے مادہ کی بہ نسبت نہایت مشکل سے اصلاح کو قبول کرتا ہے۔ ہیوجہ سے خنازیری ورم کا تحلیل ہونا بہ نسبت رسولیوں کے زیادہ دشوار ہوتا ہے

خنازیری ورم کبھی تو گردن کی جڑ کے ایک یا دو غدودوں میں شروع ہو کر قرب وجوار کے دیگر غدودوں میں بتدریج پھیلتا ہے۔ اور کبھی شروع سے ہی بہت سے غدودوں پر حملہ کر کے یکا یک پھیل جاتا اور بہت جلد گردن سے نعل اور سینہ تک غدودوں کو مبتلا کرتا ہے پھر اگر وہ ورم علاج سے تحلیل نہ ہو تو اس کے پکنے سے غدوں میں خراب قسم کے زخم پیدا ہو جاتے ہیں جو ایک مدت تک بہتے رہتے اور آخر میں ناسور بن جاتے ہیں۔

**اسباب** (۱) خون میں ایک خاص قسم کے فاسد اور غلیظ بلغمی مادہ کا موجود ہونا (۲) غلیظ اور دیرینہ اور خراب غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا (۳) غذا کا اچھی طرح سے مضغ نہ ہونا۔ اور عمدہ اخلاط کی پیدائش میں خلل واقع ہونا (۴) تنگ مکان میں سکونت کے سبب سے تازہ اور شام ہوا اور دھوپ کا طبع نہ ہونا (۵) مرض سل یا اس کی استعداد بدن میں پایا جانا۔

**علامات** (۱) مریض کو اکثر اشتہا زیادہ اور اس کا مضغ اکثر خراب رہتا اور مریض شکم کی شکایت ہوتی ہے (۲) اس کا خون رقیق اور عضلات ڈھیلے اور کمزور ہوتے ہیں (۳) مریض لاغر و نازک لگتا ہے (۴) مریض سفید رنگ۔ سینہ فراخ ہوتا ہے (۵) اسے مرغن چیزوں کے کھانے سے نفرت ہوتی ہے (۶) اگر مریض بچہ ہو تو اس کی پرورش بدنی میں خلل ہوتا اور بلوغ میں تاخیر ہوتی ہے۔

**علاج** اس مرض کا نام خنازیر اسلئے رکھا گیا ہے کہ (۱) یہ مرض اکثر خنزیر کو ہوتا ہے (۲) یا سطح خنزیر نہایت سخت ہوتا اور شکل سے مارکھانا یا قابوس آتا ہے۔ یا سطح مریض بھی شکل سے علاج پذیر ہوتا ہے (۳) یا سطح کہ خنزیر اپنی گردن کو پھیر نہیں سکتا ہے۔ یا سطح اس مرض میں بھی مریض اپنی گردن کو پھیر نہیں سکتا ہے۔ (۴) مولف

**علاج (۱)** مرضین کے بدن سے خازیری فاسد مادہ کو نکالنے کے لئے سب سے پہلے منفجیات بلغم اور صفیات خون پلا کر سہل دیں۔ یا قے سے تنقیہ کرائیں اور تنقیہ کے بعد اطریفل غدیدی کھلانا مفید ہوتا ہے (۲) خازیری ورم اگر یکینا شروع نہ ہوا ہو تو بعد تنقیہ بدن کے یہ صنماد محسل نقائیں صفتہ زفت رومی غنصل مقل۔ ترمس جدوار اہلی۔ یخ کبر۔ یخ کرنب۔ اشق۔ زراوند۔ طویل۔ ہر ایک ۶ ماشہ کوٹ چھان کر سرکہ خالص ۶ ماشہ۔ شہد خالص ایک تولہ۔ روغن زیت۔ روغن غنجل ہر ایک ایک تولہ میں ملا کر صماد کریں۔ (۳) ایضاً یخ سوسن باریک پس کر مرہم دھلیون میں ملا کر صماد کرنا بھی مفید ہے۔ اسی طرح مرہم رسل بھی فائدہ کرتا ہے (۴) غذا لطیف اور جلد بھضم ہونی چاہیے۔ حقوڑی مقدار میں دیں (۵) شکم خالی ہونے کے وقت مناسب ریاضت کرائیں۔ اور توشیوں اور غلیظ غذاؤں سے پرہیز کرائیں۔

**اگر ورم یکنے لگے۔** تو یہ صماد مفید ہوتا ہے صفتہ تخم اسی تخم کنوچہ تخم میٹھی۔ یخ سوسن آسمانی رنگ کی۔ ترمس ہر ایک ۶ ماشہ۔ سب کو نہایت باریک پس کر چھان لیں۔ اور کبوتر کی سفید بیٹ ایک تولہ اس میں ملا کر آب یخ کرنب میں ملا کر نیم گرام صماد کریں۔ اور جب ورم یک کر پھوٹ جائے تو صفائی زخم اور اند مال کے لئے مرہم رنگار کا چھایہ لگائیں۔ اگر ناسور ہو گئے ہوں تو ان کا علاج حسب قاعدہ کرنا چاہئے۔ نوٹ ہے۔

**فصل بیسویں جراحۃ حلمۃ الشدی (سوری نپل) یعنی سر پستان میں زخم ہونا** اس مرض میں کبھی تو سر پستان کے اوپر کی باریک جلد چھل جاتی ہے۔ اور کبھی اس میں باریک شکاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کو شقاق حلمۃ الشدی (ایکس کورلشن آف می نپل)

کہتے ہیں۔ ہوس یا راور اعمال جراحی میں مہارت رکھنے والے ڈاکٹر خازیری کلٹیوں کو چیر کر نکال دیتے ہیں۔ اگر تمام غدود مبتلا مرض بالکل نکال دئے جائیں تو مرہن کو انکے مصائب نجات بھی مل جاتی ہے۔ لیکن اس دستکاری میں نہایت چابکدستی اور فن تشریح سے پوری دقت لازم ہے۔ کیونکہ بعض قدیم اطباء نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے خازیر کو چیر کر نکال لیا تھا۔ اور پچھلے کی ایک شاخ کٹ جانے سے فوراً مرہن کی آواز باطل ہو گئی۔

**میرے نزدیک** یہ دستکاری ان مقامات میں سے کہیں کی گئی ہوگی جہاں خجزہ کی طرف جانے والے باریک اعصاب گزرتے ہیں۔ اور انہی میں سے کوئی عصب تقا کاٹ گیا ہوگا۔ (۱۲ مؤلف)


کہتے ہیں۔ اس حالت میں دودھ پلاتے وقت عورت کو نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی سر نستان کے متورم سوجھانے تک ذہبت پہنچتی ہے۔

**اسباب** (۱) خون میں حدت یا آتشکی فساد موجود ہونا (۲) مزاج میں زیادہ گرمی پایا جانا (۳) عام اعضا کی ساخت اور خصوصاً سر نستان کی جلد کا زیادہ نازک ہونا (۴) دودھ پینے والے بچہ کا مزاج زیادہ گرم ہونا۔ یا اس کے خون میں آتشکی فساد پایا جانا (۵) بچوں کے دانتوں سے یا دیگر خارجی اسباب سے بھی سر نستان میں کبھی زخم ہو جاتا ہے۔

**علامات** (۱) حدت خون یا آتشکی فساد یا حرارت مزاج کی علامات پایا جانا (۲) ساخت اعضا کی کیفیت کا مشاہدہ (۳) دودھ پینے والے بچہ کی حالت (۴) دودھ پینے والے بچہ کے دانتوں کے نشانات یا دیگر اسباب کا پایا جانا۔

**علاج**۔ اگر مریضہ کے خون میں حدت یا اس کے مزاج میں حرارت ہو تو اس کا اور اگر بچہ میں یہ اسباب پائے جائیں تو اس کا مناسب ادویات سے علاج کرنا چاہئے۔ اس طرح آتشکی فساد جس کے بدن میں پایا جائے اس کے لئے مناسب ندریغیل میں لائی جائیں۔ اس کے علاوہ مقامی علاج اس طرح کرنا چاہئے۔ کہ اگر سر نستان کی جلد قدرے پھل گئی ہو، یا اس کے پھل جانے کا اندیشہ ہو تو ٹھنڈی ماسٹہ۔ گلاب، تولہ میں یا صرف پانی میں حل کر کے سر نستان کو رات کے وقت ہمیشہ اس سے دھولیا کریں۔ اور اس کے بعد روغن زیتون لگا دیا کریں۔ سر نستان پر بالک کپڑا رکھ کر بچہ کو دودھ پلانا چاہئے تاکہ اس کے مسوڑھوں کی رگڑ سے زخم نہ ہونے باقی رہا۔

تصویر نمبر ۱۰۷۔ آلہ مصاصۃ اللبن کی



آلہ مصاصۃ اللبن کے ذریعہ سے دودھ پلائیں۔ اگر سر نستان میں زخم ہو گئے ہوں۔ تو سہاگہ کے پانی سے یا عرق سیبہ محلول (لڈ لوشن) سے دھو کر سہاگہ اور شہد لگانا چاہئے۔ اسی طرح مرہم سفیدہ کا شغری یا مرہم کبلیہ بھی مفید ہے۔

ایسی حالت میں بچہ کو بار بار دودھ پلانا نہیں چاہئے۔ اور ہر مرتبہ دودھ پلانے کے بعد نستان کو سہاگہ کے پانی سے دھو کر مرہم لگانا چاہئے۔ ان زخموں کے لئے یہ نسخہ بھی مفید ہے

صفقتہ گلیسرین آف ٹین سم ڈرام۔ سلفیورک ایسڈ سم ڈرام۔ پانی ایک اولنس۔ سب کو ملا رکھیں اور ایک ککڑا لٹ کا اس میں تر کر کے مقام ماؤنٹ پر رکھیں۔ کھانے پینے میں بھی گرم چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

**فصل کیسویں۔** ورم حلیۃ الثدي (مٹائی لٹ) یعنی سرپستان میں ورم پیدا ہو جانا۔ کبھی سرپستان کے کھل جانے کے بعد بچہ کو دودھ پلانے میں اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ اس طرف دوران خون تیز ہو کر ورم پیدا کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے خون کا فساد اسکا موجب ہوتا ہے۔ یا بچہ کے بدن میں تفکی فساد اور اسکے منہ کی گرمی سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

**اسباب (۱)** سرپستان کا کھل جانا اور اسکی دائمی تکلیف (۲) خود مرہینہ کے خون کا فساد (۳) دودھ پینے والے بچہ کے بدن میں آتشکی زہر کا موجود ہونا۔

**علامات۔** اسباب مرض کا وجود اور سرپستان میں سُرخی۔ جلن۔ ٹپس کا درد موجود ہونا۔

**علاج۔** تمام دہی تمام تدابیر کرنی چاہئیں۔ جن کا بیان ورم الثدي کی بحث میں گذر چکا ہے۔ اور اگر جدوار اصلی آب مکوہ سبز میں گھس کر صنماد کیا جائے۔ تو اس سے ورم بہت جلد تحلیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اکثر کٹ بلاڈونا قدرے گلابی سُرین میں ملا کر صنماد کرنا بھی مفید ہے لیکن مرہینہ کو یہ ہدایت ضرور کرنی چاہئے کہ بچہ کو دودھ بذریعہ آلہ مصفاۃ اللبن (نپل پمپ) کے ہمیشہ پلایا کرے۔ تاکہ بچہ کی منہ کی گرمی اور اس کے مسوڑھوں کا دباؤ

سَرِ پِ ستان پر

نہ پڑے

!

والخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

# تعارف

مؤلف کتاب ہذا حکیم سید عبدالرزاق بن حکیم سید غوثید علی  
 متوطن چاند پور ضلع بجنور، خاندانی حکیم تھے۔ آپ یونانی و ڈاکٹری  
 دونوں علوم میں ماہر تھے۔ اور فن تشریح میں تو آپ ڈاکٹروں میں  
 بھی ممتاز تھے۔ زمانہ طبیبہ کالج دہلی کی بنیاد آپ ہی کی کوشش کا نتیجہ  
 آپ ”مسح الملک“ دام فیوضہ کے طبی علوم میں دست بازو تھے  
 آپ کی خواہش کے مطابق مدرسہ طبیبہ ترقی کر کے طبیبہ کالج بنا۔ آپ  
 فانی الطب تھے۔ مجدد طب تھے۔ آپ کا خیمہ بھی طبی درسگاہ سے  
 بنا تھا۔ چنانچہ تیس سونتیس سال طبیبہ مدرسہ قدیم و طبیبہ کالج مردانہ و طبیبہ  
 کالج زنانہ کی خدمات پوری کر کے راہی ملک بقا ہوئے۔ اور آپ کا رزاق اس  
 طبیبہ کالج ہی میں بنا۔

احسان علی قادری

پروفیسر کلیات و معالجات

طیبہ کالج دہلی



# انتساب

بنام نامی واسم گرامی بندگان عالی متعالی علیا حضرت قوی شوکتہ  
فلک کاب، گردوں جناب، ہنر پرور، عدل گستر، سر آرائے تخت جہانبانی  
زینت افزائے مسند شاہجہانی، فریدیوں اقبال، سکندر جلال، بلقیس مثال  
نوشا بہ خصال، قدردان فیض رساں، زائرۃ الحرمین الشریفین حضور پر نور

ہنرمائس نواب سلطان جہاں بیگم صاحبہ

جی۔ سی۔ ایس۔ آئی۔ جی۔ سی۔ آئی۔ اے۔ سی۔ آئی۔

فرمان فرمائے دارالاقبال۔ ریاست لازوال بھوپال خلد اللہ ملکها وحشمتها  
وشوکتها

حکیم عبدالرزاق

معلم تشریح طبیبہ کالج مردانہ دکنچرا طبیبہ کالج زنانہ

دہلی

# ساریفکٹ

از علیحباب حضرت استاذی حاذق الملک بہادر دام اقبالہ

مجھے نہایت مسرت ہے کہ میرے شاگرد حکیم سید محمد عبدالرزاق صاحب معلم تشریح طبیبہ کالج دہلی نے میری منشا کے موافق کتاب معالجات امراض نسواں کو نہایت محنت اور جانفشانی سے تالیف کر کے بالقصور چھپوایا ہے۔ مؤلف نے اس کتاب میں طب یونانی کے مضامین کو موجودہ زمانہ کے مذاق کے موافق اس طرح ترتیب دیا ہے کہ طب قدیم کے مصطلحات اور اسمائے امراض کو عربی میں لکھ کر ان کے بالمقابل فن ڈاکٹری کے مصطلحات درج کئے ہیں۔ اس طریقہ کی تالیفات میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ عربی طب جاننے والے اصحاب طب مغربی کے مصطلحات سے اور انگریزی طب جاننے والے اصحاب طب مشرقی کے مصطلحات سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔

اب میں اجازت دیتا ہوں کہ اس کتاب کو مدرسہ طبیبہ زنانہ کے تعلیمی کورس میں داخل کیا جائے امید ہے کہ طالبات مدرسہ اس کتاب سے بہت فائدہ اور کثیر معلومات حاصل کریں گے۔ نیز میری یہ بھی خواہش ہے کہ دیسی اطباء بھی اس کتاب کو ملاحظہ فرما کر مؤلف کی محنت کی ضرورت اور دستخط محمد اجمل (حاذق الملک)

## اعلان

جملہ حقوق کاپی رائٹ کتاب تسلیم القابلہ معالجات  
بذریعہ رجسٹری بحق مؤلف محفوظ ہیں